

Alphonse



12

20

C

29

PETRI FORESTI
ALCMARIANI
OBSERVATIONVM
ET CVRATIONVM
CHIRVRGICARVM

Libri quinque,
DE
TVMORIBVS
PRÆTER NATVRAM:

Cum SCHOLIIS: in quibus eorum cause, signa,
prognoses, ac curatio graphicè depinguntur.



mar.

EX OFFICINA PLANTINIANA
RAPHELENGII,
CL^o. 1^o. 6X.



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

LECTORI

Rei Chirurgicæ studioſo.



MAGNUS Clarissimus vir D. PETRVS FORESTVS, pia memoria, rem omnem medicam triginta suis Observationum ac Curationum Medicinalium libris ita enucleatè atque absolutè pertractasset, vt medicina studiosos panè ab vnguiculis formasse, & ad culmen doctrina prouexisse videretur; ne quicquam tamen à quoquam desideraretur, huc perfectam Rei Chirurgicæ tractationem adiungere etiam voluit: quippe cum videret Chirurgiam neutiquam à medico ac physico esse alienam, quin potius à Therapeutica non aliter quam partem à toto differre: vsque adeò vt vix Chirurgia sine medici scientia, ac propemodum vix Medicina sine chirurgi operatione esse aut cogitari possit. Scripsit itaque hos quinque de Tumoribus præter naturam libros, quos nunc damus, hac serie:

LIB. I. De tumoribus præter naturam sanguineis.

LIB. II. De tumoribus præter naturam biliosis.

LIB. III. De tumoribus præter naturam pituitosis.

LIB. IV. De tumoribus præter naturam melancholicis.

LIB. V. De tumoribus præter naturam mixtis seu compositis.

Idq; eodem planè ordine, ac contextu, quem in Observationum suarum Medicinalium libris accuratè seruauit: nempe Observationes, seu Experimenta, Scholiis, id est, Praxin Theoria, & euentum rationi præmittendo: vt ita rationem experimento confirmans, ac experimentum ratione fulciens, Artis dogmata comprobaret;

vet. medicinæq; præstantiam declarando, tirones ad vera
artis arcana duceret, adytâq; ac mysteria tanta Dei
beneficentiæ largâ manu studiosis omnibus pande-
ret & reseraret. In qua re spero te tanti viri operam
hilari fronte ac grato animo suscepturum, Beniuole Le-
ctor, haud secus ac reliqua eius scripta consueuisti. Ean-
dem enim diligentiam in hisce quinque libris animad-
uertere poteris, quam in aliis de Febribus ac reliquis in-
ternis morbis tantopere laudasti & admiratus es.
Quamuis enim inter posthumos eius sætus hi libri ha-
beantur, quantum ad eorum editionem attinet; eos ta-
men per annos plus quàm viginti absolutos penes se
seruauit: ac simul cum aliis in lucem emittere potuisset,
si non maluisset singulos separatim edere, & sic paula-
tim ingenia studiosorum demereri, potius quàm copiam
omnium librorum simul ac confertim in lucem emissio-
rum eadem obtrudere, ac operum mole animos ipsorum
teneros à legendo detertere. Hoc solum in hisce libris
omissum est, quod singulis editionibus præmittere sole-
bat, nempe PROLEGOMENON aliquod, quo Lectores
suos ad lectionem librorum suorum introducere, eosq;
quodammodo præparare solebat, Sed non dubito quin
illud consulto ac studio ab eo in Chirurgico hoc Opere
prætermisum fuerit: præsertim cum in Scholiis, quæ sin-
gulis Observationibus suo more subnectit, omnia quæ
vniuersaliter Chirurgiam concernunt, ita copiosè ac di-
lucidè emucleata ab eo sint, ut nihil ampliùs Introdu-
ctionis vice, deesse aut desiderari videatur. Quare nihil
ultrà hisce libris præmittendum esse iudicauimus: nec
Forestiana purpuræ, obsoletos ac sordidos aliunde pe-
titos sentones affigere volumus. Vale igitur Beniuole
Lector: & his nobiscum frære.

CA.

CATALOGVS OBSERVATIONVM CHIRVRGICARVM,

horum quinque librorum.

Primus numerus notat Observationem, secundus paginam.

LIBRI PRIMI,

De tumoribus præter naturam sanguineis,

I. OBSERVATIO. De Apostemate calido, præter mentem & casu curato. 1.

II. De Apostemate circa regionem ventriculi, cum tumore exterius apparente. 5

III. De Apostemate seu inflammatione totius suræ, in abscessum transmutato. 12.

IV. De Phlegmone seu inflammatione in variis corporis partibus oborta. 24.

V. In qua ponuntur exempla puræ phlegmonis. 36.

VI. Exempla aliquot phlegmones illegitimæ curatæ. 55.

VII. De phygethlo sub alis apparente. 61

VIII. De phymate. 63.

IX. De furunculis, qui & dothiænes appellantur. 67.

X. De termintho tuberculo. 69.

XI. De carbunculo benigniore, in nate apparente. 70.

XII. In qua ponuntur exempla aliquot carbunculi malignioris, pestiferi, seu anthracis, etiamque bubonis. 77.

XIII. De gangrænâ ad sphacelum tendente. 87.

XIV. De esthiomene Aui-cenæ, seu sphacelo Græcorum, vel sideratione. 101.

XV. De Aneurismate 105.

XVI. De Epinyctidibus. 109.

LIBRI SECUNDI,

De tumoribus præter naturam biliosis,

I. De Erysipelate. 112.

II. De erysipellate puro. 120.

III. De erysipellate in cure. 127.

IV. De erysipellate phlegmonode & quasi postea credemstode, in corpore admodum senili. 135

V. De Herpete esthiomeno. 139.

VI. De herpete exedente, & de exulcerato. 150.

VII. De herpete miliari. 153.

viii. De phlyctænis in facie infantis cuiusdam appareptibus. 159.

ix. De Noli me tangere. 161.

x. De impetigine. 167.

xi. De serpigine atq. impetigine in crure, cum pustulis parvis erodentibus, atque fissuris. 170.

xii. De impetigine faciei. 173.

xiii. De lichene, impetigine & viceratione fœdâ intercurantâ. 178.

xiv. De specie lichenis seu impetiginis aut serpiginis, vulgari idiomate *Haerworm* dictâ. 185.

xv. De hydrois seu sudaminaibus. 188.

xvi. De ambustis. 190.

xvii. De combustis. 193.

xviii. De tactis igne aut aqua calidâ, vel qui cocturâ ignis, pulveris tormentarii, aut aquâ calidâ læsi fuerunt. 196.

LIBRI TERTII,

De tumoribus præter naturam pituitosis,

i. De œdemate. 203.

ii. De vero œdemate in femorē, lōgo tempore perdurante, & postea de illegitimo œdemate. 214.

iii. De apostemate venoso in genu. 224.

iv. De apostemate aquo-

so pedem circa iuncturas occupante. 230.

v. De hydrocephalo. 234.

vi. De hydrocephalo curato absque chirurgia. 240.

vii. De phlegmaticâ crescentiâ valde magnâ instar nattæ vel tælpæ aut strumæ, vel potius hydrocephali, in collo posteriori circa nucham apparente in infante puella duorum mensium. 245.

viii. De glandulâ, ac etiam de nodo. 261.

ix. De ganglio. 266.

x. De strumis seu scrofulis. 270.

xi. De quodam scrofulam habente in collo. 285.

xii. De steatomate, atheromate, & meliceride. 295.

xiii. De Bronchocele, bocio, seu herniâ gulæ. 302.

LIBRI QUARTI,

De tumoribus præter naturam melancholicis,

i. De duritie quadâ scirrhusa sub poplite, post malignorum ulcerum curationem manente. 308.

ii. De apostemate duro lapideo, scirrhuso, in femore, crure & genu. 314.

iii. De scirrhuso legitimo, non tamen exquisito. 320.

iv. De phlegmone scirrhusa in scirrhum illegitimum, & non exquisitum, seu

seu in duritiem lapideam
mutata. 324.

v. De cancro non vlcera-
to in mamilla dextra. 328.

vi. De cancro vicerato in
mamilla dextra, qui postea
mortem intulit. 344.

vii. De elephantiasi & le-
pra Arabum. 350.

viii. De præservatione à
lepra Arabum, de qua suspi-
cio erat. 379.

ix. De lepra Græcorum,
(quæ quibusdam probatis
autoribus deterrima species
impetiginis est) per mo-
dum consultationis, pro
puella octo annorum nobi-
lissima. 391.

x. De verrucis. 398.

xi. Per modum consulta-
tionis, de verrucis in virga
& aliis locis, ad Petrum
chirurgum Brielensem. 407.

xii. De clauo in digito
pedis, per modum consilii,
pro fratre meo Iacobo Fo-
resto, cum Louanii medi-
cinæ operam daret. 411.

LIBRI QUINTI,

*De tumoribus præter na-
turam mixtis,*

i. De maculis quibusdam
plumbeis, ad cineritium
colorem tendentibus, exte-

rius in cute apparentibus,
414.

ii. De morphea, cutis-
que defœdatione maculo-
sa. 416.

iii. De vitiligine. 423.

iv. De lentigine & pan-
no faciei. 433.

v. De lichene. 437.

vi. De parotide. 439.

vii. De varis seu ionthis,
aut cossis vel pustulis appa-
rentibus in facie: per mo-
dum consultationis. 442.

viii. De pustula quadam
elata ad magnitudinem fa-
bz Ægyptiacæ in genâ sub
oculo. 449.

ix. De pruritu totius cor-
poris. 453.

x. De scabie: in qua po-
nuntur multa exempla sca-
bici curatæ. 458.

xi. De scabie diuturna,
quæ per nouem annos du-
rauerat. 466.

xii. De diuersis speciebus
scabici curatis. 469.

xiii. De scabie humida,
& de scabie sicca, & de in-
ueterata, fœda, cum diuer-
sis exemplis. 479.

xiv. De malo mortuo.
484.

xv. De pernionibus. 487.

xvi. De panaritio, seu
Græcorum paronychia.
488.

F I N I S.

AD LECTOREM.

LECTOR, reddisur hic tibi **FORESTI**.
 Na tractare tunc, quod inuenisti
 Distu lustra duo fuit colonus.
 Nequicquam graecolens palus Aueri,
 Et tristes nebulae, summaeque segnia,
 Tentarunt decus inquinare latum,
 Quod vini soles ensera fronte.
 Cum nondum niger hunc vorasset Orcus,
 Quo posset reparatier docebat.
 Quicquid non bene temperata Celi
 Peccares plaga, quatuorve quidquid
 Inconflantia corporum maligna,
 Quorum particula sumus, genusque
 Vel quodcumque mala lūi medullis
 Imis, visceribusque inambulet,
 At nunc spondet opem malo quod extra est,
 Quodque haud dissimulat cunctis pudica.
 Sed ne despicere quod tibi legendum
 Mittis mens pia pallidum ab umbris.
 Non artu minus hic, minusque cura,
 Quoquo lumina videris, videbis.
 Inque omni tibi pagina **FORESTI**
 Occurrat, subigētque te fateri
 Quod nil abstuleris sui *Brathrum*.
 Sed fortasse rogas, amice lector,
 Quare non tibi, dum fuit superstes,
 Hac donauerit. Id labori auctor
 Seruandum cineri suo putabat,
 Ne manes aliter forent inertes.
 O quam non fuit otiosa visa
 Illi, cui minus otiosa mors est!

Scribebat.

JOANNES FORESTIUS cognatus,
 Juris Doctor.

OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM CHIRVRGICARVM

Liber primus,

DE

TVMORIBVS

PRÆTER NATVRAM;

D. PETRO FORESTO Alcmariano,
auctore.

OBSERVATIO PRIMA.

*De apostemate calido, præter mentem &
casu curato.*



PAUPERCVLA quædam mulier
Alcmariana, cùm apostema cali-
dum in musculis pectoris exteriori-
bus haberet, quod ad abscessum
tendere videbatur; (erat autem
apostema rubrum elatum:) ad me
lotium deferri iussit: sed cùm de
abscessu is qui illud lotium deferebat, mentionem
nullam faceret, qui versùs axillam apparebat, & lo-
tium ipsum cùm esset boni coloris; ego de crudita-
te ventriculi indicabam: nuntius autem tantum-
modo dicebat agram in pectore laborare, de absces-
su tacens; ideò ego suspicabar asthma esse. Quare
imperavi, cùm pauperculæ lotium esset, vt radicem
A enulæ

2. OBSERVAT. CHIRURGICARVM
 enulæ campanæ in ceruisia communi decoqueret,
 atque ex ea omni manè biberet. Nuntius verò ra-
 dicem ipsam in ceruisia decoctam & confusam
 (vtrum perperam rem intellexerit, nescio) cùm re-
 uersus esset aposte nati externo applicuit, & præter
 opinionem rupto apostemate paupercula ipsa nul-
 lo adhibito alio medicamento curata fuit casu. Me-
 lius tamen est totius medicum ad agrum vocare,
 oblotij incertam coniecturam, ut de vtroscopis aliàs
 docuimus.

SCHOLIA.

Gal. 14. Me-
 rhod. cap. 12.

Vide Tagin-
 tium lib. 1. de
 tum-ribus
 præter natu-
 ram cap. 1.

CVM vsque ad canos etiam discenda sit sapientia, ut præ-
 ceptum Salomonis habet, quæ præ cæteris hominibus
 in arte sapientiæ exiisse diuina pagina testimonio accepimus:
 idcirco immensis nostris laboribus quos insursumus in libro no-
 stris Observationum & Curationum Medicinalium, etiam
 adiciemus Observationes alias CURATIONVM CHI-
 RURGICARVM nostrarum; quas ut ad finem quoque
 perducere valeamus, auxilium diuinum imploramus, idque vnius
 Dei opt. Max. qui vniuersa sapientiæ author existis. Incipie-
 mus autem de tumoribus præter naturam. Tamen si Apostoma-
 tis, id est, Abscessus nomen non sit ita generale, ut ipsius tumo-
 ris præter naturam (hoc enim nomine solam phlegmonem in
 pus versam, necnon atheioma, stentoma & meliceridem Græci
 ipsi comprehendunt) attamen vniuso receptum est, ut omnes tu-
 mores præter naturam in homine, cùm in satis euidentem molem
 attolluntur ex humorum naturalium influxu, Apostomata vo-
 centur. Diffinitio autem ipsius tumoris præter naturam seu apo-
 stematis ex Galeno talis colligi potest. Tumor præter naturam
 est incrementum, naturalem statum in corpore excedens; & le-
 sionem actionis inducens. Vel secundum Auicennam est agri-
 tudo composita ex tripli genere morborum; nempe ex interu-
 perie, mala compositione & vitæ solutione. Vel secundum
 Hali-abbatem, Apostoma est tumor præter naturam, in quo ali-
 qua materia repleta, & distendens est aggregata. Hanc diffini-
 tionem ex omnibus suis partibus consistere dicitur, nam tumor
 locus

locum generis occupat : præter naturam adiectum est , propter incrementum illud , vel corporis totius , vel particula alicuius , naturalem symmetriam seu naturæ habitum excedens , quod supra vel ultra naturam appellat Galenus. In quo est materia aliqua superflua humoralis ; vel ad humorem reducibilis , aggregata , propter tumores qui in fracturis & luxationibus conspiciuntur : in quibus non humor , aut substantia aliqua , quæ ad humorem reduci possit , tumorem committit , sed ossa quæ exstant. Postremò appositæ sunt hæc duæ particulae , replens & distendens , ut ostendatur tria morborum genera superius posita , in unum esse congregata , atque unius morbi essentiam constituere. Tumores autem eiusmodi quæ præter naturam dicuntur , in tres species à Guldono & à Ethicis scriptoribus solent dividui , in Apostemata , Pusulas , & Exituras. Apostemata vocant illi tumores maiores , in quibus materia ex qua creantur , magis quantitate peccat , quàm qualitate. Pusulas verò quasdam eminentias , seu minores tumores , quos & Borbor vocant Arabes : in quibus subit antia unde originem ducunt , qualitate magis , quàm quantitate peccat , molestia esse solet. At Exituras eos tumores vocant , quos Latini Abscessus , & Græci Apostemata nominant. Sed de nominibus (ut dicebat Galenus) non est curandum , modo de rei essentia constet. At Fernelius humorum præter naturam differentias distinguit quoque in tumores , tubercula , pustulas , sic scribens lib. 7. de exter. corpor. affectibus , cap. 1. Hi porro affectus qui corporis summa obsident , vel in ante prominent , vel eam excutiant , vel commaculant prominent , Tumor , Tuberculum , Pusula Tumor Tuberculo maior , & utroque minor est Pusula. Tumores sunt : phlegmone , phlegmon , bubo , phyma , erysipelas , (hoc enim & in humoribus recenseri solet) œdema , hydrocephalon , hydrocele , tumor flatulentum , scirrhus ganglion , bronchocèle , parotis , struma , cancer. Tubercula sunt : carbunculus , furunculus , termitum , glandula , nodus. Pusulae sunt : epinyctis , phlyctæna , ethymata , ephelides , hydroa , herpes , scabies , prurigo , lichen , psora , lepra , omniaque verrucarum genera , clavius , callus. Sunt præterea quæ cutim tantum commaculant : & sic cutis etiam vitia quædam nihil prominent , sed æqualia manent , nullâ asperitate : huiusmodi sunt maculae.

In lib. de tum. præter naturam cap. 1.

Apud notericos sunt tres species tumoris.

Apostemata. Pusula.

Exitura.

Tumores præter naturam differentia.

Tumores.

Tubercula.

Pusula.

quæcumque alieno colore hanc fœdant : ut vitiliginis species, lenticula; ecchymata, sugillata, stigmata, vibices. Quamobrem cum de omnibus externis malis etiam scripturi sumus, de his quoque omnibus dicemus. Alij verò Tumores omnes præter naturam diuidunt in flatuosos & humorales: flatuosi sunt, qui à flatuoso spiritu fiunt: qui spiritus quandoque sub cute, quandoque sub membranis circumossalibus, quandoque in intestinis, nonnumquam in medio horum & peritonæi colligitur: à Græcis Emphysemata, ab Arabibus Apostemata ventosa dicuntur. At Tumores humorales diuiduntur in simplices, aut impermixtos seu varios. Simples autem sunt aut calidi aut frigidi: calidi referuntur aut ad sanguinem, ut phlegmone; aut ad flauam bilem, ut erysipelas: frigidi verò ad pituitam, ut œdema; aut ad atram bilem, ut scirrhus. At permixti seu varij sunt, vel ex sanguine dominante bili, ut phlegmonæ erysipelatosa; aut ipsi pituita, ut phlegmone œdematosa; aut humori crasso, lentæque substantiæ, ut phlegmone scirrhusa. E contrario superante bile, pituita & humore crasso ipsum sanguinem, vel erysipelas phlegmonosum, vel œdema phlegmonosum, vel scirrhus phlegmonosus. Eodem modo si ipsi humores aqualiter misceantur, coniuncta nomina sortiantur, ut phlegmone & erysipelas; & sic de reliquis. Sumuntur autem omnes hæc differentiæ, vel à substantiâ, ut apud Auicennam tumor magnus, parvus; magnus, ut phlegmonosus, qui in carnosissimis particulis humidioribus fit, vel œdematosus, erysipelatosus, scirrhusus: parvus, ut minuta eminentia, qualis est pustula bohor, lepra Græcorum, seu psora, scabies, impetigo. A materia, ut ab humoribus iam dictis, flatu quoque, humore seroso. Vel ab accidentibus quæ communiter ipsis humoribus superuenire solent, ut est dolor, calor, mollities, durities & id genus alia. Ab ipsis membris vel particulis affectis: ut ophthalmia, oculi inflammatio, synanche, butones. A causis efficientibus; ut à congestione, fluxione, crisi. & aliis, de quibus postea latius. Vide Galenum vnde hæc differentiæ nascantur, 1. 3. methodi. Iam & tumorum noua quædam nomina excogitata, ut est, testudo, mollis tumor calnaria inherens, & talpa: hæc ad atheroma; illa ad meliceridem magis spectare videntur. Ad steatoma verò ferè pertinet tumor dolore carens, nata ab aliis dicta, de qua suo loco.

Gal. 13. method. cap. 4.

Emphysemata Apostemata ventosa.

Tumorum humoralium distinctio.

Vide Tagaritiu cap. 7. de diff. tumor. præter naturam lib. 1. in. sit. Chirurgicarum.

Tumorum noua quædam apud recentiores nomina.

*lco. Singula verò omnium tumorum nomina & definitiones
seorsim in processu explicabimus. Nunc ad causas tumorum præ-
ternaturam extrinsecus apparentium in vniuersum accedamus;
prius hoc interposito exemplo.*

OBSERVATIO II.

*De Apostemate circa regionem ventriculi, cum
tumore exterius apparente.*

NAUTA ille qui Delphis per duos integros
annos tabe quasi consumptus videbatur, circa
stomachum tandem dolere cepit, fluxione tenden-
te ad partes exteriores, ita vt suborto circa furcu-
lam stomachi apostemate, idem paulatim ad suppu-
rationem deueniret. erat autem illius mulieris ma-
ritus, quæ post aliquot annos deinde Delphis ob
præstigia pro saga condemnata fuit & combusta.
Ad hunc nautam Cornelius Erius & ego vocati,
cùm suppuratio ad exteriora tenderet, quæ ean-
dem iuuarent præscripsimus: deinde nostro consi-
lio facta incisione hic postea conualuit. Apostema
autem seu abscessus à furcula seu mucronata carti-
lagine initium sumens, inferius vsque ad musculos
ipsos circumiacentes descendebat; & peracta inci-
sione leui, ne stomachus aut interiora læderentur,
insignis copia puris effluebat: at paulatim eduximus
pus, ne animo deficeret. Hic deinde per chirurgos
probè curatus est, absterfo vlcere; deinde consoli-
datione conuenienti adhibita. Cùm autem huic
maximè pus collectum esset iuxta stomachi regio-
nem & cavitatem ventris (nam muscoli externi li-
cet ex copia puris intus comprimente essent grauati,
ipsi tamen non erant vlcerati) videtur pus supra
peritonæum latuisse; & mirum fuit quòd ipsum
longitudine temporis sua acrimonia non corrode-
rit peritonæum, cùm verisimile fuerit apostema ibi-
dem diu collectum fuisse, deinde & abscessum ac
A 3 vlcus

vlcus conſequutum : ſed integro permanente peritonæo, pure effluente reſtitutus fuit . Sed idem poſtea ſemper ſtomachi debiliſſimis permanſit ; & poſt duos annos ab abſceſſu ſanatus, cùm pancreaticè ſatis vixiſſet, incidit in lienteriam, ex qua poſtea quoque mortuus eſt. multis tamen diebus tunc decumbebat, antequam iterum conſumptus moriretur. Eodem vel ſimili apoſtemate iuuenis piſcator Egmondanus, Gallica lue infectus (vt mihi videbatur, & chirurgis) Alcmariæ longo tempore decumbebat. huic quoque facta eſt incifio ; quamquam tribus deinde ſeptimanis ab incifione vitam finierit. At alij qui in muſculis Apoſtema habuere, facilè curati ſunt.

S C H O L I A.

QUAMQVAM illi tumores intus in corpore latitabant, & ab interioribus deſluxio ſerret aut congeſtio, exterius tamen manifeſtè apparebant. Cæterùm morbi, de quibus nunc dicere inſtitutum eſt, qui in externis partibus ex humoris vitio ſuccreſcunt, modò cum tumore ſunt, modò cura tumorem, ut diximus : & ex utriſque alij ex ſanguine, alij ex bile ſana, alij ex atra, alij ex pituita, alij ex ſero, alij ex ſlim, alij ex horum permiſtione. Humor porro qualitate aut acer eſt, & excedens, aut mitis ac blandus. Situs verò humoris aut in ſola cute eſt, aut cum cute ſubiectam quoque carnem, vel tendonem, vel adenam occupat. Qui in cute, vel in ſumma, qua Epidermis appellatur, vel etiam in vera conſiſtit, que illi ſubſternitur. Rurſum verò humor vel partem cui inſidet in ſuam naturam cœnctit, ut in elephante & alphi, vel per ipſum duntaxat ſubſtantiam effuſus ſua illam qualitate afficit. Hæ quidem propria externorum affectuum differentia ſunt, ad medendi rationem accommodatæ. Itaque uniuersusque propria continensque cauſa eſt humor quidam vitioſus præter naturam cummiſtus : cumulatür autem, vel congeſtione, vel ſtatione, quemadmodum & apoſtemata interna ſunt. Congeſtio præter naturam ſenſim fit ex humoribus in partem alimenti vice diſtributis. Quis enim pars vel ita im-

beſilla

Cauſæ tumorem.

Congeſtio.

decilla est, ut nec affluens alimentum in propriam substantiam
 minare possit, vel ita vitiosa, ut idipsum corrumpat, nec genita
 excrementa à se propellere queat, nec sibi præter naturam con-
 gestio quædam sit. Fluxio autem est humoris incursio concitatio Fluxio,
 atque copiosior, quàm parti alenda sit ex vasa. Huius interiores
 cause sunt fluxura materia copia, acrimonia vel tenuitas; pro-
 pellantis partis robur, viarum laxitas, & excipientis partis im-
 becillitas, siveve declinatio. Evidentes verò cause: contusio,
 ruptio, vulnus, luxatio, & quæcumque doloris aut caloris vi
 fluxionem accersunt. Hæc autem fusius ac latius explicantur à
 Tagaultio lictuunt. Chin. g. lib. 1. de tumoribus præter natu-
 ram cap. 3. de causis tumorum præter naturam extrinsecum ap-
 parentissimum in vniuersum. Nunc quoque ad signa tumorum præ-
 ter naturam extrinsecum apparentium in vniuersum & eorum
 dem indicia venientium Tumores præter naturam summa corpo-
 ris occupantes (quorum duntaxat speculatio ad chirurgum, in-
 quis Tagaultum cap. 4. libri citati, pertinet) indicio sensus, con-
 spectu ac manibus contractata laborante particula, statim de-
 prehendantur. In quacunque enim corporis parte incrementum
 apparet, naturalium statum excedens, ac præter naturam modum parti-
 culam quam occupat distendens, eiuq; actionem ledens, quod vel
 humor aliquis, vel substantia quæpiam ex humore procreata, aut
 qua humoris naturam vicinque respiciat, vel vaporosi spiritum
 excitauit, ibi & inuiorem præter naturam esse necesse est. Care-
 tum tumores, quæ vera apostemata appellant, tumore, dolore &
 calore magis vel minus inensis diagnosuntur. Non vera autem,
 quæ pustulæ & abscessus nominauimus, præter tumorem, mali-
 gnitate quoque, quam Græci cacœthiam nominant, & sequestra-
 tione etiã maiore vel minore determinata deprehenduntur. Signa
 autè particularis cuiusq; differentia & materiæ ex quibus sunt,
 in sequentibus suo loco dicuntur, dū scilicet de simplicibus ipsorum,
 qui præter naturam consistunt, tumorū differentiis tractabitur. Ex
 quibus & composita facillè diagnosuntur. Verum enim verò non
 prius ad particularia est accedendū, quàm de vniuersalibus ser-
 mo fuerit absolutus: in enim ordo in disciplinis observari solet; nec
 immerito sanè. Et ideo nos primò de febribus, tamquam magis
 vniuersalibus affectibus qui cū morbis tam internis quàm exter-

Nota vniuer-
 sales tumorū
 præter natu-
 ram.

nis saepe complicantur, primò egimus: secundò de morbis internis. Et ita nunc de externis agemus. Nam vniuersalia ipsa atque communia manifestiora sunt nobis quàm particularia: quippe quæ magis promiscua, confusioraq; sint: ut primo capite lib. i. Physicorum docet Aristoteles. Nemo igitur uideretur, si passim in nostris Observationibus Chirurgicis à communioribus & plurima comprehendentibus unà cum Tagantio sen per incipiamus. Sed ad propositum reuertamur, & eadem indicia tumorum præter naturam consistentium persequamur, quæ ipse Tagantius commodè ante nos posuit. Circa quæ primum aduertendum est: omnes eos tumores quæ uera apostemata uocant, si Galeno & Avicenna credimus, inuicem ac inter sese magna ex parte complicari, neque faciliè aliquem eorum syncerum & purum inueniri posse: Nam (ut Galenus inquit) phlegmonæ, hoc est inflammationi, ex sanguine, magna ex parte miscetur aliquid quod uel erysipelatæ, uel œdematis aut scirrhi naturam seruet. Erysipelatæ autem miscetur aliquid quod phlegmones aut œdematis aut scirrhi speciem referat: ita de reliquis omnibus perpende. At uerò ii tumores præter naturam, quæ non uera apostemata appellantur, ut plurimum synceri ac puri reperiuntur. ex syncerorum autem signis ac curatione, faciliè etiam compositorum signa tum curationes elucet. Secundò, periodi, paroxysmi, & crises tumorum qui præter naturam sunt, tumorum ex quibus constantur analogiarum (inquit Guido) sequuntur. Analogiam autem hic interpretamur proprietatem, seu proportionem, naturam, ac substantiæ similitudinem, quam formam specificam & occultam appellant. Tertiò, Tumores eiusmodi, præsertim salubres, & qui ex humorum influxu sunt, quatuor temporibus distinguuntur: principio, augmento, statu, & inclinatione. Principij nota est, cum particula incipit distendi, & fluxionis adest initium, cum dolore adhuc exiguo. Incrementum adest indicabis, cum uideris tumoris molem attolli, locumq; affectum impleri, ac symptomata, quæ unumquemque tumorem sequi solent, manifestè augeri. Statu uerò indicium est: cum prædicta omnia, tumor scilicet & symptomata cuiusque tumoris differentia proprium vigorem suum obtinent: nec amplius possunt incrementum assumere, quin materia faciens tumorem, in alterum generis substantiam degeneret.

Prognostica.

Lib. de diff. morb.

Quatuor tempora tumorum præter naturam.

neret, & transmutetur. Declinatio autem tunc adesse cognoscitur, cum tumoris moles, & propria ipsius symptoma minuantur: vel materia qua tumorem facit in aliam substantiam incipit transmutari. Itaque tempora eiusmodi à tribus potissimum suum discrimen accipiunt, nempe ab ipsius tumoris essentia, hoc est magnitudine: vel paruitate, à materia dispositione, & accidentibus, qua curandi indicatinnem plurimum immutant. Ceterum quatuor hæc tempora simul aliquando coincidere videntur, propter breuem scilicet, ac parè imperceptibilem vniuscuiusque durationem, ut contingit in venenosis inflammationibus non letalibus, qua statim vigent at florent. Porro tumores eiusmodi, qui ex humorum præsertim sunt influxu, nisi fieri prohibeantur, reprimendo materiam influxentem vel sponte & citra ullam manifestam occasionem intro recurrente fluxione delitescant, aliquo istorum quatuor terminari necessum est, insensibili exhalatione seu resolutione, vel facta suppuratione, vel corruptione, vel induratione, quemadmodum & de pleuritide diximus. Omnium autem istorum modorum optimus & magis expectandus, is est, qui per sensui imperceptibilem fit dissolutionem: post illum verò, qui per suppurationem. At qua per indurationem fit terminatio, absolute mala dicitur. Quæ autem si per corruptionem particula laborantis, omnium pessima cendenda est, ut aperte nobis Galenus insinuat, libello de inæquali intemperie, ad hunc modum scribens: Itaque duorum alterum inquit est necessarium; vel superante fluxione, corporum qua succubere, sequi corruptionem: vel ea denicta, musculum ad naturalem habitum reuerii. Subiiciamus igitur ipsam primam fluxionem superari (rectius enim à melioribus incipit:) duplex hinc cide curatinnis modus: quod scilicet vel digeretur, seu dissolvitur, quicquid humoris in particulam procubuit; vel concoctur: verum dissolutio optabilior existit. Ad concoctionem hæc duo necessario consequuntur: nempe puris generatio, eius in aliquod spatium abscessio. Et paucis interiectis subiungit: At si victa à fluxione particula fuerint, in tantam denique intemperiem, ut eam aliud pereat, & ipsa temporis præcorrumpanitur. Hæcenus Galenus. Resolutionis indicia sunt: ut membra, & deficiens pulsatio. Signa tumorem veri in

Tumores præter naturam quatuor modis terminantur.

Gal. lib. de inæquali intemperie.

Dissolutionis indicia.

Suppuratio-
nis nota.Corruptionis
signa.Indurationis
nota.Regressionis
& acutitatis cen-
sura indicia.Signa mor-
tali abscis-
sionis exitu-
ris, c. Au-
cenna.Nota abscis-
sionis iam facti.Aph. 47.
lib. 2.Aphor. 41.
lib. 6.

suppurationem, indicantia sunt, dolor internus, pulsatio, & cala-
ris incrementum. Fluxionem vittricem esse, & particula lato-
rantis corruptelam, testantur niger, & lividitas; quibus non-
numquam & granaeolentia accedit. Tumorem in lapideam abire
duritiem, aperie demonstrat tumoris immutatio, & cum hac du-
rities remanens. Regressionis vel desuescentia nota est, subita
tumoris diminutio, quae interdum propter nimium refrigeratio-
nem, nonnumquam vero propter venositatem (nullis forinse-
cus admotis reprimantibus) accidit. Ad hanc autem sententiam, at-
que affatum factam tumoris diminutionem, febris statim subse-
quitur; ac multa alia prava symptomata. Haec de tumoribus quos
proprie Apostemata vocant; de Pusulis suo loco dicemus. Ab-
scissionum vero (quas exituras vocant) indicia ac signa, quae vel
statim eos futuros denuntiant, vel iam praesentes adesse demon-
strant, haec sunt: Cum videretur (inquit Aviceenna) pulsationem
aut duritiem, in longum iam tempus productam, vel caliditatem,
aut dolorem incrementem, tunc existimus proximum esse, ut apo-
stema in suppurationem vertatur, & fiat abscessus. Cum autem
deprehenderis levitatem quandam affatae particulae, & doloris
sedationem, ac remissum calorem, quodque in mentis loci para
aliqua cateris emineat, atque in mucronem subducatur: ad hanc,
cum premeudo digito veni inundationem (ut loquuntur) per-
ceperis, viderisq; guttuli illius seu mucronis colorem iam albesce-
re, tunc in lica, pus eo loci subesse, & tumorem iam abscis-
sisse. Unde & ab Hippocrate recte est indicatum, quod dum pus consi-
ditur, dolores ac febres magis accidunt, quam iam confecto pure.
Porro nota eiusmodi tum iam facti abscessus, tum mori futuri,
vulgaribus his ut scilicet (quos neque Tergantium omisit) com-
muniter exprimuntur:

Durities longa, pulsus, dolor & calor aucti,
Signant pus fieri: sed factum, dicta remissa,
Sub digitis vndans, albescent pars, & acuta.

Ceterum in pure ipso cognoscendo ac diiudicando, maximè
te attentum esse oportet. Quandoquidem suppuratio ipsa, seu
pus in loco aliquo comprehensi notitia, sapius occulatur, ac
medicini later, ob loci scilicet & puri crassitudinem, ut haec
apothorica sententia nobis expressit Hippocrates: Quibuscum-

que suppuratio in corpore existens non innotescit, his ob crassitudinem puris, aut loci non innotescit. Atque hac de signis abscessuum dicta sufficiant. De horum autem iudiciis, hac ab

Auicenna & recentioribus chirurgis memoria tradita sunt. Abscessus, qui iuxta membrum aliquod nobile vel prope influvas sit, atque adeo in venosis aut nervosis ipsis partibus, quique in inexticilli particula, & nativo caloris propemodum destituta, praedicta quoque & valde densa cute obiecta, consilium, ad

Prognostica
seu iudicia
abscessuum.

haec qui crassior materia & ad motum tardiore consistat: planius citius seu aequabilis, & in eam formulam non subductus, suspectus admodum est, egregie ac tarde maturatur. Qui vero hujc ex aduerso respondet, boni moris est & laudabilis: cui enim & facile in suppurationem vertitur, sapienter, nullo sermone adhibito auxilio, per se debescit. Itaque si abscessus tendit in acutiem, & puri substantia tenuis fuerit & aeris, nec praedicta aut densa cute extiterit, natura per se ipsam, hoc est, sua facultate alienorum expultrice, & citra alimentum aliquod praeficiendum seu subsidium, conceptum humorem foras propellit, nisi

Qui abscessus
facile concoquantur.

quis facta incisione protinus ipsam spontaneam aperitionem antereferat. Abscessus eiusmodi nonnumquam per halitum digeruntur, nulla in cute facta continui solutione, ubi scilicet pus & modicum est & bonum, tenue quoque & non in alto delitescens.

Qui abscessus
per resolutionem
maxime terminantur.

Sapienter tamen facta à natura vel arte emissario, conceptus humor profundius, quam digeratur. Quae autem à natura sit aperio, multo iucior est ea qua manu operata sit: quod si arte molientia sit, securius multo & melius scalpello aut candenti ferro illam

Melius ac tutius
scalpello
in quam ruptorio
abscessus aperiantur.

scindas, quam adurentie medicamenta, quod ruptorium appellatur, autem aperio eiusmodi, quam in abscessibus manu & arte oluntur, deterior est ea qua natura beneficio accedit, quod si eam generet, & in futurum verratur. Vbi tamen urget necessitas, nec alio datur vii meliore & praesentiore auxilio, ea inirepide

credendum est. Hac autem modo commemorata incommoda abscessus, si facta (cum res exposulat) aperitione, pus mentia, ad

quorum maturationem, & detergentia laboranti particulae adhibentur. Ceterum puris optimi ac deterrioris nomina, oratione lib. I. Praesagiorum nobis expressit Hippocrates, ad hunc

Puris optimi
& deterrioris
nomina ex Hippocrate.

textu inquiriens: Pus illud optimi censeatur, quod album, equale

(id est

(id est sibi undique simile) laeque, tangenti & quam minimè fatidum est: quod verò huic maximè contrarium apparet, pessimum est. Porro reliquorum, tum humorum, tum solidorum corporum quae in abscessibus continentur, signa & indicia, cum de singulis particulatim agemus, explicabuntur. Quare & his subiciamus caput de curatione vniuersali apostematum ex influxu humorum, & abscessuum quas Exiuras vocant, quae & ex Tagaustio desumere non verebimur, cum admodum breuiter hanc rem ipse tractauerit; interim appposito exemplo sequenti, ut curatio vniuersalis manifestior euadat.

OBSERVATIO III.

*De Apostemate seu inflammatione totius surae,
in abscessum transmutato.*

IOHANNES Heuterus Delphensis, vir egregius, Anno 1569. in principio Maij mensis, cum Brabantiam accederet, oborto apostemate seu inflammatione in crure sinistro, etiam febre correptus, cum Dordracum peruenisset, rursus domum remeare coactus est. Ad quem accedens, crus sinistrum à talo vsque ad genu rubedine cum quadam duritie renitente totam suram occupante inflammatione seu apostemate affici deprehendi. Cum vrina utcumque tincta esset, & febris, licet non vehemens, adesset, ut à vino abstineret, tum esu carniū, imperaui: & quia materia adhuc in fluxu erat, sanguinem detrahère iussi ex basilica brachij sinistri, ex loco opposito inflammationis, quamuis præcedente septimana sanguinem eidem detraxeramus: nam maximè sanguine abundabat: & ideo quotannis in principio veris sanguis illi mittebatur. Sanguine detracto, cum ingens dolor superesset, & iam per tres dies antequam domum venire posset, fluxio facta esset, puris repellentibus uti non audebamus, nec iis quæ fortiter repellerent. Quare medullam panis albissimi tritam & infusam lacti, addito

dito vnguento populneo, cataplasmatibus modo cruri apposui-
mus. Interim iuleb exhibuimus in hunc modum: ℞. syr. de endiu. syr. viol. syr. ex infus. ros., syr. de acetos. citri ana ℥ j. aquæ cicoreæ, endiuæ, boraginis, acetosæ ana ℥ iij. fiat iuleb. Postea etiam euacuauimus sequenti decocto: ℞. folior. coluthæ ℥ β. rhabarb. selecti ℥ j. β. sem. anisi ℥ j. squinanthi ℥ β. infunde in aqua cicoreæ, end. acetosæ ana ℥ iij: facta ebullitione maneat infusa per noctem; & fortissimæ expressioni adde oxyzacch. simplicis, syr. ex multiplici infus. ros. ana ℥ j. misc. & fiat portio pro duabus dosibus matutinis. Sub noctem utebatur hordeato. Postea cataplasma ex foliis maluæ, farina hordei cum butyro apposui-
mus, adiecta adhuc medulla panis trita in lacte. Intermissis aliquot diebus, cum calor mitigaretur, & paullo durius crus euaderet, ex foliis maluæ, farina hordei & furfure minutissimè trito & cribrato, adiecto oleo violaceo, cataplasma composuimus. Sed cum videremus quod tenderet ad abscessum, duobus conuocatis chirurgis, ad maiora molitina deuenimus, adiecta radice althææ, postea & liliorum, & floribus meliloti, folisque viol. quia calor adhuc supererat: & in processu augebamus radices althææ: tandem ad maturationem paulatim deuenimus. Cum iam maturum esset, in sura, in ea parte vbi magis materia collecta erat, emplastrum ex galbano apposui-
mus: sed cum attractionem ferre non posset, illud amouimus: & denuò cataplasma ex malua, rad. althææ & capitibus liliorum apponi mandauimus: & cum pars in medio suræ in mucronem emineret, & iam quasi albesceret, vt scalpello aperiretur per chirurgum, consuluimus: & emanauit pus admodum copiosè: nam maximam partem suræ occupauerat abscessus. Postea operâ chirurgorum detergo pure, ac vlcere mundato probè admodum, breui deinde ad consolidationem

14 OBSERVAT. CHIRVRGICARVM
tionem deuenit, & egregiè curatus est. Totius cu-
rationis tempus mense completum est.

SCHOLIA.

Tumores
omnium cu-
randorum
communis
indicatio.

TVMORVM omnium, qui præter naturam sunt, iam fa-
ctorum, & qui non adhuc in generatione sunt, communis ac
prima curandi indicatio una est Galeno lib. 13 & 14 Meth. me-
dendi; nempe ut quod præter naturam in particula est, & cum
in tumorem attollit, totum vacuetur. Qui verò adhuc in gene-
ratione sunt, in his prior vacatione est, consuetis ad affectum
locum humoris inhibitis. proinde in illis non simplex, sed compo-
sita est medendi sollicitudo, ac curandi indicatio, quemadmo-
dum scripsimus. de internis quoque apostematibus in Observatio-
nibus nostris medicis diximus & ostendimus. Ha autem commu-
nes indicationes pro tumore ipsius differentia; & particula la-
borantis natura, plurimum variant & immutantur. Siquidem
in omnibus iam factis tumoribus, & qualibet corporis parte, esse
quod infestat vacuatio, haudquaquam similiter administratur,
ut lib. 2. ad Glinc & locis nuper citatis docet Galenus, quod
ex sequentibus etiam euadet manifestum Sed neque isdem sem-
per auxilium, quibus, nunc incipientibus adhuc tumoribus, &
quamlibet particulam occupantibus, occurrimus, aut quod in illis
iam factum est, vacuamus: sed aliis atque aliis, prout tumoris
genus, & partis affecta natura postulat, indidentibus fluxionibus,
& vacuantibus quod generatum est, praesidium uti uisimus o-
gimur, si rectam saltem agendorum rationem sequimur. Ita-
que ab his duobus, nempe ab ipsa dispositione seu morbi essentia;
& partis affecta natura, tumorum qui præter naturam sunt, cu-
randi indicationes potissimum desumuntur Galeno. Porro dispo-
sicio ipsa, de qua nunc agimus, seu morbi essentia, tria in se, iux-
ta recentiorum placita, complectitur; nempe quantitatem, qua-
litatem, & materiam, seu substantiam quæ tumorem efficit. Quo-
rum ratione prima illa & communis indicatio immutatur, atq;
ab his etiam particulares curandi indicationes desumuntur. Ali-
ter enim tumor magnus, aliter parvus curatur: siquidem magni-
tudo & paruitas tumorum (ut existimant) differentiam constituant.
Alia enim ratione ingens phlegmone, alia minutus herpes cura-
ntur. Aliiter quoque qui per deflexionem fit, & adhuc in gignen-

Communes
curandorum
tumorum in-
dicationes,
pro tumoris
differentia,
& laborante
particula
variantur.

Curandorum
tumorum in-
dicationes à
duobus po-
tissimum de-
sumuntur.

1.
Tumoris ef-
fectum tria
in se continet.

do est, quàm qui per congectionem procreatur, aut iâ factus est. Sed & calidus tumor, ut erysipelas, aliaratione quàm frigidus, ut est edensa vel scirrhus, curatur. Quantitas igitur in tumore præter naturam curatione et avarians, est magna, vel parua. Qualitas, fluxio, seu (ut loquuntur) devinatio & congectio Materia, humor, calidus, frigidus. Caterum in partium laborantium natura, quatuor perspicuum spectanda sunt, temperatura, formatio, situs, virtus seu potentia. Quibus & quintum addi potest (inquit Tagautinus) facilitas nempe (ut ita dicam) ac difficultas sentiendi: nisi minus istud non Galenô sub virtute comprehendî atque includi. Hac itaq; communem etiam illam, quæ per singula tumoris præter naturam genera observatur, curati nem plurimum enarrant. Proinde & hæc omnes, quæ ab ipsis sumuntur indicationes, in curandis, qui præter naturam incidunt, tumoribus, memoria tenere oportet. Alius namque curatur phlegmone, aut quicquid alius tumor in carnosiss partibus, quàm in nervosis: alius in oculo, quàm in genu vel collo: alius in adenibus, quàm in aliis partibus non glandosis. Breuiter, particule ipsius laborantis, ac tumore obfesse, temperatura, & formatio, & situs, & virtus singulas quæ ipsi in verbo curando molimur operationes committant: communi etiam in intentione servata, quam semper à verbo assumendam esse Galenus edocuit. Itaq; communem curationem tumorum præter naturam methodû eorum præsertim, qui ex humorum influxu procreantur, sumpta ab ipso affectû indicatione, nulla parum ipsius affectû habita ratione, tradere hîc primum instituiamus, à Tagauti ratione minimè deviantes. Deinceps eorundem, sed maxime inflammationum, cum in abscessum degeneraverint, universalem curationem subiiciemus. Postea ad particulares affectiones & earundem curandi rationem progrediemur. Atque interim ubi locum exposulabit, nonnulla de curandi indicationibus, quæ à laborantibus & tumore obfessis particulis assumuntur, ex Galeno proferemus. Quibus rectè intellectis, facile erit cuique rationali medico ac chirurgo, tumores quoscunque quibusvis partibus insidentes, certa methodo ac ratione curare. Galenum igitur imitantes, principium curationis tumorum qui præter naturam dicuntur, ex humorum influxu procreatorum, ab invensione occasione ipsius affectû, desume-

In indicatio-
re quæ à na-
tura partium
definitur,
quatuor po-
tissimum spe-
cianda esse.

Lib. 1. ad
Glauc.

Invenio oc-
ca ionis, prin-
cipium est cu-
rationis tu-
morum præ-
ter naturam.

desume-

desumimus, ut scilicet qua cū excitant causa abscondantur: quod
verò in eo iam factum est, tollatur. Itaque unius differentia tu-
morum, qui per deflexionem sunt (de his enim duntaxat modò
hic agimus) exemplo atque analogia, ceteras etiam differentias,
quæ ex influxu humorum nascuntur, intelligamus: quare etiam
unius phlegmones breuem ac compendiosam curationem hic
subiiciemus, ut exemplū quoque iam in obseruatione posuim ma-
nifestum euadat. Hac namque & frequentissimè incidunt, & fe-
bres aliq; symptomata periculossima incutit. Nomine autem
phlegmones hoc loco, non omnem calidam, ac veluti flammæam
dispositionem, quam Græci etiam phlogosin appellant, intelligi
volumus, sed eam duntaxat, quæ fluxione sanguinea soboles est,
in carnosâ corpora maximè incidens, in qua dolor est vehemens,
rubor per summa vigens, calor veluti dentēs, tensio, renixus, &
cū malum increuerit, pulsationis sensus. Hanc enim inflamma-
tionem cum Galeno & alijs, qui eam tamquam ducem optimam
sequuti sunt, Græci scriptoribus, ut Paulus, Aëtius, & Oribasius,
proprie Phlegmonem appellant. Ut igitur rem ipsam aggre-
diamur, hac ipsius Galeni verba sunt; Communis omnium phle-
gmonarum generatio, ex sanguinis influxu est, copiosioris scilicet
quam sit parti ex usu. Influxit autem copiosior sanguis, alia qua-
piam, alijsve particulis eum aliquando mittentibus, ac ea qua
phlegmone laborare incipit, recipiente: aliquando verò particula
qua affligitur, hanc ad se trahente. Partes autem quæ mittunt,
vel ut copia superuacuum, vel ut qualitate molestum, vel utro-
que nomine succum persequuntur. Quæ verò attrahunt, hæ
morboſo calore vel dolore trahunt. Sed & his coadiutrices cau-
sæ sunt, particula imbecillitas, & ignobilitas; canalium seu via-
rum, per quas fit defluxio, ampliudo; meatuum quoque par-
tissim expellentis angustia, & situs inferior, ut iam supradictum
fuerat. Itaque ex omnibus his tres colliguntur recentiorum chi-
rurgicorum turba, curandorum tumorum, qui ex deflexione or-
tum habent, intentiones. Prima est fluxionem auertere, ac eam
omnino intercipere: Secunda est, dolorem demulcere, atque eam
occasionem, propter quam particula fluxionem excipit, vel etiam
attrahit, in totum summovere. Tertia est, totum eius humorem,
qui in partem affectam confluxit, vacuare. Ceterum quo modo
prima

Phlegmone
quid sit.

Gal. lib. 13.
Meth.

Communis
omniū
phlegmona-
rum genera-
tio.

Causæ coad-
iutrices flux-
ionis.

Tres scopi in
curandis tu-
moribus, qui
ex humoru
influxu sunt,
chirurgi
proponun-
tur.

prima intentio perfici debeat, appositè docuit Galenus lib. 13. Meth. med. ubi modos omnes auertenda fluxionis, ac rationem inhibenda phlegmones, quæ adhuc in generatione est, nobis expressit, ad hunc modum scribens: Vbi equaliter succi inter se sunt aduulsi (quod Græci Plethoram vocant) imò etiam ubi partim ab excrementis totum corpus est, & succorum mediocritatem continet, dolore, & membri, in quo phlegmone sedet, calore fluxionem excitante, sanguinis missione incipienti adhuc phlegmoni succurrimus: & idè nos rectè sanguinem detraimus. Contra etiam plethora (ut statim adiungit) tum frequenti balneo, tum exercitatione, tum multa frictione: præterea digerentibus medicamentis, modò febris non adsit: & præter hæc omnia, inedia, ac proba victus ratio: etiam si febricitet ager. Cum verò flamma, vel atra bile, pituita ve, aut serosis humoribus refertum corpus est (eum habiunt Græci Cacochymiam nominant) purgatione, quæ cuique suppuranti succo sit accommoda, vacuatio molienda est. Sed de hiis in particularibus affectionibus latius. Cæterum antispasus, id est, in contrarium reuulsio, commune est in omnibus huiusmodi tumoribus auxilium, dum fluxio adhuc valenter irruit, vtpote in principio morbi, & in augmento: in fine verò statim, & in ipsa declinatione, dum scilicet iam finis resistit, atque in membro inhaesit, & corpus totum abunde vacuatum est: vel ab ipsa qua affligitur particula, vel à maxime vicina vacuatio molienda est. Secunda intentio completur anodynis remediis, id est, sedantibus dolorem, itemq; astringentibus & interceptantibus fluxionem: ad hæc relaxantibus naturales meatus, per quos membrum affectum consueuerat repurgari; hæc lib. 6. de materia chirurg. apud Tagant. adiecta inuenies. Tertiam verò intentionem assequemur in qua materiam, tumorem excitantem, à loco affecto euacuant. Euacuant autem consentiam in loco materia, non solum diaphoreticis, id est, euaporantibus seu resoluentibus medicamentis, sed etiam repellentibus, quæ Græci ἀπορροιαὶ vocant. Itaque incipientibus phlegmonosis tumoribus, atque etiam aliis quibuscunque, qui ex humorum influxu procreantur, magis utendum est reprimentibus, quàm euaporantibus; quibusdam exceptis casibus: ex quibus (inquit Guido) Galenus visum est quatuor posuisse. Primus est, quando in-

Plethora quid.

Cacochymia.

Anospasus.

Secundus scopus.

Tertius scopus.

Casus in quibus non licet repellere siue reprecutere.

mor

mor eiusmodi fit in emunctoriis. Secundum, quando fit à materia venenosa. Tertium, quando materia est crassa & repulsiōi inobediens. Quartum, quando vehementer est impacta. Avicennas duos duntaxat casus excipit: nempe cum tumor est in emuncto-
riis, aut loco aliquo, ex quo fit timendum refluxus materia ad membrum aliquod precipuum & nobile. Alij unicuique tantum casum eximunt: alij sex, alij decem, alij novemdecim, alij viginti tres. Verum enim verò priusquam de hac re tam ambigua, quicquam statuamus, sciendum est, duplex esse genus repellentium apud recentiores & Arabes, communia scilicet, & propria. Repellentia communia, seu communiter dicta, sunt, quacunque influxus prohibent, compescunt ac refrenant, aut refrigerando aut incrassando, aut offarciendo, hoc est, lento substantia crassamento, poros ocludendo, & vias intercipiendo, aut partes confirmando. Influxum frigore compescunt & incrassant sempernium, lactuca, psyllium, cotyledon, id est, umbilicus Veneris, lentiscula pallasia, camphora. Offarciunt, id est, poros imminenti fluxioni ocludunt, farina volatilis appellata, è moletrinis, oni candidus liquor, amylin, gluten, & gummi genera: in summa, quæ cum lentore & sine morsu refrigerant. Confirmant ac roborant, hoc est, naturam temperiem partii restitunt, oleum rosaceum, omphacinum, myrtinum, chamamelinum, absinthium quoque: adhuc marrubium, nux empressi, & id genus alia, quæ affectam particulam, cui admoventur, roborando, ab imminenti fluxione eam vindicant ac timent. Repellentia autem proprie dicta sunt, quæ dum humores in partem aliquam irrunt, aut illabuntur, vi sua illis occurrunt, ac intro quasi postliminiò redire cogunt. Hæcque sunt omnino crassarum peritum, quemadmodum attrahentia tenuium: ex his plurima sunt qualitate frigida. quædam verò calida; utraque tamen, id est, tam calida quam frigida, facultate possent astringente. Frigida proprie repellentia dicta, sunt folia vitis, plantago, solanum, dipsacos, id est, virga pastoris, & quæ pastoris bursa vocantur; glaucium, balanitium, omphacium, rhus, id est, sumach, terra cimolia vulgo nuncupata, & terra sigillata, & eius generis alia. Et hæc quidem simplicia, ex quibus multa componi possunt, ut oxycerasum, unguensum ex bolo communiter appellatum, ceratum Ga-
leni,

Repellentia
communia.

Repellentia
proprie dicta.

Frigida.

ni, & similia: quorum formula ex 6. lib. apud Tagautium requirenda. Repellentia autem calida propriè dicta, sunt alumen, galbula, id est, cupressi nuces, iuncus rotundus, sine odoratum, Græcis ξύον ἄβ & onyx, id est, blatta byzantia, lupinorum farina, uina quadam, ac alia permulta. His positis, rem uniuersam de repellentibus initio fluxionum adhibendis, proloquens duobus sequentibus Gnidonis à Caulisco complectamur. Principio omnium tumorum, qui ex humorum influxu sunt, & maxime phlegmonosorum, reprimentia propriè dicta conducunt; his decem solum exceptis. Nempe cum tumor partibus adnatis, aut cum ex materia venenosa sit, vel admodum crassa, & ad repellendum inepta, atque etiam cum humor particula laborantis iam vehementer est impactus: si tumor criticus est, aut à causa primitiua excitatus: si in corpore plethorico est, aut admodum debili: si sedem habet iuxta principem aliquam partem: denique si cum vehementi dolore incidit; tunc enim mitigatoris auxiliis & non repellentibus propriè dictis opus est. Secundum proloquium ad hunc modum habet. In principio omnium tumorum, præsertim phlegmonosorum, conueniunt reprimentia communia, tribus duntaxat exceptis: si glandulosas partes, quas vocant, occupent; si critici fuerint; si ex materia venenosa procreati sint: atque in omnibus his, præcipuè verò, quando serè consiliit fluxio, & tumor prope modum factus est, oportet materiam ipsam resolvere, ac discutere, ad moris ipsi tumenti particula diaphoreticis, non quidem mordacibus, & valde acerbis, sed lenibus potius ac moderatè calidis & humidis, maxime verò in tribus ultimis commemoratis, in quibus studendum est materiam attrahere ad locum tumore obsessum, ipsumque tumorem angere, & materia iam fluxa & commixta refluxum prohibere. Quod interdum quidem facimus emplastris attrahentibus: nonnumquam verò cucurbitulis dolenti loco affixis, ut docet Anicenna. Sit ergo regula seu canon artis generalis, in principio omnium tumorum, qui ex humorum influxu crescunt, exceptis tribus paulo ante memoratis, sola ac pura reprimentia esse adhibenda. In augmento verò ipsis repellentibus, nonnihil ex iis quæ discutiant, admiscendum. At in statu, & paulo ante statum, æquæ portionibus miscenda sunt reprimentia discutientibus. Cum

Calida repellentia.

Primum Gnidonis proloquium in repellentibus.

Gale. 2. ad Glauc.

Secundum proloquium.

Si tumor iam factus est.

Artiscanon generalis.

antem declinatio, vel finis statim adfuerit, solis resolventibus & relaxantibus uti licet. Breuiter, quamdiu humor adhuc affinis, repellendum est: ubi verò iam resilitis fluxio, digerendum. Verum si medio modo res habeat, id est, partim iam aliquid fluxerit, & loco inhaerit; partim verò aliquid adhuc influat, mixtis auxiliis uti oportebit, hoc est, partim resolventibus, partim reagentibus sine repellentibus. Coëuntibus enim una contrariis indicationibus, compositum quoque praesidium esse oportet, ut 13. Therap. Gal. ait. Porro hac omnia sanè intelligenda sunt, utpote si tumor prater naturam resolutione seu (ut communiter dicunt) via resolutionis terminari debeat. Sed hac auxilia in particularibus Observationibus sequentibus ac ipsarum Scholiis manifestiora euadent. Ceterum si phlegmone, aut quini alius tumor degeneret in abscessum, eius curatio periticia praestat Gal. lib. 2. ad Glauconem, per mitigatoria auxilia, quae Graeci chalaistica vocant, id est, relaxantia, siue remittentia, cuiusmodi est medicamentum quod à Gal. tetrapharmacum appellatur, molle quidem & anodynum: cui, ex sententia eiusdem 13. Therap. mellis paululum admixtum sit oportet. Constat autem tetrapharmacum ex cera, resina colophonica, picis, seu ianrini pari portione. Procedente verò tempore, ad ea quae concoquendi, seu mantrandi ac suppurandi vim habent, transiendum est. Quae autem in aliam speciem, hoc est in alienam substantiam, & toto genere prater naturam degenerauerint, ea per chirurgiam summonenda sunt. Porro in ea amonendis, iuxta Galeni consilium 14. Therap. id agere oportebit, ut rationibus quibus id fiat, quod intendis, pensatis, optimam semper earum deligas. Sanè optimae rationes tripliciter indicantur: nempe temporis curandi breuitate, curando citra dolorem, & maxime tunc curando. Rursum ut tunc cures, tria propria sunt quibus intendimus oportet. Vnum primumque, ut omnino absolutionem operis consequaris. Alterum, ut scibi hunc non assequaris, saltem enbantem non ladas. Tertium, ut vitium non facile reuertatur. His considerationibus si optimam curationis viam indicaueris, inuenietur quidem in omnibus modò propositis tumoribus, quando potius chirurgia, & quando potius medicamentorum ope sit curandum. At chirurgia quidem studium in his potissi-

Curatio tumorum in abscessum, quem exituras vocant, degenerantium.

Tetrapharmacum.

Optimam curandi rationem tripliciter indicari.

- 1.
- 2.
- 3.

minum qua nunc dicta sunt, hac est, in tumoribus, qui toto genere sunt prater naturam, ad interruptionem eorum festinat; atque prorsus ut hi tollantur sibi proponit. Quod si perficere nequeant, proximam illud consilium habet, ut vitium transferat, veluti in hypochymatibus, id est, suffusionibus. Quod verò ex medicamentis petitur, primum huc tendit, ut quod prater naturam est, tum in pus versat, tum putrefaciat: hoc verò secundo loco destinat. Hac Galenus. Itaque ubi partes, quae phlegmone infestantur, vehementius pulstant, sic ut iam desperetur de horum, citra pus, curatione, veteres omnes (inquit Galenus 4. Thorap.) eiusmodi admovent medicamenta quae celerrimè pus movent: ante verò nequaquam. Quamquam sibi cataplasmate quod calfaciat humectetque (& ad suppurationem perducatur) illinuntur quae phlegmone infestantur, id nequaquam ex prima ratione fit, hoc est, ut remedium affectui, sed ut symptomati mitigationi, ut pote doloris: si quidem ipsius phlegmones remedia siciorum sunt virium. Et paucis interiectis subdit: Compendiosa obfessarum partium curatio, per id genus praesidia (hoc est, per siccantia & resolventia) obitur ac perficitur, quae sanè vel affectum prorsus summouent: vel si quid exiguum quod suppurat, reliquerint, alterum medicamentum acce, quod educere pus queat, requiritur: vel si tenuis circumposita curis fit, velut celerius explicatum agnum, sectione seu incisione opus est. Et hoc sanè est quod dicebat Auenenna, nempe curationem apostematis, quatenus apostema est, extractionem esse materiae extraneae, quae excitat apostema. Auxilia autem quibus mouere pus expedit, & alia quae supradicta sunt, perficere ex sequentibus cognoscet. Vel lege 6. lib. Taganti de suppurantibus. Porro suppurato iam abscessu ne corrodat pus, aperiendus est intus ferro, quam medicamentis causticis & adurentibus: & phlegmonosi tumores maxime scalpello. Porro apertio ipsa, seu puris emissarium fieri debet pro ratione tum copia materiae ibi collectae, tum etiam ipsius loci affecti. Quod si computruisse portio aliqua suppurantis partis videbitur, excindi eam est necesse, ad formam seu similitudinem folij oliuae vel myrti, quo facilius sauescat. Ceterum Galenus maximas semper sectiones vitandas esse praecepit; sanabaturque huiusmodi suppuratae particulas, etiam inguina & axillas,

Ex lib. 4.
Method.
med.

Auenenna.

Quomodo
abscessus aperitur.

13. Ther.



Notæ ex amplis sectionibus.

Section in suppuratis bubonibus cur fiat per transfversum.

Septem attendenda in apertione iacti suppurati abscessus.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Duo spectantur Galeno in apertione iacti suppurati abscessus.

- 1.
- 2.

Detergentia.

las, sola ut plurimum incisione & medicamentis valenter succantibus. Quod si aliquando exscindere aliquid propter multitudinem, non puris modo sed etiam corruptarum partium, fuit opus, contentus erat sectione non maiore quam myrti folium est. Ex amplis enim sectionibus, ubi ad cicatricem perducta est particula, præterquam quod turpissima redditur, fit etiam imbecillior, & ad motum ineptior. Funt autem huiusmodi sectiones, myrtaceum folium imitantes, in his potissimum tumoribus, qui in axillis & bubonibus suppurant. Et in his quidem longitudo per transversum ducta esse debet, non autem per cruris aut corporis rectitudinem. Quippe ita cum cruris aut brachium inflectimus, naturaliter cutis sibi applicatur. In aliis vero locis incisione simpliciter semper vivitur. In ipsa autem apertione siue incisione, septem potissimum sunt attendenda, iuxta recentiorum placita: Primum, ut sectio fiat eo loco, quo materia continetur. Secundum, ut fiat in loco inferiori, quo melius purulenta illa colluvies vacuari possit. Tertium, ut fiat secundum rugas & processum musculorum. Quartum, ut videntur vena, & arteria, quoad fieri poterit. Quintum, ut non tota materia simul ac semel, idque affatim educatur, præsertim in magnis abscessibus (ut in nostro Hentero erat, ideo per vices pus extraximus; licet prima vice vix in maxima copia efflueret) ne scilicet ex nimia subitaque inanitione & spirituum resolutione, virtutis sequatur prostratio. Sextum, ut blandius, & quam minimo fieri potest dolore, locus tractetur. Septimum, ut facta apertione locus detergeatur, carne impleatur, & ad cicatricem more aliorum ulcerum deducatur. Galenus autem lib. 13. Therap. duo potissimum monet esse attendenda in sectione suppurati abscessus, ad hunc modum scribens: Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea videantur tibi totum digerere posse, secare existim ei quod digestionem non cessat, eo potissimum loco oportet, quo est editissimum. quippe tenuissimam illic inuenies cutem. Memineris præterea in sectione & alterius indicationis, quæ ad fluxum pertinet: atque ad ambo respiciens, ita quod suppuravit, incidet ac deinceps medicamentum aliquod eorum, quæ sine erosione siccant, impone. Auxilia autem detergoria post apertam vomica purgando ulcers sordido accommoda, sunt mollia tomenta vel lintea.

linsea, concepta linamenta, emplastra & ung. quæ sexto lib. apud Tagantum explicantur. At primis diebus sufficit Guidoni vitellus oui aluminis saccharino inspissatus; quo remedio etiam utebatur Guilhelmus à Saliceto. Postea verò deueniendum est ad mel rosatum, & mundificatum ex apio: & postremo, ad ung. Apostyl. & Aegyptiacum, si res ita desideret. Supra vero ipsum tumorem iam apertum, sequentia vnguenta sunt admonenda: nempe basilicon, diachylon, & diaphanicon vulgo nuncupatum, atque alia id genus quæ ad ulcera instituntur. Vbi enim abscessus secueris, more aliorum ulcerum curari debent. Galeni lib. 13. Therap. post excisionem cuius in phlegmonis axillarum & inguinum, medicamento quod Græci mannam, id est, thuris purgamentum vocat, affectam partem implebat: hæc autem leni adstrictione prædita est. Sed & mitigare (inquit) prius incisionem partem, quantum poscere videbitur, oportebit: fomentis primis, dein cataplasmatibus, mox humectare aliquo medicamento, aut non siccante, singulis scilicet extrinsecum impositis. Nam in ipso ulcere tum manna (ut dictum est) tum ex præsidio, quæ linæolis excipiuntur: primum quidem ea quæ purgant, deinde quæ expurgant, sunt imponenda: post quæ si canitas etiam mansit, quæ impleant adhibenda sunt: siu aliter, ea quæ cicatricem inducant. Porro si laborans nec ferro candente, nec scalpello fieri sectionem præ mollioræ admiserit, medicamentis adurentibus erit molienda apertio. Ad hoc autem laudas Anicenna semen lini, fermentum & sterqus columbinum. Hæc præstantiора efficies, si cum sapone molli, aut melleagine seminis sinapi miscueris. Catartum ruptorium seu causticum, quod sit ex calce & sapone in hac re principatum obtines. Hactenus de tumoribus præter naturam in uniuersum: ac deinceps de particularibus eorum differentiis, & primo de sanguineis singulatim agemus. Reducuntur autem ad tumores phlegmonosos seu sanguineos omnium primò phlegmone dicta, & deinde ad phlegmonosos phlegiblon, bubo, phyma, qui affectus sunt glandularum, tertio hos, dothienes seu furunculi, secundum Galenum: item gangrana, sphacelus, ab Arabibus Aschachilos dictum: carbonculus, quem anthraca Græci vocant, & Anenryma. Sic etiam Fernelius de extier. corp. aff. lib. 7. cap. 2. ad tumores,

Vnguenta super tumorem is apertis applicanda.

Mannæ thuris vsus post incisionem. Partem incisionem prius mitigandam esse.

Quæ in ulcere ponenda.

Auc. in fine tract. 1. Fen 3. lib. 4.

Sanguinei tumores.

Paul. 4. cap. 22. Gal. detum. pr. naturam cap. 25.

suberentia, pustula è sanguine refert: phlegmonem inprimis, phlegmon, phyma, carbunculum, furunculum, epiphytoidem, cithymata. Sunt & alia inflammationes, teste Leonono de tumoribus præter naturam, quæ à loco unde oriuntur, particulare nomen sibi asciscunt, ut gurgulio, qui Græcè γυργυλιὼν & σαρφάδῃ, Latine columella seu vna dicitur, & paristhymia, seu consula, item pleuritis, à pleura, id est costâ, quoniam est inflammatio membrana costas subcingentis. Sed nos de visui apparentibus tumoribus in præsentia loquemur; nam de iis cum de internis morbis ageremus, scripsimus. Et licet alij quoque sint tumores non ex humoribus, ut est gibbositas, ὄγκος, vel κνέσις, vel κνέσις Græci, Latini gibbos vocant, item epiplocele, enterocèle, enteroepiplocele, bubonocèle, exomphalos, de iis tumoribus quoniam in Observationibus nostris medicis diximus, hic non agemus. In hoc itaque primo libro Observationum chirurgicarum de sanguine tumoribus agemus, initio factò de phlegmone.

OBSERVATIO IV.

De Phlegmone seu inflammatione in variis corporis partibus oborta.

VIR quidam istis temporibus phlegmonem in crure à talo vsque ad genu habebat, cum rubore, caliditate & febre: huic post vniuersalia remedia farina hordei cum aqua ros. & succo semperuiuæ apposita est; & tota inflammatio cessauit. At Theodoro de Rijck, viro admodum robusto & iuuenti annorum 24, mali regiminis, tam cibi quàm potus, Veneri valdè dedito, viro admodum corpulento & sanguineo, anno 1546, in fine mensis Maij, in manu sinistra oborta est inflammatio seu phlegmon cum exigua portione bilis, ut valdè parum erysipelatis haberet, sanguine tamè valde exuberante, quod inflammatio rubicunda cum inflammatione indicabat: hic cum intensissimo dolore afficeretur, tandem me vocauit post quartum diem suæ afflictionis: inueni autem hominem simul laborare tertiana continua,

cum

cum virtutis quadam prostratione, tum ex dolore tum vigilia præcedente, quia in quatuor diebus & quatuor noctibus non dormierat: aderat & tunc chirurgus, qui medicamenta calida & resoluentia appōuerat, in corpore plethorico, sanguinis missione non præcedente; quæ dolorem magis auxēre: quare statim ea amoui. & cū aluum non deponeret, glande illam irritauimus: post ventris solutionem, atque eductis fecibus communibus, ilico basilicā in eodem brachio pertusā, ob febrem, statim sanguinem detrahère mandauimus; alioqui in principio statim vocatus, propter phlegmonem, ex pede eodem sanguinem detraxissem, quemadmodum de arthritide calida fecimus, in Nicolao Nielzon ex mente ipsius Aëtij, vt aliās de arthritide diximus lib. 29. nostrarum Obser., 5. scilicet Obs. Nam ita quoque canones medicorū habent. Hinc Valescus tract. suo de chirurgia cap. 2. de phlegmone præmittens canones aliquot generales in curatione obseruandos, sic ait: Primus canon est: Apparente corporis repletione in principio celebranda est phlebotomia à parte opposita, diametris bene secundum longum aut latum consideratis. Propterea quoque præceptor meus Benedictus Fauentinus in sua Empirica ita inquit: Cū phlegmone sit sanguineum apostema, idcirco initio illius curationis non prætermittas phlebotomiam: & in quacunque parte corporis initium capiet phlegmon, ad oppositam partem trahendo, sanguinem mittes; vt si in dextra, in sinistram: si sursum, deorsum; & in aliis sic procede, nisi apostema fuerit pestiferum. Facta phlebotomia diuersua, attenta quidem semper virtute, & etiam ætate, phlebotomabis patientem ex eadem parte lateris phlegmonantis, vt humor qui iam ad particulam patientem fluxus est, illinc phlebotomiā deriuetur, vel euacuetur. Et sic nos in quarto die vocati, ex eodem brachio, nam satis

distabat ab ipsa parte inflammata, scilicet manu, sanguinē extraximus: (tamen ex loco vicino magis fieret euacuatio:) tum propter febrem continuam, cuius materia in venis hæret; ex basilica à fonte ipso sanguinem, scilicet ab hepate, euacuando; & bene ad rem fecit. Prior autem chirurgus in hunc canonem peccauerat, quòd ab initio neque sanguinem detraxerat, præcedente semper ventris lenitione, vt fieri debet. Topica etiam calida malè applicuerat contra canonem medicorum. Vnde dicebat Valefcus: Secundus canon est; si materia videtur calida, danda est medicina superfluitatum calidarum euacuatiua. Tertius canon: Euacuata sufficienter antecedente materia saltem per phlebotomiam, repercussiva debite phlegmoni superponuntur, nisi apostema sit in emunctoriis membrorum; & ideo addit quartum canonem, narrando res quæ impediunt repercussionem, quæ, inquit, continentur istis versibus vulgaribus:

Grossities, frigus, congestio, copia, virus;

Nobile, plethoricum, crisis, vel causa forensis.

Et idcirco præceptor meus quoque dicebat loco citato: His sanguinis missionibus peractis, ventris lenitione semper præcedente, considera si phlegmon fuerit in loco propinquo membro principali, & tunc nõ debet fieri curatio cum his quæ ipsam materiam repellunt, vt cum fuerint phlegmones in emunctoriis cerebri, vel sub axillis: in illis quidem timere debes de reuulsione materiæ ad cerebrum, in istis ad cor vel ad hepar. Cane quoque quantum possibile sit, ne in emunctoriis testiculorum, & in inguinibus initio curæ phlegmonis, vtaris repellentibus; quoniam testiculi membra sunt principalia: nam facile ad ipsos materia possit duci: ob quam rem si apparuerit phlegmon in aliis membris nostri corporis longè distantibus à principalibus, securè vti poteris à principio repellentibus; & tanto secu-

rius

ritus, cum sanguinis missiones præcesserint. At nos-
ter hic chirurgus in hunc canonem peccauerat:
nam in corpore plethorico, non detracto sanguine,
etiam calida resolutiua apposuit, cum ea postea ap-
ponenda essent. Hinc, inquit Valescus, canon quin-
tus est, quando in principio apostema videtur quod
crescat & incedat via exituræ, & tendat ad matura-
tionem, tunc postponenda sunt infrigidatiua & re-
percussiuua, imò ponenda sunt maturatiua. Potest
tamen ante hunc canonem in augmento & statu
maximè apponi, magis ex resolutiuis, num fortè
phlegmon resolui possit: si non, tunc ad maturatiua
deueniendum, vt in Scholiis sequentibus latius di-
cturi sumus. Sextus canon est: postquam sanies est
generata, non potest dissolui: quare dico, inquit Va-
lescus loco citato, quòd non oportet incisionem ne-
gligere vel retardare, apostemate saniem habente,
sed festinanter fieri, maximè si membris nobilibus
vel alicui concauitati fuerit vicinum, vt 13. Artis
paruæ. Nam magnus error inde contingit, si negli-
gentia huic rei adhibeatur. Septimus canon est Ga-
leno 13. Artis paruæ: Curationes apostematum ca-
lidorum sunt hæ: prohibere fluentia, & coadunata
dissolueret. His regulis præmissis, post phleboto-
miam adhibitam calida illa resoluentia, quæ chirur-
gus perperam manui inflammatae apposuerat, amo-
ui; & imperaui vt idem apponeret micam panis nu-
tritæ in lacte vaccino, tribus granis croci orienta-
lis additis, pulvis instar. Sed cum iam melius dor-
miret quàm antea, sed tamen dolor nondum seda-
tus esset, idèò inuncta manu vng. popul. simul etiam
medullæ panis ita nutritæ in lacte immiscui aliquid
vnguenti populeonis: & ventrem hoc modo pur-
gaui: R. decoct. viol. end. fumiterræ ℥ iij. in qua
dissolue diacathol., syr. de end. ana ℥ j. misce. quo
quinq̃ies aluum deposuit: & ita alleuiatus est, vt
deinde febris cessauerit, & vrina minùs tincta appa-
reret,

reret, quamvis dolor ac inflammatio in manu permaneret. Sed cum die sequenti dolor rursus intenderetur, neque per totam noctem dormiisset, micæ panis siliqinei albissimi, ut prius, aliquid olei ros. immiscuimus, & sine croco cataplasma imposuimus phlegmoni. Interim & sub noctem sequens somniferum & refrigerans medicamentum intus propinaui: ℞. syr. pap. ℥ j. β. aq. lactucæ ℥ iiii. sumpsit autem vnica vice post cenam, & deinde per totam noctem optimè dormiuit: & manè cum redirem, vidimus phlegmonem seu inflammationem in manu planè sedatam, rubedinem quasi ablatam, & dolorem omnino diminutum. tunc cataplasmati supra scripto addebamus vnguenti alabastrini ℥ β. ad maiorem resolutionem, quia calor magna ex parte cessauerat, tum febris ipsa: & cum rediissem sub tempus vespertinum, intellexi per totum ferme diem ipse ægrum dormiuisse: & adhuc magis sedatus fuit dolor. Die subsequenti eadem manè applicui, tunc enim surrexerat ex lecto, & non sensit ampliùs dolorem, vrina ad aureum & naturalem colorem redeunte: & sic procedens deinde cum prædictis topicis per vnum atque alterum diem, Deo auspice perfectam sanitatem consequutus est. Venit tunc mihi in mentem Adolescens ille qui Bononiæ ab Ellideo præceptore meo, constante virtute, quadratus, ætate 24 annorum, ætate media, in sinistro crure phlegmonosum tumorem erysipelatosum patiebatur, cum magno tumore, rubore, caliditate, cum febre continua: & ab illo ita curabatur: Statim ex vena interna eiusdem lateris extrahi iussit ℥ v. sanguinis. Cruri applicuit istud: ℞. ros. rub., sem. myrtill, lini, foenugræci, coriand. althææ, meliloti, cortic. gran. ana ℥ j. decoquantur; & cum ista fomentatione fomentetur crus. Ad incipientes phlegmonas frig. astringentibus est vtendum. postea iis quæ digerunt, hoc est, modicè calidis, scilicet

camomill., melil., alth., sem. lini, fœnugr. At post
sotum inungebat cum vng. alabastr. Vesperis eius-
dem diei, priore amoro, petias madefactas in oleo
ros., acer. aq. ros. ana \mathfrak{z} ij. apposuit. Victus fuit te-
nuissimus, ex aqua cocta & pane, additis paucis gra-
nis coriandri. Febris fuit continua, vt solet. Sed ista
repercutientia & infrigidantia magis lædebant
quàm iuuabant, quamuis initio fluxionis applicata.
Secundo igitur die adhiberum est sequens: \mathfrak{R} . la-
ctis, farinae panis optimi, vitell. ouorum ana: misce,
in formam pultis. Bibit singulis diebus aquam
hordei bis. Tertio die dedit solutiuum: \mathfrak{R} . elect. de
succo ros. \mathfrak{z} β . diaprun. non solutiui \mathfrak{z} j. diaphœnic.
 \mathfrak{z} β . cum decoct. communi facta in aqua end. q. s.
fiat potus. Nihil eduxit. Ante cenam iniectus est
clyster ex \mathfrak{z} j. cass. ol. viol. \mathfrak{z} ij. diagrid. gr. v. cum
brodio. eduxit semel tantum. Quarto die magis in-
frigidantia & repercutientia cruri imposuit ex suc-
co semperuiuæ, aq. ros., acer. cum petiis applicuit.
Quinto die bibit aq. hordei bis vt supra. Sexto de-
dit medicamentum istud: \mathfrak{R} . elect. de succo ros.
diaprun. solutiui ana \mathfrak{z} iij. cass. rec. \mathfrak{z} j. nihil soluit.
Vesperis iniectus est alius clyster, scilicet: \mathfrak{R} . cass.
hieralogod. ana \mathfrak{z} j. mell. ros. colati \mathfrak{z} ij. diagrid.
gr. v. cum oleo communi, sale & vitell. ouor. fiat
enema cum decoct. \mathfrak{z} j. colocynthidis. Eduxit ter.
Laudauit etiam linitiones ex atramento. Vide 13.
Method. Deinde cum ad suppurationem omnino
vergeret phlegmone, tandem emplastrum tale ap-
poni iussit: \mathfrak{R} . fermenti, adipis porcini, fimi co-
lumb. ana. Et postero die vehementer attraxit ad
locum, & materiam & humorem delinquentem.
Postea in Hospitale translatus est, vt aperiretur
phlegmone, & deinde per Chirurgum curaretur.
Calida namque & humida celerrimè pus mouens,
De hac re videas ipsum Galenum 4. Method. fol.
63. fac. 2. Ita & Bettus medicus Bononiæ celebris
laborabat

laborabat æstate phlegmone dextræ natis. imposuit diachylon cum gummis, deinde butyrum cum brassica in sartagine frixum. Intentio erat suppurandi. Deinde emplastrum ex rad. althææ, maluæ, butyro & oleo ros. Radix althææ lota in tessellas minutim dissecanda, deinde coquenda in aqua: post cocturam pistillo in mortario conterenda, & tunc butyrum cum oleo immiscenda, & paululum simul bullienda: addita est farina triticea, tres vitelli ouorum, &c. Idem in sene laborante phlegmone niaxillæ dextræ, cum corpus euacuasset, tenderetque ad suppurationem, & intro vergeret collectio, & dolor quoque premeret, adhibuit emplastrum ex ol. ros. lacte & pane: item decoctum ficum & pass. ore subinde cōtinere iussit, & ficum inuersam etiam ore tenere. Vide Gal. 11. Meth. fol. 15. & 13. In phlegmone scirrhusio Curtius in Iuene, extracto per vices bis sanguine, prisana suo more cocta exhibita, quamdiu febris durauit. Deinde pane cocto nutriuit bis die. item syrupum hunc dedit: ℞. oxymel. simpl. syr. ros. ex infus. ros. sicc. ana ℥β. syr. de end. ℥j. aquar. end., borag., lupul. ana ℥j. Emplastrum ex oleo ros, abs. de spica ana q. s. far. hordei, foenugræci ana ℥ iij. misce cum oleis. oblinebat cum eisdem oleis ante impositum emplastrum. Post febrem, & bona apparente concoctione, ℞. cass. rec. tract. ℥j. rhab. subtiliter puluerisati ℥ ij. cum decoct. communi fiat potus. Deinde post triduum, empl. de meliloto redact. cum oleo absinth. in formam vng. inunxit hepatis & splenis regionem. Vide Gal. 13. Methodi.

SCHOLIA.

Gal. 3. 2d
Glauc. ca. 2.

Ex sanguinis fluxu copiosioris, quam parti sit necessarium, fit ea inflammationis species, quæ peculiariter inflammatio, seu phlegmon dicitur, qui affectus totius generis habet appellationem. A phlegmone igitur sumimus exordium, de tumori-

huius præter naturam sanguineis, ut quæ frequentissimè incidunt & symptomata (ut Galenus ait) periculosissima excites. Itaque phlegmone Galeno, libro primo de morb. & symptomatis bisariam accipitur. Vno modo communiter, veterum qui ante illum faciunt more, pro omni partium veluti inflammatione & quadam effervescentia, hoc est pro omni calida, ac veluti flamma quadam dispositione, quam Græci propriè φλέγων appellunt. Hinc & Paulus lib. 4. cap. 17. de inflammatione scribens, inquit: Omnes ex æquo tumores calidos, quibus dolor feruorq; adest, nostri inflammationes, Græci phlegmonas appellare consueverunt. Verùm pro diuersa quæ ipsos facit, materia, hi quoque enatiunt. Cum enim sanguis probus & crassitie mediocris, in particulam aliquam vniuersim confluerit, ac propter copiam impactus inhaerit, inflammatio propriè appellata nascitur. Cum verò flava bilis in parte aliqua subliterit, herpes vocant: ubi verò & sanguis & bilis flava simul incubuerint, erysipelas excitatur. At cum sanguis, qui insit, calidus impensè & crassus fuerit, carbunculos mouere solet. Itaque ab inflammatione quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper accidit, incipiendum esse indico. Hæc Paulus. Hinc & Fuchsius lib. 5. de tumor. præter naturam cap. 1. de inflammatione: quam Latini inflammationem, Græci φλεγμονή nominant. Vox autem φλεγμονή illis bisariam sumitur: generatim pro omni calido & dolorifico, cum feruore tumore: ut planè tum idem quod φλέγων, hoc est effervescentia, significet. Sic sanè herpes, erysipelas & carbunculi, phlegmones dicuntur: quæ in significatione ab Hippocrate & aliis veteribus vox est usurpata. Propriè autem phlegmone, est tumor supra feruorem effervescentiam verbens, dolens, durus & tactu renitens, quod copiosius tradit Galenus 3. Therap. ab initio statim. ita quoque & Taganlium cap. 6. de vera phleg. lib. 1. de tum. præter naturam, inquit: Alio modo à Galeno & innioribus accipitur pro tumore ex sanguine vero ac puro; hoc est optimo, ac mediocrem crassitiam obtrahente, procreato. Et hæc quidem generis sunt appellationem: atque inflammatio æquiuoce generi Latinis nominatur, Græcis verò absolutè phlegmone. Ea autem recentioribus duplex est: vera scilicet, & non vera. Vera phlegmone

Duplex acceptio phlegmones.

1.
Phlegmone pro phlogosi.

Paulus.

Inflammatio generatim accepta.

Phlegmone propriè.

2.

Phlegmone pro inflammatione ex sanguine optimo.

Phlegmone duplex.
1. Vera.

2. Non vera.

fit à sanguine benigno, hoc est, qualitate, & substantia seu consistētia optimo, sed copiosiore quàm sit parti ex usu. Non vera & illegittima phlegmone, ex pravo & non naturali sanguine efficitur. Est autem sanguis humor calidus & humidus, ex temperatiori parte ipsius chyli progenitus: & hic quidem duplex est:

Sanguis quid & quod duplex.

Naturalis, & non naturalis. Naturalis est humor calidus & humidus, substantia quidem mediocri, colore verò multum rubens, odore autem & sapore dulcis, mitis ac benignus. Verùm non naturalis ille dicitur, qui ab isto nuper descripto deflexit, degeneravitque: intra tamen sua latitudinis terminos; quos si transgreditur, non iam sanguis, sed alius humor venit appellandus. Hunc autem (sanguineum, inquam,) degenerare à propria sua natura contingit dupliciter. Vno modo (ut aiunt) in se, hoc est, ratione sui, permixtata propria eius substantia, citra alterius admixtionem: Altero modo, per alium, seu ratione alterius.

Sanguis bifariam degenerat à propria sua natura.

Et per se quidem adhuc bifariam; nempe, vel quia eius substantia crassior est, aut tenuior quàm debeat; vel quia adurit, & quod ex eo tenuius est, in flavam bilem mutatur; quod verò crassius, in atram, idè, absque separatione. Alterius verò ratione sanguis fit non naturalis, quando alius humor illi permiscetur. Quod multifariam contingere potest, prout scilicet varia species bilis, pituita aut melancholia, cum ipso sanguine misceri possint. Ex quibus liquet, quòd ex sanguine quatuor species seu differentiae tumorum præter naturam procreantur. Primum ex sanguine naturali & benigno generatur vera phlegmone.

Quatuor differentie tumorum ex sanguine.

Ex sanguine verò illandabili factò per admixtionem aliorum humorum; tres enascuntur differentie phlegmones non vera atque illegittima: quippe quòd tres alij humores (pituita inquam & utraque bilis) ipsi sanguini permisceri possunt. Itaque si flava bilis sanguini commisceatur, quod ex ambobus unum est constat, vocatur phlegmone erysipelatodes: si pituita, phlegmone œdematodes: si atra bilis seu melancholia, phlegmone scirrholes. At ex sanguine illandabili & maligno per admixtionem, & corruptionem propria substantia, pro ratione tenuitatis aut crassitiei ipsius generantur vel carbunculi, qui Græci anthraces dicuntur: vel gangrana, vel sphacelus, de quibus suo loco. At hunc de phlegmonis quæ propriè sic appellantur & in extremis partibus eboriunt

(nam

(nam de interuallum inflammationibus in libris nostris Obseruationum & Citationum Medicinalium actum est) differemus. Phlegmones itaque causæ sunt tres, ut & aliorum omnium tumorum præter naturam qui per defluxionem fiunt. pri-
 mitina scilicet, quam & prægressam & euidentem appellamus: antecedens & coniuncta. Euidentes causæ inflammationis sunt, 1. prægressa. occasiones externæ: ut confusio, disruptio, commissio, fractura, vulnus, ulcus spontaneum, luxatio, & alia id genus, & lassitudo, quæ quatenus dolorem in laborante particula excitat, fluxionem accersunt. Ita & Aëtiū omnem inflammationem ob sanguinis defluxum, vel à manifesta vel ab occulta causâ vult fieri: omnis etenim dolor ex prægressis causis fluxionem concitat, ut Gal. 3. art. par. ut de causis primitiuis etiam recitatur à Valasco cap. proprio de phlegmone. Antecedens, ut sanguinis exuberantia, prohi quidem & inculpati: ut cum ad immoderatam venarum repletionem vena perungunt. tunc enim cogitur sanguis (veluti quid superfluum) ad partem aliquam vel imbecillam vel plus insto excelsam, vel dolore affectam, effundi ac desuere: ubi tandem compingitur, atque impactus manet, nisi protinus ab initio reprimatur. ita & Fernelius: Causa continens, inquit, sanguis est, non in solam cutem, sed in subiectam quoque carnem impactus, qui è venis eò tandem confluit. Cum enim vena arteriaq; maiores immoderata sanguinis copia distenduntur, hanc granata in minores quasi omne deponunt, ex his demum in minimas. Ac tum, cum per carum oscula, perque tunicarum meatus sanguis cohiberi non possit, effluit, illabiturque in spacia vacua quæ inter fibras sunt primorum corporum, præcipueque musculorum, venarum, arteriarum, nervorum atque membranarum. Ha partes fluxione dum perfunduntur implenturque, distenta copia quasi diuelluntur, fermentisque sanguinis ardore incalescunt, doloremq; faciunt. Sanguis quippe extra vasa collectus, nec libere perflabilis, necessarii putrescit atque inflammatur. Ita quidem si purus is erat, exquisita phlegmone fit; cuius species sunt: ophthalmia, parotis, angina, parulis in gingiuis, aliæq; ex partibus nomina adepta. Est & alia minis exquisita, cuius non syncerus est sanguis, sed aliorum quoque humorum particeps. Hinc sunt phlegmone erysipelato-

Causæ phlegmones.

Aëtiū lib. 4. cap. 30.

2. antecedens.

Coniuncta.

Signa.

Lib. I. ad
Glauc. cap. 1.
lib. de tum.
præter natu-
ram, & 13.
Method.
Notæ veræ
ac legitimæ
phlegmones.

des, ædematodes, scirrholders. Sic itaque phlegmones causa ante-
cedens existit, ut dicebat etiam Valesius, boni sanguinis repletio,
quæ est causa ut fiat sanguis superfluum ad aliquod membrum,
maximè si sit debilitatum, cum eo deriuetur & fluat. At coni-
uncta causa seu continens (ut ait Tagaulius) est ipse sanguis
qui iam loco affecto infarus est. Valesius verò ita inquit: Causa
coniuncta phlegmones sunt, non euentatio illius sanguinis,
& supercalesfactio & putrefactio eius. Hac de causis, nunc ad
signa progrediamur. Phlegmonis symptomata seu signa 13. Mat.
hæc sunt: Dolor, sensus, resistentia ad tactum, pulsatio, rubor,
calor, tumor. Sic quoque Paulus loco citato: Tumor rubens, do-
loris plenus, tangenti veniens, & calidus, ex sanguine (ut à me
dictum est) probo originem trahit: qui, sanguinem dico, nunc
ex toto fertur corpore, nunc in aliquam particulam copiosius in-
cumbit, sic ut à vasis nequeat contineri; exciditque aliquid ro-
ris modo in ampla partium quæ intercedunt, spacia. Hac Pau-
lus, ex quibus Neoterici omnes suas notas desumpserunt. & ita
inflammatione in particula aliqua orta, vehementer dolor urget,
nisi eiusmodi sit, quæ sensum omnino difficilem habuerit: pulsus
in profundo molestus accidit, tendiq; prorsus ac frangi particula
apparet, & vehementem calorem sentit, ut quasi comburi
videatur, unde & refrigerari desiderat. saliq; rubor per sum-
ma viget, qualis ex balneo aduenit, aut ex igne, aut quoniam alio
modo calefactus. Renixus partis tangenti eam, pro tensionis mo-
do, ut & fusiis Galenus ad Glauc. docuit. Quæ signa & Ta-
gaulius & Leononius etiam posuere; hoc modo: Phlegmones no-
ta sunt, tumor seu incrementum partis supra naturaliter habi-
tuum, calor vehemens adeo ut membrum comburi videatur. Ru-
bor per summa vigens, qualis ex balneis, vel igne aut quoniam
alio modo calefactus aduenit. Dolor vehemens, nisi membrum
difficilem omnino sensum habuerit. pulsus seu pulsationis sensus
in profundo molestus. Tensio seu extensio membri, quam non
modò ipsi tantum deprehendimus, sed etiam ipse ager proprio
sensu aduertit. Renixus parti tangenti eam, pro tensionis modo.
Et si quæ sint alia, quæ præsentem sanguinis abundantiam in
parte aliqua restantur. Eadem ferè & Fernellius, inquit:
phlegmone innot est calidus, præter naturam collectus, promi-

uens

ntis atque circumscriptum, cui saltem gallinacei magnitudine. Hinc quasi ex igne aut ex balneo rubor inest: calor quoque ex inflammatione vehemens, quasi pars uratur: distensio ex copia tenens: pulsatio profunda & molesta, quod attēriatum distole partem inflammata feriat: dolor ex calore, ex pulsu atqueensione acerbis, praesertim cum pars eximio sensu praedita est. Dicit enim Anicenna: Quanto membrum in quo est phlegmone magis est nervosum, tanto dolor est maior: & quanto magis carnosum, tanto minor est pulsatio & calor & dolor, & ipsius resolutio aut collectio velocior. Phlegmone quatuor habet tempora: principium, augmentum, statum & declinationem: nisi saltem fluxio intro recurrat, vel repellentibus medicamentis statim reprimatur. Vbi autem quatuor haec tempora percurrerit, necesse est ut eum materia vel resoluatur atque exhalet, vel suppuretur, vel corruptatur atque putrescat, vel in scirrhosam ac lapideam duritiem abeat. Et horum quidem omnium signa ex Scholio precedente inuenies. Sed hu etiam ea adicienda quae Valerius ex Anic. cap. proprio commemorat: Primum, quod raro accidit phlegmone simplex; sed ut plurimum eidem adiungitur erysipelas, durities, malignitas aut furiositas. Secundum dicit Anicenna, cum phlegmone est in loco nervoso, quod pulsatio est maior, ac dolor, & similiter est resolutio eius vel collectio ad saniem velocior. & illa mala habetur quae non tendit ad declinationem vel saniei collectionem; perducit enim membrum ad mortem & putrefactionem. hoc maxime evenit ob magnitudinem inflammationis & multitudinem materiae, aut eiusdem malignitatem, etiam si parua existit. Quando tumor phlegmonis diminuitur, & dolor & pulsatio alieniatur, tunc tendit ad resolutionem: si vero increscat pulsatio, & augeatur apostema & calor, transit in suppurationem. Ceterum, ut & Tagantius annotavit ex aliis, phlegmonem plerumque mala comitantur symptomata, quae eum curandi rationem interpellant, immutantque. Cuiusmodi sunt, dolor vehemens, partem admodum sensibilem occupans: recursus materiae ex glandulis (quae Graeci *adonas* & vulgo emunctoria vocant) ad partes internas: item partis affeeta mortificatio (quam corruptionem esthiomenicam appellant) ex nimia scilicet refrigeratione & valido infatu ipsius

Prognostica.

Phlegmones
tempora
quatuor.Symptomata
quae phle-
gmones cura-
tionem inter-
pellant.

materia (quæ inflammationem committit) pronens: durities quoque lapidea & penè indissolubilis, vulgò sclerotica nuncupata, ex perperam ac temerè facta tenuioris humoris dissolutione. Quo circa diligenter ac sapius quidem observare oportet, in curandis tumoribus qui præter naturam consistunt, quò quisque tandem sit evasurus, & quæ inopinatè supervenerint accidentia, ut circa id quod apparet, & urgens est, maximè insistamus. Quod nos proliè Galenus admonuit, ad hunc modum inquiens: In morbis quidem qui difficiliter resolvuntur, verendum est, ne eorum reliquæ prædura relinquantur. Quare in singulis resolutionibus attendere oportet, ad quid transmutetur omnis, cuius curatio suscipitur, tumor. Nam ea quæ cum fortiter exsiccantibus agitur, reliquias præduras operatur. ideo sæpè curatio immutanda, ut exempla infra scripta docebunt.

Lib. 3. ad
Orauc. & 13.
Therap.

OBSERVATIO V.

In qua ponuntur exempla puræ phlegmonis.

RVSTICA quædam mulier magnam phlegmonem in brachio habebat. Huic cum menstrua deficerent, facta est phlebotomia in crure ex loco opposito. Nam hoc est quod & Fuchsius cap. prop. de phleg. ex Græcorum mente annotavit. Quod si in inferiore aliqua parte, verbi gratia genu, constitisset, tum sanguinis euacuatio ex superioribus partibus facienda incidere itaque oportet in gibbero venam, aut interiorē, aut mediā: nisi alterum cruralis scarificare, aut in eo venam pertundere. Si verò aliqua pars superior patitur inflammationem, per inferiora sanguis est educendus. Semper enim fluxionis motum ad contrarium trahere expedit. Debet tamen revulsio fieri secundum rectitudinem, Gileno lib. de curandi ratione per sanguinis missionem teste. at nos saphenam aperire iussimus, cum & intestina deficerent. postea applicuimus parti affectæ quæ repellerent; qualia sunt hæc: R. succi solatri, plantag., semperuivæ ana ʒj. rosar. rub.

rub. myrtill. ana ꝑ ij. puluerifentur puluerifanda subtiliter: misceantur, & cum petiis lineis madefactis in illo liquore loco ipsi imponantur. Vel hæc quibus Benedictus Fauentinus præceptor meus utebatur: R. aceti optimi ꝑ iij. albuminis oui ꝑ j. aquæ rosatæ ꝑ j. ꝑ. ros. rub. subtiliter pul ꝑ ꝑ. misce, & perias lineas madefactas in dicto liquore loco affecto applicato. Vel R. vng. de cerusæ ꝑ ij. succi plantag., succi semperuiuæ ana ꝑ j. aquæ ros. ꝑ ij. misce; & cum petiis lineis apponito: aut laminā plumbeam hoc puluere inspersam: R. cerusæ ꝑ ꝑ. ros. rub. corall. rub. ana ꝑ ij. misce, fiat puluis. At cum hæc valde repellentiâ ob insignem dolorem minus iuuarent, apposui emplastrum ex micis panis cribellati, ex oleo ros. & lacte, quod in tumoribus & omnibus inflammationibus cum rubore sæpe experti sumus & dolorem sedare & fluxum materiæ inhibere. Interim statim post sanguinis missionem euacuauimus corpus omnium primò medicina purificante sanguinem, non expectando eius digestionem; quoniam (teste Benedicto Fauentino præceptore meo in sua Empirica cap. proprio) natura phlegmonis est, vt digestionem non expectet, dedimus id quod sequitur: R. cass. recent. tractæ ꝑ x. rhab. electi (quia satis diues erat) ꝑ j. spicæ gran. x. misce, & dissoluantur cum decoct. communi flor. & fruct. q. s. in diluculo exhibita est potio. Cæterum cum illud emplastrum ex mica panis apposuissemus, dolor mitigari cœpit, & inflammatio cessare.

At alia quædam mulier rustica, prope Delphos circa Hornam, cum anno 1569. mense Maii angina periculosa laboraret, & cum chirurgus phlebotomiam omisisset, ad eam quarto die demum vocati sumus: cum & tota facies phlegmone infecta esset, ac totum collum inflammatio occuparet, vt suspicio de peste esset; nam postea & infans eodem malo correptus est, deinde & assistens mulier. Huic

sanguinem ex cephalica detrahi iussimus vena, postea etiam sub lingua, aluo prius glande irritata: tandem adhibitis gargarismatis aptis melius habere cepit in gutture. Sed tantus aderat calor febrilis, ut febris pestilentialis videretur. quare postquam melius quid sumere posset, iulebum sequens propinauimus, cum satis liquida deponeret per aluum: R. syr. acetos. citri, oxyzacch. simplicis, syr. viol. ana \mathfrak{z} j. \mathfrak{ss} q. end., cicor., borag. ana \mathfrak{z} ij. misce pro duabus dosibus. At postea facies magis inflammata est ac inflata, ita ut totam faciem phlegmone occuparet, & oculos; adeo ut eos aperire non posset. igitur ad leuiter refrigerandum & reperiendum hoc epithema fronti applicari iussimus, & ut pepla subinde intincta naribus & labiis (nam illa etiam phlegmone, tum maxillæ, afficiebantur) apponerentur: R. aq. maluæ \mathfrak{z} j. aquæ ros \mathfrak{z} iij. aq. solatri \mathfrak{z} j. β . olei ros. \mathfrak{z} β . misc. pro frontali. Oculis verò inflammatis, ut aperiri possent, alternatim isti duo sacculi imponerentur: R. hordei mundati p j. folior. maluæ m. ii. sem. cicchor. \mathfrak{z} j. coquantur in aq. communi q. s. & eo depecto sæpius fouebantur: reliquæ in sacculis posite apponebantur. Postea aliquot diebus intermissis etiam totum brachium phlegmone correptum est. inunximus autem primo vng. ros. postea etiam, cum dolor intenderetur, cataplasma sequens imposuimus: R. maluæ m. iij. pistentur ad molli- tudinem: adde farinæ hordei \mathfrak{z} β . ol. viol., ros., vng. popul. ana q. s. fiat cataplasma. Septies fuit reiteratum. Interim cum aluum non deponeret, subinde suppositorio communi utebatur. & sub noctem loco eibi capiebat hordeatum sequens: R. hordei mundati p. j. amygd. dul. excort. \mathfrak{z} ij. sem. pap. albi, sem. 4. frig. maior. mundat. ana \mathfrak{z} β . fiat hordeatum cum pauco zacch. ad lib. i. & sæpiissime sumebat ex syr. sequentibus cochlear vnum: R. syr. viol. ex infus. ros. ana \mathfrak{z} j. β . syr. de acetos. citri \mathfrak{z} ij. misce.

Postea

Postea brachium inunximus vng. popul. oleo viol., amygd. dul. ros. ana p. æ. Imposito deinde iterum cataplasmate suprascripto, tandem bene habuit, & à phlegmone curata est. Sed & alteri hoc cataplasma egregiè profuit, & dolorem sedauit: R. farinæ triticeæ q. s. coquatur in aqua, addendo ol. ros. q. s. & parum croci ad sedandum dolorem. hoc etiam maturat. Aquæ enim & olei mixtura tepidam generat caliditatem, mollitque & mitigat, utpote moderatam habens facultatem, ut patet è 4. de victus ratione. Sed & hoc emplastro commodè sæpe vsumus ad dolorem sedandum, & tumorem & extensionem remolliendam, & materiam insensibiliter resoluendam: R. farinæ sem. lini, fœnugræci, sem. anethi, flor. chamæmel. melilori, bismaluz, coctis & pistatis in aqua, & incorporatis cum mucilagine sem. althææ & butyro recepti. potest addi in processu farina fabarum, quæ etiam maturant, & ex mente Galeni valdè confert lini semen solum coctum & appositum. Maturatiua malagmata pete ex Matthiolo & apud Bert. de apostema. Stomachi. Sed de his in Scholio subsequenti.

SCHOLIA.

RATIO curandæ phlegmones ex defluxione conceitata, corporis summa occupantis, hæc est. Cum inflammatio, qua Græcis peculiariter phlegmone dicitur, ex influxu sanguinis copiosioris scilicet quam sit parti ex usu, nascatur: fluxio autem incipiente adhuc phlegmone, partim fiat, partim iam facta sit: duplex sanè erit curationis ipsius adhuc incipientis phlegmones scopus: nempe vacuandi quod influxit, & prohibendi quod infuit. Porro fluxionem inhibebimus, si humorem influentem retraxerimus ac repulerimus, si afflicta parti robur addiderimus, & si quid fluxionem accersit, summoouerimus. Retrahemus autem atque in contrarium humorum defluxum reuocabimus, venæ sectione, si quidem vires valeant, & atas permiserit: sin minus, admodic cucurbitulis, vel ligaturis, vel strictionibus,

Methodus
curandæ
phlegmones
quæ adhuc in
generatione
sunt.

1. Fluxio quibus prohibetur.

1. Retractio.

a. Repulſio.

2. Cauſæ
ſummitio.Vacuatio eius
quod iam in-
fluxit.
Gal. 13.
Therap.

Scarificatio.

Quatuor in-
tentiones cu-
rationis
phlegmones.I.
Prima inten-
tio, vitæ in-
ſtitutio.

tionibus, vel calfactis partibus, directè affecto loco reſpondenti-
bus. Reſeremus autem repellentibusve, ad moris medicamentis,
qua hac facultate prædita ſint, hoc eſt, qua aliò fluxionem pro-
pellere ac tranſmittere poſſint. Cauſas verò deſtuxionum ad par-
tem iam phlegmone obſeſſam concurrentium ſubmouentem, par-
ticulam ipſam, ſi imbecilla ſit, confirmantes, roborantes ve: ſi la-
xa nimis, aſtringentes: ſi calida eſt, ut eſſe ſolet, refrigerantes:
& dolorem, ſi diſcruciat, demulcentes: ac corpus vniuerſum,
ſi ſanguine abundet, & parti contagium tranſmittat, vena ſec-
tione vacuantes. de quibus omnibus mox dicetur. Vacuamus
autem quod iam influxit, & in partem affectam ſe recepit, non
modò medicamentis iis qua digerunt ac reſolunt, hoc eſt, diſcu-
tiunt ac reſolunt, ſed etiam qua aſtringunt & refrigerant.
Magisque proſectò (inquit Galenus) ad incipientes phlegmonas
frigida aſtringentibusq; quam iis qua digerunt eſt vitendum.
Atque etiam magis, ubi craſſum quod conſuiſt non eſt. Sed ſi
ſanguis in particula, quam phlegmone prehendit, vehementer
eſt impactus, non eſt amplius repercutientibus vitendum: ut in
precedentibus dictum eſt ſed tum digerere eſt tempeſtuum. In
vereaſcente quoque inflammatione, qua poſt totius corporis
vacuationem, aliamq; idoneam curationem, duritiem quandam
ac nigrorem in partibus reliquit, ſanguinem ſcarificationibus au-
ferre (Galenus etiam autore; non eſt incommodum. atque hac
peritis methodus vniuerſalis ſufficere poſſet. Sed ſi neotericos ſe-
quamur, quatuor intentiones curationis phlegmones reſultabunt
ut debita viſtus ratio; influxionis inhibitiò, ſeu materia antece-
dentis auerſio; & humoris qui iam ſe in partem recepit (mate-
riam conuictam vocant) vacuatiò: & ſymptomatum corre-
ctio. Prima itaque intentio perficitur debita ſex rerum vulgo
non naturalium appellatarum & eorum qua illis annexa dicun-
tur adminiſtratione. de quibus pluſquam ſatis diximus in libris
noſtris Obſeruat. & Curationum medicinalium; ita ut repeten-
da non ſint, ne nauſeam lectoribus moneant. Qua omnia (quo-
niam phlegmone ſubinde febres accendit) ad frigiditatem, &
humiditatem ſpectare debent. Aërem itaque ſyncerum & cla-
rum eundemq; frigidiſculum eligito. Viſtum tenuem frigidum
& moderate humidum ſernato. Vinum debile & pauciſerum,
id eſt,

id est, quod in temperando haud multam aqua missionem sustinet (Græci oligophoron vocant) assumito. Quod si febris vehemens (ut saepe affolet) acceperit, abstemius esto. Partem phlegmone obfessam ne exercuato: quiescem, quantum potes, praesertim si plurima succorum abundantia sit, seruato. In somnis & vigiliis modum teneo. Somnium diurnum & praesertim meridianum vitato. A crapula & inglutie summo opere caneto. Aluus fusa & mollis sibi semper esto: atque eam interdum, si opus est, clysteribus vel glande subducito. Iræ, clamorem, contentionem, ut inimica fugito. A Veneris usu, velut ab hoste infestissimo, te subtrahito. Secundus scopus curanda phlegmones, qui est fluxionis anersio, perficitur vena sectione, si vires & aetas ferant. Semper autem in omnibus membris vena secetur è regione sine è directo (quod Græcè κατ' ἴκιν dicitur) siue reuellere, id est in contrarium retrahere velis, siue ad latus deriuare, etiam si plethora adsit: è directo autem suus dextra dextris, & sinistra sinistris: ut in genu si inflammatio sit vel in inguinibus, ex superioribus partibus ut in gibbero vel media: si superior pars, in inferiori: nam & à laborante particula indicatur vena secande electio. Valet & motus, frictio, ligatura partis opposita, celebrata prius (ut dictum est) sanguinis detractio. Itaque si in manibus phlegmone est orta, crura exercitanda sunt, vincienda, & fricanda: sin in cruribus, manus. Tertium scopum assequimur solis per initia phlegmones, repellentibus (exceptis prius memoratis casibus) parti inflammatione laboranti admoitis. Vacuatur enim (ut Gal. ait) quod impletum est non modò medicamentis in qua digerunt, sed etiam qua adstringunt & refrigerant: cuius generis sunt, qua repellentia & reagentia dicuntur. In augmento autem ad presentem intentionem, id est, ad vacuandum quod iam influxit, simul & prohibendum ne deinceps amplius aliquid confluat, miscenda sunt digerentibus reprimentia: ita tamen ut horum copia ac potentia, illis adhuc prepolleat. In statu verò æquis portionibus innicem commiscenda sunt, ac mitigatoria (cum vehementissimi tunc dolores adsint) applicanda. At in fine status, & in declinatione, solis digerentibus quod impactum est, vacuare oportet, si saltem ipsa phlegmone resolutione seu discussione terminari debeat. Si verò degeneret in abscessum,

2.
Secunda intentio, auersio fluxionis.

Gal. 2. ad Glauc. cap. 1. 13. meth. & 14.

3.
Tertius scopus, qui est humoris iam in parte recepti vacuatio.

Reprimentia in augmento prepolleere debent digerentibus.

Et phlegmo-
ne in absces-
sum degener-
ret.

Paulus lib. 4.
cap. 17. de
inflammatio-
ne.

abscessum, & fieri non possit, ut prius collectio ac eruptio impe-
diatur, tum suppurationibus, aperientibus, ac detergentibus medica-
mentis vti licebit. Porro exiccantia conferunt in fine viriusq; af-
fectui, hoc est phlegmones & abscessus. Hac enim quod reliquum
humoris est prorsus absorbunt. Verum facta sectione in abscessu
iam suppurato, medicamentum quod sine erosione siccat impo-
nendum est, ut in sequentibus dicitur. Cum itaque inflammatio
(inquit Paulus) repente effragio particulam quampiam sine ma-
nifesta causa precedente absiderit, totum verò corpus partis conta-
gium transmittat, uniuersum quidem tum sanguinis demissione
vacuati oportet. quod autem inflammationem experitur, super-
fundere ac illinere medicamentis, quæ non calefaciant, humi-
dientq; sed illuminem humoris repellere sint idonea. At quod iam in
affectum partem se receperit, euacuantur. Itaque illinitur cata-
plasma quod constat semperniuo, mali punici cortice, vino in-
octo, cera & polema. hoc & similibus, cum dolor vehemens
non urget, utendum est. Vbi verò particula fluxionem cum dolore
ampliore senseris, ne tum quidem calens aqua oleum ve adhiberi
debet, aut ex farina cataplasmata, ut quæ fluxionum vitii om-
nia sunt inimici: doloris tamen vehementia leniri eo quod constas
passo rosaceo, cerâq; modica & lanis sordidâ quæ a sibi multum
conspiciant. per aëratem quidem frigida, hyeme egelida exci-
piuntur, applicanturque: sed ita ut superiores quoq; affectus par-
tibus locos, spongia vino austero imbuta aut posca frigida com-
prehendant. Caterum miscentur cum cataplasmatibus vtiliter
etiam herbe. Ad incipientes itaque phlegmonas repellendo aptis-
simum auxilium est à Galeno oxycraton, quod Latini poscam
aqueam nominant. Est autem mixtura ex aqua & aceto, ita
quidem temperata, ut adhuc bibi possis. Spongia ergo hoc ipso
oxycrato persusa atque imbuta, parti in qua phlegmone reside-
re imponenda est. Loco autem oxycrati, Galeni ipsius consilio, su-
mi potest vinum aliquod austerrimum, vel frigida solum, in par-
tibus scilicet, quæ circa artem sunt. Sic enim dicit: In particu-
lis quæ circa artem sunt, sat fuerit (per initia phlegmones) etiam
spongiam vel ex frigida aqua, cui paululum aceti sit immixtum, vel
aqua sola imponere, sicut etiam ex vino aliquo austero. Ad idem
efficax est eiusdem Galeni cataplasma ex semperniuo & malico-

Repellentia
circa initium
phlegmones
adhibenda.

1.
Oxycratum.

lib. 13. me-
thod.

rio in vino decoctis, rhu, id est sumach, & polenta. Repellit enim quod influit stringendo, atq; id quod continetur exiccando vacuat, effectasq; partes utroque nomine confirmat & corroborat. Hoc remediū a recentioribus, & Auicenna sub hāc formula postea descriptū est: R. succi semperuini lib. 1. vini quod crasse sit substātia & saporū acerbi, lib. ʒ. farina hordei quart. 1. cort. malor. gran. sumach puluerisat. ana ʒ ʒ. coquantur: & fiat linimentū. Aliud quod ad idē efficaciter auxiliatur, ex Hali-abbate: R. Santali albi & ryb. an ʒ ij. memitha, id est, glaucij ʒ ij. terra cimolia, bol. arm. ana ʒ i ʒ. omnia in tenuissimū pollinem terantur, & diligenter cribrentur: postea dissoluantur in succo semperuini aut porrulacā vel lactuca, & fiat linimentum. Aliud ad incipientes inflammationes phlegmonosā, iritū & vulgare, quod & recentibus vulneribus, & nuper acceptis contusionibus valde utile est. consistat qui candido liquore, rosaceo & aqua ros. stillatitia: hoc enim panniculi imbuuntur, parti inflammata apponuntur, & subinde mutantur. Si vehemens dolor fuerit, cataplasmata ex plantagine, lente, solano, pane & oleo rosaceo imponenda. As Paulus, ut diximus, ante supra particulam male affectam spongiā vino aufero aut aqua frigida madefactā apponit. melius est ut ali-quid aceti admisceamus. Inter remedia, quae phlegmonarum incremento forinsecus admodum subueniunt, efficaciter auxiliatur rosaceum: Græci rhodinon vocant. Hoc enim partim repellit, partim per balitum digerit: quippe quod olei rosacei, mediam ad unguem naturā ebrineat. Itaq; rosaceo paucula quadam inest adstrictio, quae tenues ipsius particulas praeuerti quidem (inquit Galenus) nequit: sed ubi illa altius penetrauerint, in ipsam iam superficiem agere incipit, pro virili constipando, contrahendo ac condensando. proinde sit ut rosaceū phlegmonarum augmentis optimum sit & aptissimum praesidium. Aliud Auicenne, phlegmonarū incremento valde efficax: recipit fol. mal. nam. ʒ. abs. ros. ana ʒ ʒ. farina hordei ʒ j. olei camomil. ʒ j. ʒ. coquantur & pinsantur, ac in formam emplastri mollis redigantur. Aliud eiusdem, habet vini ad dimidiam vel tertiam coctis (hoc est, sapaui, illud defusum appellamus) quart. 1. id est ʒ ij. aqua ros. aceti ana ʒ j. ʒ. croci ʒ ij. moderato igne parū feruant: postea colantur, & panni eo liquore imbuti parti phlegmone obfessa applicentur

Galenicarū
plasma lib. 2.
ad Glauc.

Fen. 3. lib.
4. tract. 2.
cap. 3.

Hali abbatis
linimentum.

Remedia
phlegmonarū
in incre-
mento admo-
uenda.

Lib. 1. de
simpl. med.

applicentur epithemati modo. Parietaria quoque, iuxta Paulum loco citato, ad omnem inflammationem accommoda est, tunc per initia, tum per augmentum: consimiliter glaucium, atriplex, malua, lactuca, cucurbita calidis illita: benefaciunt & tribuli utrique inflammationibus ex influxu concitatis. brassica vero durescentibus valet. At praeceptor meus Benedictus Fanentinus hoc experimento quod repellit & resoluit, utebatur: R. Urinae pueri masculi citra decem annos lib. 1. albuminis oui num. iiij. aceti albisimi & foriss. lib. ss. aq. ros. 3 ij. misce. cum pecia vel ex stappa madefactis applicato. Si tamen applicatione horum vel etiam repellentium prima vel secunda die non appareat indicium abolitionis phlegmones, tunc oportebit, idem inquit, aliis ingenii vii, & simul repellere & resolvere: quale est hoc, expertum in prohibitione augmenti ipsius apostematis: R. olei chamomill. lilior., amygd. dul. ana 3 ij. assipi humidi 3 j. succi plantag. 3 i. ss. ros. rub. pul. 3 ij. misc. & cum lana infusa in dicto liquore calido locum patientem medicaberis. Sed si una intentio sit solum removere, actu frigida applicabis: si sit resolvere intentio, calida actu & potentia applicabis. Porro eiusmodi praesidia, quae in augmento inflammationis adhibentur, mixtaque ex reprimentibus & digerentibus facultates habent, tardius amoveri & mutari debent, quam pura repellentia, initio ipsius phlegmones accommoda. Auxilia in vigore seu statu phlegmones, & cum in ea vehementes urgent dolores, idonea sunt Aëtio, malua priuatum, & cum modico pane & rosaceo illita. Melilotum quoque in passo decoctum, & cum pane admotum. Idem possunt (inquit) & palmula in passo elixata & cum pane rosaceo confecta & mixta. Aliud, quod per halitum digerit, in vigore phlegmones summè efficax: R. perdicij, id est, parietaria, malua ana m. j. fursuris, farina volatilis ana p. j. fœnuigræci, anethi ana 3 ss. ol. chamamel. 3 j. ss. vino incoquantur, & exactè subigantur, donec in unitatem coeant: & fiat emplastrum. Aliud ex Galeno desumptum i 3. meth. quod etiam relaxat & dolores mitigat: R. medullæ panis lib. 1. maceretur in aqua calida per unam horam: post exprime, & addas mellis optimi 3 ij. Hoc discutit, & dolores mulcet. Ung. basilicon, & quod è succis conficitur diachylon nominatum, in

vigore

Cautio.

Quæ in statu phlegmones conueniant.

Actius li. 14. cap. 31.

Emplastrum Galeni.

vigore phlegmones admonenda esse consulit Arabs ille Auicenna. Verum hoc remolliendo, illud verò maturando magis est idoneum: quamquam tamen utrumque vi aliqua etiam digerente polleat. Vide apud Tagautium lib. 6. horum discutientium & aliorum descriptionem. Sic & Benedictus praeceptor meus: Vbi, inquit, est transitus phlegmones ad statum, tunc relictis ipsis repellentibus cum resolventibus & maturantibus ipsam phlegmonem procedes. primo tamen augmentabis resolventia, ipsis maturantibus minoratis, quia phlegmonis cura est resolvere ipsam materiam sanandam. A principio igitur statum phlegmonis medicamento sequenti medicaberis: R. rad. althae mund. ʒ ij. flor. chamomill. meliloti, anethi ana m. j. folior. malua cum radicibus violariae ana m. ʒ. bulliant in f. q. aqua ad consumptionem medietatis. deinde addatur farina fenugraci, sem. lini ana ʒ j. farina tritici ʒ ʒ. ol. chamomill. amygd. dul. ana q. s. ad impinguandum emplastrum. Et aduerte (inquit idem) & memento in quolibet medicamento, quantumcunque resoluino, ipsi phlegmoni semper addere modicum de oleo viol. & de oleo ros. completo, idque propter caliditatem quam semper secum phlegmone adducere consuevit. & hoc quidem emplastrum phlegmoni tepidum applicabis quater in die naturali. Ad idem valet & sequens medicamentum: R. myccilag. sem. althae, mucil. sem. malua, mucil. sem. fenugraci, & sem. lini ana ʒ j. succi althae ʒ ij. ol. amygd. dul. ol. lilior. alb. ol. chamomill., & sibi humidi ana ʒ ʒ. olei viol. ʒ j. misce, & cum lana succida in praedicto liquore madefacta phlegmonem medicaberis: & scias, ut sit minus fastidium ex praedictis rebus, fiat ceratum cum resina, & in corio extensum applicetur. Vel ex iisdem fiat foris cum spongia; deinde ceratum applicetur. Ceterum haec & similia, quae ad

Cautio.

Quibus utendum auxiliis in declinatione phlegmones.

plicata.

placata. item lana succida, supa, spongia, aut quid simile vino calente imbuta, postea expressa & apposita: hac enim omnia discutienti vi possunt, & dolorem non excitant. Caterum si ob morbi pertinaciam & difficultatem locus affectus nimis multam & resolutioni contumacem materiam continuerit, non ideo propterea, ut quidam faciunt, ad chirurgiā, id est, sectionem aut caustionem, prorumpere oportet, sed enī, ut collectus humor discussoris medicamentis per balnū digeratur. Moliri enim prius digestionē oportet medicamentis ad id conducentibus, quā inflammationem incidere. Quod si tumor digerentibus medicamentis non cadat, nullaq; amplius discutienti quod in eo continetur spes relinquatur: sed videatur potius materia ad suppurationē spectare, ad ea quæ maturant, & p̄u moent transundū erit. Sperant autem minorem (etiā si iam in abscessum degeneraverit) per habissimū digeri posse, si materia quæ eum excitavit, tenuis & pauca resoluat; idonea fuerit: si & in loco minimè profundo delitescat, cuiusq; particula laborantis rara extiterit. Si verò humor multus sit & crassus, atque in alio sinu reconditus, cuius verò densa, exhalatio seu resolutio nequaquam speranda est. proinde ad maturantia & p̄u moentia veniendum erit: cuiusmodi est cataplasma quod ex farina triticea in aqua & oleo temperatè cocta, constat: hoc enim celeriter inflammationes, quæ digestionī non cesserunt, ad suppurationem perducit, ut etiam Galenus nobis auctor exiit. Si quidem & calorem habes nostro calori persimilem, nempe temperatum ac mediocre, & ratione farina & olei (quæ lentoris quippiam habent, quo meatum obstruendo partis calorem nativum digeri, id est dissipari aut distrahi, prohibent) ut emplastica prædium est. Quæ duo maxime in maturantibus & p̄u moentibus medicamentis desiderantur. Sunt qui huic cataplasmati croci momentum coloris gratia adiiciunt. Sic etiam Paulus inquit: Quod si fieri non posse tibi videatur, ut partis eruptionem impedias, panem hydrelao incotsum delines, aut farinam hordeaceam consimili preparatam modo. particulas inter rad. alihæa incotse fovebis. At si tumor ad suppurationem contumax est, aut agere discutitur, cataplasma se ex ficis siccatis utere: oportet autem ficus dulces pinguesque incotse aqua aliquescere, ac in ipsam in tenui mellis spe-

Lib. 13. cap.
5. Method.

Quando spe-
randa resolu-
tio.

Pusmonen-
tia.

lib. 2. ad
Glauc.

Paulus lib. 4.
cap. 18. de
exterioribus
corpore ab-
cessibus.

tiem cogi, farinamq; hordeaceam adilei: & siquidem tumor subsidet minus ac conuenit, sicus incoques, & hyssopum, origanumve: sin voles magis intendere, salem decocto iniicies, diligenter animum aduertens, ne ex siccitate nimia pars in duritiem occallescat. Tale si quando videris, cucumis sylvestris radicem, aut alibea aut bryonia aqua simul decoques. Valentior autem & discutiendo promptior, dracunculi radix est, ipsiusque medicamentum, quod dracunculo enstat, valide huiusmodi vitia discit. Nonnumquam igitur solum hunc decoques, nonnumquam & sicus siccatus admiscebis, farinamq; simul cum adipe. Iam anethinum oleum crudos humores incostosq; tumores & concoquit & discit: itaque praeuros, ac crudos tumores uniuersos cataplasmati inditum concoquit, magisq; liquidum. Ceterum, ut etiam annotauit Tagantius, & Leonus, si tumor, ob infarctos in eo crassos & viscosos humores, apte ad suppurationem ducitur, eximie subueniet cataplasma ex rad. alibea & carie, dulcium ac pinguium decocto, quod mellis crassitudine representet, & farina triticea compositum. Ergo accipe praedicti decocti lib. i. farina triticea lib. ss. incognantur simul, & in formam cataplasmati reducantur. Si autem loco farina triticea hordeacea apponatur, vel cibarum panis, quem Graeci *σύνεμιρον* vocant, discutienda inflammationi magis quam suppuranda conueniet, ut lib. ad Glanc. 2. Galenus annotauit. Aliud in declinatione phlegmones puri monendo apprimè idoneum, quod à vulgaribus ebirurgis communiter usurpatur. Habet autem corticis radiceis maluanisci, id est, alibea, rad. lilij, senecionis, Graeci erigeron dicti, & foliorum maluae ana m. j. farina triticea ℥ iij. farina sem. lini ℥ j. axungia suilla recentis lib. ss. coquantur herba in aqua q. s. & iundantur cum reliquis in mortario; fiatque cataplasma. Ita quoque Benedictus Fanentinus praeceptor meus in sua Empirica cap. proprio sic dicebat: Aduersante verò secunda parte statim, ubi cognosces resoluentia non complere opus suum, statim dotes sollicitare ipsius phlegmonis suppurationem, quam utique complebis sequenti emplastro: R. rad. maluae cum foliis violariae ana m. j. ss. rad. alibea munda & minutim incisa ℥ ij. rad. lilior. alb. ℥ j. ss. bulliant omnia usque ad consumptionem medietatis aqua,

Huius cataplasmati meminit Hallabas.

Cataplasma commune.

Cautio.

aqua, deinde adde mucilag. sem. caulium \mathfrak{z} j. β . farina frumenti \mathfrak{z} β . fermenti \mathfrak{z} j. pingued. porci, butyri recentis, lactis mulieris ana \mathfrak{z} j. ol. lilior. albor., ol. amygd. dulc. ana q. s. ad impinguandum emplastrum quod calidum loco patienti apponatur: & aduerte ne calida multum emplastra apostematibus applicentur, quoniam partes materia subtiles resolverentur, & grossum petrificaretur, quod esset impedimento maturationi: eadem quoque emplastra frigida minime apponantur, quoniam sua frigidityte compingereut, & maturatio prohiberetur. Ad idem, egregie maturans & suppurans: R. lactis vaccini, à quo non sit extractum butyrum, lib. i. medulla panis subtiliter trisurata lib. i. succi caulium \mathfrak{z} iij. croci \mathfrak{z} β . olei lilior. albor. \mathfrak{z} iij. misc. & calidè apponito. Vel R. diachylonis sine gummi \mathfrak{z} iij. succi caulium \mathfrak{z} j. β . croci \mathfrak{z} j. cera citrina q. s. ad incorporandum ung. satis densum, quod extensum super corium per unum vel duos dies continuos patiens portet, & beue erit. Ad idem, estq; optimum, cum apparuerint signa maturationis in phlegmone, applicare ei, ter vel quater in die permutando, sequens medicamentum: R. farina tritici lib. β . olei ros. completi \mathfrak{z} iij. aqua fontis clara \mathfrak{z} iij. croci \mathfrak{z} β . misc. & omnia simul apud ignem bene ducantur, quousque fiat veluti unguentum. Ad idem, & est expertum in maturatione phlegmonis, si ipsi applicetur sequens medicamentum, repente suppurabit: R. tritici bene masticati & stomacho ieiuno cum salina bene permixti, lib. β . olei ros. completi \mathfrak{z} ij. croci \mathfrak{z} j. misc. & loco patienti cum assidua permutatione applicetur. Paulus hoc medicamentum abscessus coctos expellere affirmat, ut subinde pus in splenio reperiatur, nondum verò coctos in totum digerere dicit. habet lapidis pyritis \mathfrak{z} xij. ammoniaci triti tantundem, lomenti \mathfrak{z} v i. exceptum pice liquida, pelliq; illitum imponitur. Splenium verò non prius auferatur quam sua sponte deciderit: sed medicamentum non multo ante preparari debet, ut quod confestim ficescat. Vide & apud eundem Dionysia descriptionem, quæ ad abscessus mirabilis est, & ad mammas & inguina, epipastice, quæ per latentes meatus discussit: habet olei valeris, aqua, singulor. lib. hydrelaum incoquitur, mox aphronitri \mathfrak{z} v i. adiciantur mystos \mathfrak{z} j. vel ij. coquantur donec manus non inquinent. Deinde miscentur man-

Dionysia.

na jhm

na iheris, cere, ibereb. ana \mathfrak{z} vi. Ad Nernicos abscessus; B. cera colophonia, buxyi ana lib. i. picis. arida, melle ana lib. ij. arug. \mathfrak{z} iij. Vide & plurā alia apud eundem cap. citato de abscessibus. Sed & hac maximè suppurationem iuvant: farina triticea, sem. lini, fenugr. buxyr. pinguedo porcina, radix alibae; & alia multa vide apud Tagan. lib. 6. Ceterum si collecto ac iam confecto pure, abscessus in quem phlegmone degeneravit, sponse non aperiatur, scalpello, vel cauterio ani medicamento quopiam erodente (liberis iam ab inflammatione partibus) molienda puris, quod digeri non potuit, euacuatio est. Deinde vulnus ad cicatricem, similiter reliquis ulceribus, perducendum est, nempe detergendo, carne implendo, glutinando, & demum cicatricem inducendo. Porro si materia, qua tumorem parit, crassa est, & resolutioni, atque etiam concoctioni consumax, vehementerq; meatibus impacta, qualis esse solet in diuturnis inflammationibus malè curatis, resoluta scilicet tenuiori humoris parte, & crassiore in meatibus relicta, scarificatio iuvanda non est, praesertim (ut 2. lib. ad Glanc. Galenus admonnit) ubi durities, limor ac nigror apparuerint. Sic itaque, ut dicebas Paulus loco citato; in his si tumor non dissipatus fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello disinsa, id ipsum vacuatur; curā deinceps adhibita, ne oleum aut aqua admoneantur: verum si vulnus abluere interim oporteat, aqua mulsa, posca, vino & mulso utendum est. Vbi illa caremus, alio quodam medicamento, quod illini queat in huiusmodi fistulis utemur, quinetiam & quod constat chalciside. Ceterum super ipsis iniicitur spongia lana ve vino austero imbuta: vulnere autem nullum pingue medicamentum accommodatur, quale est tetrapharmacum. nam vehementer postulat siccescere. Si itaque cum inflammatione adhuc sit, cataplasma ex lense adhibeatur, vel oleum ros. cum interis onorum, aut aliud quod inflammationem arceat: si sine inflammatione sit, emplastica & glutinansia imponenda, ut est amylinum, cerusa, pompholyx, malicorium, as ustum, abluto prius loco cum melicrato vel oxycrato vel vino & mulso. de quibus vide Galenum 2. ad Glanc. & 3. Therap. Sed quoniam nonnulli abscessus ferramento (inquit Paulus) dividi non sistent, tentanda sunt & medicamenta, qua ab extrahendo dicta sunt

Abcessus
aperiendus.

Quia abscessus
sua rumpant.

D

epistastica:

epistastich: Narcissi radice in pollinem destricta, & in mulla cum
 itino costa illinitur; vel. tenera calami radice, minimum destricta
 cum melle. quod si dura fuerit, mulla prius incoquatur: vel
 aristolochiam cum melle applicato. Rumpis autem picis arida
 & propolis Cretica par modum cicatricemq; inducis. Ego felicif-
 forme galbanum appono in ea loco in quo rumpere volas: ut in eo
 loco fiat materia collectio. Benedictus Fanentinus praeceptor meus
 inquit: Maturato vero phlegmone (cuius indicia erunt molli-
 ties cum undositate apparens, carentia doloris; & loci tensionis
 privatio;) tunc temporis debes preparari ad illius disruptionem;
 quod si si patiens ferro vel igne terretur; disrumpatur phlegmo-
 ne sequentibus ingenii: R. diachylonis simpl. ʒ ij. fermenti ʒ j.
 olei amygd. dul. ʒ ss. misc. & grosso modo extendatur supra
 petiam vel corium, & in medio pone stercoris columbini sub-
 tiliter pulverizati ʒ j. & phlegmoni hoc applicabis, sterco-
 re ipso columbino apposito in loco in quo habilior eris phle-
 gmonae disruptio. Secundum ingenium est hoc rupiorum, pos-
 sum in loco convenientiori; quo facilius disrumpetur: R. fer-
 menti ʒ ss. salis communis ʒ j. aceti optimi ʒ ij. pul. cantharid.
 ʒ iij. omnia simul bene misceantur, & in mortario bene du-
 rantur; quousq; fiat pasta, cuius ʒ ss. vel secundum quantitatem
 phlegmonis disrumpendi applicabis ipsi apostlemati, superposito
 cerato dicto maturativo, vel emplastro supradicto. Tertium in-
 genium est maxime validum in disrumpendo apostlemate matu-
 rato, si in loco, in quo tentabis disruptionem, tres vel quatuor
 guttas inscripti liquoris apposueris, eodem quippe cerato su-
 perposito: R. vitrioli Romani ʒ ij. arsenici ʒ ij. sublimati ʒ ss.
 succi vitis alba ʒ v l. cantharicum tene tritatum ʒ ij. omnia
 simul bene misceantur, & ponantur in alembico, & distilletur
 liquor qui erit ad modum olei; de quo duas vel tres guttulas cum
 baculo loco disrumpendo applicabis. Disruptio apostlemate hoc
 modo, vel etiam cum ferro, vel melius ut antea diximus, &
 cum minori periculo cum scalpello debes cancellam observare,
 ne enacetur, totum apostlema à sanie ipsa, quia cum sanies
 ipsa dicatur esse multum spirituosissima ad similitudinem spermatis,
 citius membri, & totius adeò debilitaverit, ut esset timen-
 dum de casu eius. Quapropter enacato apostlemate à parte
 saniei.

Cautio.

saniei, statim ipsum à principio disruptionis sic medicaberis: R. albuminis oui unum. ij. salis 3 ij. boli arm. 3 i. madesiant placelle stupæ in dicto liquore, & per diem naturalē loco disruptionis apostematis eas applicabis, ubi timeres fluxum molis sanguinis ad locum incisum. Vbi verò non haberes hunc timorem, (sicut in suppuratis apostematibus ferè hoc nunquā est timendū) tunc talia apostemata sic secundum plurimū medicaberis à principio suæ disruptionis: R. terebinthina 3 ij. vitelli oui unum. i. optimè agitentur simul, quousq; fiat forma unguenti, de quo unguento tentā factam ex pecia vel eius filis ad quantitatem foraminis effecti, extendes, & foramini impones. Demū verò ipsum ung. extendes supra peciam, & totū apostemata teges. Factaq; idonea ligatura, non multū quidem stricta, ne prohibeatur exsuctio spiritus, & caloris ad membrum, & materia residua maturatio, sic continuabis per tres dies, donec materia fuerit sufficienter euacuada, & labia vulneris optimè digesta. Mundificato verò apostemate, mutabis intentionem ad maiorem iteratam mundificationem & abstersionem: & sic appones ung. sequens, & tentam intinctā in sequenti unguento, foramini apostematis ab extremis usq; ad fundū attingentem, & non cum extremis acutis ludentem: R. terebinth 3 ij. mellis 3 j. misce, & vsui seruato: semper superponenito ung. digestū prius factum. Mundificato vero phlegmone, quemadmodū poteris videre ex priuatione generationis saniei, & ex alterius mala materia currentis ex ulcere, tunc curabis cum abstersione & mundificatione: & quando tunc indigebis vulnus incarnatione & viceris consolidatione idē cum sequenti ung. procedes: R. terebinthina 3 ij. mellis 3 j. ʒ inris, masticeis, myrika, alijs ana ʒ j. sarocolla ʒ ʒ. puluerizentur, puluerisanda, & omnia in mortario bene ducantur & agitentur, quousq; fiat unguentum. & sic continuabis usque ad veram ipsius consolidationem. Deinde verò si ex inobedientia ipsius agrotantis aut medici ignorantie, sequereint fraudulentum vlcus & puridū, ex ipso iam disrupto phlegmone, illius curā relinque prudenti chirurgo. Hac præceptor nūc admonet, At Leonus ex mente Græcorum, in Metho, de tumoribus præter naturam: Confecto, inquit, puro abscessus erit aperiendus & vacuandus, abluendusque, & insuper abstergendus melicrato vel

52 OBSERVAT. CHIRURGICARVM

oxyeratio. post si adhuc perseveret inflammatio, imponendum oleum ros. cum odoribus luteis & ierebinthina: vel aliquid aliud quod inflammationem mitigare possit. Si vero sine inflammatione fuerit, nullum opus erit abstersione & digestionē, tunc ad medicamenta sarcolica seu incarnantia transendum: inter que erit hoc Iohannis de Vigo: R. mellis ros ʒ ij. ierebinthine ʒ iij. simul bulliant; iburis ʒ j. ꝑ. myrrha ʒ ij. croci ʒ j. aloës hepatica, sang. drac. ana ʒ ij. ꝑ. farina sanguis, bordei absque furf. ana ʒ ꝑ. sarcocoll. ʒ j. ꝑ. misce: & fiat ung. quo filamenta ulcus ingredientia iungantur. Inde superaddatur in cerati forma de infra scripto Basilico ung. magistrali ipsius Iohannis de Vigo, quod habet diachylonis albi sine gummiis lib. i. ser. i. vaccini, vernicis ana lib. ꝑ. iereb. ʒ vii. medull. cruris vacca ʒ j. ꝑ. olei ros. lib. i. ꝑ. axungia suilla liquefacta ʒ x. litharz. aurei ʒ ix. picis naval ʒ v. succi plantag. lib. ꝑ. oleum, axungia & succu simul bulliant quamdiu succus consumetur: deinde cum reliquis misceantur; & cum cera alba, ad ignem subagitantur, donec satis notabilem consistentiam acquisierint. Valet hoc ceratum ad omnia ulcera etiam crurum. Ad cicatricem inducendam confert abluere ulcus huiusmodi decocto etiam ab ipso Iohanne descripto: R. vini nigri, aqua cineris ana lib. i. aqua plantag. ʒ vii. ros. foliorum oleastri, sem. myrtill. & folior. ana m ꝑ. balauit. num. v. aluminis roche ʒ ꝑ. terenda conterantur: omnia simul bulliant, donec tertia pars absumpta fuerit. tandem tali aqua excolata vitetur, & supradictum ceratum imponito. Theriaca etiam mirifice incarnat, purgat & cicatricem inducit. Hec omnia iam dicta continebantur sub tertio scopo. Restat itaque adhuc quartus scopus, qui in curanda phlegmone chirurgo ac medico proponebatur; & erat symptomatum, quae ipsi inflammationi supernebantur, correctio & summoitio. Ea autem ferè sunt (ut etiam annotavit Tagautinus) dolor, regressus materia, ex qua tumor excisatur, ad interiora, pueredo & corruptela partis suppurantis, & veluti lapidea quadam durities, ex valenter exsiccantibus & digerentibus relicta. Ergo si vehemens dolor inflammationi accesserit, modis omnibus laborandum est, ut istatim mitigetur. Quandoquidam vaterquam quod vires prosternt, & legitimas actiones impedit,

4. Intentio curandi, scilicet symptomaticum correctio.

2. dolor.

impedit, fluxiones quoque accersit, & sanguinem ad se allicit. Itaque si dolor acrius urget in phlegmone, confestim imponenda sunt, qua doloris vehementiam circa ullam noxam lenient, & demulceant. Quale est quod ex passo, oleo rosaceo & pancula cera, cum his ambobus liquata conficitur Galeno: hoc autem lana succida, qua plurimum habet assipi, excipiendum est: ac æstate quidem frigidum, hieme verò tepidum apponendum. Itaque medicamentum eiusmodi, sic ut dictum est, attemperatum & admodum, rarefacit, extenuat, digerit, euacuat; humorem acrem, lenium, crassum aut viscosum, partibus hærentem, æquabilem reddit, vaporemque crassum, commodum exitum non habentem discutit, atque sic dolorem mulcet; nullam verò sua caliditate noxam iniebit: rosaceum namque oleum calorem retundit. Quo fit ut hoc remedium circa noxam ullam dolorem mitiget, & affectui non incommodet: ut aqua calida, oleum & triticea farina, qua in inflammatione cum dolore incidente ex usu esse non possunt, ut testis est Galenus. Hæc enim caesaciendo ac humectando relaxant, ac robur partis resoluunt, unde & imbecillior redditur & ad fluxionem excipiendam propior. Ad eundem usum (nempe ad mitigationem doloris in phlegmone) efficaciter apponuntur, rosaceum, snorum lutea, qua & vitellos appellant, mica panis albi, in aqua calente macerata, postea expressa & rosaceo permixta. Præsenti etiam auxilio sunt valius in aqua decocta, mixta cum fursure, & rosaceo, vel oleo violaceo. Crocum autem in omnibus sedandis doloribus assumitur Apicenna, atque aliis anodynis (id est, dolorem mitigantibus) valiter commiscetur. Porro si tanquam vehementius sit doloris acerbitas, ut iis qua à sedando, leniendoque dolore quasi suppetiis latius natura, propriè anodyna & paregorica dicta sunt, demulceri non possit, ad narcotica, id est, stupefacientia, transendum erit. Inter qua hyoscyamum admirandam opem sæpe contulisse, frequenti experimento præter quorundam auctoritatem comprobatum est. Itaque folia eius sub calidis cineribus coquito, recenti axungia misceto, & admovento. Hoc vehementes dolores mulcet, & phlegmonosos tumores ad suppurationem perducit. Cavenda autem semper est, dum hoc moliris, nimia humectatio quippe qua per initia inflammationum, cum magno

Dolorem in
phlegmone
lenientia.

Lib. 2. 24
Galen.

Crocum.

Nota de hyo-
scyamo.

2. Recursus
materiæ ad
interiora.

3. Durities
relicta.

Galenî cata-
plasma ad
induratos
tumores.

4. putrefa-
ctio.

Capita cura-
tionis, rheu-
maticæ, id
est, ex humo-
rum influxu
factæ phle-
gmones ad-
huc incipien-
tis, & cum
dolore non
vsque adeo
magno assu-
gentis.
Ex Gal. lib.
8. ad Glauc.

dolore fluxu incipiente, perniciofa sit, ut paulo ante diximus. Ca-
terum si metus alius recursu materiæ phlegmonem excitantis, ad
loca penitiora, & maxime versus principes partes, eam ipsam
trahentibus medicamentis (de quibus lib. 6. apud Tagautium
fussimè agitur) vel etiam admoris cucurbitula, qua vehe-
mentius & ex penitioribus partibus trahant, foras educare oportet.
Si vero à vehementer exiccantibus ac digerentibus inflam-
mationi temerè admoris, reliquia tumori in scirrulum abierint,
radices cucumeris agrestis (ut prius ex Paulo) quæ vulgo herba-
ris & officinis cucumer asinus dicitur, aut bryonia aut asari,
in aqua decoques. Sape quidem (ut præcipit Galenus) hæc solis
veris, nonnunquam verò & caricas pingues adicies. & deinde
farinam cum aqua misceas; cui & aliquid adipis, præsertim
anserini aut gallinæ, adicio. quod si horum copia non sit, simi-
lum addito, & cataplasma conficis. Hoc scirrhum effectum
ex valentius exiccantibus & digerentibus medicamentis in par-
te, qua phlegmone occupatur, relictum, efficaciter sanat. Prædi-
ctarum quoque herbarum, & cum his althæa radices, post mo-
deratam decoctionem cum panis & adipe contrita & admota,
eiusmodi induratos tumores discutunt; ut lib. 2. ad Glauc. li-
culenter docet Galenus: Itaque si phlegmonosos tumores, qui
agrè per balneum digeruntur, nec satis concoquuntur, in scir-
rhum mutari timuerimus, valenter digerentibus semper emol-
lientia remiscebimus. Porro si portio aliqua suppuranti particu-
le compuruerit, eam protinus excidere oportet: vel plurimis sca-
rificationibus aqua falsa persundere: & demum emplastrum ap-
ponere ex fabarum aut orobi farina cocta in oxymelite. Reliqua
quoque tibi molienda erunt quæ de gangrena curatione suo lo-
co ponemus. Sed nunc melius fuerit capita curationis eiusmodi
phlegmonosi affectus, ex Tagautio, breuibus quibusdam sententiis
complecti. 1. Corpus vniuersum congruis euacuationibus, sed
præsertim vena sectione, molè nihil obliterit, inanito. 2. Par-
tem inflammatam his, qua influenti humoræ repedendi vim
habeant, persundito ac illinito. 3. Humorem qui in affecto lo-
co continetur, admoris exiccantibus, ac digerentibus medicamen-
tis, vacuato. 4. Robur ac virtutem affectæ parti & eam cir-
cumsistentibus addito. Rursus: 1. Vbi inflammatio ex de-
fluxione

influxione orta, grauiore cum dolore affligge, doloris vehementiam Capita cura-
 circa ullam noxam mitigato. 2. Ergo quæ vehementer strin- tionis eius.
 gunt, aut quæ calefaciendo & humectanda relaxant, ac robur acmple-
 resoluunt, ne admohero. 3. Sed quæ quod influit, mediocriter gmones, quâ-
 stringendo repellunt, & quæ iam affectam partem obsidet, va- do cum gra-
 cuant, in inflammatæ loca adhibeo. 4. Spongiam acerbæ vino uio-
 aut poscæ imbuiam, ut fluxus humori uia præcludatur, applica-
 to. 5. Si hæc profecerint, Exumquam adhuc præ apparet, et
 malibus & in quæ aduersus fluxiones temperantur, mitigatis, uisior.
 6. Et in autem, quæ exsiccare, & fluxum sanguinis non repellere, circa dolorem possunt, tamquam epima de uino
 quale est quoddam caside confiat, rosaceo resolutum. Deinde la-
 mam puram, ex uino acerbæ madentem, superponito. 7. Si
 uerò pus in parte ipsa apparuerit, semel aliquæ serui supra d-
 Antæ casaplisma, aut potius quod ex hordei farina confiat, ad-
 moneto. 8. Si purus, eiusque ualde exasperat, medicamentum
 superes, adeo ut nulla resolutionis spes habeat, exitum ei quod
 digestionem non cessat, eo potissimum loco, quo aut redintegratur,
 parato. 9. Post sectionem, nisi dolor urgeat, unius extrahat,
 ac circa dolorem deservito. 10. Si post sectionem dolor ur-
 geat, enim fomentum primum, deinde casaplisma, mox hume-
 ctante aliquo medicamento, aut saltem non siccante, mitigato.
 11. Si uerò pars adhuc inflammata sit, casaplisma ex lentica-
 la, quod uaginat & repellit, imponito; Et hæc de uere phlegmo-
 nes curatione dicta sufficiant.

OBSERVATIO VI.

Exempla aliquot phlegmones illegittime
 curate.

FRANCISCVS Teylingius, sororius
 meus, cum phlegmone erysipelatode vniuer-
 sam faciem apprehendente & nasum ad mira-
 culum propemodum tumefaciente ac inflante la-
 boraret; ad eum accedens, insolitum illum tumo-
 rem faciem foedantem considerans, cum eum
 simul etiam febris animaduertentem, protinus ex

capitali vena interna dicta sanguinis 3 vi. extrahere feci: deinde iulebum & syrupum hunc ebibere iussi: R. syr. de succo end., syr. de succo acetosæ, syr. ros. ana 3 ss aquæ acetosæ, cicoræ, fumitretæ ana 3 j. misce & frigidum bibat. & reiterabatur quotidie. Posuerat autem supra faciem pannos lineos lotos cum sapone, & exiccatos & frigidos sæpe renouabat. hoc remedio vulgares vruntur. sed cum non proficeret, adhibitis etiam refrigerantibus aquis, vt solatri, lactucæ, ros. & similibus (cum nec illæ iuuant) folia hederæ arboræ in aqua quæ rectis regulatis cæruleis destuit cocta & humida supra nares & faciem posuimus. Hoc experimentum habuimus à Iohanne Heyligen tonsore ac chirurgo Alemariano seniore, quod in seipso tum sua vxore sæpius ad guttam quodque rosaceam in facie expertus fuerat; & ego non solum in sororio meo, sed aliis quamplurimis. Interim & cucurbitulas scapulis quoque apposui cum scarificatione: & quarto die eundem purgaui cum diacath. & electuario de succo ros. vt hoc modo: R. Diacathol. ʒ j. elect. de succo ros. ʒ iij. dissol. in aquæ cicor. ʒ iij. ss. syr. acetos. simp. ʒ j. misce. capiebat in diluculo: & apposisis illis foliis (quæ etiam ad ambusta valere scribit Dioscorides lib. 2. cap. 172.) iisque sæpius mutatis, curatus fuit. Quemadmodum & monachus ille qui erysipelate phlegmonoso apud Franciscanos Alcmariæ totam faciem deturpatam habebat. Sed & apud Diuam Claram Delphis monialis quædam à sanguinis missione ex cephalica; deinde ad moris quoque cucurbitulis & purgatione; à simili erysipelate phlegmonoso Delphis in hieme curata fuit anno 1361. & ante eam Iuuenis quidam sanguineus annorum 26, cereuisiarius Delphenfis, rubrâ semper facie, qui in Aggere longo commorabatur anno 1559. mense Martio: qui cum in facie insolitum ruborem, cum maximo tumore & inflatione, facie

eiem totam fœdantem haberet, astantes eundem peste correptum putabant: febriebat hic, & dolebat capite, & angorem circa cor sentiebat. Cùm erysipelas phlegmonosum esset, ex vena cephalica in homine robusto & sanguineo § VII. sanguinis demere iubeo. mox iulebos intrigidantes frigide exhibeo, ac folia hederæ faciei impono, vt supra dictum est: & facta quoque purgatione, ex infuso senæ & rhab. cum decocto communi, & syr. ex infus. ros. aliisque conuenientibus adhibitis, hic cum multorum admiratione sanatus est, & quamplurimi eodem modo cum eo. Rembrandus Astrius mathematicus Alemasianus multos ab erysipelate phlegmonoso per mulierculas curatos testabatur sola applicatione foliorum verbasci vel tapsi barbari. id tamen ego nondum expertus sum, cùm bene & feliciter semper mihi successerit applicatio foliorum hederæ, post vniuersalia remedia adhibita. Eodem modo & folia vngulæ caballinæ cocta in aquâ, & apposita egregiè profunt, vt expertus sum; quamquam in herpete magis conueniant, vt de muliere Delphensi herpete affectâ alijs diximus, nempe libro 4. Observationum nostrarum de febr. Obseru. 22. Scribit autem Dioscorides lib. 3. cap. 107. folia tussilaginis seu vngulæ caballinæ ex melle tria igni sacro, & omnibus inflammationibus illita mederi. Sed de herpete suo loco alijs dicturi sumus. At in domicella Duyuenvordia in Haga. Comitris erysipelate phlegmonoso affectâ, post vniuersalia remedia, scilicet sanguinis missionem, lenitiuum ex castâ & electuario lenitiuo & diapruno lenitiuo, communi consilio cum Hughone Haghen- si medico, & chirurgo applicuimus post quartum diem (postquam mulieres succis herbarum intrigidantium, vt solatri, semperuiui, vt mihi videbatur, vsq; essent) decoctum foliorum maluæ in decocto hordæi, deinde folia ipsa contrusa cum modica fari-

58 OBSERVAT. CHIRURGICARVM
na hordei & mucilagine cydoniorum & oleo vio-
laceo, in hunc modum: & folior. malvæ virid. m.
ij. coquantur in decoctione hordei, deinde pisten-
tur: adde farinæ hordei ʒ. ꝑ. mucilag. cydon. ʒ. ij.
cum oleo viol. q. s. fiat emplastrum: & optimè ha-
bit. Hæc tamen post aliquot dies recidiuans, &
morbo vterino post paucos dies & febre correpta,
postea interit. Egregiè confert erysipelati phle-
gmonoso sola crema seu pinguedo lactis loco affecto
illita. Sic

SCIIOLIA.

QUOMODO curetur phlegmone exquisita, iam ante di-
ctum est: sed si fuerit illegitima, iuxta mixtionis rassi-
nem ac modum, commixta etiam situratio: nam siue ea sit à
causa primaria, siue antecedente, semper ubi corpus plenu-
do adfit in principio istam materia est: ut si fluxu, sicut in phle-
gmonæ vera, conuenit phlebotomia ex parte opposita: & ubi
tam transierunt dies, vel quatuor dies, tunc exiundo est in fla-
ra, & maturior: tunc fluxa est: & ut dicebat Valeſc. cap. proprio)
conuenit phlebotomia ex eadem parte, deinde purganda materia
que sanguini vel malle sanguinari videtur mixta: & sicuti
in pura conuenit cystis fistula cum thamaripulo, & glect. de
succo rosarum, quia sanguis faciliè bileſcit: Ita quoque si bilis
admisceatur, & sit phlegmonæ erysipelatodes, vñ erysipelæ phle-
gmonodes. Idcirco rectè dicebat cap. proprio de phlegmonæ Be-
nedictus: Fauentini præceptor meus: Post sanguinis missionem
enacuerit primò corpus medicina purificans sanguinem; non
expectando eius digestionem; quando natura phlegmonis est sa-
lis, qua digestionem non expectat: Dabis igitur primò medi-
cinam sequentem: R. cassia noniter trita ʒ. x. rhab. electi
ʒ. i. ꝑ. spice grana xi. misce; & dissoluantur cum decoctione
communi stirum & fructuum q. s. & dabis patienti hora ex-
hibitionis medicinarum in dibuculo: Et cum intentio cura-
tionis phlegmonis sit sanguinem ipsum purificare, idcirco est
usurpandum rhabarbarum cholera enacuatissimum, & sangui-
nis mundificatissimum: & ad eandem intentionem potes ad-
miscere

Phlebotomia.

Purgatio.

miscere ipsi cassia diaprimum solutissimum, vel elect. rosatum, Nicolai. quæ solutissima etiam conueniunt in illegittima phlegmone, scilicet phlegmone erysipelatode, bile cum sanguine permixta, ita ut etiam de phlegmone illegittima verba facere videatur, ut sequentia ostendunt; sic deinde scribens: Et si cognoueris per indicia quod phlegmon generetur ex sanguine cum permixtione pituitæ vel atra bilis, ut docuit nos Galenus in lib. de tumoribus præter naturam, usurpabis cassiam vel turbit, vel electuarium de dactylis, vel indam, vel puluerem hiera simplicis Gal. quoniam euellunt omnes superfluitates à toto corpore: vel pro atra bile uicis elletoro nigro, vel polypodio, vel puluere sena, vel confectione banech. Mundato itaque corpore, sic & ex præcedentibus phlebotomii potèris aggredi audacter magis intentionem resolutionis, & resolutionis, pro tempore morbi: & eo quidem tempore residuum materia remanentis digerere procurabis, & digestiua erunt appropriata materia peccanti; ut si materia fuerit sanguinea cholera admixta, syr. erunt digerentes cholera, qualis est hic sequens: R. syr. de succo end. syr. de succo acetosa, syr. ros. ana ℥ j. Digenio, aquar. end. acetosa, citreæ ana ℥ j. misce. Si uero fuerit admixtio phlegmatis cum sanguine, digeratur materia cum oxymelite simplici, cum syr. de duab. rad. cum melle ros. colato, addendo aquar. fœniculi, capill. Ven. & hyssopi q. s. Si uero permixtum fuerit humor melancholicus, non prætermittes syrupum Sabor regis, syr. de epithymo, de thymo, de lupulis, de fumoterra & melle ros. cum aqua bugloss. borag. lupul. melisse, fumoterra & huiusmodi: idem intelligendum de topicis remediis. nam eadem mixta esse debent: nam Topica, si sit phlegmon erysipelatodes, partim quæ conferunt phlegmoni, partim uero erysipelati apponenda sunt: non tam en debent esse adeò frigida reperiensina ut in erysipelate, quoniam uolentia ista repellentia frigiditate sua præternaturali materiam nimis quam oportet inuicem repellendo, partem externam quidem lenare videntur, sed internam ac omnia viscera ladunt. Sint igitur hic præque lenia reperiensina, quæ in phlegmone dicta sunt; ut est succus portulacæ, end., cucurbitæ, virga pastoris,

pastoris, succus solatri & succus psyllij spongia in aqua frigida
 & aceto insusa, egregie, teste Valesio, valet in phlegmone, vel
 ex herbis dictis confecta emplastra. ceterum fœca que ad phle-
 gmonem & erysipelata scribuntur inier se miscantur probè cu-
 rationem inuenies. ita quoque si phlegmon cum ædemate exi-
 stat, vel cum scirrho, ex utrisque mixtis curatio probè resula-
 bit: quamobrem si in nonnullis hos tumores simplices curare, fa-
 cile & compositos curabis. Nam & exemplum erysipelatis
 phlegmonosi faciem fœdantis habes egregium apud Amatum de
 quodam iuvene valdè forti & potente, ad quem ipse accedens,
 & insolitum illum ruborem cum maximo tumore faciem fœ-
 dante considerans, & febrem & angorem anxietatēque, 3
 V I I I. ex vena externa capitali dicta extrahere fecit, & hunc
 stup. ebibere: R. syr. nenupharini, de succo acetosa; rosali
 simplicis ana 3ss. aquar. nenuph. lactuca, portul. ana 3j. mi-
 sce; & frigidum bibis, & singulis diebus sequentibus reitera-
 bat, tenuiq; vitu præscripto, & vi abstemius viveret, ac de alii
 respondentia curam haberet; supra locum infectum hæc primo
 imposuit: R. succi lactuce, umbilici Ven. ana part. æq. por-
 tulaca, partis viuius medium. misce. & eo pannu lineu imbu-
 itis supra locum affectum imponebatur, ac sape renouabatur.
 Sunt autem erysipelati conuenientia refrigerantia lib i 4. me-
 thod. à Galeno hæc citata: solanum, semperuiuum, portulaca,
 umbilicus Ven. psyllium, aliercum, lactuca, inrybum, palustris
 ientacula. quibus & addere possumus violariam, folia encybitæ,
 melonis, melongena tam vulgaris quàm spinosa. Verum anim-
 uerò erysipelas phlegmonosum non tantam exposcit pro sui cu-
 ratione frigiditatem, quam purum erysipelas, & eo magis
 faciem occupans. periculum namque minatur si ab externis
 partibus ad internas transsint: quod Hippocrates lib. 6.
 Aphor. monnit, quum dicit: Erysipelas si ab externis partibus
 ad internas transsint, malum: qd interioribus vera foras,
 bonum: idèò diligenter animaduersandum cum foras emineat
 in membro ignobili, ne ad nobile & internum refrigerantibus
 & propellentibus medicamentis intempestinè applicatis retroce-
 dere faciant. At quarto die idi volem ex electario è psyllio com-
 posito & cathalico, rhabar. adiecto & portinnucula diaphœnico-

nīs cum saccharo concinnato deolusendum exhibuit, & inde melius habere cepit: tunc verò cum faciei inflammatio mitior reddita esset, ad emplastrum compositum ex farina hordei, sem. lini, fœnugraci, adiecto ibisco & chamomilla pulvisculo, cum oleo rosaceo & chamomillino deuenit, & tandem breui sanitatem adeptus est. Sed de his postea latius; nunc ad tumores reliquos qui ex sanguine fiunt; ordine superius scripto veniamus.

OBSERVATIO VII.

De phygethlo sub aliis apparente.

VXOR Petri Teylingij cognati vxoris meæ in Anticastro habitans, cum febricula laboraret, phygethlo seu inflammatione suborta sub axillis, ipsa suspicabatur pestem esse: nos verò detracto sanguine ex vena brachij eiusdem, cataplasma ex attriplice, malua & radice althææ cum butyro & farina frumenti apposuiimus; ruptoque abscessu paulo post ipsa conualuit.

SCHOLIA.

PHYGETHLON phlegmone est (inquit Fernelius) in adenum locis emergens, maxime verò in cervice, in alis aut inguinibus: Latinis Panūs appellatur. Sed & qui in inguine nascitur, peculiari nomine bubon nuncupatur. Apud Celsum lib. V. phygethlon tumor est non altus, sed latus, in quo quiddam pusilla simile est. Similibus ex causis, inquit Fernelius, ortuq; simili ac phlegmone nascitur, iisdemq; signis innouescit. Ferè autem fit aut post febres, aut post dolores partis alienius, qui fluxionem prouocant in adenes. Fit maxime aut in vertice, inquit Celsus, aut in alis, aut in inguinibus: panem ad similitudinem figura nostri vocant. Est autem phygethlon; ut etiam Leonus annotauit, inflammatio glandularum in inguinibus & aliis: qui deinde affectus induratus chæras, id est, struma vocatur. Galenus 2. ad Glauc. cap. 1. dicit quòd phygethlon est inflammatio paruius laxarum, quæ adenas, id est, glandulas appellant.

Phygethlon.

Panus.

Causæ.

Gal. 2. ad Glauc.

Stena.
Cral cap. 2.
de n. 16.
cap. 2.

appellant. Inque hac calida passio quandoque partem post partem apprehendens, totum concalescit corpus, & febrem excitat. Sed, ut addit Celsus, dolor dilesis sique vehemens est, & maior quam pro magnitudine tumoris, interdum etiam febricula, idq; tarde mitrescit, neque magnopere in pus convertitur. Sed cum omnes hi, inquit, nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen tribui latius vixit ad suppurationem spectans, idem, siue sit aut post febres aut post dolores partis alicuius; maximeq; eos, qui venirem infestant. Sapiusq; oculis expositum est, si eandem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius quod phyma vocari propoim: (unde & a phymate differre videtur, ut postea dicemus: nam & ipse diversis in locis de iis qui) rubetq; cum calore & paulo post etiam cum duritia: magisq; innocenter indolescit, & sum vigilans exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest, maximèque ubi alius pus mouetur. Sed cum sit vigiliatq; sentitum intus aliqua punctio: & quod de subito durus non est, melius est: & quamvis non rubet, coloris tamen aliter mutari est. Quae signa pure oriente nascuntur. Tumor vulbi que multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus ut materia aditus est per cataplasma ista quae simul & reprimunt & refrigerant, qualia erysipelas conveniunt. Si iam durior est, ad ea veniendum, quae digerant & resoluant: qualis est fici arida confusa, aut fœx vitula cum cerato quod ex adipe sinilla coactum sit: aut cucumeris radix, cui ex farinae duae partes adiecta sint, ante ex mulso decoctæ licet etiam miscere aquae portionibus ammoniacum, galbanum, propolis, viscum; pondusq; adicere myrrhae dimidium, quam in prius singulis erit, si non disiunctiatur, necesse est, ut maturescat: idq; quo celerius fiat, imponenda est farina hordeacea, & aqua cocta rectè miscetur. Sed hac & maioribus abscessibus rectè sunt. Duriora naque mollienda malua contrita, vel scennigræci lixique semine ex passu cocto: & aperiri abscessu pus purgandum cum lenientia; ex melle & vino cocto. Curatur itaque phlegmon quemadmodum cetera inflammationes: in initio utendum his quae repellunt, refrigerant, attinguntque, vel spongiis ex posca impositis, vel lanis oleo erudo, unoq; imbutis, vel rosaceo, vel melino, vel lenis-

scino,

Prognostica.

Curatio.

felino, vel myrteo, vel cerato humido ex oleo & pura cera, ex aqua frigida subacto accuratèque madefacto, inde inasperenda quæ digerunt. At si corpus vniuersum succo equaliter rethi-
des, prius ipsum vacuare conuenit: vbi iam inanitum est, vi-
ceris, in quo id prouenerit, cura haberi debet. Cùm tumor
ad suppurationem spectauerit, non promptè diuidendus est se-
ctione, sed medicamentis, quæ cerati speciem referunt, discen-
dere nitimur; cuiusmodi est ex perna compositum: R. perne
suilla veteris pinguis, gutta ammoniaci, casei veteris vacui,
feni taurini, apochymati, quæ est naris rasura, ana lib. ß.
medull. ceruina 3 iij. hyssopi cerati 3 j. ß. cyprini olei 3 iij.
vini opt. q. s. Si autem per hoc vel per aliud simile non discen-
tiur, rumpere, & aliorum abscessuum modo illis mederi eg-
grediemur. In his quæ ob febres aut omnino ob humorum ab-
undantiam procreantur, cauere debent repellentia, ne ma-
teries penitus detrusa, cursum repeat. Sed ab his quæ discen-
tiunt, statim curationem incipere consilium est. Si autem
nihil prohibet, nempe aut atax aut virius, sanguis prius
è cubito demittetur; deinde loco fomenta induentur, ex de-
cocto chamæmeli aut anethi, aut eius generis aliquo. Phy-
gethils incipientibus, gliscentibus, emolibus, & vixit fer-
uentibus, helxine cataplasmatibus, item atriplex, & mal-
ua hortensis sunt commodiores: videntibus autem & declinan-
tibus ac indurascensibus atriplex, & malua agrestis maximè
sunt accommodata.

Gal. 1. con. 6.
de simpl. med.
lib. 7. cap. 1.
lib. 7. cap. 1.

Paul. lib. 7.

Gal. de
simpl. med.
lib. 6.

OBSERVATIO VIII.

De phymate.

PVER V. L. V. s. cùm phymate in ventre in-
feriori versus pubem corripereetur, id statim
factum est acuminatum, & augebatur, & ad
suppurationem festinabat. & quoniam phyma
est tumor acuminatus, qui statim augetur (te-
ste Galeno 2. ad Glauc. cap. 2.) & ad suppurationem
festinat: quod tuberculum ad similitudinem
eorum

eorum quæ ex terra nascuntur appellant. Cæterùm quoniam phymata quædam sunt calida, & cum vehementia quadam exiliunt, ut in hoc puero: quædam frigida siccaque sunt: permulta alia inter hæc consistunt, (ut dicebat Galenus de morb. vulg. comment. 1. tex. 13.) alia quidem exactè media illorum, quæ diximus: alia à medio in utramque partem paulatim inclinant. Nos hîc de phymate calido, quod sub genere inflammationis continetur, hîc intelligimus. Vide de phymate quod & passus est Amatus in femore, curat. 29. Cent. prima. Accipitur tamen aliquando phyma pro panò apud Paulum Æginetam, ut Scholio sequenti latius dicemus: Fernellius verò inquit: Phyma quoque tumor adenum est, simplici phlegmone atque phygethlo aliquanto minor ac planior, minusque rubens ac dolens. Non enim è puro sanguine proficiscitur, sed ex eo cui pituita quiddam sit admistum, ut sit phlegmon œdematis particeps. Siceriam Celsus lib. 4. Phyma verò nominatur tuberculum furunculo simile, sed rotundius & planius, sæpe etiam maius. Nam furunculus, ut postea dicemus, oui dimidij magnitudinem rarò explet, numquam excedit. phyma etiam latius patere consuevit, sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Vbi euulsus est pus, eodem modo appâret ventriculus, seu concauitas; quod in furunculo non inuenitur: verùm omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & sæpius nascitur (ut in hoc puerulo) & facilius tollitur: in iuuenibus rariùs oritur, & difficiliùs curatur. Vbi ætas indurauit, ne nascitur quidem. at tamen in senioribus conspeximus, quin & Amato euenit. Phyma, inquit, Galeni est quod ego passus sum, quod Itali *Bognon* à tumore appellant: & à Philotheo enarratione illius aphor. lib. 3. sic incipientis: Quum verò iam magis adoleuerint. ubi ita inquit: Vocat autem ipsa phymata per metapho-

ram eorum quæ producuntur in terra, quoniam celeriter nascuntur & augentur, & ad suppurationem perducuntur: quæ omnia à Galeno prius sunt dicta lib. 2. art. curat. ad Glauc. cap. 1. Cùm itaque plerumque & phymata in pueris absque medicamentorum appositione & suppurentur & ad sanitatem perducantur, diachylon cū gummis applicari mandauimus; quemadmodum & alteri emplastrum de mucilaginis: quibus faciliè ad suppurationem deuenerunt phymata, & curata sunt.

SCHOLIA.

AUTHORE Galeno, Bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectus sunt: bubo quidem inflammatio: resolutur tamen aliquando, ut hoc anno 1570. mense Aprili in puerpera illa quæ bubone in inguine capiebatur, absque magna tamen inflammatione, inunxi cum oleo ros. viol. amygd. dulc. & chamomill. & applicui (quia paupercula) folia maluæ, viol. cum flor. chamomill. adiecto butyrō instar cataplasmatidis, & dolore sedato sine suppuratione facta est resolutio. Phyma autem est glandula inflammatio ad suppurationem spectans. Aliorum verò quorundam sententia communiter omnes, qui à natura abhorrent, cum tumidi abscessus, quamcunque corporis partem obsideant, Phymata appellantur. Siquidem Hippocrates in hunc modum scribit: Quibus phymata urinarium meatum exercent, hi abscessu in vomitum erumpente liberantur. At bubones qui prolapsi aut aliis ulceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo vacant: febribus autē supernuenientes, qui plurima parte ex pestilentiali lue solent incidere, deterrimi sunt, siue femora, siue alas, aut cernicem inuaserint. Verum priores initio, quemadmodum inflammatio qualibet, auxiliis repelluntur quæ refrigerant, astringuntque (ut & Scholio precedente diximus) vel spongiis posca impositis, vel lanis oleo crudo vinoque imbutis, vel rosaceo, vel melino vel lentiscino, vel myrteo, deinde in qua digerunt utendum. At si corpus uniuersum succis aequaliter reddiderit, prius ipsum vacuari conuenit: ubi iam inanitum est, ulceris in quo id pronerit, cura haberi debet, sicut in cap. de

Paulus lib. 4.
cap. 22. de
phymate.
bubone &
phygethlo.

Glandula
cum inflam-
matione.

ulceribus explicabitur. Glandula si inflammatione tenetur, la-
nis oleo quodam laxante irriguis rectè lenitur, totumq; ipsis
membrum involuitur. Cum tumor ad suppurationem spectane-
rit, non promptè dividere, sed medicamentis, quæ cerati speciem
referunt, digerere nitentur. Sed si non plenè discutitur, ut
aliis abscessus rumpemus, & similiter illu medebimur. In iis
autem qui ob febres aut omnino humorum abundantiam pro-
creantur, cauteri debent repellentia, ne detrusa intus repant, sed
quæ digerunt imponenda; & si nihil prohibet, etiam vena in
adultis (ut diximus Scholio præcedente) secanda; & ea appli-
canda quæ ad parotidas scripsimus. egregiè confert aster Atti-
cus herba, quam & bubonion, quasi dicas inguinariam, ipsa de
causa vocant, non solum illius sed etiam alligatus, bubonibus an-
niliari creditur. Phymata autem primisim discutit adianthon, si
illixatur, atriplex, parietaria, alibæ radix vino incocta, ammo-
niacum cum melle mollium inductumque, viscum quercinum
cum resina ceratog. Rumpit autem abscessum propolis, lupini
amari ex aceto illiti, cucumeris sylvestris radix, terebinthinâ
excepta, capparis radix similiter, nitrum cum fermento aut ficis.
Cæterum tuberculum hoc (ut etiam annotavit Amatus loco in
Obs. præcedente citato,) curatur tritico maulo & imposito; non
minus visis pafis, quibus semina sunt exempta: faciunt eodem
modo ficus arida pingues, per se, vel cocta cum semine lini, scenn-
grato: adiecto oleo ros. vel pinguedine gallinaceorum vel anseri-
na, cum vitello oni & paulo salis faciunt quoque pulicula pa-
rata ex fermento, subacta cum oleo ros. vitello oni: item puli-
cula ex farina tritici cum butyro & croco parata maximè valet:
sed pellis leporis recens imposita, phyma curat, vel si sicca spuito
madefacta fuerit, non minus papyrus spuito madefacta & im-
posita valet. Plerumque verò (ut aliàs diximus) absque medica-
mentorum appositione phymata suppurantur & ad sanitatem
perducuntur. At Amatus in suo phymate anserina pinguedine
tantum usus est, & bene habuit.

Quæ phyma-
ta discutunt,
ex Paulo.

Quæ rum-
pant.

Curatio phy-
matis.

OBSER-

OBSERVATIO IX.

*De furunculis, qui & dothienes
appellantur.*

NOBILIS quidam furunculos sæpe experiebatur in dorso: nam rarò (inquit rectè Fernelius) fit vt hic solitarius erumpat, sed ferè multis corpus scatet atque inquinatur. Quocirca vt phlegmone multitudinis, sic furunculus cacochymix soboles est. ideò etiam facta missione sanguinis ex mediana; insuper eundem egregiè curauimus cum decocto senæ, prunor. fumiterr. acetos. cum sero lactis. sunt enim hæc tubercula acuta cum inflammatione & dolore, ouum columbinum magnitudine non excedentia: (Vulgares nostri *Bloetvinnen* appellant:). nam phymate minora sunt, sed acutiora, rubentia, ac dolore grauiore. furunculus itaque phlegmones veram speciem exhibet, sed eius exigua, & quæ vix infra cutem descendat, atque subiectæ carnis minimum comprehendat. Suppurat furunculus perinde atque phlegmone, hincque à simplici carbunculo discernitur. Fit autem non quemadmodum phlegmone è probo sanguine qui in particulam vi quadam irruat: sed è crasso & vitioso, non perinde tamen atque in carbunculo exusto, quem à reliquo puriore natura secernens tanquam infectum & inutilem in corporis summa propellit. Quocirca (vti diximus) vt phlegmone multitudinis, sic furunculus cacochymix soboles est: raroque fit vt hic solitarius erumpat, sed ferè multis corpus scatet atque inquinatur. Cæterum à sanguinis missione & purgatione solo pane nigro frumentaceo cum butyro manso & valdè pingui appposito facilè ad suppurationem perueniebant, vel solo diachylo appposito: vel, vt aliàs expertus sum, beta vel cau-

libus butyro illitis appositis erumpebant, & facile curabantur. Interim tamen huic nobili ut à vino abstineret mandauimus. & sæpius reiteratis purgationibus cum syr. ex infus. ros. de fumo terræ non ampliùs suppullulârunt: consulimus deinde ut quotannis semper in Vere ad præcautionem sanguinem mitteret: quod ita profuit, ut similibus furunculis deinceps nunquam laborauerit. Sed & hoc cataplasma ad furunculos expertum est & alia apostemata ex adustione sanguinis: R. fol. mal. acetosæ ana m. j. ficuum ping. num. vi. uuar. pass. amoris arillis ʒj. sem. lini p. ij. bulliant. pistentur in mortario; addendo fermenti acris ʒj. ꝑ. axungię porci recentis sine sale q. s. fiat cataplasma.

S C H O L I A.

Dothienes.
Furunculi.

DOTHIE NES & Furunculi idem sunt apud Galenum 2. Methodi cap. 2. & 5. de compos. medic. secundum loca cap. 7. Generantur per uniuersum corpus, duplices existentes: aliqui quidem, ut ita dixerim, variosi, duri & agrè concoctiles: aliqui verò inflammati, in quibus aliquando etiam febris consistunt, & tumor in magnitudinem excrescit & in pus transmutatur, unde curatio ipsorum ut plurimum eadem quæ inflammationis existit. Furunculus verò (apud Celsum lib. 5.) inberculus est acutus cum inflatione, & dolore, maximeq; ubi iam in pus vertitur. Qui ubi adaperitus est, & exit, apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subnigra, quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum est: siue id quidem in promptu est, vel resina vel fermentum. Expresso pure nulla ulterius curatio necessaria est. Furunculus verò apud Paulum tumor est abscessus præfrens, qui ex crasso humoribus in carnosus plerumque partibus concipitur, mitis quidem, cum in sola cute coit: perniciosa autem malignisque, ubi subter artus radicitus in superficiem erumpit. Dissipat

Paul. lib. 4.
cap. 23. de
furunculo
qui Dothien
appellatur.

anem

autem furunculum ac concoquit triticum commansum, & impositum: mastiche Ægyptia, vna passe quibus acini sunt exempti, cum sale trita ac illita hunc disiciunt aut rumpunt, vel sicci fici hydromelise incocta imponuntur, vel resina fici mista inducitur, vel ipsa ficus cum fuerint pingues dissecta, vel fermentum cum nitro, vel lini semen cum melle, vel alterci folia trita cum butyro. Composita verò hæc proficiunt: nempe quod ex fermento, quod polline farinaceo constat, & quod prunatim à furunculo Græce dicitur dothienicon; Fomenta autem adhibentur ex spongiis mollibus continuè calenti aqua intinctis, deinde sic medicamenta iniiciuntur.

OBSERVATIO X.

De termintho tuberculo.

TUBERCULUM quidam habuit in nate, cui in supremo vlcere bulla atra erat: nos iudicauimus terminthone esse: idè brassicam cum melle tritam apponi iussimus, quæ etiam Aëtius lib. 14. cap. 62. ad epinyctidas valere scribit: atque hoc tuberculo dissecto pus inuenitur. Hinc & Oribasio species phymatis est, & Aëtio species pani, cum sic scribat lib. 14. c. 63. Terminthus pani species est, adiacetq. supremo vlceri bulla atra: qua distincta, quod subiacer hypofyrmati simile apparet: hoc autem dissecto pus inuenitur. Curatio quam ad epinyctidas diximus, huic quoque accommodabitur. Hæc Aëtius.

SCHOLIA.

TERMINTHVS tuberculi species est: incumbit autem Terminthus. ipsi pustula nigra supernè ac infernè: qua rupta infernè desquamato similis apparet: hoc autem dissecto pus inuenitur. Apud Fernelium terminthus eiusdem generis pustula cum epinyctide est, ex fernido præassatoq. sanguine prorumpens. Epinyctidi par quidem est magnitudine, sed cui pustula incumbit

Paulus lib. 4. cap. 24. nigra ac rotunda, quæ ardore in squamam abit. Paulus vero terebinthum appellat, ita inquit: Oribasius terebinthum sanè phymatis speciem esse asserit, super quam pustula nigra emineat: hac rupta id quod subiacet desquamato simile apparet. ubi scalpello diuiseris, pus deprehenditur. Dioscorides autem Alexandreus literis mandauit terebinthos cutis esse excrescentias rotundas, nigro virides, terebinthi fructum referentes; atque aliis phymatum tumoribus similiter curari censet: auxilia ex supra comprehensis huc transferenda. Sed & curant talem affectum calx cum oleo ad mellis compagem subacta, & imposita, & laser cum aqua; desiccatur enim absq; mordacitate. Item brassica vel solani vel hyoscyami folia cum melle imposita, & una passa cum rutâ egregiè medetur.

OBSERVATIO XI.

De carbunculo benigniore in nate apparente.

CUM aliquando cum chirurgo ad ægrum deflecteremus qui carbunculum attramen benigniorem parte dextra natis habebat, quamuis eo tempore pestis non grassabatur, attramen quia videbatur febricitare, & vrina tincta erat, sanguinem ex vena basilica detrahare iussimus: si fuisset pestis, & carbunculus malignus, potius ex crure & loco magis è directo & vicino detraxissemus. deinde dedimus serum caprinum cum foliis senæ, epithymo & rhab. ac thamarindis. & apponi mandauimus emplastrum ex arnoglōssa ab Auic. & aliis conscriptum; & in circuitu defensionum ex bolo arm. vero, aceto & aqua ros. Postea ad maturationem accepimus emplastrum ex malua, ficibus, uuis passis, farina hordei, cum butyro, & rad. althææ. & post ruptum apostema pro mundificatiuo vsi sumus vnguento ex melle, farina hordei & succo apij. Deinde illud Auic. exiccans vsque in finem, descriptum etiam cap. de carbunculo apud Valescum: R. cerusæ 3 v. litharg. 3 ij. scorix argenti 3 iij. β. drag. 3j. fiat pul. &

& cum cera alba in mortario, & oleo ros. q. s. vel sit ceræ quantitas \mathfrak{z} j. olei ros. \mathfrak{z} iij. fiat vng. At carbunculi illi magis sæui in facie illius infantis fabri argentarij Delphensis apparentes, maximè in ipsis genis, nullo modo curari potuerunt; morte ipsa paulo post subsequente, vti prædiximus.

SCHOLIA.

CARBO, qui & carbunculus, Græcis ἀρπαξ dicitur: Carbo.
Carbunculus.
Anthrax.
nam magnas inflammationes, carbunculum, & gangrena & sphacelus concomitari solent: de his igitur nobis hic agendum est, sed prius de carbunculo. Est igitur carbunculus ex influente sanguine nigro crassoq; ac sæculento eodémque feruente atque impensè calido, & est tumor ulcerosus: vel carbunculus est ulcus cum inflammatione. Sed errant recentiores, qui anthracem & carbunculum diuersa esse mala putant, ut copiosè lib. 2. Paradox. cap. 18. Euchsius demonstrauit. Arabum placita sectantes Prunam & ignem Persicum nominant hoc vitium. Duplicem tamen etiam doctissimi quique carbunculum constitunt: nam carbunculorum (ut & Fernelius annotauit) alius simplex, qui è solo ardore simpliciq; putredine nascitur; alius malignus, qui his etiam iungit venenatam qualitatem: talis in pestilentia grassatur, de quo plura diximus lib. 6. Obs. & Curationū medicinalium, cum de peste scriberemus, maximè Obser. 10. de peste cum anthrace seu carbunculo. Chirurghi huius ætatis peculiari nomine anthracem vocant, & à carbunculo sola malignitate & venenositate differre voluit: cum tamen ἀρπαξ Græcis sit idem, quod carbo vel carbunculus Latinis. Proinde supernaculum est eorum causas, signa & curationem (ut etiam dicebat Tagautius cap. proprio) quod serè omnes chirurghi faciunt, distinguere, & in diuersis capitibus de iis pertractare. Carbo itaque, ut dictum est, ex influente sanguine nigro crasso ac sæculento, eodémq; feruente atque impensè calido nascitur. Cui si iuuenes quædam humiditates admixta fuerint, pustula quædam ambustis consimiles, per summa cutis excitantur; appellaturq; tum hæc inflammatio, carbunculus cum pustula. quod vitium sæuè frequentissimè incidit. Interim tamen (licet rarò) & citra pustu-

Gal. de compos. med. per genera lib. 5. cap. 15.

Carbunculorum alius simplex, alius malignus.

Carbunculi generatio & descriptio.

Carbunculus duplex: alius cum pustula, alius sine pustula. Notæ carbunculi. 1. Vlcus crustosum. 2. pustula.

Paul. lib. 4. cap. 25.

Indicia.

Curatio.

Vena sectio.

Scarificatio.

lam, pustulâs ve incipit: verum omnibus crustosum vlcus fit. Dixi autem, citra pustulam, pustulâs ve, quoniam una duntaxat ali- quando pustula maiuscula cum hoc morbo exoritur, qua rupta, vlcus cum crûstâ gignitur. Sape verò non una tantum pustula erumpit, sed multa exiles, veluti milij semina, crebra in particu- la residentes: quibus praruptis, similiter crustaceum vlcus pro- uenit, quale serraamenta candemia excitant, ut latius reperies ubi de peste cum anthrace seu carbunculo scripsimus; præcipuè Observatione 12. & Scholio eiusdem, & Obser. 24. & 25. 29. Carbunculus itaque quamcumq; partem corporis inuaserit, eam mox exurit, pustulasq; circum se ardentissimas acerrimasq; ciet, tandemq; ardoris vi crûstâ vel nigra vel cinerea obducitur. Hinc partes vicina longo sape tractu consentiunt, caloris do- lorisque participes: valida quoque febris accersitur. Inflamma- ta pars numquam suppurat, sed seriore exusta corrupta car- nis lobum tandem excutit, quo excidente vlcus canum sordidum- que manet, hocq; vno maximè (ut dicebat Fernellius) à cæteris feimgitur tuberculû. His & reliqua signa adiungito qua loca citato scripsimus: nam omnino hic denud reperire non opus est. Carbunculus minùs lethalis est quando primum rubens, deinde citrinus apparet, & quando in aliis locis quàm emunctoriis, sed circa principem partem magis venenosa subito recurrens homi- nem interficat. Reliqua prognostica his adiciet ex loco iam ci- tato: nam anthrax seu carbunculus omnis licet sit morbus acutus, periculosus & contagione inficiens, omnium tamen pessimus in emunctoriis & prope membra principalia. Si circa stomachum siue œsophagum sancès ve incidat carbunculus, subito (ut ait Celsus) spiritum sape elidit. Minùs lethalis Avicenna qui pri- mum rubet, ut diximus, deinde citrinus apparet. Qui verò line- scit aut nigricat, neminem ferè non ingulat; nullus tamen ex sua natura non periculosissimus censetur. Quanquam & plu- rima de curatione diximus, ab incisa vena incipienda, ut Gale- nus præcepit 14. meth. & 2. ad Glauc. ad animi defectionem us- que. & vena semper partem affectam è directo respiciens, atque pro eim: si u nunc humeraria nunc interior, interim etiam media, & ea qua in malleolis est, secatur. Mox supra locum affectû sca- rificatio rectè accommodatur, plagis ob succi crassitiem altioribus.

Sunt & alij qui precipiant ipsos scarificatus in crustaceo ulcere duntaxat esse faciendos. Ipsas verò incisiones aqua salsa calente statim perfundunt, ne in illis sanguis coëat, concrescatve, sed foras egrediatur. Interdum etiam erodens medicamentum imponunt; cuiusmodi est arsenicum, quod in ea re inter cetera primum obinet. Quidam verò loco scarificato sanguisugas admovent. Caterum laboranti particula (tametsi quod ad inflammationem spectat, refrigerantia desideret) valide repellentia handquaquam admoneri debent. Nec enim huiusmodi fluxionem propter humoris crassitiem; atque etiam malitiam auertere poteris. Et si quando id feceris, aliud quippiam (ut Gal. ait) quod in alio sit corpore offendes. Atqui nec affatim affluere in humor, ipso Galeno autore, permittendus est. Inquirenda igitur remedia sunt, quæ cum modicè reprimendo, etiam digerere seu dissipare possint. Tale profectò est cataplasma quod ex plantagine conficitur, cum quod ex lente bis cocta constat. Sed his admiscenda nobis erit mica panis, qui furno sit coctus. Esto autem panis (ex Galeni consilio) nec omnino a sursum purus, nec nimium eius habens. Eiusmodi autem cataplasma recentioribus appellatur emplastrum de arnoglossa, cuius forma apud eos est talis; R. arnoglossi, lentium, panis furnacei ana par. aq. coquantur in aqua. His gallas addit Anic. Alij, ex Paulo & Galeno, ex foliis plantag. coctis, lente cocta, pane clibaniz, oleo ros. cōficiunt. Sed quia hoc in loco de pane clibaniz facta est mentio, non ab re fortasse erit recensere genera quatuor panis, quæ erant in usu apud antiquos, & hoc ex Galeni sententia primo de alimentis, cap. 2. Erat igitur panis clibanitis, valdè laudatus, quoniam summa coctus erat diligentia, ita ut in omni sui parte crustam reserret, dictus à clibano, hoc est à furno testaceo: huiusmodi testis nostra tempestate raras coquere solemus. Secunda panis species vocabatur *ipnitis*, ab ipno, id est furno, vel fornace furnaria maiori & sine comparatione capaciorem quàm clibanum: itaque corrige Gal. in supra allegato loco, qui in mentione huius furni legit minori: tu verò scribes maiori. Tertia panis species coquebatur super cratem, vel supra cineres. Quarta species panis erat panis infermentatus sub cineribus, & sub cineritij vocabantur, & erant prani nutrimenti. Panes etiam diversa sortiebantur nomina à compositionis diversitate: nam

Aqua salsa
perfusio.Arsenicum,
Sanguisuga.Lib. 14. The-
rap.Cataplasma
ex arnoglos-
so.Quatuor ge-
nera panis
apud anti-
quos in usu.

appellabant *πτοχίας* panes ex fursure confectos; *αυτοπύργος* autem ex tota farina: quos etiam *συγκομισ* et dicunt. Erat panis *σιμιδάλιος* id est, similaceus, panis *σιλινγίτης*, id est, siliginis: panis *ἄζυμος*, id est, infermentatus. Ad rem igitur ut veniamus: quando non est copia panis clibanitis, buccellatus appellatus, passum eius loco accipere crustam panis *αυτοπύργου* maiori furno cocti. Sed quo digesti sumus veneriamur. Hinc autem ad eandem intensionem probat cataplasma quod constat duobus malis granatis, coctis in aceto aut aqua acetosa. Et hac quidem tum parti ipsi laboranti, tum circumiacentibus imponunt. Huic sententia accedit & Paulus Aegineta, ita inquit: Ut radicitus carbunculos dinellas, dirimasq; ab adiacentium commercio, malum punicum acidum minutatim concisum in aceto coques: ubi autem intabuerit, in lanorem deteres, linteosq; illum induces: cum siccescit, aceto humectabis. Quidam tamen hoc medicamentum nimium repellere volunt, periculumq; esse ne sanguis infectus intro repellatur, senioresq; inferat symptomata: quare & infra scriptum magis probant: R. malum punicum acidum, malum punicum dulce, bordei m. j. folior. plant. m. ij. coquantur in posca, donec rumpatur hordeum; & contundantur: postea accipe pulpam mali cydonij sub prunis cocti, vel alterius mali acidi, & fiat emplastrum. Item nucis avelanae veteris vel etiam non veteris medulla carbunculos matrat, rumpitq;. Alij nucleos inglandis viridis idem posse contusos cum carnibus cydoniorum vel aliorum malorum acidorum, contendunt. Optimum autem etiam fuerit perpetuo circumiacentibus ipsis partibus ung. ex bol. arm. rosaceo vel myrtaceo oleo & aceto confectum inducere: ne scilicet intro, qui iam fluxit humor recurrat. Sunt qui virus ipsum & malignum humorem in pestilenti carbunculo, suctu, cucurbitulis & medicamentis attrahentibus ad locum carbone obsessum emocant vel alligant. Quod sane & faciendum consuluerim, si artus & minus nota partes, ambrae occupet, & pigre moveatur fluxio. Si vero valide atque affatim irruat, modice reprimentibus (ut modo ex Galeno dictum est) infrenandus utcumque est fluxionis impetus, ne scilicet ingens nimis dolor ex fluxione tam violenter irruente in laborante particula excitetur, atq; ita malum exasperetur.

Cataplasma
ex malis puni-
cis.

Medulla nu-
cis avelanae,
carbunculos
matrat, et
rumpit.

Auxilia at-
trahentia vi-
rus.

retur. At quando imminet timor gangrena, tunc quidam imponunt emplastra ex farina orobi: adherendo, quod orobus, MOCO Italis dictus, nō est bonus: sed accipiatnr orobus Cretenfis, vel farina lupinorum, vel farina lolij, & oxymel; & posca. Si autem vident quod per impositionem horum medicamentorū tumor cedat, variant cum infra scripto: R. folia cupressi viridē, passul. sine nucleis, farina hordei, caric. ana ℥ ij. folior. rutae m. j. nucleis iuglandis ℥ ij. contundantur, & fiat emplast. & imponatur circumquaq; locum tumorem. Super ipsum verò vlcus crustosum, ubi precipue membrū putrefcit, valens aliquod medicamentū & quod vehementer exiccet, non autem quod concoquat & pus moueat (quando ita putredinem particula soneris) imponendū est. Cuius modi est Andronis, Musa, Passonis vel Polyde: diluig; id vino aliquo dulci vel sapa ad sordū crassitudinē debet. Cataplasma etiam, ut paulo antē diximus, quod ex orobi farina & oxymelite constat Galeno, rectē apponitur ubi vlcus malignū & cum putredine fuerit. In cōmuni autem usu est ung. vulgo Aegyptiacū nominatū. Quod si hac paruin proficiant, ad acriora & quae ignis vires habeant deveniendū erit, cuius generis sunt radix dracuncul, vel aristolochiae ex aceto trita & imposta, calx, arsenicū, sandaracha, & alia huiusmodi quae non aliter quā ignis adurant. Haec proficiunt satis, si protinus à vīna corruptam partem resoluant. quo facto quicquid corruptum est & emoruum, protinus auellere & radicibus exstirpare oportet. Cū autem sub ipsis erodentibus medicamentis sequatur crusta, undique à vīna carne diducta, vlnus quidem, quod ex eis excitatur, ut cetera aduēta curandum est. Ceterū cū extremis morbis (ut inquit Hippoc.) exquisitē extrema remedia optima sint, cōgimur aliquando (victis scilicet malo medicamentis) malignū carbūculū, canterio ut vocant actuali, hoc est, candente ferro exstirpare. Finis autem adurendi est, dū ex omni parte sensus doloris est, ut rectē Celsus admonnit. Post hac crusta vlcēribus inducta auxiliū ad id accommodis resoluenda est; ut hoc emplastro, vel alio simili: R. farinae hordei, frumenti ana ℥ iij. decoct. maluar. viol. rad. alibae ana q. s. butyri recentis, axung. suillae liquefactae ana ℥ ij. fiat empl.: cui à bullitione remoto addantur dno onorū lutea. post crustae ablationē locus mundeatur & detergetur tali medicamēto:

Quid supra vlcus crustosum imponendum.

Vide Gal. lib. 5. de compositione medic. per genera cap. 12. Paul. lib. 7.

Ung. Aegyptiacum.

Adurendi medicamentum.

Quando vlcionem properandum.

Rx. terebinthina ꝯ ij. syr. ros. solut. ꝯ i. mellis ros. ꝯ v. bulliana
 simul q. s. & ab igne ablatus addatur oui intemum: farina hordei,
 farina frumenti ana ꝯ vi. misc. Purus iam factus locus implen-
 ribus medicamentis curari debet. Vbi verò iam penitus fuerit
 impletus, ea quæ cicatricem inducunt adhibere tempestivum
 erit. Quòd si adustionem laborans pati recusaverit, aliquis ex
 humili plebe adhibendus est, qui carborem ipsam mordicus ap-
 prehensum radicibus euellat. Quales olim erant Psylli in Italia
 nominati, qui vulnura ex morfu serpentum illata innocuè ex-
 gebant. Porro auulso sic vel quomodocunque absumpto carbun-
 culo, sinus, cessante iam inflammatione, primum ut diximus de-
 tergeri, deinde iam purus factus implentibus medicamentis, quæ
 Græci synsclotica vocant, illinendus: deinde impletus cicatrice
 obducendus; quorum materiam ex lib. 6. Taganti inuenies. Ca-
 terum si non admodum saniat malum, nobisq; aliquas dederis
 inducias, maturatur & aperitur Auicenna, ad moris fribus, ser-
 mento & sale adinnicem mixtis. Vbi autem bis vel ter apposi-
 tum fuerit huiusmodi cataplasma, locus omnino uiger & dehi-
 scens apparere solet. Atque tunc mundificatio ex apio locum de-
 tergendus erit. Medicamen quoque ex vitellis onorum & sale
 confectum, si sapius admoneatur, maturat & aperit carbunculum,
 ut scribit Theodoricus. Ad eundem finem in communi usu est
 hodie medicamentum quod melle, sale, triticea farina & onorum
 luteis constat. Consolidæ maior (quod Græcè symphyton appellat)
 inter duos lapides contrita, diuino quodam (ut referunt) mira-
 culo anthracem sanat, & ex toto intra diem unum interimit.
 Reliqua autem quæ crassas in ulceribus resolvunt, vide in iis quæ
 de peste & anthrace diximus ac scripsimus, idq; praci-
 pue sexto libro nostrarum Obseru. de febris. Quidam repur-
 gato ulcere illud hoc ung. glutinant: Rx. olei ros. ꝯ ij. cerussa,
 plumbi vsti, litharg. ana ꝯ ss. ros. rub ꝯ ij. rad. symphyti mai-
 ris, balaust., bol. arm. ana ꝯ ss. sem. portul. gran. ij. cera can-
 dida q. s. fiat ung. Sed quoniam in eiusmodi maligno morbo
 sana symptomata euenire solent, erit prudentia medici omni-
 bus resistere: frequentiora accidentia sunt calor ingens: appeti-
 tum prostratus, cordis tremor, delirium. Quibus instabis ace-
 so, aq. ros. & aliquo epithemate cordi imposito, hoc mo-
 do:

Psylli,

Maturatium
Auicennæ.Mundificati-
um ex apio.Consolida
maior.Quomodo
symptomatis
succurren-
dum.

do: R^z. aq. melissa, ros., bugloss. ana ʒ iiij. vini maluatici ʒ ij. pul. meliss ros. ana ʒ j. corall. rub. specier. diatrion sant. ana ʒ ij. fiat epithema secundum artem: pluribus vicibus varietur & imponatur. Si impatientes sint, & epithemata abhorreant, inungantur hoc ung. R^z. olei ros. ung. ros. Mes. ana ʒ j. aceti ros. aqua ros. ana ʒ ij. cera alba ʒ ss. misce: & bulliant ad consumptionem aceti & aqua. adde pul. sant. alb. corall. rub. specier. trion sant. ana ʒ ss. misce, & linteolo illinito apponatur. Si delirium adest, refrigerantibus utemur. Si nausea ratione humoris calidi in ventriculo sit, vomitum proritabimus cum ʒ ij. vel iiij. ad summum huius aqua: R^z. putamina viridis nucis in glandis lib. x. contunde, infunde in aceto per 4 dies: deinde alembico aqua extrahatur. Vel detur syr. ros. solut. vel cassia. Si nimis adsit vomitus, cohibe enim cum syr. cydon. vino cydon. vel diacyd. Si cordis tremor, utere elect. diatrion sant. diar. cum pul. unionum & sinaragd. reliqua inuenies qua de peste scripsimus ad longum. Ceterum de Anthrace etiam maligno seu carbunculo hac exempla adhuc adducimus.

OBSERVATIO XII.

In qua ponuntur exempla aliquot carbunculi malignioris pestiferi seu anthracis, etiamque bubonis.

HENRICVS, iuuenis 23. annorum, pictor, qui commorabatur apud insignem illum pictorem Blocklandium dictum in Aggere longo Delphis, anno 1567. ipso 29. die Martij cum febre corripereetur cum vomitu ac nausea, ad eum vocatus fui sub noctem; & animaduertens duas pustulas admodum paruas sed subrubescences & purpureas, statim suspicionem de peste ac carbunculo venenoso & anthrace habebam, quamuis solummodò morbillorum instar iam priùs erumperent. augebat suspicionem quòd circa vicinos pauperes pestis esset: sed post vnum diem magis hæc manifesta euadebant,

debant, cū hic fateretur se cū cane magno cuiusdam vicini, qui in ædibus familiaris erat, luisse, qui inuentus est habere in collo bubonem pestiferum admodum magnum. Caterū primā illā vocatione, morbo iam prius inuadente, licet levis suspicio esset, venam secui in talo in pede dextro è regione femoris in quo duæ illæ pustulæ apparebant, tum quā etiam in eodem inguine dextro nonnihil dolebat, vt etiam de bubone pestifero suspicionem conciperem. Detracto itaque sanguine ex talo satis copiosè ilicò, vt & sequentem syrupum caperet iussi: R. syr. de limonibus ℥j. syr. de acetositate citri ℥ss. aq. scabiosæ, acetosæ, borag. ana ℥j. misce. Trigesimo die Martij manè cū redirem, carbunculi duo seu anthraces in femore ad quadrantis magnitudinem apparebant, & bubo pestilens etiam in inguine emergebat. tunc, quia ventrem non deponebat, hæc subsequētia administrari mandauimus: R. folior. senæ ℥iij. agarici femin. rhabarb. selecti ana ℥ss. sem. anisi ℥j. squinanthi, zinzib. ana ℥ss. bant in aq. scabiosæ, cardui benedicti, borag., bugloss. ana ℥j. & fortiss. expressioni adde syr. ex infus. ros., de limonibus ana ℥ss. misce, detur vnica vice, & optimè aluum deposuit. Eodem die etiam accitus est Cornelius Erius confrater meus: & tūc præscripsimus vt etiam sæpissimè sumeret ex syr. sequenti: R. Syrupi de limonibus ℥iij. syr. viol. borag. bugloss. ana ℥j. misc. Deinde vt & hæc adhiberentur: R. boli arm. veri ℥j. rad. tormentillæ, foliorum dictamni Cretici ana ℥ss. fiat puluis, & diuidatur in tres partes: & aquæ scabiosæ ℥i x aceti ros. ℥ij. misce pro tribus dosibus, cum puluere. Supra carbunculos venenosos qui in femore apparebant apponi mandauimus fermentum cum cantharidibus, & vitriolo, vt per 24. horas remaneret. Deinde altero die, qui erat vltimus dies Martij, tantum puluerem vitrioli chirurgus apposuit: ad quem etiam

ager

eger die præcedente, cum Blocklandius pestem esse intelligeret, translatus est: sed nec ipse chirurgus ille ægotantem diutius in ædibus suis retinere volebat. Die itaque 30 Martij Petrus Frederici chirurgus, qui in vico Iacobi Gerardi dicto commorabatur, ægrum in ædibus suis recepit, & tunc apposita sunt anthraci attrahentia. Postero die, hoc est ultimo die Martij, vitriolum tantum chirurgus apposuit; & supra ipsum digestium, & ultimo diachylon. At buboni inguinis appositum est emplastrum de mucilagibus, quod maximè extollebat Eri-
cius, quamquam id mihi & chirurgo vix sufficiens esse existimabatur: quomobrem eodem die ultimo Martij redeuntes à meridie, cum hoc non satis ad rem facere videretur, communi consilio cape assatum sub cineribus cum capite liliorum alborum & theriaca instar cataplasmati commixtum appositum fuit buboni inguinis. Altero die, qui erat primus dies Aprilis, eadem adhibita sunt, adiectis tamen farina sem. lini, fœnigræci, malua, bismalua, & rad. althææ, prius coctis cum s. q. oleorū sequentium, cataplasma appositum est. Hæc erant olea quæ immiscebantur: & olei irini ℥iij. olei lini, de meliloto, lilior. chamomill. ana ℥ij. misc. Interim istis diebus quoque semel capiebat pul. suum cum aquis superscriptis, & ex mixtura syrupor. superscript. sâpissimè. Secunda die Aprilis valdè debilis erat: quare sequentem panem Martium illi exhiberi mandauimus: qui ita præparabatur: & pulparum caponis & carnis, alarum & totius caponis q. s. amygd. dul. excortic. in duplici pondere ad præcedentia, cum aqua rosacea & sacch. ros. fiat Massa panis seu panis Martius secundum artem. A meridie ter per se aluū reddidit. Sed quia inflammationem palati, linguæ ac gutturis incurrebat, aphthas meruebamur: quare ne illæ suppullarent, gargarisma sequens præscripsimus: & aquar. plantag. solatri ana lib.ß.
syr.

syr. granat. \mathfrak{z} ij. oxymellis simplicis \mathfrak{z} j. misc. pro gargarismate. Tertio die Aprilis, relicto vitriolo, supra anthraces in femore præcipitatum positum est, deinde butyrum, & postea diachylon, ut prius. At buboni in inguine emplastrum illud ex cæpe cum reliquis illis iam dictis adhuc apponebatur. Quarto autem die Aprilis, id est septimo die ab initio morbi, excidit eschara ab utroque anthrace qui in femore erant, & ampliata sunt foramina ultra medium stuerum nummum. Ut autem carbunculis tunc digestivum apponeret chirurgus, iussimus. interim boli arm. veri \mathfrak{z} ij partiebamur in 6 partes, & de tribus horis in tres horas partem vnam cum syr. de limonibus exhibuimus. Manè, cum alium non deponeret; suppositorio sequenti bis alium deiecit: \mathfrak{z} pul. trochis alhandal \mathfrak{z} j. pul. hieræ picræ \mathfrak{z} j. cum sale & melle, fiat suppol. Subinde & hac mixtura utebatur: \mathfrak{z} syr. ex infus. ros. \mathfrak{z} iij: syr. de limonibus \mathfrak{z} iij. misc. etiam his die præcedente usus fuerat, nempe tertio die Aprilis. At quarto die Aprilis cum bolum cum syr. de limonibus exhiberemus, postea per se incidit in fluxum ventris, qui illi duravit etiam nocte sequente, & duos vermes deiecit. delirabat, & ante quam nox veniret prodeplorato ab omnibus habebatur, & putabatur mori; imò & inunctus ultima inunctione, quamquam ipse delirans nihil sciret. Quinto die Aprilis, id est octavo die ab initio morbi, melius habere coepit, & duo carbunculi in femore optimè pus eiciebant, ut valdè speraremus. Sed postea bubo paulatim delituit. tandem, & tertio carbunculo quamvis exiguo, cum pustula exigua, in eodem femore prope illos duos anthraces exorto, & post aliquot dies etiam in manu (licet & valdè minutus & hic existeret) istis inquam à nouo suppullularis, etiam supradicta attractiva applicuimus; mox & butyrum & diachylon; postea etiam decidente eschara tandem

tandem & digestium. Sexto die Aprilis, omnia meliora: mente constabat, & optimè morbum ferebat, & denuo supposito iniecto bene aluum reddebat. Septimo Aprilis die, qui erat 10 ab initio morbi, noctem præcedentem malè tulit, valdè tussiebat, & sputa in pectore retinebantur. quapropter vt à bolo abstineret cum syr. supradictis imperauimus: interim pectus inungi fecimus cum vng. resumptiuo; & vt diatragacantho frigido in tabulis sæpissimè vteretur, mandauimus. Carbunculis autem digestium more solito imponebatur, eidem melle rosaceo nunc adiecto. Octauo die Aprilis adhuc valdè tussiebat. quare pro tussi præscripsimus hæc subsequencia: ℞. conser. viol. borag. ana ʒ v i. loch de pino ʒ j. cum syr. capill. Ven. q. s. fiat loch: & erat hic vndecimus dies ab initio morbi. Eo autem tempore omnes carbunculi optimum pus reddebant. Nono die Aprilis, qui erat dies 12 ab initio morbi, omnia meliora, præterquam quòd tussi adhuc afficeretur. quare illi etiam vinum inhibuimus, propter tussim, quod tamen antea concesseramus. Decimo Aprilis die glandem denuò iniecimus, & iterum diatrag. frig. & subinde sacch. viol. exhibuimus: postea vt & sacch. candido subinde ad libitum vteretur, præcepimus. Vndecimo die Aprilis, qui erat 14 ab initio morbi, cum tantum semel aluum deposuisset ex glande præcedente, & stercora duriora essent, vt iterum purgaretur hoc modo, mandauimus: ℞. folior. senæ ʒ iij. rhab. selecti ʒ j. squin. ʒ j. infunde per noctem in ʒ v decoct. pectoral. ob tussim. & fortissimæ express. adde syr. ex infus. ros. ʒ j. misce pro vna dosi. quater egregiè aluum deposuit, & cœpit quotidie melius habere. Duodecimo die Aprilis, cum tussis non sedaretur, vt hoc ecligmate sequenti sæpissimè vteretur, mandauimus: ℞. diatrag. frig. ʒ j. conser. viol. borag. ana ʒ v i. cum syr. de liquir. fiat loch. Decimo tertio

Aprilis, cum in ventre dolorem pateretur, vermes esse adhuc existimabat: ideò vt semine contra vermes zaccharo incrustato vteretur, præcepimus. at vermes non reddidit, dolore paulatim evanescente. Eo tempore pro cataplasmate quod soliti eramus apponere buboni in inguine, iam delitescenti illi solum diachylon cum guminis apponi iussimus. 15 & 16 Aprilis iam curatus videbatur: quamquam 17 die Aprilis in inguine, circa testem, vbi bubo delituisse videbatur, apparuit quasi parvus carbunculus seu anthrax: quare apposuimus diachylon commune cum gummis, deinde & digestiuum: postea etiam exiguum quid puris erupit. At decimo octauo Aprilis, ne duo isti carbunculi in femore maiores aliquantulum, licet optimè pus redderent, quemadmodum & tertius in femore, licet exiguus, & quartus ille minutus in manu, optimè pus quoque redderent, ne isti duo (inquam) maiores subito consolidarentur, mandauimus chirurgus vt puluerem præcipitatum imponeret, vt foramina diutius permanencia aperta, virulentiam effunderent: interim appposito & digestiuo. At post vnum atque alterum diem reliquimus puluerem præcipitatum. & 21 Aprilis carbunculo qui in manu erat nihil appositum est præter diachylon commune: & tandem etiam alii carbunculi iam dicti, relicto planè digestiuo, solo adhibito diachylo, postea ad sanitatem peruenere, adhibitis iis quæ cicatricem inducerent. Verùm cum iam curatus videretur hic noster æger, neque eum ampliùs inuiferemus, bubo ille qui delituerat in inguine, denuò suppullulans in abscessum permutabatur; qui tandem ruptus, excreto pure, & bene deterso, deinde per chirurgum adhibita incarnatione & consolidatione curatus est. Erat autem hæc pestis sæuissima adeò, vt etiam vxorem eiusdem chirurgi, quantumuis grauidam in vltimo mense partûs, inuaserit, anthrace in dorso

fo suppullulante. quod cum chirurgus mihi cum animi dolore narraret, hæc subsequētia præscripsimus: ℞. aquar. scabiosæ, acetosæ ana ʒ j. syr. de limonibus ʒ j. boli arm. veri ʒ j. misce. retinuit quidem sed & caro corripiebatur, delirabat; & anthrax videbatur delitescere, vt chirurgus putaret eā morituram. mandauimus vt continuò syrupum de limonibus exhiberet. postea & hoc apozema purgans dedimus: ℞. rad. tormentillæ, foliorum dictamni veri Cretici, scordij veri, rad. zedoariæ ana ʒ j. colutæ ʒ iij. rhabarb. selecti ʒ j. cinamomi ʒ ij ʒ. coquantur in aqua scabiosæ pro ʒ iij. fortiss. expressioni addendo syr. ex. infus. ros. ʒ j. misce. ter optimè aluum excreuit: & post purgationem die sequenti iterum anthrax apparuit. Bolum arm. cum syr. de limonibus iterum dedimus: deinde commoda, vt superius diximus, adhibita sunt remedia anthraci per chirurgum: & ipsa intra septem dies conualuit. Sed & Aleydæ Iodoci, vxori Bokelli Alberti Delphensis zytheptæ, in cuius cupis malleus fabri pro insigni erat, pestilenti febre ac bubone in inguine correptæ, dedimus nostrū sudatoriū, descriptum lib. vi. Schol. Obs. 16. de peste & pestilentibus feb. deinde ex talo è dicto sanguinem misimus: & cum bubo à muliere tractaretur, cum chirurgum non admitteret, vesicatorium apponi iussimus: at postea factus est abscessus: deinde & optimè curata est. Sed antequam euaderet, cum aphthas in ore haberet, & cum ego illas repurgarem, ilicò ingenti dolore in inguine correptus, ac febris, domum rediens, cum omnia signa pestis haberem, eādē nocte syr. de limonibus cum aqua scabiosæ, acetosæ, & aceto, & bol. arm. cum mco puluere accepi: & vestibis in lecto bene coopertus adeò sudaui vt madore ferè diffuerem: & ita ille dolor euāuit in inguine; & optimè, laus superis, curatus fui. quamquam post diem vnum aut alterum

rum febre lenta correptus fuerim, non tamen pestilentiali; quæ mihi ad sex deinde septimanas ferè adhæsit.

SCHOLIA.

DE carbunculo benigniore actum est Obser. præcedente: at in hac de sano pestilentiali & contagioso egimus, cuius causam naturalem & eius signa, immo etiam prognostica ad longum diximus Scholio Obs. 13. lib. 6. cum de peste & anthrace seu carbunculo diceremus. Pauci autem absque evidenti Dei optimi auxilio ab ipso enadunt. Ceterum quomodo pestis curetur, si anthracem vel bubonem habeat, satis luculenter diximus in 6 illo lib. iam citato. Sed hic breuiter quadam addemus, quod aeris ratio sit habenda: nam eius attractione (ut lib. de theriaca ad Pisonem cap. 16 scribit Galenus) contagione homines afficiuntur: unde Hippocrates admirandus aerem igne exsiccat & corrigebat, ut latius loco citato. prosequuti sumus: nos eius exemplo fumigis odoriferis ibidem descriptis aerem corrigemus. Alij iuterim vetant ne infirmi facies aut aqua aut aceto abluatur, ne materia intus consilipetur. alij, ut etiam odorifera naribus apponantur commendant, ad præcautionem: & ita poma odorifera olfaciunt, (quorum formulas è libris De peste requiras) & alia fragrantia cum spongia aceto intincta. in æstate frigidiora, in hyeme calidiora odoraamenta admittunt. quod ad victus rationem attinet, cum sit summa virium imbecillitas, attenuante non visumur, sed qua facile concoquuntur exhibemus, & ea qua plurimum nutriunt, ut sunt pullorum confusa, succo limonum, aranciorum, puniceorum respersa. Gal. bolum arm. cum vino tenui exhibet. alij vinum dilutum concedunt pro potu. Sunt qui aquam admodum frigidam probant, ut Aëtius, sed male. nam cum viros debiles sint, & calor naturalis exiguus, imminet periculum ne is extinguatur. Sed de his latius diximus Obs. 23. & Scholio eiusdem, lib. 6. nostrarum Obs. Somnus autem moderatus esto, qui non ex horarum numero, sed temperamenti ratione æstimari debet: talis enim coctionem adiuvat, spiritumq; & vires restituit. Diutius somnus vituperatur, nisi quis ob assuetudinem non possit eum absque noxa dimittere; alij

Curatio.

Viciatio.

quid enim consuetudini condonandum est: immoderatus vero
 & statim à cibo, corpus enervat, ingenij aciem obnudit, gravi-
 tatem quandam & malam concoctionem progignit: estq; in-
 causa quòd sopitis membris hac lues longius serpat & depascu-
 tur. Exercitio non utendum nisi mediocri, & in loco temperato,
 atque aëre prius per medicamenta ac suffimenta purificato: &
 emendato: cauendum igitur illud genus exercitij, quod crebrans
 aëris inspirationem requirit, ut sunt choreæ, cursus concitatiotes,
 & saltationes. Tristitia, ira, grauiorcs cura, odium, timor, &
 quicquid est cogitationum feneratorum, fugienda omnia: gaudij
 & hilaritate mediocribus utendum. Vbi ad agrum hac lue la-
 borantem ingressus fuerit medicus, lenita alio cura à vene se-
 ctione auspicanda, modò vires, ætas, tempus & cætera à Galeno
 requisita consentiant. Vena eo latere intidi debes in quo pestilens
 bubo vel anthrax extiterit. Si postures aut circa mentum aut
 alius faciei partibus, ex humerali vena vel cephalica eiusdem la-
 teris sanguis mittendus: si sub alia, basilica seu iecoraria, vel me-
 dia, si non apparuerit. si in inguine, ex malleolo eiusdem lateris.
 si nullus compareat bubo aut anthrax in parte exteriori, ex eo
 loco ubi maior dolor & gravitas sentitur: qui quidem partium
 dolor indicabit venam, à qua ipsa sic faciendâ enacuatio. Supra
 thoracem partibus magis grauius & afflictis, ab humerali: tis
 verò quæ infra collum magis molestati, ab interiori seu medior
 inferioribus autem laborantibus, poplitibus aut malleoli vena inci-
 denda: & ubi virtus valida fuerit, aliq; non impediant, copio-
 se mittendus sanguis erit. Quod si propter aetatem aut alius do-
 censis non liceat, cucurbitula collo, humeris, dorso aut cruribus
 affigantur. Quod si inter prandendum siue cenandum, iam ven-
 triculo repleto, aliquem inuasit pestis, ilico veniendum est.
 Corpore tandem vacuato, & ventriculo, mox medicamentum
 aliquod quod venenis aduersetur, quale est elect. Iohannis de
 Vigo, vel pul. noster contra pestem ad sudandum, cum alios pul.
 quos explicamus; & alia antidota contra pestem lib. iam cl-
 tato. Vel antidotum descriptum cap. proprio apud Leonum de
 sanguinibus dictum. eiusmodi, vel pulnere aliquò tali sumpto,
 ager in lectum calefactum, mollibus linteis instructum, stragu-
 lisque probè rectum reclinetur, ut quatuor aut quinque horas

Medicamen-
 torum ratio.

pro vitium ratione fudet. Sndor deinde purissimis linteis abster-
gatur. Hinc è lecto, si velit & possit, surgat, aërem extra-
neum vitet. Interpositis duabus aut tribus horis à sudore, cibari
& nutrirì potest inf. Vinnu, & cibus iam supradictis. Tandem
vixè studendum est (ut iam plus quam satis diximus lib. na-
stro iam citato) ut humores venenati ad locum, unde carbuncu-
li emerferint, apposis cucurbitulis arte medicamentis vim tra-
hendi obtinentibus alliciantur: qualia multa in lib. nostro iam
citato de peste posuimus. quale & hoc est: R. ficuum piug-
num. v. i. unar. pass. 3. ß. salis fossilis 3 ij. nigella 3 j. cum oleo
chamomill. fiat emplastrum. Vel quod ex cepa tosta, iheria-
ca Andromachi, adiectis rura & salnia succis sit: qua buboni
quoque possunt apponi. & anthrax fortioribus quoque curari
potest, ut iam exemplo precedente ostendimus. Deinde hac
suppuratoria, ut R. diachyl. simpl. 3 j. ß. ammoniaci, galban-
ana 3 i. contusa appone. Vel R. farina scennogæci, lini, flo-
rum chamomill. ana 3 ß. rad. althæa, lilior. albor. ana 3 j. ß.
ficuum num. v. i. folior. dictamni 3 ij. rad. pbn 3 ij. sem. si-
napi 3 j. ß. simi columbini 3 ß. olei chamomill. lilicæ ana
3 j. ß. redigantur in cataplasma: quo vitior, facta mutatio-
ne. locus ubi adest carbunculus, ferro aperiat, vel cauterio
aduratur. Quidam statim cauterium actuale etiam apponunt,
ut diximus lib. nostro citato de peste, quod tamen Valescus
videtur non probare, quia ignem igni addunt: & ideo ponit
maturatima, quæ dicta sunt cap. precedente de carbunculo, vel
emplastrum de ficibus: alij tamen tam diu expectare nolunt, ne
ager statim moriatur: & ideo adhibitis iam illis attrahentibus
dictis seu suppuratoriis, ferro aperiunt, vel cauterio adurant,
hoc est igne vel medicamento adurent. Vultus postea abster-
gatur & cicatrice obducatur ut cætera vulnera. Aposte-
mate rupto, vel quouis modo aperto mundificatum ex melle
& farina & succo apij imponit Valescus, & deinde appo-
nit alia emplastra, ut diachylon. Alij quoque, si pest ruptu-
ram non cessat malitia, apponunt scabiosam vitam, & ipsam
dant in potu cum vino vel aqua. Interim dum hac fiunt, per
interim quoq. dantur ea quæ materiam preparando, veneno re-
sistant, ut R. syr. acerosi, de succo citri, endivia ana 3 ß.
aqua

aqua end. acetosa, bugloss. ana ʒ j. misce. dein per quatuor dies omni manè. Alia quoque medicina hac leniatur: R. manna electa, diaprui lenitini ana ʒ j. cum aq. end. acetos. viol. fiat posm. A medicamentis laboriose soluentibus & electivè ducentibus humores fortiter, abstinendum. Sed clysteribus, & lenientibus, cum excrementa educere opus est, insilendum. Si vires imbecillæ fuerint, partes roboranda principes. ut R. sacch. violati, ros., buglossati ana ʒ j. ꝑ. bol. arm. præpar. ʒ j. corall. rub. ʒ j. cort. cit. ʒ j. ꝑ. cum syr. de limonib. fiat antidotus liquida. Episthemata, sacculi & ung. cum alia libro nostro citato iam inuenies, ut non opus sit eadem hic repetere. At ethymata, quæ etiam referuntur ad pustulas è sanguine, etiam si pestilentiæ conditionem sequantur, ex sanguinis quoque feruore produnt, & extuberant; neque manifesta est pituitæ permixtio. Tempore concoquuntur & albescent, eorum materia in pus iam conuersa, quæ tandem vi in squamas siccæ sit. Sed quoniam de his diximus lib. 6. Observationum & Curationum medicinalium, de pustularum varis generibus in peste, & cum de variolis & morbillis loqueremur, non opus est rursum de iis mentionem hic facere, aut curationem adiacere, cum ea ipsa petenda sit ex locis iam citatis. quare sermone absoluto de carbunculo seu auitrace, ad Gangranam & Sphacelum & similes affectus transeamus.

OBSERVATIO XIII.

De gangranâ ad sphacelum tendente.

DO M I N U S Guilhelmus Brasserus, septuagenarius fere, sacerdos Agathanus Delphensis, cum longo tempore post contusionem leuam inflammatione pedis sinistri afficeretur, & à chirurgo tractaretur, etiam secundo tandem aduentante chirurgo, gangranâ à medio pedis ultra talum correptus est. Solent enim, ut antea diximus, magna sæpe vitia phlegmonis aliis tumoribus succedere,

quorum non aliud gangrænâ peius. Est enim incipiens partis corruptio, siue (vt alij vocant) mortificatio, nondum tamen integrè facta. In gangrænâ itaque pars nondum mortua est, nec sensu priuata, sed emoritur, atque ad extinctionem tendit. Eius mali tanta vis est, vt nisi ocyssimè succurramus, facillè pars laborans mortis habitum repræsentet: hoc est, promptissimè vitæ, sensus & motus extinctionem contrahat. Vbi verò membrum ipsum languens perfectè & in totum emortuum sensuque ac vita destitutum fuerit, tum hoc malum non amplius gangræna, sed sphacelos Græcis, Latinis Sideratio, recentioribus Esthiomenon vocatur. Differunt etiam alia ratione gangræna & sideratio, quòd scilicet gangræna carnosissimè tantum partibus & vasis, sideratio verò ossibus etiam innascatur. Sic ego Bononiæ vidi in Hospitali mortis os vndique nigrum in tibia, vt sphacelo affectum serra auferri deberet: sed chirurgus tunc expertissimus os abradebatur, & cum album fieret, vlcus cacoëthe, quo æger diu laborauerat, osse tandem sphacelum habente, ita abraso à nigritie & mortificatione, sine ossis ablatione, cum omnium medicorum præsentium admiratione curauit. Cæterum absolutam hanc laborantis partis corruptionem, sensus penitus auferentem, vulgus ignem Sancti Antonij appellat. Fit autem Gangræna & sideratio, quando vel parti vitalis denegatur facultas, vel quando in magnis inflammationibus nativus calor perit & extinguitur, perinde atque exigua flamma à maximo igne: vel à consusione, vt latius Scholio sequenti dicemus. Cognoscuntur iis notis: color floridus, qui in phlegmonibus adfuerat, in ipsis extinguitur: deinde dolor & pulsus recedunt, non finito adhuc affectu, verum sensu iam emortuo. Vnde membrum mox nigrum conspicitur (vt hîc,) molle quoque & putridum, foetoremque exspirans, cadauerosum efficitur.

citur. Hæc cum in seniore conspicerem, amissionem membri metuebam: nam & chirurgi de morte vel saltem membri amissione cogitabant. Curationem tamen tentandam pronunciauimus. Missionem sanguinis, in sene, peragere non audebam. ideo facta scarificatione satis profunda, vel potius vt Chirurgi faciebant cum rasorio cutim vniuersam secando cum subiecta substantiâ profundè sanguinem bene emanare mandauimus. Pro affectus magnitudine fiebant illæ sectiones & incisuræ, idque frequenter; quibus peractis, prima vice, cum sanguis non valdè emanaret, postea profundius facta est sectio, sanguineque effuso linamenta carpta & infusa in aqua vitæ apposuerunt chirurgi, ita paulatim carnem putridam abscindentes, cum circa labia eschara fieret. interim partem sanam cum repulsorio medicamento ex bolo & aliis defendebant, & loca vicina, ne latius mortificatio serperet. ipsi vero utebantur post incisionem aqua vitæ, abluendo; sed alij aqua salsa abluere iubent, vt sequenti Scholio dicemus. Ego autem, cum febricitaret æger noster, dedi syrupos conuenientes, & conuenienter hominem purgaui, & coepit melius habere. postea chirurgi medicamentum faciens ad putria vlcera imponebant ex farina fabar. ex aceto, vel oxymelite: deinde cum separaretur, etiam digestiua sua prius imbuta aquâ vitæ, apponebant. Postea solis digestiuis vtentes, tandem per incisiones progressi sunt, & naturâ ipsâ praua materia magis separari coepit: & sic sanam partem inungebant vng. popul. deinde magis subiade mundificabant cum Ægyptiaco vng. si opus esset: paulo post leniori. Ad separationem etiam escharæ cataplasmata superinducebantur ex malua, aliisque emollientibus: & postremo cum optimè purum vlcus existeret, & gangræna tota ablata esset præter spem, cum timor esset quod ferra auferri deberet, pes curatus est: ita tamen

ut postea in fene vlcus annuū maneret, nec consoli-
dari poruerit, licet nūc optimè adhuc viuat & degat:
quamquā circa talū vlcus exiguū madens ad mediā
staueri nummi magnitudinem maneat: sed præstat
eiusmodi vlcera annua in senibus permanere aperta,
quā ut in totum consolidentur, totius corporis
effluuie tanquam saburra eò consueta fluere.

S C H O L I A.

Gangræna
quid.

GANGRÆNA (teste Gal.) est corporis mutatio à natu-
rali cuiusque habitu in alienum, atque extinctio cum vlce-
ratione, vel sine: aut, gangræna sunt ea quæ ex magnitudine
inflammationis sunt mortificationes, quæ nondum tamen inte-
grè factæ sunt & iam confirmatæ. Eius mali tanta vis est ac
tyrannis, ut nisi celerrimè succurras, facilè affecta pars mortis
habitu repræsentet, hoc est, promptissimè, vita, sensus & mo-
tus extinctionem contrahat. Vbi verò membrum sic visiatum
& languens, in totum sensu fuerit destitutum, ac omnino emor-
tuum, ita ut percussum, vel scissum vel admissum non sentias ea
quæ patiuntur, affectum hunc non iam amplius gangrænam, sed
sphacelon Græci nominant, Latini verò siderationem, recentio-
res Græci esthiomenon appellant: quod nomen etiam ad gan-
grænam extendunt. Auicenna autem esthiomenon vocauit,
quando ad partes continuas transit corruptio, quo nomine in re
alia utuntur Græci. Quidam affectum hunc modò herpetæ esthi-
omenon, modò cancerum ulceratum, improprie tamen, nominant.

Sphacelus,
sideratio,
esthiomenos.

Ignis Sancti
Antonij.
Aschachilos.

Alij, ut diximus, ignem Sancti Antonij vocant. Idem autem
hoc quod sphacelus est, alijs sideratio, ab Auicenna Aschachilos
vocatur. Vnlgu Galicum appellat, teste Tagautio, ignem San-
cti Antonij, alijs Sancti Marcialis. Accidit autem sideratio etiam
ossibus (ut admonuimus Obser. precedente) cum caro ipsis cir-
cumdata ac circumfusa tetros gignens ichoras, id est, deprauatam
saniem (ut sæpe in nosocomijs conspeximus Bononiæ) generas, hoc
tetra viru ea imbueris, ac foetidissima putrilagine consumperis,
ut iam bis quoque conspeximus in duobus mortuis ex abscessu ie-
coris, quæ tanta virulentia ossa costarum infecerant, ut combusti
viderentur, & vix diu attacta frangerentur. Cum itaq; membrū

Ossum sde-
ratio.

isa

ita ex toto, vita, sensu, motuq; priuatim apparuerit, confessum ad
vinum usque, quam proximè sana parti, erit ressecandum. Itaq;
differt sphacelum à gangrana, quòd ille osibus etiam (ut dictum) in-
nascatur, nedum carni & vasis; hæc verò osibus non adueniat:
una tamen species sphaceli est, sed proprium nomen & singulare
præter cōmune sortita. Causa efficiens huiusmodi esse solet, vel
corruptio ipsius temperaturæ in parte affecta, vel ablatio ipsorum Causæ effi-
cientes.
spirituum. Multis modis temperatura corrumpi potest: nempe per
contusionem, nam partes contuse tumorem contrahunt, inde se-
quitur corruptio: vel propter ambiens valde frigidum, in quo qui
versantur, plerunq; ita afficiuntur frigidi-
tate, ut extrema eorū partes insensata reddantur, & vitali spiritui destituta corrum-
pantur; ut accidit istis diebus in asperissima hieme, maniaci quidā
rustici in pago Rieswylk, cui præ frigore digiti pedum corrupti
gangranā & sphacelo affecti deciderunt. Medici quoq; in experti
talem affectum causare possunt, applicantes medicamento nimis
frigida & opiala; quæ quandoq; ita stupefaciunt ipsa membra, ut
sensu etiam priuentur; idem fit per medicamenta calida caustica
& erodentia. Similiter & pustula à materia venenosa, ictus
animalis venenosi, nimia siccitas, ut in marasmode, corrumpunt
partium temperaturam. Deniq; temperatura corrumpitur per in-
flammationem & nimiam caliditatem, cum videlicet ora vasa-
rum & foramina omnia cunctis naturali perspiratione, ob maxi-
mas inflammationes, priuantur: nam quæ sic laborant corpora,
facile mortificantur. Secunda causa est ablatio ipsorum spirituum:
quandoque enim aduenit, ut vitales spiritus intercipientur vel
laqueis vel aliqua obstruptione: hinc paulatim pars à spiritibus
destituta corrumpitur: & sic fit Gangrana, ut vidimus in illo ma-
niaco Delphis, qui sibi membrum virile laqueo constrinxerat, ut
mortificationem incurreret, cum maxima nigredine, ita ut vix
chirurgus eum tandem sanare potuerit. Tertia causa est quando
destillat à capite aliqua materia, & in membro obstruitur meatus,
à qua quidem obstruptione ipsi spiritus suffocantur, unde sequi-
tur ipsius partis mortificatio, ita propter hanc quam propter aliam
quamvis obstruptionem in membro factam. Unde & Fernelius
ita scribit: Oritur autem quum pars affecta vitali calore ac spi-
ritu destituatur: aut quia à corde per arterias insinere prohibetur,
arctio-

arctiore vinculo, contusione, vel obstructione: aut quia infusus partu calor praefocatur & extinguitur, idq; vel humorum copia, ut in magnis inflammationibus; vel ingenti obstructione quae perspirationem prohibet, vel penetrabili frigore, vel venenata atque maligna qualitate. Hinc rectè & Tagantius dicebat: Accidit autem trifariam eiusmodi membrorum mortificatio, seu vita in membris extinctio ac destructio. Vno modo, quando membrum non amplius potest recipere vitam, sibi à corde per arterias transmissam; propter dissolutionem mixtionis atque harmoniae ipsius laborantis membri. Dissolvitur autem ac deperit mixtio atque harmonia partis, vel ob nimiam frigiditatem, ut aliquando contingit per hyemem validam atq; asperam: vel ab immoderata vel inconsultè ac temerè molita inflammationum refrigeratione: aut ab excedenti ac supra modum vehemens caliditate, & venenositate inflammationum, ac malignarum (ut vocant) pustularum. Altero modo gangranam & sphacelum fieri contingit, quando vita in membro recepta praefocatur atque extinguitur, ut nonnumquam evenit in magnis inflammationibus, quae ita interdum venas, arterias & poros cuius obstruant, coarctantque, ut spiritus ibidem, prohibita in totum effusio vaporosi transpiratione, & aëris externi attractione, stranguletur suffoceturq;. Tercio modo, haec mortificationes & vitae extinctiones fiunt in membris, quando prohibetur transitus atque influxus vitalis spiritus à corde ad membrum aliquod, idque vel propter vehementem ligaturam, vel contusionem aliquam in vasis ac meatibus ipsis, per quos deferitur spiritus, factam. In summa, gangrana & syderatio, quam Graeci necrosim & sphacelum vocant, nostris corporibus accidunt, vel denegata parti vitali facultate, vel nativo corporis calore ac temperie pereunte. Primum itaque coloris flos perit & extinguitur: quumq; iam sphacelus est, pars linet aut nigrescit, tumida, mollis, ac prorsus cadaverosa. nec arteriarum pulsus est, sed nec sensus ullus, ut etiam sine sensu doloris altè scalpellum adigi possit. At haec signa apud Leonum & antea apud Tagantium, & Galenum prius, in opusculo de tumoribus praeter naturam, haec sunt. Primum quidem illud coloris stridum, quod phlegmonis, id est, inflammationibus adsuerat, in ipsis extinguitur. Deinde dolor & pulsus seu pulsatio,

Mortificationis causas.

I.

Quae membrum mixtionem dissolvunt.

2.

3.

Signa gangraenae & sphaceli.

1.

pulsatio, hoc est, arteriarum motus ipsi agro sensibilis recedunt, non finita adhuc dispositione, verum sensu iam exorino. & ita secundum signum sumitur rationis defectus ipsorum symptomatum: cum adhuc adsit tumor, & non dolor nec sensus. Vnde membrum mox nigrum conspiciunt, molle quoque & putridum, foetoremque expirans cadaverosum efficitur. Tertium signum ex factore itaque est, & nigrore partis: quo fit ut cum premittur digitis, facile cedat in profundum, nec postea reuertatur aut resiliat: imò apparet cutis à carne seimcta. idè dicebat Leonus: Quartum signum erit, si apposis digitis comprimendo remaneat fovea, neque recurvat cutis, ut in œdemate. Quintum signum habebis, si cutim scarificando nullum in principio scarificationis dolor percipiatur, nisi deinde altius penetraveris: quòd si scarificando peruenies vsque ad periostion, & ad ossa ipsa sine infirmi sensu, tunc procul dubio sphacelum erit. Vltimum signum fit, quòd pellicula decidit, & efflorescit, non secus ac si ex aqua feruenti extraheretur, dummodò abscessus non adsit. Hæc autem partis affecta mortificatio, quam Græci Gangrenam appellant, tanta est (inquit Paulus) ferocitatis, ut nisi quis rupta omni mora presentissimas tulerit suppetias, laborans particula facile emoriatur, & vicinas sedes innadat, ac hominem ipsum ingulet. At si (ut refert Celsus) nondum planè tenet, sed adhuc incipit, eam curare non difficillimum est, utique in corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli integri sunt; si nervi vel lassi non sunt, vel leuiter affecti sunt. Vbi verò penitus insedit hoc malum, & iam in sphacelum abiit, insanabile est, plurimique sub frigido sudore moriuntur. Prognostica itaque bona esse non possunt, quando periculum imminet ne pars post partem corrumpatur, & sequatur mors. In sphacelo semper amissio membri pronuncianda. Si gangrena in ætate iuuenili, in parte carnosâ contingat, & medici sint diligentes & prudentes, sanitas promitti potest. Si oriatur in intestinis, mors aderit: his quoque vidi in hepate esse, & dissectis corporibus mortem fuisse sequutam; & semel ex vulnere in femore intempestinè occluso, & demum gangrenam, sphacelum subsequutum, & postea mortem. Si in utero sit, prædicemus magnam fore periculum, non tamen semper mortem, quoniam multis mulieres sana reddita sunt. At in capite pueri seu cerebro

Prognostica
seu iudicia.
Lib. 4.

Lib. 5.

cum

cum sphacelum oboriretur, ut in Obs. 11. lib. 10. Cnr. medic. recensuimus, post incisionem moris occasionem inuenimus, quam antea prædixeramus. Sed nunc loquimur de iis quæ exterius appareant.

Curatio.

Quod ad curationem attinet, his viñum humectantem & refrigerantem conuenire volunt, ac rationem cordis habendam esse: & ideo quæ putredini resistunt assumenda: & præterea potius refrigerantia & exiccantia quasi conuenirent, & potissimum ea quæ putredini resistunt, ut sunt omnia acetosa & condita cum succo citri, limonum, aranciorum. De somno, volunt quoque ut ipse infirmus patum dormiat: nam si hic morbus in vigilantibus per unum crescit digitum, in dormientibus per quatuor augeatur digitos: & hoc, quoniam calor naturalis retrahit se ad interna, destituens partes externas, in quibus ipse morbus habet postea liberam debacchandi facultatem. Insuper in somno vapor putridus ad cerebrum ascendit, causatq; furorem: à quo nulla speratur

Corrupti
sanguinis va-
cuatio.

salus. Cum sanguinis copia gangrenam generet, eius curandi ratio statim aspicienda est à copiosa corrupti sanguinis, qui in membro laborante compingitur, vacuatione. Sed interim negligi non debent, quæ ad dieteticam, pharmaceuticam, vena sectionem (si necessaria fuerit) & cordis tutelam pertinere videbuntur, pro quibus consulendus erit chirurgus peritus aliquis medicus, qui omnia probe, & ut res exigit, norit insitueret. At nostri tonsores nimium temerarij talia contemnunt: & sic agros suos

Vena sectio.

facilius in perniciem precipitant. Curam itaque aggrediemur à sectione vena, & præcipue si talis affectus fuerit ratione materia sanguinea, obseruatis, obseruandis, videlicet quòd vires, ætas & cætera conueniant. Sed insurgit dubium, an hoc fieri debeat, cum neque Gal. neque Paulus de sanguinis missione in tali affectu mentionem fecerint. Dicimus Galenum præcipere curam in gangrena, ut in carbunculo: sed in carbunculo admonet sectionem vena: ergo & in gangrena. Si autem hic morbus à frigidityte habuerit originem, vel propter ambiens nimis frigidum, vel propter medicamenta stupefacientia, tunc vena non est secanda: neque etiam si fuerit à siccitate. Eadem ratio diuersitatis obseruanda in exhibendo purgante: nam si fiat à materia calida erysipelatoza, huiusmodi pharmaca conuenire poterunt, ut diacatholicon: confectio quoque hamech, si sit

Purgatio.

crassus

crassus melancholicus: vel electuarium de psyllio: quibus senam & epithymum admiscere possumus. In loco affecto si putredo fiat ratione ingentis frigoris, tunc non statim (ut quidam faciunt) ad medicamenta caustica, neque ad membri amputationem devenies: sed prius applicabimus aliquod caloricum medicamentum, quale est quod recipit rad. rapi domestici, rad. raphani domestici ana q. s. pul. sem. sinapis 3 j. pul. garyophyl. 3 ij. olei sem. lini, olei veteris inglandis ana q. s. misce. quod maximo imponitur successu. Si autem gangraena ista, qua partem aliquam corporis nostri incipit obsidere, fuerit ratione obstructionis, deuenire debemus ad ea qua aperiuunt. Si fuerit ob vasa magna incisa, vel propter siccitatem, tunc nulla salus speranda. Si fuerit ab ictu venenoso, recurre ad ea qua venenis aduersantur. At quoniam ut plurimum gangraena fit ob magnas inflammationes, vel erysipelas, oportuna erit enacuatio sanguinis, qui in membro patiente compactus sit. Sic etiam dicit Tagautius cap. proprio: Fit autem larga illa sanguinis ita impacti (cuius occasione fiunt mortificationes) ex parte affecta emissio, vel vena incisa, si qua amplior ac turgens circa eandem partem conspicitur, vel cute vniuersa partis affecta, una cum subiecta substantia, excisa, vel pluribus & altis scarificationibus diuisa: nam illis scarificationibus profundius sanguinem recte manare permittunt, quod satis sit. Alij ad eundem finem sanguisugae admovent, & venas minores proximas aperiunt. Verum profunde illa ac frequentes sectiones aut scarificationes, multo sunt ad eius mali curationem efficaciores. Caterum pro affectus magnitudine, vel maxima sectiones fiunt, aut scarificationes, vel incisurae (quas scarificationes appellamus) utraque frequentes: illa, ubi putredini vicinius malum est; haec, ubi tantum putrescere incipit. Quo enim vitium maius est, eo maiore remedio (ut cuique constat) indiget. Vbi autem abunde sanguinem ex aliis illis plagis emanare permiseris, locus aqua salsa abluendus erit, ut sanguis crassior, & qui aliquando ibidem coualesceret, foras egrediatur. Deinde medicamentum aliquod putridis consecratum, id est, quod putrefactionem prohibeat ac resoluat, induci parti debet, quale est

Gangraena
ex frigore.

Si ex obstructione.

Si ob vasa
magna incisa,
vel siccitate.

Si ab ictu venenoso.

Si gangraena
ob magnas
inflammationes fiat.

Gal. 1. ad
Glauc. cap. 9.

Post scarificationem
locus aqua salsa
abluendus.

Medicamenta
putridis con-
secrata.

est farina orobi aut lolij, (quod Franci Iovaiam, quod vini me-
do remanentiam concitet, appellant) aut si harum facultas non
sit, fabacea farina, ex oxymelite vel syrupo aceroso. Alij ex
farina orobi, lolij, fabarum, lupinorum ex aceto vel oxymelite
vel lixinio conficiunt, & imponunt. Vitale etiam fuerit, locum
scarificatum bis in die aceto calente, sed mulso praesertim, lana-
re. Hac enim sua siccitate saniem & putrilaginem absumunt,
eamq; detergunt: frigiditate vero, quod nondum vitiatum ac
corruptum est, à putredine vindicant. Vbi autem iam ipso ve-
luti fervor subsederit, ac mali furia sese remiserit, unguentum id
quod vulgo Aegyptiacum appellatur, ex flore aris, alumine,
melle, aceto ad aequas portiones mixtis & coctis compositum, su-
perimponendum erit. Hoc enim putrefactionem prohibet, ac re-
soluit: putrefactum quoque ac corruptum ab integro & sano
adhuc dirimit & decidere cogit: denique crustam inducendo,
quod sanum est conservat, ac tuetur. Quod si valentius at-
que efficacius medicamen velis apponere, salem praedictis adice:
aut si malum magis adhuc increverit, aliquem ex trochiscis
paulo antè memoratis, exquisitissime tritum aceto & vino dilu-
tum, ut Andronis vel Polyida, vel Musa, vel Pafonis, vel
unum ex his qui recentioribus dicuntur calidiores, aldayon, &
ex asphodelo, qui ob suam vim causticam corruptum à sano di-
rimunt. Probatum in ea re ante omnia arsenicon quod vocant
sublimatum, purum aut correctum, idq; vel in pulvere, vel ex
vino dissolutum, & linamento, aut xylo, quod Galli coronem ap-
pellant, exceptum, inter sanum & corruptum applicatum: hoc
enim confestim malum siliit, & id quidem sine dolore. Quod
si necessitas exigat, spatula vel specillo separandum est sanum à
corrupto. In eiusmodi autem medicamentis adhibendis, ut res
securius tractetur attentos sedulo nos esse oportet circa naturam
corporis aegroti, sicuti rectè nos Gal. admonnit, inquit: Si cor-
pus rusticum fuerit; & durum naturâ, vehementiora desideras
medicamenta; feminem vero, & mollem carnem habens, im-
becilliora. Infantes quoque vel pueri & quicumque inter viros
& balnea amant & in ocio degunt, mollia exigunt medicami-
na. Consideranda insuper est parvitas, qua male affecta sunt,
non solum corporis totius natura, quando abscondis, aut circumci-
dis

Vnguentum
Aegyptia-
cum.

Trochisci
caustici.

Arsenicum
sublimatum.

Lib. 2.
ad Glauco.

dū quod iam computruit. Quadam enim sunt, quæ citissime ad putredinem veniunt, si negligenter curentur; aliæ vero tardiusculæ: quædam item medicaminum vires ac beneficia tardius sentiunt, aliæ citius. Vbi igitur necessitas exigat, candenti ferro incidente sanum ab agro separandum: si prima vtilio non proficit, vires secunda: quæ si fuerit inanis, tunc certus erit sphacelus; & idcō membrum totum recidendum, ne pars sincera trahatur. Sed ante quam ad huiusmodi sectionem deveniatur, non erit inconveniens proponere (ut etiam annotavit Leonus cap. proprio) quo pacto effici possit, ut membrum mortuum per se decadat. Dico igitur quod quando sphacelus est in membro, quod finitur articulis vel internodiis, & corruptio pervenit usque ad illud confinium; tunc super partem sanam imponere debemus aliquod medicamentum habens vim repellendi & resistendi. ut R. olei omphacini, ros., myrtini, viol., succi solatri, succi scabiosa ana ℥ ij. succi consolidæ minoris, aceti ana ℥ β. bulliant; & post instam bullitionem adde bol. arm., sang. drac. in lachryma, santal. omnium pulv., maceris, squinanti, cypero ana ℥ j. addatur parum cera, & illinatur linteam, imponaturq; super partem sanam. Hinc convertimus nos ad operandum ut pars affecta per se decadat: quam incidimus pluribus incisuris, & explemus illas rimulas arsenico sublimato & lithargyrio sublimato: hæc enim arescunt, comburunt & exiccant: itaque in processu membrum arescens per se decedit: sed interea ne tetrum excitet odorem, solemus illud obvolvare linteolo infecto hoc medicamine, quod sparadrappum dicunt, confectum ex simplicibus vi conservandi præditis: R. myrrha, aloës in pulvere, acaciæ, corticum mali punici, pulv. nucis muscata, santal. omnium, ligni aloës, pulv. cumini, alum. rocha combusti ana q. s. Horum omnium pulv. accipe ℥ j. β., postea addatur picis nigre, resine colophonie ana ℥ ij. thuris, mastice, storacis liquida, seni hircini ana ℥ j. misceantur, & liquentur ad ignem, quo medicamine (ut dictum est) involve partem affectam. in confinio autem partis sanæ & corruptæ imponimus quæ ad separationem faciunt. Cum autem arx ceciderit, vitunt cicatricem inducentibus. Vbi tamen proserpit, & nulla spes salutis apparet, ut Obser. sequenti docebimus, & ostendemus, præstat

Quando sectio adhibenda.

Quæ consideranda ante totius membri abscissionem.

G

abscindere.

abscindere. At si membrum affectum tale esset, ut plurimum temporis opus exigeret ad eius consumptionem & decidentiam, ita ut ager ad illum scortorem perferendum nequaquam perdurare posset, varièq; affligeretur, ad separationem cum ferro deveniendum. Hinc rectè dicebat Tagantius, & ante eum Euchsus loco proprio: Porro si nibilo magis malum his causticis medicamentis consisterit, uti id quod est inter integrum ac viciatum locum, debet. Solent vero hæc auxilia omnia, nihil interdum proficere: atq; tunc vicum, tamen si (ut Celsus ait) miserum, auxilium est, membrum quod paulatim emoriunt, abscindere: ut cætera pars corporis tuta sit. Nam quod computruit, veneni in modum sine contactu, quod adhuc sanum & integrum est, inficit & corrumpit. Si quando autem putrefactam huiusmodi atq; emortuam partem abscideris, vel quod in membro quopiam computruit usque ad sanum corpus concideris, eam quæ veluti quadam radix est, sana atque integra parti adiunctam, ob maiorem securitatem, ex Galeni consilio candenti ferro adurere convenit. ita enim celeriter sanguinis profusum compesces, & putredinem arcebis. Hic tamen aliqui contendunt, quod non debeat fieri abscisio in parte sana, sed in parte corrupta, vicina tamen dimidium digiti parti sana. cuius opinionis videtur fuisse Dominicus Leonus in Methodo sua, de curandis tumoribus cap. 11. de gangraena & sphacelo sic scribens: Si ob scortorem non possit perdurare ager, ad separationem cum ferro deveniendum est, non quidem eo modo quo docet Celsus, nam ager nimis torqueretur, & negotium non ita bene succederet. Secabimus igitur ex Galeni sententia in parte corrupta, vicina tamen dimidium digiti parti sana; hinc tamen atque hinc adhibitis convenientibus ligaturis, ne nimium sanguinis effluat. Peritus itaque chirurgus habeat nonaculam igneam, qua circumcidat membrum affectum usque ad os: postea quam citissime fieri potest, ferra probe dentata ferret os ipsum. Diximus nonaculam igneam, ad hoc ut ora vasorum exurantur & à fluxu sanguinis prohibeantur: diximus in parte affecta secandum, ut ager minus cruciaretur: diximus sectionem faciendam prope partem sanam, per spatium dimidij digiti; hæc de causa, ut pars corrupta, quæ relicta erat, facilius per ferrum candens ad huiusmodi usum paratum, exuratur si-

mus

Vñlo quando
adhibenda.

Sigangrana
in sphacelum
abierit.

Lib. 2. ad
Glauc.

mini cum ipso osse, quamuis os vehementiorem adustionem requirat. Hac Leonus. Alij tamen in parte sana id faciunt, ut etiam postea, cum capita curationis gangrena & sphaceli ex Tagantio adferemus, rectè intelligi poterit. Sic ego vidi in muliere illa Delphensi fieri, factus duatus ligationibus fortibus in medio in loco sano, deinde circumcidendo unica vice nouacula carnem ad os usque: mox citissimè ferra dentata & acutissima os ipsum simul cum pede auferbat chirurgus; mox adhibitis restrictis foribus, ex croco Martis, & aliis, sine adustione. At alij, ut diximus, adustionem adhibent candenti ferro, & sic sanguinis profluvium compescunt. Facta verò adustione, porri succo, vel (ut Paulus ait) sale cum porro utendum est, vel aliquo ex iis quæ paulo antè diximus. Hæc enim siccant & stringunt putredinem, atque humorum affluxum prohibent. Alij facta adustione non solum ad crustæ conseruationem porri succum ex spongia conferre volunt, sed chalcanthum vstum, hoc modo: Accipe stuppam albumine oui madefactam, desuper chalcantio inspersam, & impone. Nostri chirurgi nunc videntur croco Martis, Conserunt & pastilli prædicti, scilicet Andronis & Polyida & Passionis. Ad inflammationem prohibendam: R. aquam rosatam, oleum ros., acinum rosatum, musca: & impone super partem sanam: & etiam super partem ubi fuerit chalcanthum. Tandem cum tibi videbitur his remediis adhibitis cessare putredo, ut crusta medicamenti aduentibus, vel ignito ferro inducta citius decidant, cataplasmate utendum est ex pane, vel hordeacea farina, vel triticea, hydrelæ incocta: item medicamento, quod cephalicum vocant, ex melle illito. Hac enim detergendo, crustam à subiecta carne resoluunt. Sed quoniam multa sunt genera cephalicorum medicamentorum, proponam unum ipsius Gal. 3. Meth. cap. 2. quod constat ex iride, aristolochia, eruo, thure & manna thuris: nonnulli addunt corticem panacis, vel cadmiam elotam. Eundem usum præstabit medicamentum Machæionis, quod sic conficitur: R. opopanax. galbani, arug. myrrha, iridis, guttæ ammoniaci, aristoloch. ana ℥ j. resina terebinth. cera, olei omphacini ana ℥ v. I. dimidium olei cum argine ad lenorem conteritur; reliquum verò cum cera & terebinthina coqui.

Lib. 4.

Crustas à
partibus
exutis sol-
uentia.

Paul. ex Gal.
3. de compos.
medic. per
genera cap. 3.

tur. Confert etiam medicamentum quod tetrapharmacum dicitur, præterea & Macedonicum, quæ prius monendo, ac emolliendo, crustas à subiectis corporibus diducunt: quemadmodum & reliqua omnia, quæ ad suppurationem perducunt. Hæc enim præterquam quòd emolliunt, prius sub crusta conficiunt, quod eam resoluit, scilicet inter carnem subiectam & crustam ipsam interiacens. Panis quoque cum apio aut ocymo intritus, crustam à sanis partibus circa erosionem detergendo rumpit ac separat: Sic & iris ex simplicibus, vel radix panacis aut aristolochiæ, aut acori cum melle. In mollibus verò corporibus abunde facit crui farina cum melle aut thure. Solet autem vulgus ad crustas resolvendas uti butyro aut alio quovis unctioso. Vbi crusta deciderit, locum aceto ablunt: postea sequens emplastrum admovent, quod ad Guilhelmum à Saliceto reseruat. Recipit autem mellis selibram, vitellos ovorum crudos tres, aut quatuor numero, farina hordei selibram: hæc miscentur in formam emplastri. Post biduum verò vel triduum, ut melior fiat mundificatio, huic emplastro addi possunt ꝑ x. myrrhæ electæ. In teneris autem corporibus, ad crustæ separationem & sordium detersionem abunde sufficit Gale-
no (ut antea quoque diximus) orobi farina cum melle vel thure. His vitæ peractis huiusmodi ulcera ad sanitatem perducenda sunt medicamentis, quæ carnem producant, & cicatricem inducant: synulotica & epulotica Græci vocant. Sed quoniam evenire potest, ut in secto membro os emineat, opera precium fuerit illud exiccare, ut per se cadens partem conterrinam adæquare possit. Pro exiccatione hoc erit medicamentum: R. picis colophonis, terebinthinæ anā ꝑ ss. olei massichini ꝑ j. pencedani, orobi, opopanacis, enphorbij, pul. ieros & distamni albi ana ꝑ ss. cera q. s. misce. Hoc unguento os obtectum exiccabitur; & citius cadet. Denique quoniam in his, quibus membra amputata, multa repletiones supervenire solent, & hinc postea dysenteria, sanguinis vomitus, phthisis, & multa alia incommoda, ut testatur Gal. lib. ultimo De articulis: Ideo in consensio veris, vel autumnii quotannis vena secanda: vel vitæ attenuandus. Sed hæc omnia iam dicta, in capita quedam curationis gangrenæ & sphaceli cum Tagantio reducimus. Vitium sanguinem in affecta parte impactum assatini vacuato.

Post

Gal. 2. ad
Glauc. cap. 9.

Butyrum.

Emplastrum
Guilhelmi à
Saliceto.Capita cura-
tionis gan-
grenæ &
sphaceli.

I.

Post scarificatus aut sectiones, locum affectum aqua salsa abluito.
 Deinde medicamentum putridis consecratum inducito. Vbi malū
 furia se remiserit, vnguentum Ægyptiacum superimponito. Si
 malum iis remediis non cesserit, id quod inter vitiatum & inte-
 grym est, ferro candente adurito. Quod si hæc omnia nihil pro-
 fecerint, & iam gangrena in sphacelum degenerauerit, mem-
 brum quod sic planè emortuum fuerit, usque ad partem sanam,
 ita vt nihil prorsus putridi relinquatur, ocysimè abscindito. Vbi
 quod computruit rescueris, quo securius malū radicem euellas,
 ferramenta igne flagrantia adigito. Post exulsionem porri suc-
 cum, atque alia id genus qua siccant, stringunt & fluxionem
 arcent, admoneto. Crustam vel medicamentis adurentibus, vel
 ignito ferro inductam à subiectis corporibus resolnere (solet enim
 inde sanguinis profluvium sequi) ne properato. Cum putredo ces-
 sauerit, nec ampliùs sanguinis profluvium reformidaueris, ea
 qua crustam detrahunt applicato. Vbi crusta exciderint, cura-
 tionem reliquis ulceribus communem adhibeto. Qui sequun-
 tur Aphorismi, ad medicum pertinent. Victum tennem & re-
 frigerantem gangrena & sphacelo laborantibus instituito, &
 repletionem caneto. Fluxionem, sanguinis missione, si nihil ob-
 stiterit, auertito; atque eadem plenitudinem (si adfuerit) va-
 cuato. Medicamento quod catholicon appellatur, vel nigra cas-
 sie fistularis medulla, ad hac thamarindorum, lupuli ac sum-
 maria decocto, sanguinem depurato. Theriacam atque id genus
 alia, qua cor vitæ fontem ac principium à putridis & graneo-
 lentibus illis, à parte vitata sublati effluuiis, tuentur, laboran-
 ti sumenda exhibito.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aphorismi ad
medicum per-
tinentes.

1.

2.

3.

4.

OBSERVATIO XIV.

De esthiomeno Auicenna, seu sphacelo Græcorum,
 vel fideratione.

ZYTHEPSA, qui Delfis in insigni Lilii habita-
 bat, cum clauum in digito pedis haberet, vulgo
 dictū een lyckdoorn vel exterooge: & cum pedes lauasset,
 & clauum aliquo modo cum cultello excidisset,
 vxor ex lecto cum descenderet, pedem ex improui-

so calcavit, & clavum ita læsit, ut oborto insigni dolore, acciuerint tonsorem, ad illum sedandum; nam ibidem inflammatio successerat satis magna: quare chirurgus ille oleum calidum nescio quod supra digitum pedis in quo erat clavus illiniuit: sed nihilominus ex illo dolore & vehementi inflammatione digitus pedis ad ulcerationem devenit, & tandem totum pedem gangræna occupavit, subsequente esthiomeno, à Barbaris ita dicto (de quo in Scholio latius) adeo vehementi ut paulatim pes integer syderatione affectus fuerit: ita ut postremò ego vnà cum Ericio collega meo, & Guilhelmo de Dalen chirurgo, tum alio, accitus, malum eò devenisse deprehenderim ut vnanimi consensu facta consultatione serra pedem corruptum & syderatum auferri debere pronunciaremus. Interea alij duo chirurgi acciti saniratem huic pollicebantur, ei affirmantes se eum planè curaturos sine ablatione seu incisione ullius membri. Miser itaque æger, illis fidens, aliquot menses continuos ab illis chirurgis ita malè habitus fuit, ut mirum fuerit, quòd putrefactione in pede ac toto crure pessimè olente nò fuerit mortuus. Tandem paulatim pes ille totus vsque ad calcaneum mortificatus & corruptus, excidit circa iuncturam pedis, non ampliùs procedente syderatione. Atque ita ad vltimum curatus fuit, sed cum tam atroci dolore & tam longo tempore perdurante, ut ipse sæpiùs optauerit vnico momento serra vel alio ferro pedem sibi ablatum fuisse. At Iohannes de Roen, in ponte Cespitario, in insigni Solis habitans, cum leuiter crus offendisset, cute derasa, cum ipse nescio quæ vulgaria remedia apposuisset, illis tamen nihil proficientibus, tandem totum crus ac femur gangræna, deinde & syderatione infectum fuit: adeo ut quamuis me ac Heydium collegam & Hugonem medicum Haghanum, tum omnes chirurgos totius vrbs Delfensis cõuocasset, tamen

tamen

id est nescio

tamen nullis inuantibus remediis breui vitam obierit. Brasserus autem, vir consularis, annos 87 natus, totum crus tumidum habens longo tempore, ac femur ipsum, ex scurbutto malo tandem in totius cruris & femoris esthiomenon incidit, adde vt totum femur ac crus ipsum syderatione affectum planè cadauerosum per partes excinderetur sine sensu, cum in senectutem non esset femur ipsum ferra vel ferro auferre: ita vt tandem hic moruus fuerit. Sed cum mortuus esset ob putrefactionem & cruscadauerosum pessimè olens, hoc sparadrapo antequam sepeliretur, per chirurgos, ob foetorem intolerandum, cum nemo apud cadauer versari posset, totum femur ac crus obuoluimus: R. myrrhæ optimæ, aloës ana ℥ss. Syracis liquidæ ℥j. sanctali rub. ℥ij. colophonæ ℥iij. terebinthinæ ℥ij. ceræ lib. ss. olol spicæ parum. fiat sparadrapum, vt artis est.

SCHOLIA.

AVICENNA, vt etiam Scholiò precedente admonimus, esthiomenon vocauit, quando ad partes continuas transit corruptio; quo nomine in re alia videntur Græci, cum herpetæ esthiomenon vocant, de quo malo suo loco dicturi sumus. Sed recentiores esthiomenon aliquando ad gangrenam extendunt: præcipuè autem ad hunc affectum, vt etiam antea diximus. Vbi verò membrum sic vitiatum & languens, in totum sensu fuerit destitutum, ac omnino emortuum (vt hic erat) ita vt percussum vel sectum vel adustum non sentiat quæ patitur, affectum hunc non iam amplius gangrenam, sed sphacelôn Græci nominant, Latini verò syderationem, vt diximus. Et ita propriè dicimus membrum syderatum, quum omnino emortuum, priuatione vob sensu & motu est. quumvis etiam aliquando syderationem etiam sphacelismum in cerebro appellamus, qui morbus (vt aliàs diximus de cerebri sphacelismo) senisimus est. vixit vltimus cerebrum, membrum principalissimum, depascens, quod semper letale est. Aliquando & syderatio apoplexiam significat: sic Cor-

narius apoplexiam vertit: quamvis melius fuisset (etiam Amato teste Cent. 1. Curat. 9. de sphacelismo, id est, ulcere cerebri depascente) si in sua versione mortuorum & agriudinum nominibus usus fuisset Græcis, quum notiora medicis, quàm Latina ipsa sint. In muliere quæ in calcaneo patiebatur esthiomion in iuxta Arabes, ita ut insensibilitas in carne appareret, imprimis facta sunt scarificationes cum rasorio secundum diversas diametros profundas usque ad carnem vivam. facta scarificatione tali lavabatur cum aceto vini & sale simul calefactis. Postea in loco ponebatur unguentum Aegyptiacum, & ad labia. Postea superponebatur cataplasma cooperiens locum & partes vicinas, ex farina fabarum, melle, aceto: & in tibia ponebatur desensum ex bolo arm. & albumine oui & aceto, & fiebant visitationes ter in die; manè hora media sexta, hora prima post prandium, & vespere hora nona: & semper factus fuit magnus processus mortificationis, qualibet visitatione. Quare semper fiebat scarificatio, ut supra, usque ad carnem sanam, & postea lotio cum aceto & sale calefactis: & in omni cavernositate ponebatur vitriolum Romanum vstum. Tangendo prius post lotionem omnia loca incisa & putrefacta cum tenta innoluta cum bombace in aqua fortis. postea imponebatur vitriolum, & deinde postea superponebatur Aegyptiacum, dein cataplasma ex farina: & sic fuit ad tres dies. Et processit putrefactio ad cavillam sylvestrem, id est, malleolum pedis exteriorem, minus uno digito, & in parte domestica fuit processus parvus: tertio autem die cepit consilire, & non amplius procedebat. Quarto die nulla amplius fiebat scarificatio: sed manè lavabatur aceto, & imponebatur Aegyptiacum & cataplasma, ut supra. Post prandium incepit apparere aliqua separatio escharæ à carne viva. Et lavabatur tunc cum vino decoctionis acori: & procedebatur tunc cum digestivis ad remouendam escharam: ponendo loco Aegyptiaci ung. populn. ʒ j. cum terebinthinae lora ʒ ss & cum vitellis ovorum simul mixtis. Et loco cataplasmatibus ex farina sumebantur radices acori decoctæ in vino, & contundebantur, & cum oleo communi decoquebantur ad modum cataplasmatibus, & fuit sic applicatum. Quinto die, pro sedatione doloris, & maiori putrefactione sine remotione escharæ, fiebat loci fomentatio: Re-

foliorum

foliorum caulium, mercurialis, malua, viol. rad. althaa ana m. j. coquantur in aqua; & aqua expressa locus fovebatur, & ex fecibus cum axungia porci fiebat cataplasma loco rad. acori. Et quia fuit inflammatio & dolor in canilla seu malleolo sinestri aut externo, septimo die deponebatur defensusum, & inungebatur oleo chamomill. & ros. Nono die eschara fuit quasi in totum ablata: & tunc pro digestino ulceris, loco ung. popul. posuitur fuit mel rosatum; & super hoc emplastrum citrinum, ex cera, resina, butyro non salito. Et dimissum fuit cataplasma, loco cuius madefiebat peplum quadruplicatum sequenti decocto, & superligabatur: R. absinth. ros., salvia, flor. chamomill. ana m. j. fiat decoct. in vino Pitaniensi. Postea unguento addebatur myrrha & mastix. item prescribebantur pulveres incarnativi: R. myrrha, iheris, ireos, mastich., sang. draconis, aristoloch. rotunda, centaurij min. ana ʒ ij. pulveriscentur: &c. Si isto modo non cretetur, & magis fiat corruptio cadaverosa, membrum serrâ, ut diximus, auferendum. Sed illud hic admonuisse utile censeo, quod longa experientia observatum est à Theodoro chirurgo Nosocomij Delfensis, amico nostro familiari, idq; in quatuor vel quinque quibus crura vel pedes serra auferebantur in Nosocomio ob esthiomenon, quod si prima deligatione post constrictionem sanguinis caro ossi iam serra ablato esset coequalis, tales optimè enasisse; alios vero quibus caro sursum attracta osse deundato, statim vel post paucos dies extinctos fuisse.

OBSERVATIO XV.

De Aneurismate.

NAVTA quidam cum vulneratus esset in femore, vulnus nescio quibus remediis non bene repurgatum intempestivius consolidatum est, eodem vulnere nunquam saniem aut pus reddente. Vnde cum aneurisma videretur, tumor mollis quidam & spirituosus sanguine plenus apparebat cum pulsatione quadam. Sed postea magis augescente tumore, cum maximis doloribus & instantia vigi-

liarum, ita vt conuulsio subinde subsequeretur (sanguis enim ibi concretus & prohibitus naturam veneni induebat) tandem adeò increuit tumor, vt abscessus crederetur. Cùm autem malum indies in peius vergeret, incisio facta est: sed nihil nisi sanguis corruptus & concretus in maximo tumore apparebat, pure non effluente, aut apparente: nec dolor sedatus est, etiam spasmo magis crescente; adeò vt intra paucas horas gangræna subsequeretur, vomitus quodque; & hinc sphacelus & mors.

SCHOLIA.

Quibus aneurisma differat à varice.

ANEURISMA licet magnam similitudinem habeat cum varicibus, de quibus abundè diximus lib. 29. Observatum & Curationum medicinalium nostrarum; differt tamen ab iisdem: nam in iis vena sanguine crasso melancholico repleta sunt ex dilatatione venarum. At Aneurisma arteria dilatatio est, spirituosus plena sanguine. Id interdum in externis partibus existit, in manibus, pedibus, circa ingulum atque pectus; hoc à varice distans, quod magna turgida ac saepe molesta pulsatio insit, cùm, pressio tumore, quæ intus est materia promptè subterfugit. Fit & nonnunquam in interioribus arteriis, maxime sub pectore, circa lienem & mesenterium, ubi vehemens saepe pulsatio animadvertitur. Credi vix potest, quod nonnulli comminiscuntur, per hos affectus ruptam apertamque esse venam aut arteriam. Si enim sanguis è vena aut arteria profiliens, non amplius illis contineretur, mox corruptus putresceret, tumorq; fieret generis diversi. Potest tamen interdum aneurisma fieri ex vulnere, vt mox dicemus, in quo & sanguis copiosior spiritu est, qui in grumos coit, & tumorem extendit, qui ita quoque mollior non est, quemadmodum hic evenit: sed tunc ab afflicto vulnere malè curato sanguis effluens ex arteria, & forte etiam vena, in veneni naturam conuersus & putrefactus talem tumorem & sanissima postea accidentia intulit ac mortem: & quamquam prima vice tumor mollior videretur; vt in aneurismate etiam sine vulnere apparere solet; postea tamen tumor du-

vns ac multo maior, & ingens spaciū occupauit, ut absces-
 sus futurus existimaretur. Caterū quia hic precipuus no-
 ster sermo est de aneurismate, sciendum est quod aneuris-
 ma est dilataio propriè, seu relaxatio vasis ipsius arteria: aut
 dispersio spiritalis materia sub carne per dissulationem se
 se diffunderis, distribuentisque. Vel est tumor blandus tactu,
 digitisque cedens, ex sanguine & spiritu contractus. Fit au-
 tem aneurisma quando arteria conuulnertur, & incumbens ei
 cutis cicatricem quidem contraxerit, ipsum autem arteria vulnus
 incuratum manet, dum nec coaluerit, nec carne fuerit obstru-
 ctum. Accidit sapissimè mulieribus in partu, propter violentam
 spiritus detentionem: sed & in capite circa arteriarum lo-
 cos, & in reliquo corpore, ubi arteria vulnerantur: sicut quan-
 do imperiti medici venam cubiti secturi, simul subiectam arte-
 riam dissecant. Signa aneurismatis sunt tumor parvus, aut
 magnus, concolor, citra dolorem, ad tactum mollis, spongio-
 sam laxitatem præ se ferens: & ita ad digitorum compressio-
 nem cedens, ut propemodum euanescere videatur: verum amotis
 digitis citissimè reuertens: id quod in menti aneurismate, & re-
 liquis, qui sine vulnere sunt, preciprè videre datur. At ubi
 arteria vulnus præfuit, & deinde coalescente cute vaso-
 rum dilataio accessit, tumor non similiter mollis occurrit: san-
 guis enim copiosior spiritus est, qui in grumos coit, & tumo-
 rem extendit. Quod ad curationem attinet & prognostica,
 sciendum deplorata esse aneurismata apud chirurgos, qua gut-
 turi aut capiti accidunt: simul enim cum aneurismatis sectione,
 abundantissima sanguinis eruptio contingit: cum qua etiam vi-
 talis spiritus simul erumpit, ut homo sape in medicorum manibus
 deficiat. Quomodo autem aneurismata per sectionem curentur,
 docent Paulus lib. 6. cap. 37 & Aëtius lib. 15. cap. 10. Quod
 itaque in cubiti cavitare fit aneurisma, hoc modo per chirur-
 giam aggredimur: primū arteriam superne ab ala ad cubitum
 per internam brachij partem delatam signamus: deinde in eadem
 interna brachij parte simplicem sectionem, tribus aut quatuor di-
 gitis infra alam per longitudinem facimus, ubi maximè ad tactū
 arteria occurrit: atq; ea paulatim denudata, deinceps incumbens
 corpuscula sensim excoriamus, ac separamus, & ipsam arteriam
 caco

Aneurisma
quid.

Paulus lib. 6.
c. 38. Aëtius
lib. 15. c. 10.

Causa.

Signa.

Prognostica.

Curatio.

caco uncino attractam duobus filiis vinculis probè adstringimus, mediàmque inter duo vincula dissecamus; & sectionem pollice ihuris explemus: postea verò tumorem in cubiti cavitate, siue flexura securè secamus, nihil amplius verentes sanguinis eruptionem: tunc gravis enacnatis, arteriam unde sanguis prodit perquirimus, & repertam uncino attractam sicut priorem constringimus ac dissecamus, rursusq; ihuris pollice sectione expleta, puris generationem procuramus. Qui ad aperta arteria sunt, inquit Paulus, prolixiores apparent, & in alto constituuntur: digitisq; impressis ceu strepitus quidam exauditur, cum nullus sonus in iis qui ruptura feruntur accepti, percipiat: illi verò rotundi magis sunt, & per summa oboruntur. Quae igitur alas, inguina & cernicem infestant (loca eximia magnitudinis) aneurismata curare propter vasorum amplitudinem non tentabimus. Quae verò summas partes, artus vel caput affligunt, hac ratione aggredi convenit. Si quidem ex arteria dilatata tumor obuenerit, cutim linea recta in longum incidemus: deinde diducta ora, sicut in vasorum dissectione dictum est, excoriantur, & scalpellis quibus membrana anelluntur circumpurgata arteria nudabitur: ac traiecta duobus funiculis deligatur, puncta prius scalpello per medium: ubi cum ambienti membrana unita fuerit, curatione putraturante viemur, usque dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteria creatum sit aneurisma, totum id, quatenus fieri licet, cum cute digitis apprehendendum est: deinde acn duplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transiendum. Et post acis traiectionem ansulam forfice praecludere oportet, atque sic duobus filiis hic illic tumorem deligare, veluti in staphylomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumvolvantur, altera etiam transiitenda est acis per totum, quae priorem premit, similiter duo fila ducens: amputata ansula ex quatuor ita tumorem deniciemus, vel tumore per medium adaperto post excretionem cutem adimemus, eam quae ligata est relinquentes, ac splenium ex œnelao imponentes, remediis in linamenta illis viemur. Ceterum ad gutturis aneurismata emplastrum è cupresso commodè adhibetur: miro enim modo discutit ac sanat: Recupressi folia virentia in vigore, minutissimè trita: quibus adde vinum, quod à vinaceis post primi vini collectionem exprimi-

Emplastrum
è cupresso.

unt, efficitq; solidi strigmenti crassitudinem; ac loco affecto impone, neque soluas nisi de tertio in tertium diem. Hac de tumoribus præter naturam qui ex sanguine sunt in partibus exterioribus. At de aliis qui in internis partibus sunt, uti est vna, gurgulionisq; inflammatio, angina, pleuritides, & alia inflammationes ex sanguine, de iis cum alijs dixerimus in libris nostrarum Obser. medicinalium, non opus est denuò de iisdem sermonem repetere. At quia Epinyctus pustula etiam Fernelio à sanguine fieri dicitur: quamvis alij eam ad bilem referunt, ut Leonus: ideo nos antequam de biliosis tumoribus agamus, hunc libro de sanguineis tumoribus & tuberculis finem imponentes, quadam hic de Epinyctide dicturi sumus.

OBSERVATIO XV.

De Epinyctidibus.

PUSTULAM valdè rubentem quidam habebat in dorso, quadamtenus liuescentem, ad fabæ magnitudinem, quæ noctu admodum affligebat, ita ut anthracem ferè esse timeret. quam quum spectassem, Epinyctidem esse intellexi. Nam Epinyctis Celso pustula est pessima, subrubra, quadamtenus liuescens, quæ noctu potissimùm affligit. Sponte exulceratur: ex eaque subcruenta sanies emanat. Vnde & speciem habere cognoscitur (ut annotavit Fernelius) carbunculi, causamque similem, sed quæ nullius pestilentiae particeps, lenior existat: quemadmodum & eius pustula carbunculo minor. Sic etiam Paulus lib. 4. cap. 9. de iis scribit: Epinyctides vlcuscula sunt, sua sponte erumpentia, pustularum specie, & subrubra: quibus apertis, cruenta sanies defluit: per diem non magnopere excruciat; per noctem verò, grauis magis quam pro ratione vlceris, dolor torquet. Itaque liquor silphii aqua solutus imponitur. nam citra rosionem desiccât: aut cicuta in læuorem detrita inducitur: aut brassica cruda cum aqua, quam nos imponere mandauimus, aut
apium

IIIO OBSERVAT. CHIRVURGICARVM

apium cum polenta trita applicatur, aut alterci folia cum melle pertrita admouentur, aut solanum per se & cum coriandro viridi: aut oliuæ foliis vtror cum aqua coctis: aut vuas acinis excinptis, leues, splenio illitas imponito: vel adianthum ex melle tritum. Vitari debet acrium, acidorum, & falforum efus, fomenta, balneum & insolatus. Talia aut similia in nostro agro adhibuimus: sed & eidem quoque decoctum fumiterræ cum sero lactis, foliis fenæ, & epithymo commodè exhibuimus, adiectis syr. ex infus. ros. de fumoterræ, epithymo, & similibus. Sed brassica cruda contusa sola hîc satis fecisse ad curandum hunc affectum visa fuit.

SCHOLIA.

Celsus lib. 5.
cap. vltimo.

Ex genere pustularum sunt etiam Epinyctides: qua graniter in eminentibus corporis partibus oriantur: differunt tamen, quoniam inter ceteras pustulas Epinyctis est pessima. Ea colore vel sublinida vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens inflammatio esse solet: & cum adaperita est, reperitur inîus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis: dolor ex ea supra magnitudinem eius est: neque enim sabâ maior apparet: à Græcis *ἐπινυκτίς* nomen impositum, quoniam

Signa.

Effere vel
faire: pustula
liuens.

ferè noctu oritur, & magis infestat: Ab Arabibus (scilicet Manardo) *effere*, vel *faire*, ab ipso Plinio pustula liuens vocatur. In omni pustularum curatione (inquit Celsus) primum est multum ambulare, atque exerceri: si quid ista prohibet, gestari. Secundum est cibum minnere, abstinere ab omnibus acribus, & extenuantibus: eadem nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est.

Curatio.

Præter hæc, is qui iam robustus est, si pustula minna sit, desudare in balneo debet: simulq; super eas uirum inspergere oportet, oleoq; vinum miscere, & sic inungere. Quod si maius pustularum genus occupauerit, imponenda leuicula est, detractaq; summa pellicula ad medicamenta lenia transferendum. Facit ad epinyctidas & phlyctænas hoc quod habet argenti spuma, sulphuris ignem non experti parem portionem: cum aceto applicatur. Bene facit tunc his, tunc calidis eruptionibus, & papulis fer-

Ex Paulo.

mentibus.

mentibus, gliscentibus, capitis ulceribus, furunculis incipientibus,
 & adultis, medicamentum quod ex omni præparatur: R. cere
 tracta ℥ vi. rosacei lib. j. ꝑ. argenti spuma, cernisa ana ℥ ij.
 amyli ℥ iij. oia nms. v. aquata: confice secundum artem. Epi- Aëtius.
 nyctidi medentur brassica, vel solani, vel hyoscyami, vel thami-
 ni folia cum melle inposita, & plantago trita, & centaurium
 viride, & uua passa cum ruta, cucumeris salini folia cum aqua.
 Item calx cum oleo ad mellis compagem subacta, & inposita.
 Hæc de tumoribus præter naturam sanguineis dicta sufficiunt:
 quibus hunc primum librum finiamus.

FINIS libri primi Observationum
 Chirurgicarum.

OB.

OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM CHIRVRGICARVM

Liber secundus;

DE
TVMORIBVS
PRÆTER NATVRAM;

D. PETRO FORESTO Alcmariano,
auctore.

OBSERVATIO I.

De Erysipelate.



IR ille qui in crure erysipelate
fatis legitimo laborabat, à Berto
hoc modo Bononiæ curatus est.
Dedit eidem pro purgatione se-
quens: R. mucchari ros. ʒ ij. ꝑ. aquæ
end. ʒ ij. optimè soluebat: applica-
bat solanum, semperuiuam & por-
tulacam, trita: vel succos eorum, cum peciis. Sed
& hoc pro arcano accepimus: si sperma ranarum
in ipso Martio collectum in alembico destilletur: &
ille liquor destillatus cum peciis lineis applicetur
erysipelati, egregiè prodesse. Benedictus præceptor
meus in erysipelate, si tumor adesset, sanguinem
emittebat è basilica: at si œdema in erysipelate ad-
esset, sicut contingit hydropicis, quorum crura
œdemate

œdemate afficiuntur, à phlebotomia cauere iubebat, ne hydrops subsequeretur, & tandem causa perditionis ægrotanti foret. Si autem erysipelas esset absque tumore tantùm cuti inherens, à phlebotomia abstinerebat. indicatur enim ex hoc chole-ram potius peccare; sanguine quidem paucò permixto. Quod si sanguis non peccans euacuetur, tunc bono euacuato, malum derelinquetur; quo fit vt adauctæ materia cholericæ vlceretur erysipelas, quod maximè cauendum in cura erysipelatis. Si igitur sine tumore est, hac medicina vtendum; cum non opus est ita digestionem: R. cassiæ recenter tractæ ℥j. elect. succi ros. ℥j. β. cum aq. end. fiat portio. Ab euacuatione statim alterandum est. Quemadmodum & ego istis diebus in iuvene bilioso in crure habente erysipelas satis purum; vsus sum: R. syr. ros. de succo end.; de succo acetos. ana ℥ss. aqu. plantag. ros. ana ℥j. misce. nam & styptica cum refrigerantibus conueniunt: imperavi igitur vt à vino, carnibus & ouis in totum abstineret; itemque à coitu, exercitio inflammante, à rebus piperatis, aliis, cæpe, & similibus. Deinde hæc apposui: R. succi plantag. solatri, semperuiui ana ℥vi. aquæ ros. ℥iij. misce. cum peciis infusis appone. Vnicè cauendum ne succos addamus emollientium sua humiditate, vt est lactucæ aut maluæ: quoniam sui emollitione timendum esset ne erysipelas ad supurationem verteretur, quæ est via ad vlcus. Quapropter semper à principio stypticis vti debemus: & hanc cautionem maximè obseruare, quòd cum dilutæ peciæ super membrum erysipelatosum incipiant calefieri, statim eas amouere oportet, ne ab illis reuerberata caliditate ad membrum, concreascet erysipelas. Cauendum quoque, ne calore membri attrahente ad se peciæ illam, & eam exiccante, peciæ illa adhæreat erysipelati, quoniam in ipsius ablatione posset erysipelas vlcerari, quod magnopere

H

timendum

timendum est. Præceptor meus valdè atramentum commendabat, si eo erysipelas intingeretur, ob frigida & styptica ingredientia atramenti. vel inungebat peciam vnguento de cerusa; & apponebat. vel: R. vng. de cerusa ꝯ vi. succi plantag. ꝯ ij. aq. ros. ꝯ j. misce, & eo extenso supra peciam, erysipelati apponatur. Vel hoc quod sequitur, valens in augmento: R. litharg. argenti ꝯ vi. succi plantag. ꝯ iij. ol. ros. ꝯ ij. aceti optimi ꝯ j. misc & omnia in mortario plumbéo benè ducantur, quousque fiat vng. participans de colore plumbi. de quo vng. extenso supra peciam ad quantitatem sufficientem appone, hæc quidem permutando manè & vesperi, secundum quod opottet, donec certus fueris de augmento & statu eiusdem. At cum declinare cœperit, quod cognosces ex mutatione coloris ad album colorem vel rubrum; tunc temporis siste gradum ab applicatione frigidorum, quoniam illis adducere potes patientem ad alterum duorum inconuenientium, vel ad carnis mortificationem, vbi appareret color ipsius rubeus obscurus, & sic esset periculum ne cum infrigidantibus ipsis erysipelas ad esthiomenum duceretur. tunc refrigerantibus relictis, apponente altero illorum colorum, quemadmodum nuper etiam mihi vsu venit, manè & vesperi locum hoc foris fouebamus: R. flor. chamomill. meliloti, scœnigræci ana m.ß. Bulliant in s. q. aquæ. & facta quotidiana hac fomentatione cum pecia madefacta in dicto liquore, abluatur locus cum modico vini albi odoriferi calidi. hoc enim est quod prohibet futuram membri mortificationem ex erysipelate. Si verò color membri cœperit albus apparere, caue ab infrigidantibus, ne nervis tremorem inferant vel spasmus, cum frigidum inimicum sit nervis.

SCHO-

SCHOLIA.

DICTVRI nunc sumus de tumoribus biliosis; ad quos per-
 tinet & illi tumores erysipelatosi, quos Herpetes vocant: Biliosi tumo-
res.
 quorum species sunt duplices; militares scilicet, & exedentes, quos
 Græci ἐρυσίπηδες appellant. Vtramque speciem Auicenna in-
 terpres Formicas vocauit: sed eas cum verrucis illis, quas Græci
 Μυρμηκίας, Latini Formicas vocant, nominis similitudine de-
 ceptus, eodem capite turpissimè commiscuit. Eosdem herpetas
 Celsus sub ignis sacri nomine videtur comprehendisse. Recentio-
 res eos inter pustulas (ut loquuntur) cholericas adnumerant.
 A bile etiam proveniunt phlyctæna à Græcis vocata, de quibus
 agit Auicenna cap. de vesicis & inflammationibus. item hy-
 droa, Latini sudamina, à Rhase alhasaphum, ab Auicenna
 plausta noctis vocata: vulgares Fectidure apud Italos vocant.
 De quibus omnibus ordine agemus iuxta sumentes ab ipso ery-
 sipelate. Tamen si pisuita, in generatione humorum, sanguinem
 consequatur, maiorq; eius humoris portio sit in corpore, secundū
 sanguinem, quàm aliorum humorum: quia tamen tumores præter
 naturā à bile procreati (quæ apostematata cholericæ cōmuni-ter vo-
 cant) in valde multa conspirant cū sanguineis: consequens est post
 determinationem phlegmones, & aliorum qui à sanguine fiunt, tu-
 morum præter naturam consistentium, de iis nunc dicamus, qui
 à bile excitantur, & nomine communi Erysipelata vocantur
 Græci, Latini verò antiquioribus ignes sacri, ut diximus. Est
 igitur erysipelas biliosa fluxionis germen, circa cutem vtramq;
 quam maximè consistens, & eam scilicet, quæ foris est, omnium
 partium communè tegumentū, & membranosam illā ac tenuem,
 quæ singulis internarum est circumdata. Nonnumquam verò &
 aliquod quoque subiectæ sibi carnis occupat, sicuti & phlegmonē
 (quæ fluxionis sanguinea soboles est, in carnis corpora maximè
 incidens) etiam cutis aliquid apprehendit. Itaque cum flava bi-
 lis verè tenuis, vel sanguis fetuens & consistentiā tenuis, (quæ
 recentioribus cholera dicitur naturalis, Galeno verò ρολή χυρὴν)
 per solam cutem diffusus fuerit, nihil inferiorem carnem mole-
 stans: particulam tamen in tumorem aliquantum atrolens, cum
 inflammatione & rubore in flammam elanguescente, ac protinus ad

Erysipelas
quid.

Erysipelas
exulatum.

taetum enascentis, affectus hic primum ac proprie Galeno, verum atque exquisitum erysipelas nuncupatur. Hoc autem vniuersationis est, seu (ut dicunt) uniforme, & absq; ulceratione incidit: Anicennas Spinam vocavit. Cum vero amara bilis succus crassior acriorq; quam pro natura modo redditus fuerit, summam cuticulam (quam epidermida Graeci vocant) exulcerat, excoriat: ut atque aliquando cutis exulceratio spacio temporis ad profundum pervenit, ita ut inferiorem seu subiectam carnem attingat. Nuncupaturq; tunc eiusmodi affectus etiam Erysipelas: sed cum ulceratione, quod (Galeno auctore) eiusdem generis est cum Herpete. Verum enimvero, si nec plane biliosa nec sanguinea fluxio sit, sed ex amabibus mixta, non iam tantum erysipelas, sed dispositio permixta erysipelate atque inflammatione nominatur Galeno. Ab eo autem quod in mixtura exuperat, nomen vitio indetur. Etenim ubi sanguis praecellit, Phlegmone erysipelatosa dicitur: ubi vero flava bilis prepollet, Erysipelas phlegmonosum appellabitur: verum ubi neutrum vincit, & aequalia utriusque appaiverint accidentia, tunc vitium id Phlegmones erysipelatosq; medium vocabitur. Iam vero & aliarum mixtionum similis utique erit interpretatio: nempe si multa bilis paucio humori pituitoso aut atrabilario remisceatur, erysipelas oedematosum, vel scirrhosum dicitur. Erysipelas igitur non longe a phlegmone abest, qui ex bilioso succo, seu ex fermentis & tenui sanguine nascitur. A phlegmone tamen differt, primis colore, qui rubrum in phlegmone, pallidus flavusq; in erysipelate conspicitur. Praterea magnae phlegmones pulsatio est proprium symptoma, quippe quae alie magis in corpus demittitur: erysipelas vero in cute potius consiluit, quam alie descendit; tenuis namque substantia est pallida bilis humor. itaque facile ad ipsam cutim transiit, carnosius raris corporibus transmissis. Causas autem propter quas erysipelas nascatur, aliis repensando ostendemus. Triplex est in venarum concoctione excrementum, unum amara bilis, alterum nigra, tertium serosum. Biliosum quidem vesica, quae iocinori subest, expurgat: melancholicam lienes: serosum renes. Parum commodè purgantur horum singula, vel ex debilitate propriorum instrumentorum cuiusque, vel viis quomodocumque obstrictis. Cum autem haec duplices sint;

Spina.

Erysipelas
cum ulcera-
tione.Erysipelas
non legiti-
mum, & eius
species.Phlegmone
erysipelato-
des.Erysipelas
phlegmono-
des.Medium vi-
tium.Gal. 14. Me-
thod. cap. 2.

Causa.

Gal. de
Anat. causis
3. cap. 2.

sunt; alia per quas trahitur supernaculum, alia per quas emittitur, in utrisque sanè separationi obest angustia. aliquando horum nullum est in culpa, sed excrementi multitudo, cum immodica est, nec tota simul expurgari potens, una cum sanguine per totum corpus defertur. Hanc immodicam excrementi vim, duplices causæ pariunt, alteratrix facultas parum commodè se habens, & ciborum vitium. Ac laedenda quidem virtutis, particularum intemperies est causa. Ciborum vitium cuique excremento respondet suum. Alij namque magis melancholica natura sunt, alij magis aquosa, alij magis biliosa. Sed & alteratrici potentia intemperies, quæ ad calidius sit versa, aliàs biliosum, aliàs melancholicum efficit excrementum. ad frigidius verò mutata, vel pituitosius vel aquosius facit excrementum. & singula excrementa, propria symptomatis species comitatur; nam pituitoso excremento in toto corpore sparso succedit hydrops, leucophlegmatias dictus: cum verò in una corporis particula insedit tumor, tunc ille œdema Græcè dicitur. Si verò serosa excrementa redundant per vniuersum corpus, tum ascites vocatus hydrops succedit: si in aliqua parte, papularum proventus. Nigram bilem in toto quidem corpore, elephantia; in una quapiam particula, cancer comitatur. Amaram denique bilem, cum illa vniuersim in corpore redundat, reginæ vocatus morbus; cum vnâ quâpiam particulam obsidet, erysipelas, & ulcera serpentia insequuntur. Sed ut & hæc ipsa manifestiora adhuc enadant, sciendum est, cum simpliciter bilem dicimus, vel biliosum humorem, more Galeni & aliorum medicorum, nos intelligere pallidam bilem seu flavam & amaram, non autem acidam & nigram. Hæc autem naturalis cholera, & certa, aliis nominatur, ex sanguine quidem tenui & feruente generationem obtinens. Atram verò bilem nunquam a solutè bilem nominamus, sed semper cum adiectione humoris, appellationis colorem adiungente. Est igitur bilis, quæ ὀδὴ Græcis dicitur, vulgo autem Cholera, humor calidus & siccus, ex tenuiori & calidiori parte chyli, vel ex sanguine tenui & feruente, ut modò diximus, procreatus. Hæc autem duplex est, iuxta neotericorum divisionem: naturalis scilicet, & non naturalis. Naturalis, est humor calidus & siccus potestate: substantiâ quidem tenuis, colo-

Bilis.

Bilis flaua duplex.

Naturalis.

ve verò flamm, aut inter, declinans ad quandam citrinitatem seu flauitiam : sapore verò exactè amarus, non autem acutus sine acris, ut quidam malè affirmarunt. Non naturalis verò bilis dicitur, quæ à prædicto humore verè bilioso degenerat, in iya terminos tamen suæ latitudinis continetur; quos si egrediatur, non iam bilis, sed alius humor reputabitur. Hoc autem (bilem, inquam, egredi limites suæ latitudinis) contingit bifariam: uno modo (ut sic dicatur) per se, & in se: altero modo, per admixtionem. Per se, & in se, adhuc dupliciter: uno modo, quando bilis illa naturalis putrescit, & aduritur; & talis dicitur adusta per putrefactionem: altero modo, quando bilis non naturalis, vitellina dicta, igneo calore percoquitur in hepate, aut in ventriculo, aut in venis, & efficitur porracea, quam etiam prassinam vocant, vel arginosa, quæ extrinsecus quidem mala sunt. Per admixtionem verò bilis efficitur non naturalis, seu præter naturam, cum alius humor illi extrinsecus accedit. Et hoc quidem fit multifariam: Nempe si phlegma tenue & aquosum illi admisceatur, citrina seu crocea efficitur; si crassum & viscosum, vitellina: si verò melancholia adusta illi permiscetur, efficitur bilis adusta per admixtionem. Et sic, iuxta Avicennæ placitum, sex sunt species bilis non naturalis: apud Haliabbatem verò quatuor duntaxat. Nullam enim prorsus mentionem fecit de duabus speciebus adustis. Galeno autem lib. 2. de virtutibus naturalibus, nulla bilis præter naturam esse dicitur, præter vitellinam, quæ omnium vitellis, immo colore immo crassitudine est adsimilis. Siquidem porraceam & arginosam ex prauis ac corruptis humoribus, propter quorundam esculentorum aut olerum cruditatem, qualia sunt beta, capra, brassica, sæpenumero in ventriculo aut generari. Atque etiam interdum talibus nequaquam ingestis, ratione ægritudinis aut malæ alicuius dispositionis in venis ipsis generatur. Ex iis itaque colligitur, quatuor species seu differentias inflammationum (quæ vulgus cholerica apostemata vocat) ex bile ipsa generari. Nempe ex bile vera, sincera & laudabili (quam tenuem feruentemque sanguinem appellamus) procreatur ea species inflammationis, quæ Galeno verum atque exquisitum erysipelas appellatur, lib. 2. ad Glauc. quod tantum cutis solius pressio est, Græcè autem ἀνέγχε

2.
Non naturalis.

Bilis duobus modis deficit à sua natura.

Vitellina ex meraca bile.

Bilis porracea.

Arginosa.

Crocea bilis.

Vitellina ex admixtione pituitæ.
Avicenna.

Hali.

Porracea bilis quomodo signatur.

Quatuor inflammationum differentia ex flaua bile oriuntur.

ὥς ἐρυσιπιδας. Ex bile verò non naturali, & alijs humo-
 ribus permixta, tres alia nascuntur differentia, ut pose erysi-
 pelas phlegmonodes, erysipelas œdematodes, & erysipelas scir-
 rhodes. Ex bile autem quæ præter naturam ex aduisione fa-
 cta est, pro ratione tenuitatis aut crassitudinis substantia ipsius,
 generantur vel herpes æthiomeni, id est, exedentes (qui
 eiusdem generis sunt cum erysipelatibus, quia cum exulceratio-
 ne incidunt) vel phagedæna (quæ cum cute pariter subie-
 ctam carnem alijs erodunt; & exulcerati cancri, alijsq; eiu-
 smodi erodentia, & cancrothe, id est, maligna ulcera, quæ pu-
 stula corrosiva recentioribus chirurgis dicuntur. Itaque tenuis-
 simus quidem in eiusmodi humoribus, est is, qui exulceratum
 herpetem excitat; crassissimum, qui cancrum: proximum de-
 inde locum occupat, quod ad crassitudinem attinet, qui pha-
 gedænas creat, ut lib. 14. Meth. med. Galenus annotat.
 Causa veri erysipelatibus, uti & phlegmones veræ, sunt tres.
 prægressa, quæ & primitiua dicuntur: antecedentes, & con-
 iunctæ. Caterum raro fit erysipelas à causa prægressa: fri-
 ctiones tamen violentæ, insolatio & admodum medicaminum
 attrahentium, ipsum nonnumquam excitant. Fernelius li-
 bro 7. cap. 4. de exter affect. & pustulis à bile: Erysipelas,
 inquit, ardor est vehemens, per corporis summam diffusus. Nec
 tumore manifestio exuberat, nec partem attollit aut distendit,
 nec penetrat in subiectam carnem, sed late diffunditur, nulla
 collectione circumscriptum. Quamcumque partem prehendit,
 vehementer mordicat & urit: color inest ex rubro flauescens,
 qui pressu subierfugit, moxque redit. Dolor nec pulsans nec ad-
 modum vehemens est. Quum fluxio excutitur, horror quidem, ac
 dein febris, hominem adoritur: ac sæpe cum in cuncta irrui, ab
 inguinis tumore initium ducit. Serpit id quidem herpetum mo-
 re, atque priori derelicta sede, in vicinas partes sensim obrepit.
 Est autem duplex: unum, quod simplex erysipelas Celso ap-
 pellatur, sola rubore & ardore molestum. Alium, quod eidem
 Sacer ignis & alius ignis proserpens vocatur, quod tunc vehe-
 mentius est & calidius, cum acritus quibusdam topicis intempe-
 stivè aut sine indicio adhibitis materia biliosa acrimonia irrita-
 tur: & tunc merito, inquam, hæc secunda species Celso sacer ignis

Verum erysi-
pelas.

Tria erysipe-
lata illegitti-
ma.

Herpes ex-
edens.

Phagedæna.

Cancræ exul-
cerati.

Causæ veri
erysipelatibus.

Fernelius.

nuncupatur: estq; exulceratum erysipelas. Huius dua species sunt: una, qua summa cutis sine altitudine exulceratur; in qua & crustula instar furfuris excitantur: altera, cuius exulceratio aliis in cutem penetrat; è qua, ruptis pustulis, sanies exit. Simplici erysipelatis origo est è feruente tenuiq; sanguine, quò biliosum appellatur. Exulcerati verò ex eo cui bilis supernacua, visq; incallescens, nonnihil sit admissum. Is è venis tenuioribus propulsus, nequaquam in carne subsistit & haeret, sed tenuitate in cutem feritur & enolat, quæ densior & compactior hunc retinet cohibetque. Quumq; tenuis sit humor, facillè dispergitur, neque in conspicuum tumorem se attollit. Genus hoc vniuersum exquisitum est erysipelas: quod verò phlegmonodes appellatur, tumens quidem, sed minus feruidum existit, multoq; minus œdematodes. Barbari autem, ut Valesius, erysipelas apostema cholericum vocant, in superficie corporis generatum, quod pilis quasi adhæreat, & propriam passionem cutis esse volunt. Vnde & Auicenna dicebat sen 3. 4. cap. proprio, quòd erysipelas non sit nisi in eo quod apparet de cute. & de causis veri erysipelatis agens 2. primi cap. 5. est cholera rubra pura; & istam vocat primò causam (cap. de qualitate generationis humorum) spumam. Galenus 2. ad Glanc. cap. 13. ex cholera subtili bulliente feri asserit, vel sanguine tenui feruescente bilioso. Vnde & Lanfrancus dicebat: Si sanguis tenuissimus in substantia & feruens in qualitate, currit ad aliquem locum, facit inflationem latam & rubeam, sparsam in membro in superficie, quæ vocatur erysipelas. Sed hæc pauca etiam de signis adieciisse sufficit de quibus Scholio sequenti latius.

Simplicis
erysipelatis
origo.

Causa exul-
cerati erysi-
pelatis.

Valesius.

Auicenna.

OBSERVATIO II.

De erysipellate puro.

VIR quidam Delphensis, cum legitimo satis erysipellate laboraret in crure, illi post exhibitum infusum rhab. cum sero lactis, & syr. violaceo, terram cimoliam ex furno cum butyro instar pultis mixtam circa suram apposuiimus: & statim
erysi-

erysipelas curatum est. Sed & hoc tempore, cum hæc colligerem, Iodoca seu Iusta Teylingia, cognata mea, annorum 20, erysipelate legitimo in crure sinistro circa talum, sursum ad furas ascendente correpta est, 18 die Iunij, anno 1570. cum dolore. Legitimum fuisse erysipelas ex signis propriis facile collegi: Color enim aderat ex rubro flavescent, qui pressu digiti subterfugiebat, & mox redibat. Ad hoc curandum epoto hoc pharmaco, quinquies aluum deposuit: R. folior. senæ ʒ iij. β. scm. anisi ʒ β. infunde in ʒ v. decoct. communis, facta ebullitione leui, & fortiss. express. adde syr. ex infus. ros. ʒ j. misc. Cruri autem apposuimus pultem ex lacte & pane siligineo contrito, & pulvere terræ illius chimoliæ quæ exterius furnis circumducitur, est-que grisea, & vocatur apud nostrates vulgari nomine *Cley*. cum ter quaterve hoc emplastri modo apposuissemus, dolor sedatus est, & rubedo euauit; & ab erysipelate statim curata est. Venit & hic mihi in mentem illius Cyriaci Mathæi, qui in balistario Delpheni anno 1569 ipso 12. die Octob. erysipelate ferè legitimo, quamuis ad phlegmonodem accederet, corripiebatur in collo, qui & ad humerum tendebat. Ad hunc cum accitus essem, & rubedo adesset, licet leuis, & quasi febris pestilentialis dolorem illum consequeretur, statim sanguinem detrahare iussi ex venacephalica in brachio sinistro, nam sinistram partem colli, tum humerum sinistru, tumor ille latus occupabat. deinde iulebum sequentem propino: R. syr. de limonibus ʒ j. β. aquæ cicoræ, end. betonicæ ana ʒ j. misc. Die autem sequenti hoc sequens decoctum præscripsi: R. folior. senæ ʒ β. rhab. selecti ʒ j. β. infunde in ʒ ix. decoct. communis, per noctem. facta prius ebullitione & fortiss. express. adde syr. de limonibus ʒ j. β. syr. viol. ʒ β. misc pro duabus dosibus. Sumpsit tantum vnam, & quinquies aluum deposuit. Deinde

de ex terra chimolia in parte externa furni collecta, & cum butyro trita, instar pultis apposita curatus est; hoc enim arcano etiam plures alii ex erysipellate phlegmonoso curati sunt per me. Verum cum in hoc Cyriaco non purum omnino esset erysipelas, ideò quoque sanguinem probè detraxi. sed in præcedentibus, magis puro & legitimo erysipellate laborantibus, id non feci. At alij quoque nonnulli hoc sequenti experimento vsi sunt, tam ad erysipelas purum quàm impurum & illegittimum, seu erysipelas phlegmonosum: quod constat ex vitellis duorum duris, & sale, contritis. Hoc enim modo Petrus Wittius ille Delphensis, qui postea hydrope obiit, cum in crure erysipelas phlegmonodes haberet, curatus est: & similiter vxor eius, ante illum eodem malo correpta, sanata est; tum postea alij quam plurimi per eandem vxorem hoc solo remedio conualuere, ut ipsamet mihi rettulit.

S C H O L I A.

Signa.

Gal. 2. ad
Gilauc. cap. 2.

S V A signa hac passio habet: est enim multo (ut diximus) inflammatione calidior, magisq; colorem flammæ repræsentans: & si tingeris, facillè sanguis subterfugit, rursusq; illabitur, exquisitè tenuis, & aspectu rubidus: non tamen dolet hoc veluti inflammatio, neque vi aliqua inflammationis species pulsam aut compressionem aut tensionem inuenit similem: sed quandoque valdè parum infestat, ac tum præsertim quando per solam cutim diffusum fuerit (ut in cognata mea) nihil inferiorem carnem molestant: & talè sæpius accidit, atque hoc est exquisitum erysipelas. Quòd si autem bilis cum sanguine mixta fuerit, erysipelas phlegmonosum vocatur, ut erat in Cyriaco. nam postea cum videretur curatus, ita ut solus chirurgus illum tractaret, febre iam omnino amota. nescio qua incuria post aliquot dies recidens passus est, & factus est abscessus in collo; à quo tamen evasit. Ceterum cum de vero erysipellate n: bis sermo sit, hic prius de signis & indiciis eiusdem agamus. Signa itaque & indicia (ut & Tagalium annotavit) veri atque exquisiti

quisiti erysipelatis sumuntur ex collatione ipsius ad phlegmonem, iuxta Galeni doctrinam 14. Method. medendi, & 2 ad Glauc. ex quo aperte colligitur verum ac legitimum erysipelas veluti quandam speciem esse phlegmones, id est inflammationis generaliter acceptæ. Nota igitur erysipelatis sunt, color aspectu rubidus, in flauum elanguescens, qui (rubor inquam flauescens) ad tactum, hoc est, digitorum appressum facile subterfugis, rursusque illabitur. Tumor exiguus, in cute potius consistens, quàm aliè descendens. Calor vehemens, febrem excitans maiorem eà quæ ex phlegmone accenditur. si quidem calidius multo est erysipelas, quàm phlegmone. Pulsatio (quæ magna phlegmones proprium est symptoma) non admodum foris. Dolor mordicans & pungens, nullam (ut in phlegmone contingit) innuens tensionem, & si quæ sunt alia bilis dominium significancia. ita quoque & Neoterici, ut Valescus, signa erysipelatis secundum Anicennam ponunt, quæ etiam ipse ex 2. ad Glauc. à Galeno excepit, cap 4 quia adest calor & rubedo, tendens ad citrinitatem: & si rubedo tangatur digitis, enanescit, & statim reuertitur, id quòd materia sit subtilis: nec est tantus dolor sicut in phlegmone, nec tanta elenatio, imò vix transis tumorem cutis. Est tamen ille dolor pungiuius & mordicans, non extendens sicut in phlegmone; nec est tanta inflatio seu pulsatio sicut in phlegmone, nec tensio, nec profundatio; imò mollis inuenitur, quando in sola cute expanditur humor, non ledens suppositam carnem; & cum ea adest magna sitis & febris. Quod ad presagia attinet, bona esse non possunt, quando erysipelas caput aut cervicem occupat; nam imminet periculum, ut, nisi efficax consequatur auxilium, interim affectos strangulet. item si osse denudato, circumstans caro erysipelate prehendatur, malum: significat enim consuere sanguinem calidiorem, & sanam bilem quæ adiacentis carnes sua acrimonia exedit & absorbit. Pariter certum est, erysipelas esse malignum, quando suppuratio, aut pueredo ipsum consequitur. Quod erysipelas delitescit in pulmonibus, in hepate, & huiusmodi visceribus, nec non in utero gravidæ mulctis, lethale. Erysipelas exterius effusum, verò introrsum, non est bonum; ab interioribus autem foras, bonum. Errant igitur medici, qui erysipelas

De signis & indicis veri erysipelatis.

Notæ erysipelatis.

1. Rubor flauescens, ad tactum subterfugiens.
2. Tumor parvus.
3. Calor vehemens.
4. Pulsatio exigua.
5. Dolor pungiuius.

Prognostica.

Hippoc. 7.
apho. 19.

5. aph. 43.
6. apho. 25.

cxlra

extrâ in cute appârens, intempestivè per frigida & reprimèntia
 medicamenta ad interiora, & partes principales propellunt; cùm
 melius sit, erysipelas, aliudq; quodcunque malum, in externis
 esse corporis quàm in internis. Quod ad indicia erysipelatis quo-
 que attinet: primò dicit Anicenna, ut etiam citatur à Valesco
 cap. proprio, quòd ex caliditate erysipelatis comburitur cutis, &
 virulentia vesicat ipsam cutem. hoc autem non fit in phlegmo-
 ne, nec in vero erysipelate. Secundo, dicit, si accidat erysipelas
 à fractura ossis sub cute, est malum. Tertiò idem Anicenna di-
 cit quòd interdum accidit erysipelas in facie, & incipit à lépo-
 re nasi, & augmentatur apostema, & expanditur in facie to-
 ta. Quartò, in erysipelate putredo aut sanies, malum. Quintò,
 ut plurimum erysipelas terminatur per evacuationem in sensibi-
 lem: & sic non cùò facit sanum, quæ aggritudo est multum ac-
 uta. Ex quo loco Tagautius & sua indicia accepisse videtur, cùm
 sic scribat: Quod ad indicia pertinet, erysipelas ut plurimum
 faciem præhendit; incipitq; maximè in ea nasi parte quæ vulgo
 lepus appellatur. Deinde mox in faciem totam expanditur; ge-
 minâ quidem occasione; nempe ob faciei raritatem, & ipsius bi-
 lis lenitatem. In ossis autem exutione seu denudatione erysipe-
 las superveniens, malo est, ut scribit Hippoc. aphor. 19. lib. 7,
 hoc est, symptoma prævum est, si osse nudato caro circumstans
 ab erysipelate occupari videatur. hoc autem, Galeno teste, ra-
 rissimè accidit. Rursus sequenti aphor. scribitur ab eodem Hip-
 pocrate, Quòd ab erysipelate putredo aut suppuratio, malum.
 Hac enim (inquit Galenus) numquam erysipelatis superveniunt,
 nisi valde malignis. Verum ac legitimum erysipelas quatuor
 habet tempora, uti & alij præter naturam immores. Horum
 autem signa ex præcedentibus sunt requirenda. Exquisitum ery-
 sipelas rarò terminatur suppuratione, sed magna ex parte in sen-
 sibili transpiratione seu resolutione. In erysipelate quadam in-
 terdum contingunt symptomata, quæ nonnumquam magnitu-
 dine ipsius morbi causam exuperant, atque ideo curandi ratio-
 nem interpellant; hoc est, curæ rationis ordinem enariant, perner-
 untq; ut etiam in præcedente lib. de phlegmone dictum est.
 Ad hæc, erysipelas motum sequitur tertiana febris; nam ad eius
 materiam quandam habet analogiam. utriusque enim materia

est

Anicenna.

Indicia ex
Tagautio.

1.

2.

In comment.
prædicti
aphor.

3.

4.

5.

6.

7.

Erysipelas se-
quitur motum
tertianæ fe-
bris.

est humor biliosus. Caterum erysipelas ab exterioribus uertit ad interiora non est bonum: ab interioribus autem ad exteriora, bonum, ut ab Hippoc. scriptum est apud. 25. lib. 6. Erysipelata uero, quæ capiti oboriuntur, plus facessunt negotij, adeoque (ut Paulus ait) periculosa esse solent, ut nisi efficax consequantur auxilium, interdum affectos strangulent. Scribit etiam Hippocrates lethale esse, si erysipelas sit in utero mulieris pregnantis. Facto enim sic in utero erysipelate, scilicet ex necessitate moritur. Si quidem acuta febris (ut Galenus ait in Commentario) sapientem (nempe scilicet in utero matris) citra inflammationem interimit. Caterum ante curationem particularem hæc authores canones aliquot uniuersales proponunt: & primus hic est positus à Galeno 14. Method. cap. 2. quod uniuersalis materia purgatio prius sit exequenda: nam si purgetur membrum, mox ad suam qualitatem reuertetur. Secundus canon est; cum erysipelas non tantum quantitate sed etiam qualitate bilis generet inflammationem nimiam, idcirco oportet magis in frigidare, quam in inflammatione aut phlegmone. Tertius: refrigeratio iamen facta cum frigida & repercussiuis non in omni loco fieri potest secure, neque cholera rubra à membro ignobili ad nobile propelli debet aut derinari, ut Galenus loco citato explicauit. Quartus canon est eiusdem Galeni loco iam dicto. Sicuti phlegmoni repercussientia non sunt imponenda, nisi prius purgato corpore toto, ita neque erysipelati applicanda sunt. Quintus. & quemadmodum in phlegmone sit phlebotomia, ita in erysipelate conuenit pharmacum. Sextus: estque Galeni 9. Artis parua: necesse est ut erysipelas non maturetur, sed refrigeretur. Septimus ibidem. nec nocet aqua frigida erysipelati, si purum sine alterius commixtione sit; sed eius potatio est cura illius. Octauus: ista apostemata, id est, erysipelata, calidiora sunt, quia de cholera rubra facta: quare oportet in ipsis magnam refrigerationem facere. 13. art. par. Nonus: in puro erysipelate refrigerandum est membrum donec color apostematis mutetur: & mox ut colorem amittit, euadit uel quiescit. Decimus, & est Anicenna in 3. quarti cap. de cura erysipelatis: & oportet ut in frigidatio eius in principio sit fortis stypticitas, adeo ut forsitan augmentetur eius stypticitas super ipsum frigus: sed circa statum sit frigiditas ipsius uehementior stypticitas.

Canones
uniuersales
ante curationem particularem præmittendi.

Particularis
curatio ery-
sipelatis, ex
Neotericis.

stypicitate. Undecimus ibidem : & est quoque Auicenna : & caue ne denigretur membrum & fuscum fiat, & incipiat perne-
rire ad viam corruptionis : & tunc remoue infigationem &
stypicitatem. Istis praeceptis facile innotescit particularis cu-
ratio ex Neotericis, qui barbaram sequuntur medicinam. Unde
& Valesc. cap. proprio dicebat : Particularis curatio erysipe-
latis est, ut in principio fiat purgatio materia calida cholericā
seu biliosa cum decoct. flor. vsualium & prun. in qua dissol-
natur oxyphœnicon, cassia fistula, māna granata, vel rhab.
vel elect. de succo ros. vel amyrob. citr. & fiat phlebotomia, si
expedit; maximè si erysipelas est cum tumore; sed de hac Scho-
lio sequenti latius : & praescribatnr à principio vultus ratio qua
febricitantibus conuenit, ut est aneuatum, hordeatum, ius par-
ni pulli cum agresta. sumatur lactuca, portul. amygdal. Ca-
neat à vino ex toto, vel sis valde lymphaticum : praestātque
aquam hordei gustare. Deinde à purgatione in principio con-
ferent repercutientia, ut herba solatri, succus sempernina, por-
tulaca, psyllium, insquiamum, lactuca, lenticula, aqua arnoglos-
sa, ut ait Haly. recurre ad alia repercutientia dicta de phlegmo-
ne. Auicenna commendat & aquam frigidam, ut 7. canone
dictum est. Potest & apponi succus plantaginis, bursa pastoris,
virga pastoris, cum aqua ros. intinctique panni in iisdem fre-
quenter mutati. Sed cum denigratur membrum, ab his absti-
nendum, iuxta canon. 11. & ideo, ut admonuit Guido, & di-
cit Haly lib. 3. 2. part. regal. dispos. quod si apostema est com-
positum ex erysipelate & phlegmone, curetur tunc compositis
medicamentis, secundum dominium materiae exuberantis. Post-
quam autem maximus ille calor cessauerit, ponenda sunt aliqua
resolutina, sicut est aqua solatri, & decoct. camom. ros. Sed &
ex farina hordei & sennigraci cum decoct. camomill. potest
fieri emplastrum : nam cum aliquando accidit corruptio, &
quasi mortificatio in apostemate ante maturationem vel reso-
lutionem, & locus incipit fieri venetus vel niger & fuscus, &
sensus diminuitur, & fit quasi corruptio & mortificatio eius,
tunc scarificetur locus, & lauetur frequenter cum aqua salsa;
& fiat emplastrum ex farina hordei vel fabarum, cum melle
& aceto. At si erysipelas ulcereitur, vel ex medici impruden-
tia,

tia, vel malo patientis regimine, vel ex malitia materia, qua corrigi non potuit virtutibus medicinarum, et applicatis vng. sequens, quo praeceptor meus Benedictus Faentinus feliciter utebatur. procul dubio enim sanat erysipelas ulcerarum: ℞. litharg. \mathfrak{z} iij. vng. popul. cernisa abluta, infrig. Gal. ana \mathfrak{z} ss. ol. ros. completi \mathfrak{z} j. misce. & omnia in mortario bene ducantur, quousque fiat vng., quod in opere continuabis usque ad consolidationem erysipelatis. Reliqua curatio etiam iuxta Gracos sequenti Scholio manifestior enadet. Interim hoc sequens exemplum apponamus.

OBSERVATIO III.

De erysipellate in crure.

IVVENIS biliosus cum in crure erysipellate afficeretur, infusum rhab. exhibuimus cum nanna, cum decoct. prunorum in sero lactis. & primo, quod ad topica, aquam rosaceam & plantag. tinctam cum pannis lineis: postea & succum plantaginis cum cimolia terra: illud enim egregie iuuabat. Sed & hoc commodissime in erysipellate vti sumus: ℞. cerusæ & lithargyrii ana \mathfrak{z} ij. misce cum succo solatri clarificato, & oleo rosato: hoc enim erysipellate compescit, & herpes miliares sanat: quemadmodum & hoc in statu & declinatione erysipelatis etiam puri conferre cognouimus: ℞. farinæ lentium, pul. ros. ana \mathfrak{z} iij. β arnoglоссæ m. ij. bulliant, & incorporentur cum oleo ros. Sed & in puella in crure erysipellate laborante in declinatione decocto florum chamomillæ, ros., plantag. etiam adiecta malua (duritie quadam apparente) cum pannis lineis & intinctis ac sæpius appositis commodè vsus fuit.

SCHO.

SCHOLIA.

Curationis
erysipelatis
scopi vniuer-
sales duo.

CV M erysipelas, sicuti & phlegmone, de qua lib. præcedente ante egimus, affectus calidus sit, & ex humorum defluxione fiat, geminus etiam erit totius curationis ipsius scopus; nempe refrigeratio & vacuatio. At veluti vaccinationis indicatio in phlegmone, refrigerationis indicationem vincebat, ita refrigerationis indicatio in erysipelate, magis urget quàm vaccinationis. Illa enim quantitate, hoc verò qualitate magis premittit & discruciat. Itaque erysipelas magis refrigerari & minùs vacuari; inflammatio contrà magis vacuari, & minùs refrigerari debet. Quamquam utriusque affectus curandi (ut inquit Galenus) commune caput sit, infestantis scilicet humoris vacuatio. Ideoque postquam refrigeratum erysipelas fuerit, ad ea quæ digerynt seu discutiant medicamenta conuertimur. Porro ut geminum hunc scopum vniuersalem, refrigerationem inquam & humoris infestantis vacuationem, assequamur, quatuor aliis scopis particularibus, iuxta posterioris ætatis chirurgorum placita, est opus. Primus scopus, consistit in recta vite institutione atque observatione. Secundus, humoris ad partem affectam confluentis, quem antecedentem materiam appellant, auersionem concernit. Tertius in humoris, qui iam in partem agram influxit (quem materiam coniunctam dicunt) vaccinatione consistit. Quartus verò & postremus circa symptomatum correctionem, ac propulsione, versatur. Primum scopum facillè assequemur, si rerum omnium, quas non naturales vocant, administratio, ad humiditatem & frigiditatem (ut in febre tertiana) spectaueris. Quandoquidem erysipelas ex flava bile oriunt habet, quæ temperata est calide & sicce. Ergo aërem quoad fieri potest frigidiorē & humidiorē deligito, preparatoq;. Aestate igitur subterraneas domos frigidissimas, maximè perfalas & ad Arcton versas, tibi deligito. Si loci eiusmodi occasio non datur, & calidior eēt extiterit, ipsum sic preparato. Aquam frigidam ex vasis in vasa subinde transfundito. pavimenta domus assidue aqua, quæ prorsus gelida sit, aspergito. Rosas & violas plurimas, vitium folia, & capreolos, salicis quoque ramulos, & reliquos flores ac germina, quæ frigida humidaq; facultatis sunt, humi spargito,

Particulares
curandi ery-
sipelatis sco-
pi quatuor.

I.
Primus sco-
pus.

Aëris dele-
ctus.
Ambientis
preparatio.

spargito, ac in aërem proiicito. Turbam hominum conclauē laborantis ingredi prohibeto. Quod ad cibum pertinet, talis sit, qualis in febribus & similibus calidis malis expetitur, videlicet refrigerans. Pinguis, dulcis, acris calidæ omnia vitato. Lactuca, cucurbita, porulaca, oxalide (quam acetosam vocant) hordeato, oryza & aliis id genus, quæ sanguinem incrassant & refrigerant, lubeus vescitor. à vino in totum abstinet. cremor ptisane aut aqua hordei tibi potus esto. Viduus temperantiam seruat. Alius tibi semper mollis esto; & lubrica quantum potes seruetur. Ab omni motu, præsertim vehementi atque immoderato, abstinet. Vigilia mala est: somnus bonus. A passionibus animi caneto. iram, contentionem atque omnem animi vehementiorem motum, aut perturbationem, tamquam aduersissima fugito. Nitida ac munda circa te omnia sunt. Venerem ne exercero. Atque hæc de primo scopo dicta sufficiant. Secundum autem scopum curationis erysipelatis consequemur, si succum in corpore delinquentem commodâ vacatione ademerimus. Ergo in vero ac legitimo erysipelate, non necessariò, ut in phlegmone, sanguinem ex vena detrahemus: sed medicamento quod fluxam bilem exigit (cholagogon Græci vocant) ventrem per inferiora expurgabimus, si saltem affectus magnus sit, & corpus bile abundare videatur. Itaque cum erysipelas febres accendat, & eas vehementiores quàm phlegmone, medicamenta, quæ impensè calida sunt, & scammonij succum, quod recentior Græcia diacrydion vocat, recipiunt: (cuiusmodi est, quod vulgo in officinis electuarium de succo ros. appellatur) huic affectui minimè idonea sunt. Ergo vel rhabarbarrum offerendum est, vel potio quæ Rhafi aqua thamarindorum dicitur. Recipit autem pruna damascena 24, thamarind. recentium 3 x. sacch. viol. quart. semissem. cui, ut efficacior reddatur, aliquid dilui rhab. adici potest. Manna his quoque & cassia & diaprun. lenis. cum aqua solatri vel end. aut aqua casci commodè dantur. Quod si exigua sit affectio, ne hæc quidem cholagoga medicamenta necessaria erunt; sed abundè fuerit, tunc acris clysteri uti, ut Galeno visum est. At in erysipelate phlegmonoso non abs re fecerit (modò nihil obstitit) si curationem à sanguinis missione auspicatus fuerit. Tale autem sapius faciem apprehendit: unde & Paulus

Cibus.

Potus.

Repletio.

Inanitio.

Motus.

Vigilia.

Somnus.

Animi affectus.

Venus,

2.
Secundus
scopus.Non temerè
in erysipe-
late valdè ca-
lido vtendum
electuario de
succo ros.2. ad Glauc.
In erysipelate
phlegmonoso
composit
phlebotomia.

protinus

protinus ab initio venam in cubito præsertim humeralem in eo incidendi iubet: sin autem hæc non appareat, eam que se conspectui magis obicit. Si quid verò sanguinis detractionem impediat, purgatione ex medicamento, quod bili ducenda dicatū est, utendum præcipit. Non pugnat tamen Paulus cum Galeno, ut etiam refert Tagantius. Nam cum Paulus secandam esse venam præcepit in erysipelate, quod capiti seu faciei oboritur, de phlegmonoso erysipelate intellexit, quod sapissimè faciem apprehendit: Galenus verò de legitimo erysipelate locutus est, in quo sanguinem non mittit. At in œdematoso aut scirrhuso erysipelate purgatione utendum est, quæ mixtas habeat facultates, hoc est, partim flavam bilem, partim verò pituitosum, aut melancholicum succum educat. Atque in iis quidem omnibus consulendus est doctus aliquis ac prudens medicus, à cuius consilio & decretis ne transuersum quidem unguem discedere debet chirurgus. Sitque hoc satis semel monuisse, quod chirurgus nihil umquam in iis, quæ ad purgationem & sanguinis missionem per phlebotomiā attinent, attentare debet, citra periti alicuius medici consilium, nisi forsitan si quando urgeat necessitas, & ubi nullus præsto adest medicus, quod & Tagantius diligenter observandum præcepit. Ceterum de hac controversia etiam meminit Leonus in Methodo sua curand. humor. præter naturam cap. 14. & proprio de erysipelate in hunc modum. Cuius ipse Celsus lib. v. c. 25. & Paul. lib. 4. cap. 21. exordiantur à sanguinis missione & potissimum quando erysipelas constitit circa cervices aut caput (ut in Cyriaco nostro, de quo antea dictum est Obs 2. huius libri, enenit.) Galenus lib. 2. ad Glauc. de erysipelate in uniuersali loquens, dimittit sectionem venæ, imò dicit non esse necessariam. Hæc contrarietates conciliarem, dicendo quod Celsus & Paulus loquuntur de erysipelate periculoso & particulari, ubi angina & suffocatio timeatur, propter sortas hæc ceterorum humorum redundantiæ. At Galeni intentio est circa erysipelas uniuersale, quod ut plurimum aduenit, in quo humor potius qualitate, quàm quantitate peccat: & ideo sanguinis detractio minimè necessaria: & præcipue cum per venæ sectionem non tantum humorem peccantem irahimus, sed promiscuè omnes humores. quapropter cum in tali affectu ipsa bili faciat negotium, nobis sat erit ventrem per inferisra purgare

Chirurgus in iis quæ ad phlebotomiā & purgationem attinent, nihil attentare debet, citra periti alicuius medici consilium.

Celsus.
Paulus.

purgare medicamento quod bilem trahat, in hunc modum: R. Purgatio.
 casie rec. extracta, diaprunis nou solutini, manna electa ana
 ℥ β. rhab. electi, infus. ℥ j. syr. viol. ℥ j. cum decoct. flor. &
 fructuum cordialium, fiat brevis potio. Si affectio sit exigua,
 sufficiunt clysteria huic similia: R. malua, viol. folior. la. Clyster.
 Anca, in ybi utriusque ana m. j. β. mercurial. m. j. sem. cn-
 turb., melon., porulaca ana ℥ ij. flor. nymphæ p. j. herdei
 ℥ j. coquantur in aqua suffic. ad tertius: cuius decocti libra uni
 admiscebis medulla casia fistularis ℥ j. hiera picra ℥ β olei
 viol. ℥ ij. ol. nymphæ ℥ j. salis communis ℥ j. β. fiat clyster.
 Post totius corporis purgationem ad tertiam intentionem acce-
 dimus, nempe reprimentia auxilia. Tertiam verò intentionem
 complens refrigerantia & reprimentia in principio fluxionis,
 exceptis casibus in capite uniuersali lib. primo procedente com-
 memoratis. Transactò verò principio, & stata iam fluxione,
 quod membrò inhaesit & impallum est, digerentibus sen enapo-
 rantibus medicamentis extrinsecus admois; vacuandum est,
 per occultam scilicet sensui transpirationem. Omnium siqui-
 dem huiusmodi sic prater naturam consistentium, vacuatio du-
 plex est Gal. 14 Therap. Vna quidem repellentium ad alias
 partes: altera foras digerentium, per eum qui sensum fugiat
 halitum. At quoniam erysipelas non quantitate modò affigit,
 sed etiam ex vehementi scilicet inflammatione, qualitate ipsa
 cruciat, ampliorem refrigerationem, quàm phlegmone requi-
 rit. Post totius igitur corporis (ut paulò antè dictum est) va-
 cuationem, reprimentibus auxiliis utemur, afflicta particu-
 lam, sen ipsam qua patitur curiam, ut decet, refrigerantes, præ-
 sertim cum sine manifesta aliqua occasione factum fuerit ery-
 sipelas. Est autem refrigerationis terminus, ipsa coloris
 mutatio. Etenim quod purum erysipelas est, statim cum hoc
 quiescit. Quod non purum est, sed iam quodammodo phle-
 gmonodes, si plusculum refrigeres, linidam curiam præfert.
 Sin ne sic quidem quis desistat, nigricat, potissimum in se-
 nili corpore: sic ut quædam ita refrigeratorum, ne digerentibus
 quidam postea medicamentis ad perfectionem possint sanari: sed
 scirrhusus quidam tumor in particula derelinquatur. Ergo sa-
 tius est (inquit Galenus lib. 4. Therapenticon) ubi laborau-

3.
Tertia in-
tentio.

Hic Guido
deprauatè
citatur Gale-
num.

Quærentis
refrigeran-
dum in ery-
pelate.

Lib. 14. Therap.

his particula alteratim colorem videris, à refrigerantibus retundentibusq; ad contraria, id est, dissipantia seu digerentia & exiccantia, transire, priusquam vel linida vel nigra prorsus fiat. Adhibenda semper cura est, ut qua illiuntur, perliquida sint atq; humida, eaq; sapins commutentur, ac per spongas frigido aliquo liquore imbutas, subindeq; admota sunt, abluantur: siquidem multis particula sermor celeriter in vaporem erumpens, hac desiccatur. Caterùm inter ea qua refrigerandi atque repellendi facultatem obtinent, in hoc affectu convenientem, laudat imprimis Anicennas ex simplicibus, persusionem aqua frigida. Galenum verò commendat succum solani, semperuini, portulacae, psyllij, alterci, id est, hyoscyami, lactuca, umbilici Veneris (qua herbula Graecis cotyledon appellatur) intybi, id est, cichorii, lenticula palustris, cucurbita, atque alia id genus. possemus & earundem herbarum liquoribus stillatiis particulam afflitam irrorare. Ceratum quoque ex aqua admodum frigida, quod recipiat quadruplum rosacei ad ceram albam. Sit autem rosaceum ex oleo omphacino, id est, immaturo sine sale confectum: quibus in pila emollitis aqua frigida superfunditur quantum potest recipi. Si verò aceti tenuis & pellucidi momentum admiscueris, praestantius atque efficacius medicamentum reddideris. Porro haec omnia actu frigida sunt admonenda, & subinde mutanda, priusquam manifestè incaleant aut arescant. Conueniunt & haec infra scripta: R. albumina ouor. unum. iij. ol. ros. completi 3j. ung. ros. Mes. succi plantag. vel solatri ana 3j. in frigid. Gal. 3j. β. misc. & super affectum locum reitertatis vicibus sapins impone. Vel R. folior. malua, viol., hordei decorticati ana m. j. coquantur in s. q. aqua; & contundantur: quibus confusis adde sem. cydonior. mucilag. de psyllio ana 3j. s. ol. ros. viol. ung. popul. ung. ros. ana 3j. misc. & cum cera liquefacta in mortario plumbeo subagitantur quoad & plumbi colorem & emplastri consistentiam acceperint. Vel R. ol. ros. ol. viol. ana 3vi. succi plantag. 3j. albumen oui, misce, & fiat linimentum. Minè prodest ung. ros. Mes. & ceratum Iohannis de Vigo, quod in omni huius affectus tempore impositum confert, itaque, nequid desideretur, hic apponendum statui: R. ol. ros. ung. ros. ol. viol. santal. alb. ana 3ij. succi plantag.

Materia refrigerantiam ex Gale.

Ceratum.

Ceratum Iohannis de Vigo.

plantag. solatri ana ℥ j. ꝑ. mucilag. psyllij, malua, violar. ana ℥ iiij. bulliant omnia vsque ad mucilaginum consumptionem. postea addatur cera q. s. Conducit etiam plurimum ad rem presentem, si pars erysipelate obfessa illinatur ceru:â solâ, vel mixta cum aceto & lycio, vel terra cimolia, aut singulari, cum solano; aut argenti spuma, cum rosaceo; item acacia cum aceto. Ad idem confert plurimum sequens compositio: R. succi plantag. ℥ j. rosacei ℥ iiij. litharg. nutriti ℥ j. ceru:â lora ℥ iiij. lactis muliebris ℥ ꝑ. misceantur omnia simul in mortario plumbeo; & fiat linimentum. Teri debent primum lithargyrium & ceru:â: deinde oleum & succus paulatim ac sensim affundi debent, donec exactè misceantur. Quod si amplio rem refrigerationem desideres, his & aliis prius enumeratis (ex Pauli sententia) admisceri potest opij aliquid, vel cicuta, vel mandragora. Verum ab iis & similibus, quæ stupefaciunt, abstinendum esse censeo cum Tagautio & Leono, nisi maxima urgeat necessitas. Caterum ubi inflammatio ægrotantis membri iam desit, ac feruor erysipelatis sese remisit, Galenus humorem in particula receptum, quam coniunctam materiam vocant, priusquam ex refrigeratione liuor appareat, discutit, hoc est, resoluit: imposito cataplasmate ex bordei farina, seu ex cruda polenta, ὠμὴν ῥόσιν Græcè vocant, & aliis in canone curande phlegmones lib. præcedente dictis, his vel fixilibus resoluentibus. Quemadmodum enim signa erysipelatis sumebantur ex analogia signorum phlegmones, ita & curationis ipsius erysipelatis auxilia, ex analogia remedium curationis phlegmonis sumenda sunt. Porro talia medicamenta, quæ dissoluendi, seu enaporandi facultatem obtinent, in hoc affectu conuenientem, plurima tum simplicia, tum composita referuntur à Paulo Aegineta lib. 4. cap. 21. item ab Aëtio lib. de re medica 14. Satius autem fuerit nunc unum ex multis recensere, quod omnium mihi præstantissimum visum est. Alibæ nonellæ foliorum pondo, id est, libra assumitur, concoquantur in hydrelæo: cocta verò probè terminatur, adiectoq; rosacei triente, id est, uncis quatuor, argenti spuma & ceru:â singulorum uncis duabus & semisse, id est, dimidia: iterum lenigantur cum succo coriani aut sempernini, aut solani: deinde micis panis adiunctis, ut emplastrum formam induat, illinitur. Quod

Compositum
medicamen-
tum;

14. Method.
cap. 3.

Evacuatio
coniunctæ
materiæ per
evaporantia.

Hydrelæum
est mixtura ex
aqua & oleo,
scu oleum di-
lutum.

Si liuoriam
locum occu-
pauit.

Quarta in-
tentio.

Doloris &
ardoris mi-
tigatorium.

Si erysipelas
exulceretur.

Septem de
erysipelate
a thorisui, co-
tam ipsius
curationem
summam
complecten-
tes, ex Gale-
no.

1.
2.
3.
4.
5.

si forte liuor iam locum occupauit, incisa ante cute, cataplasma superponendum est, persundendumq; locus, plurimum quidem (vs Galenus precipit) aqua calida: digerit enim & plagas abluir: sed & aqua, & muriâ interim conducet locum fovere, cum scilicet crassior est. hac enim crassitudinem incidunt ac deter-
gunt. Quarta intentio curationis erysipelatis, qua est acciden-
tium correctio, perficitur ut in curatione phlegmones dictum est lib. precedente, cum agebatur de reditu materia & induratio-
ne & corruptione. Item de dolore & ardore. Hac enim symp-
tomata etiam erysipelati, uti & phlegmonae, accidere solent. Por-
ro optimum doloris ac uehementis ardoris mitigatorum auxi-
lium sit ex foliis & radicibus hyoscyami inuolutis in stuppis, &
coctis sub prunis: deinde mixtis cum ung. quod populeon vul-
go appellatur, vel cum axungia, ut superius dictum est in cura-
tione phlegmones. Si uero contingeret ipsum erysipelas exulce-
rari, curetur ad morione ung. albi & ung. de lithargyro, quod
est: R. pul. lithargyri 3 ij. cerusa 3 ss. olei ros. ana q. s. fiat
ung. decoctum ad ignem, vel in mortario sine decoctione com-
ponatur: quod si his adderetur aliquid storie, id est, recrementi
plumbi, optimum sanè, atque efficacissimum foret remedium.
Sed praestat hic ex Tagauro, ut totam curationem erysipelatis,
hæc quibusdam sententiis in modum epilogi complectamur,
ut quæ diffusius à nobis supradicta sunt, memoria tenacius hæ-
reant. In exquisito erysipelate, sanguinem ne detrahit. Si bile
corpus abundet, & affectus magnus sit, ventrem medicamento
cholagogo, per inferiora purgato. Quod si exiguus morbus sit,
& corpus bile vacuum, à medicamento finam bilem per aluum
ducente, abstineto, & acri clystere contentus esto. Vniuerso, ut
oportet, corpore purgato, partem affectam per initia moderate
reprimentibus medicamentis, & abundè refrigerantibus, usque
ad coloris mutationem, persundito atque illinito. Vbi laborantis
particula alteratum colorem uiderit, & feruorem erysipelatis
iam remissum, ac inflammationem desisse, à refrigerantibus,
astringentibusq; priusquam uel linida, uel nigra prorsus parti-
cula fiat, ad contraria, hoc est, digerentia, san discrucientia & ex-
iccantia transito. Quæ ex ulceribus, alijsq; enidentibus causis
fiunt erysipelata, primum scarificato, deinde cataplasma ex
herdea-

ordeacea farina imposito. Si erysipelas non exquisitum fuerit, sed phlegmonodes, præsertim ubi sanguis in corpore exuberat, intrepidè sanguinem mittito. At nunc exemplum erysipelatis phlegmonodis & quasi œdematodis curati apponamus, ut doctrina hæc clarior evadat: nam præcepta sine exemplis obscura nimis & difficilia intellectu esse solent.

OBSERVATIO IIII.

*De erysipelate phlegmonode & quasi postea
œdematode, in corpore admo-
dum senili.*

AVVS pharmacopœi Arnoldi iunioris Delphensis, octuagenarius, incidit in erysipelas phlegmonodes; & crus dextrum à genu usque ad calcaneum rubore infectum est. ille verò imposuerat per quatuor dies aquam plantaginis, solatri, in qua semina cydoniorum infusa erant, cum aliàs laborasset simili affectu, & tali remedio in principio curatus esset. Ego autem ad hunc accitus 24. die Martij, (anno 1558) animaduerti non purum erysipelas, sed phlegmonodes esse, tendens nunc quasi ad erysipelas œdematosum. Crus licet rigidum videretur, compressum tamen digitis, fossulam faciebat leuem; & mutabatur nunc color ad liuorem & nigritiem quandam. hinc non erat purum erysipelas: ideoque ex eiusmodi remediis citius infrigidatum. terminus enim refrigerationis, teste Galeno lib. 14. Method. in ipso puro erysipelate est ipsa caloris mutatio. Etenim quod exquisitum & purum erysipelas est, statim cum hoc quiescit. Quod enim non purum est, sed iam quodammodo phlegmonodes, si plusculum refrigeres, liuidam cutem præfert. Sin ne sic quidem desistat, nigricat; & colorem naturalem prorsus amittit;

potissimum in senili corpore, ut hic erat. Imposuerat tamen pharmacopœus ex consilio chirurgi præsentis adhuc nutritum ex oleo rosaceo, viol., vng. popul. oleo nenupharino & litharg. commixtis in mortario plumbeo. Vnde adhuc magis crus induratum est, & plus ad nigritiem tendere cœpit. Contingit enim aliquando (ut in præcedentibus diximus) ut sic quædam ita refrigerantium, ne discutientibus quidem medicamentis ad perfectionem sanentur, sed scirrhusus quidam tumor in particula relinquatur. Ergo satius est, ubi laborantis particulæ alteratum colorem videris, à refrigerantibus ad contraria transire, priusquam vel liuida vel nigra prorsus fiat. Vbi itaque feruor ægrotantis particulæ iam desit, refrigerantibus admiscenda sunt discutientia medicamenta, idque priusquam liueat, ut aquam solani cum chamæmeli: vel imponendum cataplasma ex farina hordei & fœnugræci. Consultum igitur fuit inter nos & pharmacopœum, qui etiam antea chirurgus fuerat, ut farina hordei decoqueretur in aqua chamomillæ, maluæ, althææ, solatri, ad modum pultis, exiguo butyro adiecto. Nam & æger ipse alia linimenta ac vnguenta abhorrebat, cum & ipse diceret ex iis crus magis affectum fuisse, & ex linimento supra dicto malum peius euasisse. Interim præscripsi eidem iuleb ad alterandum calorem febrilem: nam cum febre vehementi erysipelas eundem inuaserat, ita ut is de peste suspicionem haberet: nondum enim consopita erat hoc tempore pestis illa famosa Delphis, de qua in lib. nostris Obser. & Curationum medicinalium egimus. Tale autem iuleb erat quod præscripsimus: *ʒj. syr. de cichor. cum rhabarb. oxyzacch. simplicis, syr. de end. ana ʒj. aquæ fumiterræ, cicoræ, end. ana ʒij. misce pro duabus vicibus. sanguinem non detraximus, eo quod senex esset, & principium mali iam præterierat. Purgavi autem hoc modo,*
cūm

cū viderem & pituitam & melancholiam adesse
 simul cum bile: R. rad. cortic. cichoreæ, endiuæ,
 dentis Leonis, fœniculi ana ʒ β. herbar. cichoreæ,
 dentis Leonis, fumiterræ, borag., bugloss summi-
 tatum lupul. capill. Ven. ana m. j. flor. cord. p. j.
 sem. anisi ʒ j. β. sem. 4. frig. maior. ana ʒ j. prun. da-
 masc. num. ix. iuiubar. sebesten ana num. v. vuar.
 pass. ab arill. mund. hord. mund. ana ʒ j. follicul.
 senæ ʒ vi. epithymi, polypod. querc. ana ʒ j. aga-
 rici ligati in pecia rara ʒ β. fiat omnium decoctio in
 sero lactis ad lib. j. coletur: colaturæ adde oxyzach.
 simplicis, syr. de cich. cum rhab. ana ʒ j. arom. cum
 ʒ j. specier. diarthod. abb. & clarificetur; & in di-
 cta decoct. dependeat puppa rhab. (electi scilicet)
 ʒ ij. β. spicæ gran. vii. Habuit ex vno haustu se-
 des tres, & postea cum febris reliquit. At crus cū
 aliquo modo ad nigritiem tenderet, consului ægro
 vt & chirurgus vocaretur; & vocatus est eo tempore
 M. Iohannes chirurgus, qui ad antiquum templum
 commorabatur. Communi igitur consilio, ad ma-
 iorem ipsius cruris emollitionem (nam durum erat)
 & ad resolutionem, appositum est decoctum viol.
 maluæ, plantag. hederæ arboreæ in aqua althææ,
 maluæ, exigua solatri & plantaginis aqua adiecta:
 idque per vnum atque alterum diem. at crus qui-
 dem mollius efficiebatur, & scirrhus ille quasi euane-
 scebat, sed quotidie nigrius euadebat, ita vt ad sup-
 purationem tendere videretur: & tunc etiam acci-
 tus est Cornelius Erius, eius medicus, qui eo tem-
 pore peregrè profectus erat, & nunc redierat. Cū
 autem ad suppurationem vergere videretur, malum
 metuebamus, ex Hippocratis aphor. 20. lib. 7 Ab
 erysipelate putredo aut suppuratio, malum. adhuc
 peius, eodem teste, apho. 19. libri eiusdem: In ossis
 exutione erysipelas, malum. Galenus hoc interpre-
 tatur in Commento, quod casus prauus est osse nu-
 dato carnem circumstantem videri ab erysipelate

138 . OBSERVAT. CHIRURGICARVM
 apprehensam. Nihilominus tamen cum in nostro
 hoc agro suppuratio adiuuanda & promouenda es-
 set, procedebamus cum violis, maluis, sem. malux,
 & sem. scenugræci decoctis in aqua simplici: in ea-
 que pecia linea demersa totum crus inuoluebatur,
 & optimè successit. sed in vno loco facta est quasi
 eschara; eâque cum butyro illinitâ, & iam quasi
 amotâ, hoc digestiuo vsi sumus: R. terebinthinæ
 lotæ in aqua ros. ʒ ij. ol. ros. ʒ ʒ. vitellum vnius
 oui: optima fiat commixtio. applicabantur cum fi-
 lamentis. Deinde optimè omnia successere, vt reli-
 quum curationis chirurgus commiserimus, ad eò vt
 breui vir senex conualuerit.

SCHOLIA.

RECTE diximus in precedentibus quòd erysipelas purum in
 corpore senili rarissimè aut numquam sit. Caterùm reme-
 dium singulare in principio erysipelatis habes apud Gal. lib. I.
 simpl. medic. cap. 6. ceratum humidum dictum ex aqua, vt
 Scholio precedente diximus. id enim refrigerat, & eos qui in
 febre vruntur si hypochondriis superponatur: & omnem phle-
 gmonem, similiter herpes quoque & carbunculos, tum erysi-
 pelata & phlegthla, ac breuiter omnes morbos calidos. Vide &
 eundem lib. 10. Therap. cap. 9. Caterùm tamen excellenter fri-
 gida non conueniunt in corpore senili, multoq; minùs in erysipe-
 late non vero, vt huic agro nostro enenit: nam licet in erysipe-
 late phlegmonoso semper in principio curationis intrepide ve-
 nam secare debeamus, vt Scholio precedente abundè ostendi-
 mus, dummodo ætas & cetera consentiant, hic tamen in corpo-
 re adeò senili non conueniebat. Caterùm quomodo curatio mi-
 xta sit adhibenda in erysipelate illegittimo, id iam satis ex præ-
 cedentibus liquet, tum etiam ex lib. 1. de tumoribus præter natu-
 ram Obser. 6. in qua posuimus exempla phlegmonis illegittimæ
 & phlegmonis erysipelatodis: semper enim illi, quod exuperat,
 magis resistendum: eodèque modo in omnibus aliis erysipel.
 compositis procedendum. Nam ubi quoque œdematodes sūt,
 multo minùs refrigerandum, sed magis resoluenndum & exic-
 candum.

Vide Gal.
 lib. 1. de
 simpl. med.
 facult. cap. 6.
 in quo ostendit
 aqua non
 frigefacere,
 ex cerati ef-
 fectu, quod ex
 ea conficitur.

candum. ubi verò scirrhus, magis emolliendum. Sed satis est nos exempla plura in libro precedente posuisse, & his etiam hæc de corpore senili adiecisse. Nunc igitur ad illos tumores præter naturam accedamus, qui cum erysipelate societatem habent.

OBSERVATIO V.

De Herpete esthiomeno.

NO B I L I S Matrona 35. annorum, mulier valdè obesa & crassa, ac prorsus plethorica & cacochymica, incidit in herpetem esthiomenon: chirurgus verò qui eam tractabat, formicam more barbarorum & Auicennistarum appellabat. Herpetes enim (ut latius in Scholio sequenti dicturi sumus) qui ad erysipelata referuntur, duplices specie sunt, miliares scilicet & exedentes, quos esthiomenos Græci appellant. utramque speciem Auicennæ interpretes Formicas vocavit, sed eas cum verrucis illis, quas Græci myrmecias appellant, Latini Formicas, nominis similitudine deceptus, eodem capite turpissimo errore commiscuit. Cæterum hæc nobilis matrona per plures dies in pede isto exedente herpete affecta, per chirurgum, qui tunc accitus erat, curari non potuit, topicis adhibitis remediis; idque non sine causa, cum & Auicenna quarto quarti tract. 3. cap. 9. dicat: Horum malorum vlcerum curatio optima est mundificatio corporis, aut membri ipsius, si corpus fuerit mundum cum eo quod mundificat ipsum solum ex ventosis, sanguifugis & epithematibus rectificandis complexionem. Dixit Galenus 14. Therap., & ponitur à Rhase 13. Continentis: Cum in formica (intelligit autem herpetes) aliquis procedit in cura cum laxatione cholerae rubeæ, superponendo postea medicinas formicæ repercussivas, sanabitur.

bit formicam . Sed si ipse non purgauerit corpus, neque inhibuerit, ne influat humor ad locum ; cum reperiussis, sed breuiter tendat ad solidationem, non curabitur, sed excoriabitur, & vlcerabitur locus alius proximus illi inseparabiliter, nisi euacuetur primus humor. Et idem dicit Auicenna : Cum non incipis in ea cum euacuatione humorum secundum quod oportet, imò medicaris vlcus cum eo quod sanat ipsum vlcus, scilicet cum consolidationis, redit ex alio loco cum nocumento. Nam augetur & spargitur, & occupat alium locum, & non cessat facere corrosionem. Quia sanantia vlcus sunt exiccantia, quæ apposita ante euacuationem & materię minorationem, non sunt potentia multam materiam exicare. sed fiunt causa retentionis eius in profundo, & sparsionis eius ad partes circumstantes. Si ergo curetur ante euacuationem per exiccantia, & si sanetur per ea; tamen postea redit eum maiori nocumento vel in ipsa parte, vel in alia. Ita euenit huic chirurgo, vt malum itæcrus corroserit & ab herpete exedente in phagedænam, id est, vlcus depascens transmutatum fuerit. Est autem phagedæna species vlcus depascentis (quod vulgo lupum vocant:) nam & totam carnem vndique exedebat. & chirurgi imperitia, qui per totam æstatem & maximam partem autumnu cruri frustra topicis medicabatur, vt circa talum paulo altius totum crus ad os vsque depascendo serpsisset, tandem per transuersum totum crus penetrans inter ipsa ossa perspicuè vlcus depastum videretur. Ad hanc itaque matronam ipse tandem Kalendis Nouembris anno 1554 vocatus, cum malum adeò progressum prius ex herpete in phagedænam adeò horribilem spectassem, plurimum metuebam, cum vlcera illa, *vulgi* Græcis dicta, quæ subiectam carnem vndique exedunt, velut vlcera omnia illa quæ cacoëthe, hoc est, mali moris aut maligna vocantur, diligenti curatione

atione indigeant. Quare potionibus prius institutis hoc malum superare primò tutius videbatur, vt fè in lue Gallica fit; deinde ad topica demum deuenire decreui. Hanc igitur potionem præscripsi: R. afuræ ligni guaiaci cum cortice limatæ ʒ ij. β. acetosæ, scabiosæ, fumiterræ, agrimonix ana m. j. solarij, borag., buglossæ, endiuix, cicoreæ, dentis leonis, flo. hypericonis, chamædryos, pentaphyllonis ana m. β. absinthij Romani p. j. santal. omnium, of. squinanthi, spodij, cortic. rad. thamarisci ana ʒ j. sem. anisi ʒ j. β. folliculor. senæ ʒ vi. epithymi, polypod. querc. ana ʒ j. prun. damasc. num. vii. ruar. pass. ab arillis mundat. ʒ β. fiat omnium secundum ordinem decoctio in aquis fumiterræ, lululorum, scabiosæ, acetosæ ad lib. ij. stent per noctem super infusionem: demum coletur cum forti express. cui addas rhab. electi ʒ j. spicæ ʒ β. ligatum in puppula rara cum filo, syr. de fumoterræ, acetosi simplicis ana ʒ j. β. bulliant leui ebullitione, & arom. cum ʒ ij. specier. diarrhod. abb. & ʒ j. β. cinamomi electi, deinde albumine oui depuretur, & fiat potio clarificata diligenter secundum artem. Sed & puppæ rhabarbari adiciebatur ʒ j. agar. trochis. Ex qua potione sumebat semel aut bis in die, exprimendo puppulam dictam secundum operationem medicamenti: & habuit omni die semper quatuor aut saltem tres secessus. Finita hac portione, intermisso vno atque altero die, dosim follicul. senæ auximus ad ʒ j. imponendo epithymi, polypodii ana ʒ ij. tertia deinde vice reiteratæ potioni folliculor. senæ ʒ j. β. epithymi, polypodij quercini ana ʒ ij. quibus potionibus vlus consolidari cœpit, tiam vrente chirurgo nunc opportunissimè iisdem opicis remediis, quibus antea pessimo iudicio & importunissimè vlus fuerat. ex quo constat quantum valeat methodus vera curandi, & quantum distet medicus ratione vtens, & regulis prædecessorum

rum

rum institutus, ab eo qui nulla methodo vititur. Cæ-
 terum cum hanc matronam præ manibus habe-
 rem, venit mihi in mentem Iacobus ille Verhœc-
 uius affinis M. Iohannis Tiengij medici Amstelro-
 damensis egregij, qui pariebatur formicam seu
 herpetem & vlcera ambulatiua in coxa ferè per to-
 tam ætatem anni 1524. cui & hæc præscripta sunt
 ab eodem medico: R. guaiaci rasuræ ʒ iij. acetosæ,
 scabiosæ, solatri, pentaphyllonis, agrimonix, fumi-
 terræ ana m. j. borag. bugloss. florum hypericonis,
 chamæd., chamæpit. ana m. ʒ. corticum citri ʒ iij.
 squinanthi, spodij ana ʒ ʒ. ligni thamarisci ʒ iij.
 fiat decoctio in aqua acetosæ, lupul., fumiterræ pro
 lib. ij. & exprimatur. cui adde syr. de fumo terræ,
 syr. de acetositate citri, syr. de epithymo, syr. aceto-
 si simplicis ana ʒ j. misce. Deinde exhibuit has pilu-
 las: R. pilul. indarum, de fumo terræ ana ʒ j. turbiti
 electi, rhab. electi ana ʒ ʒ. agarici trochis. epithymi
 ana ʒ j. zinz. spicæ, salis gemmæ ana ʒ ʒ. trochis. de
 myrob. citrinis ʒ j. cum aqua passul. fiant pilulæ,
 decem ex qualibet drachma; addendo scammonij
 gr. v. fumebat tres vel v. secundum tolerantiam
 solutionis cum aqua lactis post mediā noctem. Ad
 vlcera capiebat rasuræ guaiaci lib. ʒ. centaury mai-
 oris, hypericonis, auriculæ muris, acetosæ, arnoglos-
 sæ, agrimonix, folior. oliuæ ana m. j. alum. ʒ j. fie-
 bat decoctio in lixiuio sarmentorum vitis, adden-
 do parum aceti, ne mordicationem faciat. Subtepi-
 da hac decoctione vlcera lauabantur & balneaban-
 tur. Deinde chirurgus vng. & emplastra solita ap-
 ponebat. Postea pannus accipiebatur lineus, made-
 factus in dicta decoctione, & superponebatur em-
 plastris, & circumligabatur deinde cum fasciis. Sed
 & Nicolaus in vlcerebus cauernosis, autoritate Al-
 bucasii, lixiuium tale componebat ex cineribus li-
 gnorum ficus vel vitis, vel ilicis aut quercus: & cre-
 do quod si fuerit ex rosemarino, esset optimum.

Dixit

Dixit Galenus, & idem probatur à Nicolo cap. de
ura vlcerum ambulantium, quòd auricula muris
gregiè confert membris putrefactis, & prohibet
putrefactionem, eo quòd exiccet sine punctione,
per fetantum superposita, aut cum vino, admixto
nelle & nitro trito. Similiter dicit quòd hypericon
exiccet omne vlcus: & ideò tritum impositumque
vlceribus putrefactis, mollibus & inflatis, eadem
sanat.

SCHOLIA.

TVMORES illos præter naturam, qui cum supra compre-
henso erysipelate societatem habent, atque ad ipsum quo-
dammodo pertinere videntur; ex bile autem non naturali, &
secreta, id est, aliis humoribus minimè permixta, generationem
trahunt, recentiores tum medici, tum chirurgi, pustulas malas
holericas appellant: Græci verò (ut Hippocrates, Galenus &
Paulus) Herpetas vocant: quæ vox Latinis ferè sonat, malum
quod serpit: ἐρπεω enim idem quod serpo, unde ἑρπης serpens di-
citur. Herpes tamen non absolute malum quod serpit, significat
pud medicos, sed certum morbi genus, de quo nunc agitur.
Eaque malum quod serpit, latius patet quàm Herpes. Nam &
phagedæna serpentia vlcera dicuntur, & quæquam in hac no-
minali maiora ex herpete phagedæna seu vlcera serpentia oborta
sunt, nos non de illis vlceribus phagedænicis, quæ & nomides di-
cuntur, sed de herpete agemus. Huiusmodi autem vniuersas pu-
stulas Auicennas formicas appellat: Galenus verò eas inter
inflammationes adnumerat: sed Celsus sub ignis sacri nomine
as intellexisse videtur lib. 5. cap. 24. Fit igitur Herpes, quando
aus bilis, non naturalis, sola & secreta, id est, nullo alio illi
mixto humore, in particulam aliquam confluit, atque ibidem
insistit. quæ si consistentia sua crassior sit, acriorque, totam exul-
trat cutem, usque ad carnem suppositam, vocaturque; tunc
initium huiusmodi Hippocr. & Græcis ἑρπης ἐκ δὲ ἰδίου, La-
tis verò exedens, vel depascens: & 14. Therap. Galeno ab-
luto nomine Herpes. At hic affectus barbaris quibusdam, ut
alefro, herpestionemum, qui voces Græcas corrumpunt, dici-

Pustulæ ma-
læ & chole-
ricæ vulgo
dictæ.
Herpetes.

Formicæ
Auicennæ.
Herpes.
Ignis sacer.
Herpetis spe-
cies dux.

Y.
Eρπητις ἰδίου
ὑποῦ, id est
exedens vel
depascens.

tur est animi, ut idem refert, ulam quod interpretatur, seipsum
 comedens, ex genere serpentis, quando non inuenit hominem
 vel animal quod mordeat, vulnerat se ipsum. & ideo dicitur
 quasi serpens edens se ipsum. Si autem ulcerat suppositam car-
 nem, herpestiomenum appellari volunt: si autem ulcerat cutem,
 simplici nomine herpetem vocari volunt. Hinc idem Valescus,
 si, inquit ex mente Galeni, cholera rubea mittatur ad totum
 corpus, facit isteritiam. Si vero fuerit expulsa ad aliquod mem-
 brum, facit morbum, qui vocatur herpes, non profundando se in
 membro. Et si fuerit cholera grossa & corrupta, corrodit vel ul-
 cerat cutem usque ad carnem suppositam inclusam, & facit
 herpestiomenum. & si non sit ita acuta, causat formicam milia-
 rem: si est multo grossior, facit gangranam. Sed idem postea
 confundit herpetem esthiomenon cum vera gangrana, id est, mor-
 tificatione, ut postea ex signis qua ponit & curatione liquet,
 quam diximus Schemio Obs. 13. libri precedentis, & sideratio-
 nem & esthiomenon vocari, qua etiam ab ipso tum Guidone
 ignis Sancti Antonij vel Sancti Martialis vocatur. Sed nos,
 omisso Valesco, de vero Herpete esthiomeno agimus: scilicet ex-
 edente & depascente, differente tamen a gangrana, in qua &
 membri mortificatio & dissipatio fit. Si vero tenuior & minus
 acris, calidaque fuerit bilis, pustulas exiguas per summam cutem,
 id est, in sola superficie cutis (hanc enim tantum veluti deurit)
 milio, hoc est, milij seminibus similes excitat: ob quam similitu-
 dinem affectus tunc Latinis miliaris herpes nominatur: Græcis
 vero quibusdam post Hippocratis ætatem *κρύζεις*, ob eandem
 rationem dictus est; *κρύζεις* enim Græcis, milium nobis dicitur.
 Atque hæc species, Galeno autore lib. 2. ad Glanconem, generis
 sortitur appellationem, cum simpliciter & sine additione illi her-
 pes vocetur. Alibi tamen herpetis nomine, Galenus herpetem
 esthiomenon, id est, exedentem, intelligit: ut paulo post dicitur.
 Herpetem vero Fernelius papulam vocat. Est autem ardor (in-
 quiens) cutem serpentibus minimis pustulis exasperans ac ro-
 dens; Græcis Herpes appellatur. Ea quidem duplex, una simplex,
 qua herpes est miliaris; altera fera, qua herpes exedens nuncupa-
 tur. Papula fera ruptis pustulis veram cutem exulcerat, rodit
 atque depascit: serpit in latus atque in altum; ex eaque vlcuscula
 manent

2. Herpes
 miliaris siue
 genchrias.

Papula sim-
 plex.

Fera.

manens arida. Papula simplex & mitior summam cutem exasperat, & sub una epidermide consistit, exiguas illas pustulas excitans, quæ minimè extant aut prominent, nilio haud absimilis. Vtraque in vicinas partes quasi in orbem quoquo versum serpit, sed diffundit, ac plerumque medium sanescit, extremis longius procedentibus. Papula exulcerata erysipelati summè affinis est, ut idcirco nonnulli in genus idem confundant: hoc tamen discriminis intercedit, quòd erysipelas conspicua fluxione de repente emergit, herpes verò seu papula sensim multoq; tempore, nec conspicua fluxione efflorescit. Herpetis pustula arida sunt, è quibus ruptis nec sanies nec pus exit. Erysipelatis pustula sunt magna, exulcerata & humida, quæ saniosum pus effundunt. Herpes pruritu, erysipelas dolore ac ardore torquet. Omnis papula diuturna est, prorsus febris expers; nec nisi tempore sanescit. Erysipelas verò ferè cum febre est, praeceps, & quod breui vel sponte soluitur. Vtriusque herpetis materia continensq; causa, bilis est sincera, supernacua; eaq; ardentissima, cuiusmodi praefina vel arginosa, quæ sensim nulloq; fluxionis impetu è venis expurgata, tenuitate partes omnes precipueq; carnosas, transgreditur, dum densiorem cutem attingas. At verò crassior ea atque glutinosior est, quam in erysipelate, ac proinde diutius atque tenacius in cute haeret ac subsistit. Quæ igitur glutinosior fuerit, simulq; actior, in cute tota remoratur, pustulasq; mouet, quibus ruptis exulcerata cute, papula fera emergit. Tenuior verò cutem etiam penetrat, coerciturq; in sola epidermide; quam si sudoris modo nequeat transire, erodit, & pustulis intercurrentibus exedit. At herpes miliaris, non protinus vlcus facit, ut alter quæ exedens dicitur: sed, ut dictum est, admodum exiguas pustulas ad speciem milij excitat, quæ & ipsa interposito spacio, ac procedente tempore, cum disrumpuntur scilicet, in vlcus abeunt. proinde non sine ratione Oribasio & quibusdam aliis, etiam ante Galeni tempora, visum est, in eiusmodi vniò, bili esse aliquid pituitæ tenuis admixtum, quæ pustulas illas minutulas procreat. Vnde & nonnullis pustulosus herpes dictus est. Alter verò, qui èst hiomienos appellatur, non ita pituitæ commixtus est, sed exalta bilis, ac nullo alio humore infecta, esse videtur: idèoque cum erosione accidit, affecta cutis continuitatem prebendente,

Quibus differat herpes exulceratus ab erysipelate.

Ex Paulo & Galeno.

Lib. de tum. præter naturam.

unde & nomen illi impositum est. Esthiomenos enim idem est quod erodens vel exedens. Atque hic affectus (ut & Tagantius ex Galeno annotavit) eiusdem quidem generis est cum pustuloso atque exulcerato erysipelate : à quo tamen differt humoris ipsius biliosi (ex quo vitium utrumque habet) tenuitate. Id quod testatur Galenus his verbis : Est enim (inquit) admodum tenuis humor, qui herpetem excitat; adeo profecto, ut non solum omnes interiores partes, quæ utique carnosæ substantiæ sunt, transeat, sed etiam cutim ipsam ad summam usque cuticulam (epidermida Græci vocant) quam solam, propterea quod ab ea remota sit, cum erodit, cum exedit: quando si hanc quoque sudoris vice transiret, haudquaquam ulcus excitaret. Quippe id ulcerum quæ ex mordente humore oriuntur, quæ nimirum spontanea vocant, commune est, quod humor qui ea facit, sistitur in exitu, ac tardat. Hactenus Galenus: ubi nomine herpetis simpliciter & sine adiectione, intelligit herpetem esthiomenon, ut ex ipso contextu signis & curatione, facile estprehendere. Atque ita illo in loco generis sortitur appellationem, cum simpliciter & absolute herpes nominetur: quemadmodum & in illo libello de moribus præter naturam, ubi de eo sic idem Galenus ad verbum scribit: Depascitur quidem & herpes, vicina, id est, ea quæ in circuitu sunt, erodens: verum solum curis est exulceratio. Caterum utramque herpetis speciem, id est, tam milia-rem quam exedentem, sub nomine formica Barbatæ ferè omnes neoterici comprehendunt. Quibus ea in re, ut & in multis aliis, erroris occasionem primum præbuit Anicennas, qui nominis similitudine deceptus, quoniam Græci myrmecias, id est, formicas genus quoddam verrucarum vocant, eodem capite verrucas illas cum herpetibus errore sædissimo commiscuit. Guido tamen discrimen ponit inter herpetem & formicam, confunditque nomen formica modo cum verrucis (quas myrmecias & acrochor-donas Græci vocant) modo cum herpete exedente: qui (comedens, inquam, herpes) modo etiam illi herpestes, modo herpes absolute nominatur: putaturque eidem nihil aliud esse quam erysipelas pustulosus & ulceratus. Cum tamen ille (ut ex Gal. adductum est) ab hoc differat humoris tenuitate. Tenuior enim est bilis, quæ herpetem creat, quam quæ ulceratum erysipelas. At hoc

Lib. 14. method. med.

Humor biliosus qui herpetem excitat, admodum tenuis est.

Herpes folius cutis est exulceratio.

Anicennas myrmecias confundit cum herpetibus.

Guidonis error maximus.

hoc erysipelas quod cum exulceratione incidit, nō tantum cutem, sed cum ea etiam aliquid subiecta carnis occupat. Herpes vero, quo de hīc agitur, solam cutem apprehendit, exulceratq; . Itaque tametsi hac eiusdem sint generis, (ut Galeno visum est) non tamen omnino sunt idem. Porro pustulas illas, quae Anicenna interpreti, & imperiti medicorum turba, morbilli appellantur, sub herpese comprehendisse videtur Hippocrates lib. 1. Epidemiorum. Fiant autem morbilli eiusmodi a tenuiore materia, quam pustula illa, quae vulgo variola dicitur. Haec enim (ut voluit Anicenna) ex sanguine, illi vero ex bilis sanguinisque sunt mixtione. Si quis autem desiderat, quo nomine eiusmodi pustulae apud antiquiores dictae sint, diximus Latinis à Plinio vocari papularum & interdum pituita eruptiones: Graeci vero Hippocrati ecchymata lib. 3. Epidemiorum: Galeno autem exanthemata. Caeterum utriusque herpesis nota, indicia & causae ex precedentibus satis innoscunt. Superest igitur ut eorum curationem subiiciamus. In curandis herpetibus, sicut & in aliis eiusmodi spontaneis ulceribus, quae ex mordenti & acri humore oriuntur, tres scopi communes sunt observandi. Primus est, ut humoris in partem affectam confluxio inhibeatur: secundus, ut quicquid in laborantem particulam confluxit, & eidem inhaesit, vacuetur: tertius, ut saneitur vlcus. Primum scopum assequimur, totum corpus medicamine, humorem (unde vitium enascentur) educens, expurgando: mox repurgato corpore humorem influentem reprimendo, regerendq;. Ergo in herpese exedente, medicamento videndum est, quod flavā bilem per alnum exigit. Hunc enim purum ac syncerum (ut diximus) biliosum procreat succus. Proinde sit ut quantum ad totius corporis evacuationem attinet, medentes herpetas similiter ut erysipelata curare oporteat. Itaque quoniam tenuis humor est, qui id vitium creat, abunde est Galeno, etiam alnum leniter soluisse, vel urinas per ea quae id modicè efficiunt, cisse. In altero vero herpetum genere, quem à similitudine quam habet cum milio, miliarem & cencbriam Graecè appellari diximus, medicamento opus est, quod mixta sit facultatis, hoc est, quod bilem simul & pituitam educat. Quibusdam enim non sine ratione (ut Galenus ait) visum est in eiusmodi vitio bili esse aliquid pituitae admixtum. Porro

Herpes est
ecchymenon
& erysipelas
ulceratum
non omnino
idem esse.

Morbilli ex
herpetum
sunt genere.

Variolae.

Papularum
eruptiones,
ecchymata, &
exanthemata.

Herpeticus
curatio tres ha-
bet scopos.

Primus
scopus.

Herpes ex-
edens medi-
camentum
exigit cho-
lagogon.

Herpes mi-
liaris medi-
camentum
desiderat
quod bilem
simul & pi-
tuitam edu-
cat.

Reprimendi
tempus.
lib. 14. The-
rap.

Non esse re-
primendum,
si multus sit
vltimus hic-
cus.

Regerentium
materia.

Quæ refrige-
rant pariter
et humectant
num conue-
niant herpe-
tibus exacer-
batis.

Reprimentia
herpetibus
exacerbatibus
accommoda.
2.

Hæc com-
plent secun-
dam inten-
tionem.

Cataplasma
mali punicii.

vacuato, ut decet, eo qui in corpore redundat, ac vitium com-
mittit, humore: medicamentis utendum est, quæ influentem hu-
morem reprimant, regerantq;: Tuior namque ac convenientior
tunc fuerit eorum usus. Quandaquidem (inquit Galenus) si quis
exiguam vitiosi humoris, post rite factam purgationem, adhuc
in corpore remanens ad viscera, & magnas venas redundat; nul-
lum profecto quod sensu percipiat, malum committet. At si
eius non tenuis quantitas sit, in princeps aliquod membrum ali-
quando protrahit. Vbi scilicet prius natura viribus totum cor-
pus expurgantis, non sit, vel per deiectionem, vel urinam: vel
cuius ex toto corpore includit, vacuatus. Ceterum reprimunt
quidam: regeruntq; non solum ea quæ adstringunt: sed
etiam quæ sine adstrictione refrigerant. Cuiusmodi sunt: lactuca,
polygonum, ex stagnis lens, portulaca, setis, semperivivum, &
id genus alia, quæ erysipelatum valde erant opportuna. Verum
eiusmodi medicamenta, quæ scilicet præter id quod refrigerant,
etiam humectare naturam apta sunt, herpes præsertim depa-
scentes, minime desiderant: sed sola ea admittunt refrigerantia,
quæ etiam maxime possunt aridescere. Quæ enim refrigerandi,
atque vna exiccandi vim habent, sed mediocrem (cuiusmodi est
solanum) non satis illis conveniunt. Apponere igitur ipsi oportet
ex Galeni consilio, ab initio quidam, ex vito capreolas, & fo-
lia rubi, & rubi canini, & arnaglossi. post hæc verò & lenticulo-
lam his adungere oportet, & aliquando mel, & farinam hor-
deaceam. Item cataplasma sine semperivivo, quod ad phlegmo-
nas, quæ ex fluxione enerviunt, inferibitur. Repellit enim quod
influit, atque id quod in parte affecta conuiescit, exiccat, &
membra corroborat. Proinde transacto morbi principio efficax
erit remedium. Itaque fiet eiusmodi cataplasma ex corticibus ma-
lorum punicorum in vino decoctis, & rhu siue rhoë, id est semi-
ne coriarij fructicis (quod posteriori medicina sumach appella-
tur) & farina hordei. Ceterum hoc cataplasmate secundam in-
tentionem, seu scopum curandi herpetis probe assequeris: quippe
cum sufficienter digerere possis, quod iam in affectum locum con-
fluxerit. Constat untem, quod in generatione ulceris exuperare
debent quæ reprimendi facultatem habent: ubi verò non am-
plius consinit in egrotantem particulam vitiosus humor, quæ di-
gerant.

gerunt. Quod ad tertium scopum attinet, qui vlcus sanandum proponit, summam hac te cognoscere oportet. Nempe quod omne vlcus sine sponte sine ex accidenti factum fuerit, exiccare desiderat medicamento, ut inquit Hippocrates, non aspero, hoc est, non mordente, neque vehementer irritante, prater quam ubi malignum & cum purulagine fuerit. Talia enim (inquit Galenus) acriora expetunt medicamina, & quæ ignis vires habeant: quale est mysi & chalcitis & arsenicum & calx & sandaracha, atque id genus alia, quæ non aliter quàm ignis adurunt. Loca igitur exulcerata in herpete exedente, inungenda sunt pastillis seu trochiscis, in libris qui pharmaceutici dicuntur ad herpetas inscriptis: qui cum res exigit, ut illis utamur, passio, vel vino aliquo dulci, vel si dulce non adsuerit, vino tenni & subaustero non minùs veteri (hoc est, quod non aliquam in gustu ob antiquitatem contraxerit acritudinem) aut posca aquosa (quod oxycraton vocant) diluuntur. Paulus his vititur remediis ad herpetem, qui sub cute affligit. Reirimentum plumbi, rubea leuigato succo excipitur, aut ceratum myrtem vice rubea. Aliud: lana veteris illota, circa sedam combusta drachma duodecim & semissis, id est, dimidia, cera drachma viginti quinque, recrementi plumbi drachma, seu capilli curati lotiq; ex aqua drachma viginti quinque, myrtei uncia quinque. Ad herpetas vero acutè seu acriter depascentes hoc remedium iubet admo-
 ri: Cory mali punici dulcis drachma sex, argenti spuma tan-
 tundem, lana illota, seda seu sedaceo ligno adhaerentis & com-
 busta drachma tres, cera drachma duodecim; cerusa drachma
 octo; thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, vino aut myr-
 teo excipiuntur. tam verò in longum tempus protractis vlceri-
 bus, neque vino dulci, circuli parui, id est, trochisci, & huius-
 modi alia medicamenta, quæ ad herpetas scribuntur, dilui de-
 bent; sed neque pusca adhuc aquosa, quin potius vino satis au-
 stero, præcipuè verò nigro, vel (si id non affuerit) albo. Medi-
 camenta autem in hoc tempore, hoc est, inueteratis iam vlceri-
 bus efficacis & maximè accommodata sunt pastilli Musa & An-
 draque & Polyde: quorum descriptiones apud Paulum & Aë-
 tium & Gal. inueniuntur, & in fine carbunculi posite sunt.
 Item trochisci qui Calidicon & adaron dicuntur. Antenna &

3.
 Vlcus cura-
 tio in herpe-
 te, quæ ter-
 trus est sco-
 pus.
 Vlcus omne
 exiccare desi-
 derat.
 Lib. 2. ad
 Glauco.

Loca exulce-
 rata quibus
 inungenda.

Posca vel
 pusca.

Remedia ex
 Paulo sum-
 pta.

Ad herpetas
 depascentes.

Ad inuetera-
 ta iam vlcera.

Si pustulæ
miliares in
vlcus abeunt,
quid agen-
dum.

Lib. 7. ad
Glauc.

recentioribus, quorum descriptiones ex lib. 6. apud Tagarium
requirenda. Herpetas verò, qui tantum summam cutem exul-
cerant, ut sunt, quos miliares diximus, nullo horum medica-
mentorum superius commemoratorum (si saltem Galeno credi-
mus) innungere oportet. Vehementia enim sunt ac validè exiccā-
verim istis sufficiunt quæcunque vim glauci, id est, memithæ,
habent; eaq; diluere oportet, maxime quidem aquā. Quod si
hac nihil profecerint, etiam acutum miscendum est. Quod si et-
iam solani succo intinxeris, aut arnogioli, magis adhuc inue-
ris. Sed hac quæ iam diximus de Herpete, exemplis sequenti-
bus manifestiora evadent.

OBSERVATIO VI.

De herpete exedente, & de exulcerato.

IVVENIS quidam cum herpetem exedentem cir-
ca diaphragma haberet, huic decoctum sequens
præscripsimus: R. acetosæ, hepaticæ, herbæ liche-
nis dictæ, solatri, viol., sumiterræ ana m. j. prun. da-
masc. num. xij. epithymi ℥ ij. bulliant in sero la-
ctis, in cuius decocto infunde per xij horas rhab-
electi ℥ j. spicæ ʒ β. colaturæ infunde cassiæ rec. tra-
ctæ ʒ β. pulpæ thamarind. ʒ iij. syr. ex infus. ros ʒ j.
misce. Pro cibo hordeatum dedi, & ius parvi pulli
alteratum cum lactucis & agrestæ, portulacæ; & ute-
batur iisdem herbis: & loco potus sumebat aquam
hordei seu prisanæ communis. Et quia tendebat ad
aliquam adustionem & malitiam, præscripsimus li-
nimentum ex lactucâ, portulacâ, nenuphare, hepa-
tica, solatro, plantag. & rubo, hordei cortice, granat.
& capreolis. quæ etiam apposita ante ulcerationem
conveniunt. etiam sola aqua madens ex truncò vitis.
At Erigius præceptor meus Bononiæ in Hospitali
mortis in puero habente formicam in dorso seu her-
petem, commodè usus est sequentibus remediis:
R. malvaif., malvæ, matroni viol. ana q. s. cum
butyro

butyro fiebat cataplasma, & loco affecto applicabatur. deinde inunctus est locus cum vnguento cerusæ & paulo butyri simul mixtis, & locus cum aqua maluarū. Profluit in tenello. Utendum tamen magis exsiccantibus & infrigidantibus. Vide Auic. 4. primi xxj. cap. Sed cū fieret corrosio & vlcera ambulancia, ad magis exsiccantia deuenimus. quale est vng. de plumbo; cuius descriptio ponitur in Antidotario M. Bartholomæi Montagnanæ. Valer, secundum eundem, in excoriationibus & inflammationibus membrorum in vlceribus fraudulentis corrosiuis & ambulatoriis, & in antiquis gangrenis ceterum & aliarum partium. sic autem componitur: ꝛ. plumbi vsti ꝑ ij. lithargyrii ꝑ j. cerusæ lotæ, aceti ana ꝑ ß. ol. ros. ꝑ iij. mellis ros. ꝑ j. vitellorum ouorum num. iij. myrrhæ ꝑ ß. ceræ q. s. Sed & puella quædam 20. annorum Delphis anno 1538. per totum hypochondrium herpete vlcerato laborabat, & paulatim per medium corpus serpebat: multi eam primò peste infectam putabant: alii hoc malum lingua vulgari *ommeloop*. vocabant. Hæc autem multis muliercularum remediis tum empiricorum frustra vsa erat. adhibuerat autem & aquam solatri, & solatrum ipsum, tum infinita remedia, quibus nihil proficiebat: nos tandem vocati duas cucurbitas cum scarificatione & natibus & scapulis affigi iussimus, sanguine pauco bilioso & melancholico extracto: deinde per os exhibuimus decoctum senæ, & infusum Rhab. & vsi sumus syrupis aptis, vt de fumo terræ, de cichorea cum rhab. lupulorū & similibus. postea fouimus locū, ad sedandum etiam dolorem & mitigandum calorem, decocto maluæ, in quo semina cydoniorum infusa erant: sed cū nihil proficeremus, hoc linimento adhibito cœperunt vlcera saniem profundere, & paulo post ipsa cum admiratione conualuit. linimentum tale erat: ꝛ. resinæ terebinthinæ lotæ cum aqua

aqua ros. \mathfrak{z} j. ol. rosacei \mathfrak{z} β . ouorum lutea num. ij. succi d^orum malorum aranciorum dulcium; com-
mixtis omnibus fiebat linimentum. Quod si vlce-
ratio tum corrosio processisset, trochis. Auic. Alan-
darum distemperassem cum vino styptico, aut cum
aceto lymphato, & obliuisssem. cuius hæc est descri-
ptio: R. cap. granatorum \mathfrak{z} x. alum. de pluma \mathfrak{z} iiij.
calamenthi \mathfrak{z} xij. drag. \mathfrak{z} xij. myrrhæ \mathfrak{z} iiij. olibani
 \mathfrak{z} vii. aristoloch. \mathfrak{z} xij. confice cum aqua mellis,
& fac trochyscos. Alij addunt gallas virides. Valdè
sunt styptici & exiccantes: ideo valent in ulceribus
& in omni casu vbi est necessaria exiccatio & re-
strictio.

SCHOLIA.

Causa herpe-
tis esthiome-
ni seu exeden-
tis.

QUID sit herpes esthiomienos & exedens, iam Scholia
precedenti diximus. & ex iisdem iam dictis constat eius-
dem causa. Fit enim; quando flava bilis, non naturalis, sola
& secreta, id est, nullo (saltem sensus indicio) admixto humo-
re, in particulam aliquam confluat, decumbit vbi, atque ibidem
consistit: quæ si consistentia sua crassior sit, acriorq; totam exul-
cerat cutem, vsque ad carnem suppositam. Signa autem patens
ex Scholio etiam precedente: primò enim fit excoriatio, & pan-
latim serpit, postea autem magis ulcerat, ambulat & corrodit
loca, quia cholera crassa, manens sub cute, pustulas (Barbari Bo-
thores vocant) seu elenationes crassiores efficit, magnum dolo-
rem & puncturam ibidem inferens. Ad indicia & prognostica
hæc referuntur: si enim formica (ut Barbari loquuntur) id est,
herpes, in tantum angeatur, ut circumbeat totum corpus, homoq;
moritur: quia multiundo (inquit Valesius) materia arguitur in
corpore esse tam intra quam extra, & mala intemperies ferè per
totum corpus adequata. Curatio huius licet ex precedente
Scholio satis sit manifesta, hic tamen, quod ad curationem her-
petis esthiomieni attinet, oportet prius humorem peccantem ex-
purgare, ut antecedens materia minuat, non expectando di-
gestionem, quia materia est furiosa. & secunda regula est etiam
ab Avicenna posita cap. proprio, quod in formica seu herpes
exulce-

Signa.

Prognostica.

Curatio.

exulcerato declinemus ab impositione rerum humectantium, si herpes faciat corrosionem & ulcerationem, quia humectatio non conuenit ulceribus. inprimis itaque prescribemus victum qui Victusratio. in tertiana febre aut erysipelate conuenit, nempe humectantem & refrigerantem. A vino in totum abstinemus, eiusq; loco aquam hordei aut simplicem cum cinnamomo dabimus: mox etiam in principio materiam expurgabimus cum cassia, rhama- Purgatio. rind. epithymo in aqua casei dissoluto, aut rhab. in aqua end. per noctem temperato. Vel, ut in erysipelate diximus, sequenti syr. materiam digeremus: R. syr. de fumoterra, lupulor. ana ℥ j. s. decoct. fumiterra, lupul. bug. ana ℥ ij. misce pro duobus dosibus. Materia preparata & obediens facta, ita purgetur. R. confect. hamech ℥ ij. cassia recenter extracta, diacatholic. ana ℥ j. s. cum aqua de fumoterra vel end. fiat potus. Deinde Reprimentia. ad reprimentia accedemus, quæ & refrigerent & exsiccent: qualia sunt, ut diximus, vitii capreoli, rubi canini cacumina, arnoglossum: lenticula palustris etiam cum melle & polenta. Vel Ad exulceratum herpetem. cataplasma ex malicorio, sumach, in vino coctis, cum polenta, id est hordei farina, permixtis. Vbi vero exulceratus herpes est, Pauli medicamentum ex plumbi recremento vel ex malo puni- ro dulci, precedenti Scholio descriptum, apponemus: vel pastillos illos iam dictos, ut Polyide, Andronis, Musa, ubi iam affectus inueteratus est. Valet & fel hirci, cum nitro & pipere, & nitrum cum urina pueri linita. Egregium quoque, teste Vale- sco, experimentum commendatur ad omnes herpetas, si spatium quod in circuitu est liniatur, & aliquid in loco affecto, cum ung. facto ex bolo arm. & terra sigillata, distemperata cum aqua ros. & aceto. Nunc ad exempla herpetis miliaris curati transeamus.

OBSERVATIO VII.

De herpete miliari.

QUOMODO herpetem miliarem curauerimus in muliere illa quæ horrida febre quoque laborabat, diximus lib. 5. Obs. & Curationem medicinalium,

nalium, obs. 22. de febre horrida, cui accessit erysipelas phlegmonodes, & tandem herpes miliaris. Purgatio ibidem descripta, quæ bilem purgabat, plurimum ad herpetem faciebat. Vnde & Galenus 14. lib. Method. medendi sub finem ferè ita scribit. Romæ mulier quædam illustris cum herpetem in malleolo haberet, primum quidem medicamento quod algam recipit, est vsa. Hoc cum protinus cicatrix induceretur, proxima illi summa cutis est excoriata, veluti ex desquamatis. Cui deinde cum superpositum medicamentum est, rursus illi continua est exulcerata. Idque ita assidue perrexit donec ad genu ulceratio perueniret: cum interim quidvis potius pati quam medicamento bilem trahente, purgari, parata esset. Itaque etiam quod fieri in talibus assuevit, quoniam plerique culpant non culpanda, damnato ex alga medicamento, aliud ad-moueri iussit. Deinceps igitur quod ex sandice componitur, vrebamur. Vt verò id quoque quod exulceratum iam fuerat, sanauit; quod verò nunc exulcerabatur, non inhibuit, sed iam ad bubones vsque vitium ascenderat, ipsa necessitate coacta, serum se lactis sumpturam annuit. immittebant igitur clanculum minimum scammonæ, inuitam purgauimus ac sanauimus. Igitur in talibus, ut postea ibidem docet Galenus, humorem abundantem expurgare oportet, ac denuò herpes curare. At mulier nostra, quam historiâ inuenies loco iam citato, applicatione foliorum farfaræ ab herpete curata est. Sed & istis diebus cum herpetem miliarem haberemus, prius purgauimus choleram & pituitam, hoc modo: *℞. fumiterræ, boraginis, viol. ana m. j. sum-mitatum lupul. m. ℞. folior. senæ ʒss. agarici femin., rhabarb. selecti ana ʒ j. seminis anisi ʒ j. squinanthi, zinzib. alb. ana ʒ j. prun. damasc. num. vii. li-quiritiæ rasæ ʒss. fiat decoct. in sero lactis, pro ʒ viij. adde syr. ros. solutiui ʒ j. ℞. misce pro duabus dosibus*

bus matutinis: deinde vt hoc remediũ Auic. applicaretur, mandauit. erāt autem pustulæ illæ miliares in ipso dorso cum magno pruritu, ardore & dolore etiā serpentes: & gallæ plidiæ, balauft. boli ar. ana ꝑj. fiat pul. cum aqua ros. & aceto in exigua quantitate: fiat mixtura, ne faciat mordicationem: & cum pluma ilinebatur locus affectus. Prius tamen fiebat ablutio cum aqua decoctionis plantag. solatri & vngulæ caball. & maluæ ac viol. Nam Amatus scribit quod licet ex Galeni sententia medicamenta frigida & exsiccantia herpetibus admoveantur, maximè exulceratis; possunt tamen etiam contra sententiam ipsius Auicennæ quandoq. & frigida & humida applicari sine ægrotantium periculo. Sed maximè in herpete miliari. cuius & tale exemplũ ipse idem Amatus ponit. Iuuenis, inquit, quidā herpetem miliarem in femore patiebatur. Erat enim rubedo quædā viuida, vt in erysipelate, cutis tantũ superficiem prehensens, multis pustulis granis milii similibus, fœdata: à quibus affectus hic herpes miliaris dictus est. Cũ igitur ex humore subtili & bilioso ortum haberet, nulla expectata cōcoctione deponendus videbatur. Iticō igitur quum ad eum peruenimus, pharmacum hoc illi propinauimus: & syr. ros. solutiu ꝑ iij. diaphœn. ꝑ iij. infus. thamarind. ꝑ iij. misc. fiat potus, quem in aurora bibat, quo multa liquida biliosa egressit. Succedente verò tempore syr. alterantes calidam intemperiem præscripsimus, qui ita habent: & syr. ros. cicoreæ ana ꝑj. aquar. end. cicoreæ ana ꝑij. misc. quos per aliquot dies continuare poterit. At topica medicamenta primò sic applicata sunt: & succi plantag. solani ana lib. ꝑ. aceti ros ꝑij. misc. in quibus pānus lineus intinctus superponatur malo, & sæpe innouetur. Sed quum malum perseueraret, cataplasma hoc applicatum fuit, quod habet: & plātag. ros. solani, caudæ equinæ an. in j. in sufficienti quantitate aquæ fiat decoctio. Facta decoctione & co-

& colatura, prædictas herbas in mortario tere, quibus adde farinæ hordei, lentium ana ℥ iij. vini granat. acetosorum ℥ iij. prædicti decocti quantum ad spissitudinem mediocrem sufficit, misce. fiat cataplasma, & desuper ponatur. At quum exulceratæ pustulæ fuerunt, ad vng. de plumbo devenimus. Quo sanus exactè factus fuit. Suadet namque Paulus in hac curatione, utpote pustulosi herpetis, lib. 4. cap. 20, recremento plumbi ex vino austero leuigato utamur: super quo plantaginis folia indidimus: & optimè sese habuit. Hæc Amatus. At ego in pueris pustulas eiusmodi miliares seu herpetas in facie habentibus, quas vulgus *Springent vier* vocant, quæ etiam fortasse ad phlyctænas seu phlyctides, de quibus paulo post dicemus, pertinere videntur, accipio cretam, oleum oliuarum, acetum vini, ex omnibus æquas portiones, atque linamenti instar commisco, & felicissimè inungo. quo linamento si utaris, videbis subitanæam admodum curationem, & perbreuem ac salutarem.

SCHOLIA.

Causa herpetis miliaris.

QVOD autem bilis minùs acris minùsque calida, sed cum pituità mixta herpetem miliarem progignat, iam dictum est: id enim & longiore sermone & ipse Amatus ex Galeno tum Anicenna prosequitur loco iam citato. Dicitur autem herpes miliaris, uti diximus, eo quo pustulas exiguas in superficie cutis milij seminibus similes excitet: unde & Græci *νιζαντες* dicuntur. Hic autem non protinus ulcus facit, ut superior exedens, sed (ut dictum est) admodum exiguas pustulas ad milij speciem, quæ & ipsa interpositio spacio ac procedente tempore, cum disrumpuntur scilicet, in ulcus abeunt. Proinde non sine ratione (ut refert Paulus) Oribasio visum est, in eiusmodi vitio bilis esse aliquid pituitæ admixtum, quæ pustulas illas minutulas procreat. Unde & nonnullis pituitosus herpes dictus est. Quod ad curationem attinet, victus sit, qualis in superioribus descriptus est.

Signa.

Lib. 4. c. 10.

Curatio.

Cura etiam ferè eadem, nisi quòd Herpes miliaris mitiora modicamenta

camerda requirit: & qua mixta sint facultatib; hoc est, qua bilem simul & pituitam educant. Inprimis igitur purgetur bilis & pituita, dando decoct. flor. cum ʒ iij. epithymi & ʒ i. ꝑ. pul. diatribib; cum ʒ ꝑ. castia fistula. Sic etiam Amatus Centuria 4. Curatione 67. Iacobus, inquit, ex Galitia inuenis annos natus viginti quinque, mense Decembri in herpes miliaris incidit, quæ costas & pectus lauiam partem occupabant: pro quibus tollendis illico agrotanti pharmacum bilem præcipue, & aliquantulum pituitam purgans propinauimus: ex bile autem & pauca mixta pituita, miliaria hæc ulcuscula oriri aliàs dixi. Cæterum supra ulcuscula hæc unguento plumbeo & albo camphorato mixtè admoto, breui delituerunt: intus tamen ad pectus æger dolebat, & multum angustabatur: sed tunc hirudines ani venis admotæ sunt, quæ sanguinem multum suxerunt: & postea ebibitis syrups acetos. simpl. & de endiuia, ac deuotais cataportis ex aloë & aggregatinis cum agarico, ex integro tunc sanatus est. Sed utrum hic conueniat phlebotomia, dubitatur, quamvis ipse videatur admittere, cum loco in Obser. præcedente citato Centuria 2. Curat. 37. hæc adiicit: Nec enim ad sanguinis missionem deuenimus: quam etsi Galenus & ceteri enim sequentes medici pro hac curanda affectione non admittant; neotericum tamen consilio, præcipue Matthæi de Grado, auertendi gratiâ, ex basilica eiusdem lateris fieri poterit, ut in curatione phrenitidis apud ipsum legere liceat. Snædus autem Gentilis de Fulgineo, nobilis Auicennæ enarrator, ne bilis furiat, in vera phrenitide sanguinis extractio non fiat: veluti quoque in puro erysipelate & herpese hoc miliari, quod ex bile quoque subtili originem trahit. Cui Matthæus de Grado adstipulatur: præsertim in sanguinis missione, quæ euacuandi gratia fit: sequi autem in ea, quæ auertendi ratione admittitur, quam hæc tantum absit, ut noceat, aut bilem in furorē aut acridinem trahat, ut eam potius refrigeret & domet, ac agroto magnum afferat iuuamen. Parca autem diuersina hæc sanguinis missio est: nec ita copiosa, ut ea quæ euacuandi gratiâ fit. Porro vacuato, ut decet, eo qui in corpore redundat, humore, medicamentis tunc utendum erit, quæ influentem humorem reprimant, ut diximus: tutior namq; ac conuenientior tunc fuerit eorum usus, ut ex Galeno etiam

Purgatio.

Historia
Amati de her-
pete miliari.

Verum phle-
botomia in
herpese fieri
possit.

Scholio

Scholio precedente & Obs. precedente exemplo ostendimus. Caterum qua reprimunt iam diximus: qua & sine adstrictione refrigerant, qua hic conveniunt potissimum: cuiusmodi sunt lactuca, polygonum, lens palustris, portulaca, scrius, sempernium, & id genus alia etiam erysipelati opportuna. Vbi vero iam fluxus restitit, desiccare conuenit, sed medicamento blando, quale est apud Paulum lib. 7. quod recipis cerussa, amyli, glaucij, aluminis an. q. libet, cum vino aut loi palustris succo terantur: quod si hac nihil profecerint, acetum, solani vel arnoglosi succum adiciendum est. Omne enim vlcus, quacunque occasione natum sit, sine sponte, sine manifesta causa, exiccare debet medicamento blando minimeq; mordente, ne fluxio proritat. Reliqua his adice qua Scholio Obs. 5. precedentu diximus ad herpetas miliares valere. Valscus, capita piscium, inquit, salitorum torrefiant in testa ad ignem, donec sint quasi adusta, distemperentur cum vino pontico, & liniatur desuper. Aliud fortius istud. Sumatur flos aris, & sulphur citrinum adustum: misceantur cum aqua ligni vitis; & fiant linimenta. Nos autem, inquit idem, vidimus (cap. prop. de curat. formica miliaris) & scimus unam mirabilem experientiam: qua, siue alia quacunque medicina, prater dietam & purgationes, multi tempore meo curati fuerunt gratia Dei: R. lanam succidam omnis vel muttonis; & torrefac in cacabo super ignem, donec sit nigra & arsa, & tunc puluerifetur, & distemperetur cum aqua ros., vel cum aqua peculi, donec sit quasi incanstum cum quo scribimus. & de hoc incansto bene spisso, cum pluma circumligiatur formica; id est, herpes; & fiat hac linittio bis in die aut teranempe diluculo, vespere, & in principio noctis: & panno lineo continetur, non stringendo. Non vidi me hercle medicinam in isto casu magis expertam: constatq; ratione, quia desiccet & stringit. Et in quot locis incipit, in tot fiat linittio: quia egram partem curat desiccando, & sanam defendit stypticando & roborando.

Arcaum Valesci contra herpetem miliares.

OBSERVATIO VIII.

*De phlyctanis in facie infantis cuiusdam
apparentibus.*

INFANTVLVS cum phlyctanas (quæ & phlyctides, Græcis nuncupatæ sunt) haberet in facie, tales enim repente emergunt subflauī humoris copiā distentæ, bullarum modo lucidæ, æque iis similes quæ ab aqua feruidā vel ab igne ambustis erumpunt, non manifesto tamen dolore graues. His ruptis humor excidit, crustulæque obdurescunt, dum sanescant. Has constat non nisi ex feruentissima bile gigni, quæ ignem viribus suis adæquet: vt non idcirco præter rationem illas vulgus ignem syluestrem appellet, id est, *Wilt vier*: alij & *Springent vier* appellant: quamuis tamen & herpes miliares, vbi malum serpit, milii instar, etiam *Springent vier* vulgari nomine simul cum phlyctidibus confundant. Cæterum huic infantulo, cum ob vitiosum alimentum biliosumque pustulæ istæ orirentur, neque cibum sumeret, succo plantaginis & solani pustulas oblinire iussimus: postea adhibita etiam creta & aceto linamenti instar, & decocto rosarum ablui iussimus: interim vt nutrix cibis frigidis alteratis cum succo acetosæ vel agrestis vteretur, mandauimus, & vt serum lactis biberet: quo & puerulus postea aluum exoneravit. nutriebatur & nutrix lacte acetoso, modò hordeato, vt sic lac biliosum & acre corrigeretur. Quibus remediis infantulus breui conualuit.

SCHO-

SCHOLIA.

Actius lib. 14.
cap. 63.

Curatio in
feminis.

Curatio in
infantibus.

Paul. 4.
cap. 10.

Ex humore pariter bilioso quaedam pustula, siue papula, à Græcis phlyctæna dicta, similes hiæ, quæ à fernida aqua ambustis emergunt, non tamen multum dolorem inducentes, exoriri solent: quibus ruptis subflavi humoris copia paulatim effluit, ad biduum aliquando, ac triduum durans. Hæc feminis, quibus mensis æna discedunt, aut alias non rectè purgantur, sæpe in cru-ribus apparent: viris rarissimè accidunt: infantibus verò ali-quando in toto corpore. In feminis autem menses opportune cie-re oportet: virorum verò corpora congruo medicamento purgare: & utique verò alimenta alium emollientia exhibebimus; & urinas precipiemus; imperando ut ab acris ac salsis absti-neant. Infantibus verò, quoniam ob vitiosum alimentum hu-morodi pustula oriuntur, nutritrix eligenda, quæ sit boni habitus: cibique optimi succi meriacus. Lactem autem ipsos rosarum de-cocto, aut lactis: quod si amplius adstrictione opus habemus, myrti aut malicorij magis verò ulceratis, cataplasma ex plau-estimo imponemus, aut ex feride. Siq. vitulo cum pane: aut ex flore polentæ cum portulaca, aut semperiviva, aut Veneris um-bilico, aut hyoscyamo, aut rosæ virides, vel siccas coctas cum me-liliso & palmulis adhibemus. Pustulae cuius non sua sponte vni-puntur, sed graui dolore excruciant, acistâ perforari acn debent, ut humoris collantes habeat emissarium. Deinde humore leniter expresso, cutis præposita finitur donec impleatur. ac si vulnus conuineat, demò pustula perforanda est similiter & exprimen-da, tum cutis adstricta seruanda, quamdiu id, quod sub ea exul-ceratum est, ad cicatricem peruenerit. Sed priusquam pustula aperiantur, cocta lenticula cum aqua lenivata inancitur, vel mali granati virgulta, cinere calido reposita imponuntur, & loci attinguntur. quod si rupta fuerint, & vicus excitatum, adeps suillus liquefactus & argenti spuma deirita misctus, in lintemq; illitus admonetur, vel lilij radix in aqua cocta tritaq; cum cerato imponitur. Aliud, ad pustulas: R. spuma argenti, ceruse ana ʒ iij. malicorij sicci lenissimè triti ʒ ij. succi stratio-tæ, vel etiam lentis palustris, quantum sufficit, & fiat empla-strum. probè etiam facit emplastrum ex ladano vel ex herdeo.

oui candido, & rosaceo aut myrteo oleo dilutum. His & alij adiungunt pustulas epinyctides dictas: sed alij volunt pertinere ad pustulas sanguineas: ideo de iis scripsimus lib. precedente, Obs. 16. circa finem libri: quare ad illum locum citatum recurrere. Caterum quia post erysipelas in facie & herpetem corrodentem sequitur illud malum, quod appellare solent necrotici chirurgi noli me tangere, ideo & de hoc capite Valescus agit statim post herpetem seu formicam miliarem: quare & nos quaedam de hac passione subiungamus.

OBSERVATIO IX.

De Noli me tangere.

PETRVS Florentius, facie admodum rubicunda, & naso supra modum rubro & lato ac magno, annorum sexaginta trium, cum viginti annis sæpe gutta rosacea laborasset, cum tumore quodam duro carcinomatis instar, potissimum in gena dextra; tandem tumor ille valdè durus ad oculum peruenit ferè: idem semper quasi lippitudine perpetua oculorum laborans ex fluxione oculos rubicundos habebat. Commorabatur autem hic Delphis in domo angulari plateæ Latæ, diuersarum rerum mercaturam exercens. Ad hunc anno 1570, 23. die Iunii vnâ cum Theodorico chirurgo, qui nosocomio Delphensi inseruiebat, accitus fui, qui & illum sæpe præ manibus habuerat: is autem malum Noli me tangere appellabat: erat autem tumor cum duritie carcinomatis instar, & pustulæ quædam in medio valdè biliosæ sanguinæ & adustæ apparebant: nō erat tamen adhuc vlceratio, quamuis ego metuerem quod tandem in cancerum vlceratum transiret. Palliationem itaque tantum adhibendam vterque censuimus, de vera & perfecta curatione pænè desperantes. Quare ego 23. die Iunii primò præscripsi vt omni manè cochlearia duo

L huius

huius syrupi caperet, & hora 4 à meridie cochleat vnum: ℞. syr. de fumo terræ ʒ iij. syr. de epithymo, ex multiplici infus. ros. ana ʒ ij. misce. Deinde, quia facilis erat solutionis, hoc sequens descripsi- mus apozema: ℞. end., cicoreæ, acetosæ, dentis leonis, agrimonie, borag. buglossæ, fumiterræ, sum- mitatum lupul. ana m. β. euphrasie (propter oculos lippientes) m. j. sem. 4. frig. maior. ana ʒ j. fo- lior. lenæ ʒ vi. polypod querc. ʒ iij. epithymi ʒ ij. flor. cord. p j. prun. damasc. num. ix. vuar. passul. enucleat. ʒ j. hquiritiæ rasæ ʒ β. coquantur in aquæ communis & fumiterræ ana q. s. pro lib. j. post infus. per noctem adde syr. de fumo terræ, & epithymo ana ʒ j. syr. ex infus. ros. ʒ β. misce: & fiat apoze- ma pro tribus dosibus matutinis. Deinde ad hæc topica devenimus: ℞. aquæ solatri lib. j. solani vi- ridis m. j. bulliant; & in fine adde vini Pictaviensis stillati ʒ iij. aluminis vsti (quia pruritus habebat in pustulis) ʒ ij. misce. & fiat lauamentum. eo chi- rurgus epithimabat tumorem. Postea, quia videba- tur maior inflammatio, die 27 Iunii hæc sæpius applicari mandavimus: ℞. succi solani ʒ vi. aquæ plantag. solatri ana ʒ ij. misce. Oculi inflamma- ti interim aqua ros. cum aqua albuminis oui sæpe fovebantur: & intra oculos aqua ipsa instillabatur. Hoc lauatorio utebatur ad finem Iunii. Postea 1. Iu- lii hoc lauamento sequenti vsti sumus: ℞. succi so- latri ʒ vi. aquæ solatri ʒ iij. misce. reiterabatur sæ- pius. & hoc remedio contenti fuimus vsque ad fi- nem Iulii. interim si venter non responderet, ex foliis sepiæ infusis vel decoctis in sero lactis cum subinde purgavimus. Postea 1. die Augusti Chi- rurgus, cum magis ad cancerum, hec non vlcera- tum, tenderet & subinde maximum calorem sen- tiret, lauamentum sequens apposuit communi con- silio: ℞. aquæ solatri ʒ vi. tuniæ præparat. ʒ j. plum- bi vsti. tantumdem. fiat lauamentum. Cæterum post

post octo vel plures dies, cum diceret se plus iuamenti habere ex succo solani cum aqua solani, deinde id reiterari iussimus sapius. At 24. die Augusti, cum magis extuberaret malum, ut iam perfectè in cancerum magis magisque transiret, hoc linamentum fieri iussimus, cum ingentem calorem in loco perciperet: R. succi solani ℥j ꝑ succi temperuiui ℥j ducatur diutissimè in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad modum linamenti. Postea huic adieci mus plumbum vstum: deinde, ob ingentem calorem, etiam aliquid vnguenti popul. ut commodius in formam linamenti concretesceret. Sed paucis post diebus, cum malum nihilominus in peius vergeret, me dimisit, & chirurgum solum sibi reserua-uit, ut reliquum palliationis persequeretur. malum enim iam ad carcinoma degenerat confirmatum, quod tantum præcautione protrahi poterat. Sed huic postea nares ita ex carcinomate comprimebantur ut anhelitum per nares trahere non posset: & ideo denuò in consilium adhibitus, consului ut turundas cannulatas, argenteas in naribus poneret, ut per eas anhelitum commodè traheret ac reciprocaret, & nares minus comprimerentur. Hic tandem tamen mortuus est, ut antea longo tempore prædixeramus. Animaduueramus enim ab initio morbi, vlcera plurima praua latere, in cancerum tandem eruptura.

SCHOLIA.

VALÆSCVS tract. chirurgia cap. 8. de Noli me tangere: Propterea, inquit, quod aliquando fit erypelas in facie, vel formica corrosiva, id est, herpes exedens; si ista non bene curentur, vlceraur facies, & fit corrosio in facie. & hac passio vocatur Noli me tangere, quia tangentem inficit, vel quia quanto plus tangitur, tanto magis crescit & in peius vergit. Facies enim membrum rarum est,

Qualis sit passio Noli me tangere apud Chirur. gos neotericos.

& delicatum, & superfinitates cerebri ad partes eius derivantur, & ipsa eas facilius recipit. Quia autem hoc malum maxime sequitur erysipelata & herpes, ideo post curationem formica seu herpes agit de curatione huius passionis, & post purgationes & victus rationem convenientem curat cum oxymelite simplici, vel cum aqua decoctionis agrimonie; deinde iubet ut diligenter exsiccentur. Post desuper ponatur unguentum de plumbo, & ung. factum de flore aris cum alumine & melle simul coctis, & secundum Theodoricum incorporetur sal gemma cum succo plantaginis; & in loco affecto cum propria urina superponatur bis in die. Vel extrahatur succus linaria & plantaginis, cum sale gemma, & fiant linamenta, & superponantur, & continentur. Sed hic sciendum, quod omnia ulcera quae sunt in labiis vel naso vel facie, sunt difficilis curationis. Quidam dicunt quod succum canlis rubei infusum sanguini eius qui habuerit noli me tangere, vel lupum, quod curat sic illius. Sed & in libro quodam manuscripto inveni quod herba oculis Christi contusa & superposita ac epota sanat noli me tangere. Sed quia hic quoque fecimus mentionem de gutta rosacea, egregie confert unguentum pineatum, quo quondam Laurentius Brunnicus chirurgus doctor insignis viri solebat, quo & maximam pecuniam corrasisse se fateretur. fit autem hoc modo: R. granorum pini, argenti vini extincti cum salina hominis ieiuni, axungia porcinae recentis, quam non setigit aqua: aqua de floribus fabarum ana p. j. conserantur bene simul omnia in mortario; & facies innungatur, quando vadit dormitum; & postero die nihil apparebit. Vide Rosam anglicanam. Sed hic cautio adhibenda, quod hoc unguentum suaviter applicetur in superficie faciei, ob argentum vinum quod ingreditur, quia aliqui post secundam applicationem passi sunt vertiginem. Ad idem: R. sulphuris triti par. j. albuina duorum durorum tritorum & bullitorum mundatorum a vitellis, toidem, vel plus, misce ad modum ung. & innunge pustulas semel aut bis in die: recedent. Et si manserit rubedo, fac unguentum de bacis lauri bene tritis, incorporando cum axungia porcina, & modico camphora; & per alba facies. Grana iuniperi trita in urina viri optime bullita, & cum pinguedine supernatante unge guttam rosaceam; facis mirabilia.

Ad

Unguentum
pineatum, ad
guttam rosa-
ceam.

Ad idem: R. argenti vini \mathfrak{z} ij. sulphuris \mathfrak{z} ij. fellis porci, succi hederæ terrest. ana \mathfrak{z} ss. misce cum axungia veteri; inunges faciem, prius lotam cum vino albo: & si istis addatur zinziber & ellebormis, erit fortissimum. Aqua ad idem: R. lactis caprini lib. 4. rad. altheæ mund. & minutim incisarum, crystalli puluerisati ana \mathfrak{z} ss. ponantur simul in alembico, & distillentur lento igne. Contra innaturalem ruborem faciei, quando adsunt pustulae; conficiatur casem recens cum succo solari aut semperuina. coletur per pannum: & erit sicut unguentum viride, quo illinatur facies serò & manè. abluitur cum aqua sursuris. Sed ante illud expediet faciem stuprare vel fumigare cum decoctione paleæ auenæ vel hordei, malua, viol. &c. Contra guttam rosaceam, impetiginem & maculas leproforum: R. lithargyri auri, lapid. calaminaris, boli arm. salis gemma ana \mathfrak{z} ss. vitrioli Romani, argenti vini ana \mathfrak{z} j. incorpora cum oleo laurino sine igne; & primò frica locum affectum cum pauco crassiore usque ad sanguinem: deinde præscripto liniatur sub noctem: manè verò abluet cum aqua lappæ. Ad idem, pro gutta rosacea: R. albumina ouorum num. ij. lactis vaccini tantundem. misce & contundantur: & liniatur locus de nocte quando vadis dormitum: manè verò lauetur cum aqua sursuris. Ad idem: R. lithargyri auri \mathfrak{z} j. cerusa \mathfrak{z} ij. axungia anseris, gallina ana \mathfrak{z} iij. argenti vini extincti cum salina \mathfrak{z} ij. fiat ung. cum quo serò inungatur; & manè lauetur cum dicta aqua sursuris. Item pineæ recentes pista cum crema lactis in modum unguenti coeant: quo inungatur gutta rosacea: mirabile habetur. item, Accipe limaces rubras q. v. & mundentur per medium, & aspergantur puluere salis gemma: & illud liquidum quod destillas admisceatur pinguedini terra, quæ ubique terrarum inuenitur, & vocatur stella terra, vel casus terra; & cum isto lauentur pustulae faciei, & consumet pustulas ipsas. Vel: R. litharg. bene triti puluerisati lib. j. aceti fortis lib. iij. misceantur, & stent ita per duos dies: postea coquantur ad consumptionem tertiæ partis: deinde adde aquam florum fabarum lib. ij. & simul ponantur in alembico, & distilletur. postea cum ista aqua distillata misceantur gummi tragac., gummi arab. q. v. & fiat ung. quo facies inungatur: R. sulphuris vini \mathfrak{z} j. myrrha electa, thuri ana \mathfrak{z} ij.

Aqua contra guttam rosaceam.

Contra innaturalem ruborem faciei, quando adsunt pustulae.

Contra guttam rosaceam, impetiginem, & maculas leproforum.

Aqua quæ ru-
bedinem fa-
ciei aufert &
pustulas.

camphoræ ʒ ij. quodlibet per se puluerizetur: deinde omnia simul
miscantur cum aqua ros. lib. j. & reponantur in aliqua am-
pulla, qua sapienter moneatur: cum qua aqua abluatur facies sub
noctem. manè lauetur cum aqua curruant. Ad idem: R. aqua
mercurij ʒ j. misce ei vernicis, alum. ianchni, cerusa bene lota
ana ʒ i. & simul miscantur in modum unguenti; & postea eo
vni omni tempore, remouendo unguentum, tenendo faciem su-
per funium aqua decoctionis paleæ anenæ. Sed hæc adiungam re-
gimen quod aliquando præscripsi cuidam habenti rubedinem na-
si & maxillarum. primò phlebotometur bis in anno ex saluarel-
la dextra, scilicet in Vere, & in sinistra in Autumnio. purgetur
quater in anno cum istis pil. R. pil. de fumo terra, indurum ana
ʒ j. pil. de hiera, pulv. rhab. ana ʒ ß. diagr. mastich. ana gr.
ij. cum succo sumiterræ fiant pil. v i i. Prius capiat per quin-
que dies tria cochlearia syr. sequentis: R. syr. de fumo terra ʒ iij.
syr. ex infus. ros. ʒ ij. ß. syr. de epithymo ʒ ij. syr. de end. ʒ j.
misce. Si sentiat grauedinem in ventriculo, antequam aliquid
sumat capiat pil. vnâ azzaieret. & post sumptionem cibi
capiat tria grana coriandri zacch. exiguo incrustati. Caveat
ab omnibus acutis, potu fumoso; & sit sobrius in potu. Ad re-
inouendam rubedinem: R. sulphuris citrini lib. ß. aq. ros. lib. ij.
puluerizetur sulphur subtilissimè, & cribretur per pannum ser-
icum: & infundatur in dicta aqua ros. simul in vase vitreo; &
soli exponatur x. diebus, cuius officium sit optimè strictum; &
omni die semel aut bis vas moueatur: post hoc epithimentur
partes rubræ. Sed & ad maculas rubeas apparentes in aliqua
parte corporis ob cholericos humores transmissos intra cutem &
carnem: R. hellebori alti pulv. & pone in aceto, & decoque ad
medietatem aceti, & frica locum; & post sudorem delebit ma-
culas. Ad rubedinem magnam in modum serpiginis: R. radices
lapathij acuti crudam & incisam per rotulas: & contundatur
cum pipere nigro, & transtoleantur cum aceto Rhenensi: deinde
pannum manifestum in isto liquore superpone per noctem, &
videbis mirabilia: nam hac modo plures illic curati fuerunt.
Ceterum cum eiusmodi pustula non solum faciei sed & alia-
rum partium corporis pertineant ad tumores mistos, de iis po-
stea suo loco dicemus. Sed quia æger hic noster sæpe faciem sæ-
datam

Regimen pro
quodam ha-
bente rubedi-
nem nasi &
maxillarum.

Ad pustulas
cholericas, &
maculas.

Ad rubedi-
nem magnâ
in modum
serpiginis.

datam eiusmodi pustulis antea habuerat, & simul guttam rosaceam passus erat, hac experimenta hic inferere opportunum duximus, ne etiam nostra, quantumvis arcana, lectori pio ac beniuolo & innuoribus medicis celaremus. At auctores post Noli me tangere de serpigne & impetigine agunt; quidam vero, ut Leonus, cum ad tumores milios peruenire velint, de iis postea mentionem faciunt. Verum cum ipse Fernelius, vir doctissimus, recenseat impetiginem sub externis affectibus & pustulis & bile, hic de eadem agere opportunum duximus.

OBSERVATIO X.

De impetigine.

IOHANNES Heuterus, vir egregius, qui post quartanam & hæmorrhoides cæcas (ut in lib. de feb. & hæmorrhoidibus diximus) etiam in facie & cruribus sæpe passus est impetiginem vel serpiginem, quam vulgares appellant Teter, vel Tetter, ab hoc malo post vniuersalia remedia curatus fuit hoc lauamento: R. maluæ cum toto, foliorum salicum, hederæ arboreæ, folior. lappæ ana. m. j. coquantur in vino Pictaviensi. lauentur crura, & apponatur folium lappæ: ad idem valet & folium hederæ appositum: & etiam folium quercus in lichene, ubi crura madent. Sed & hoc commodè vsus est, & ego in aliis quamplurimis expertus sum: R. foliorum salicis, hederæ arboreæ, foliorum lappæ, vngulæ caballinæ ana. m. j. coquantur in vino Pictaviensi. deinde apponatur folium vngulæ caballinæ. Valet egregiè, ut experti sumus, etiam si in facie appareat; sinapi recentè molitum, & supralinitum: quod quidam pro maximo arcano tenuerunt; etsi apud antiquos quosdam autores eius quoque mentio fiat.

SCHOLIA.

Fernelius de
impetigine.

O'arcomos.

Vera impeti-
go & lichen
Græcis nun-
cupata apud
Fernelium.

H'foge.

H'liopa.

Tagantius.

Lepra.
Piora.

IMPETIGINEM ipse Fernelius sub lichene ponit; & affectus quod sit asperitas dura ac sicca, cum ingenti pruriginē. Ed autem a scabie distat, quod sicca sit, & omnis humoris omninoque saniei expert. Ex siccis enim pustulis fit, scabies vero ex humidis. Huius quatuor, inquit, sunt species: una admodum simplex, quæ cutis rubra, exasperataque, vehementi pruritu roditur: at hæc simplici pruritui nomine continetur. Oritur ex bile, aut ex pituita tenui, quæ tamen purida sit & salsa, & quæ sub una epidermide coercetur, eamque exedit. Altera est vera impetigo, Lichen Græcis nuncupata, quæ asperior pustulis maioribus emergit, acrius corrodit, latiusque procedit. Hæc sæpe ex neglecta papula fit, sæpeque ex eâ quæ papula fera nuncupatur; & quæ nisi mature sublata sit, in lichenerem vertitur, hic deinde in psoram, psoræque in lepram. Lichenis materia est bilis ardentior, ac pituita purius ac salsa, nec tenuis illa quidem, sed quæ crassior aut ex se aut ex aliorum permissione contrahit. Tertia species est Græcorum Psora, hæc enim a scabie longè est, diuersa) quæ cutis crassior, sicciore, durior, immenior & serpentinis pustulis asperior enasit: hic vehementer roditur & exeditur, passimque finditur; ex se sursum area quadam nigra excutit. Hinc originem dedit aura bilis in cutem effusa; è qua digeri, vix potest: agere siquidem hoc malum sanescit. Quarta species est lepra Græcis nuncupata, omnium sanè deterrima. Ea cutem vehementer rodit, aliè depascit atque findit: ex qua non solum sursum, sed & squamula decidunt, modò pallida, modò subnigra: nullis hæc cedit remediis, & de eius curatione vulgus diuos implorare solent. Nascentur ex bile atra, cui etiam crassa lentaque pituita, saltem quiddam sit admistum: hincque non epidermidem solum, verum etiam totam cutem prehendit ac obsidet. Quodcumque psoræ lepræve inquinatum sit corpus, sensim id tabescit & absumitur. Hæc Fernelius. At Tagantius lib. 1. Instit. Chirurg. de tumor. præter naturam cap. 2. de differ. tumorum; Ex pustularum genere, inquit, sunt lepra Græcorum, apud Latinos nomen suum retinens, & psora, iisdem scabies appellata; affectus quidem inter se admodum affines: cutis enim sunt aspredines, cum

cum pruritu & corporis colligatione: ab eodem tamen humore progignuntur, nempe ab atra bile. In hoc tamen differunt, quod lepra cum manifestis squammis cutem profundius in orbem depascitur: psora verò superficiem tantum variis figuris ladeat, & fursuracea quadam corpuscula remittit. Huc etiam spectat ea levis cutis infectio, quæ Græcis Lichene, Latinis impetigo, & vulgo quibusdam (ut Manardus refert) volatica nominatur. Hæc fit mixtis saniebus tenuibus & acerbis, cum aliis crassius; & frequenter ac facili in prædictos affectus, lepram scilicet & scabiem, quam psoram vocant, Galeno auctore, degenerat. Sunt tamen qui Græcorum lepram, impetiginem vocari à Celso contendunt. Verum enimvero cum ipse seorsum scribat de impetigine, & quatuor eim species faciat lib. quinto sua medicina, euidenti argumento convincitur, eum aliam rem per impetiginem intellexisse, quam Græcorum lichenas. Quandoquidem nullus auctor Græcus legitur qui tot genera lichene unquam agnouerit. Itaque si propriè & cum Galeno loqui volumus, lepra & lichene vel impetigo unum & idem esse non possunt, alioquin idem in se ipsum mutaretur. Ut igitur omnia in pauca contraham, quando leniter cutis inficitur, cum sola scilicet aspredine ac pruritu, id Græcè Lichen, Latine verò Impetigo dicitur. Dum autem peior fit affectus, nomen, sicuti & formam, mutat. Si enim manifestè squamæ lichene excitat, atque altius cutem depascitur, lepra propriè dicitur. Si verò per extimam tantum superficiem extenditur, & corpora fursuracea emittit, psora à Græcis, à nobis propriè scabies vocatur. Quanquam scabiei nomen vulgo & recentioribus medicis, latius longè pateat, qui omne vitium cutis scabiem nominant. At impropiè loquuntur: pura enim ac vera scabies Latinis u. procul dubio affectus est, qui Græcis Psora vocatur, ab Anicenna Albara & Morpheæ (contra quorundam opinionem) diuersus. Nam quod illi & Punicis ferè omnibus Albaras dicitur, à Græcis & Celso Lence nuncupatur. Sed de his latius, cum de missis tumoribus dicturi sumus, & quomodo Græci tum Latini impetiginem curent. Nunc autem de impetigine & serpigne agamus, iuxta neotericos, etiam illos qui Anicennam tum Barbaros sequuntur.

Lichene.

Quatuor impetiginis species.

Impetigo.

Lepra.

Psora.

Scabies.

OBSERVATIO XI.

*De serpigine atque imperigine in crure, cum pustulis
paruis erodentibus, atque fissurâ.*

ANNO 1551. Arnoldus Heynricus, poculorum
fuser, cognatus meus, Alcmarianus, mense
Octobri, cum crura pustulis paruis corrodentibus
carnem infecta haberet, atque ea specie serpiginis &
impetiginis laboraret, quæ lingua vulgari *Hærworm*
dicitur, ut eidem apta remedia præberem, rogauit:
nam diu variorum empiricorum opem, tum mu-
licularum frustra expertus erat. Cæterum post-
quam hac portione per me præscripta, tum linimen-
to sequenti usus esset, breui sanitatem consequutus
est. Hæc erat potio: R. corticum rad. cicor. dentis
leonis, liquiritiæ ana ʒj. fumiterræ, cicoreæ, den-
tis leonis, acetosæ, viol., borag. ana m. j. ꝑ. capill.
Ven. flor. cordial. ana ꝑ. j. sem. quat. frig. maior. ana
ʒj. sem. anisi ʒj. ꝑ. prun. damasc. hum. xv. vuar.
pass. ab arill. mund. ꝑ. j. follicul. senæ ʒj. ꝑ. poly-
pod. quercini, epithymi ana ʒij. rad. elebori nigri
ʒj. myrob. omnium ana ʒꝑ. coquantur omnia se-
cundum ordinem in sero lactis ad lib. iij. & post co-
laturam optimè dulcoretur saccharo. deinde: R.
agarici electi ʒij. ꝑ. rhæarb. optimi & selecti ʒij.
zinzib. salis gemmæ, spicæ, squinanthi ana gr. v.
contundantur crasso modo, & fiat puppa suspen-
sa in dicta decoctione, & exprimenda dum potio su-
metur. ex qua capiebat bis aut semel in die, prout
aliud deponerebat. Linimentum autem constabat
ex piceliquida nauali (vulgo *Teir* dicitur) sulphure,
& axungia porcina.

SCHÖT

SCHOLIA.

IMPETIGO & serpigo (inquit Valescus cap. proprio) sunt infectiones cutis. Dicitur autem impetigo, quia cum impetu latet, & serpigo à serpendo dicitur, quia videtur serpente hinc & inde. Illa ergo quæ serpit, dicitur serpigo: sed quæ stat, dicitur impetigo. Et sunt infectiones superficiales maximè cutis, prouenientes ex cholera subtili (ut Gordonius quoque asserbat) mixta cum humore grosso, peruenientes ad cutis superficiem, facientes infectionem cum squamis siccis. Impetigo primò occupat paruum locum, deinde aliquando ampliat se, dilatando, aliquando vlieriùs aut longius proserpendo: (ita in Hentero per totam crus serpente vidimus:) & mutando locum, priori tamen non dimisso, ut dictum est de formica seu herpete: & habet squamas siccas ut fanilla. Causa istarum infectionum est materia acuta sicca, habens acuitatem, & est permixta materia melan-
cholica, & est materia grossior ipsa materia scabiei. Et dicit Gordonius, quòd cholera subtilis aliquando superat materiam crassiores, & aliquando est cholera grossa; vel plus de materia crassiore; aliquando aqualis, quando aqualiter affligit. Sed intelligendum est quòd sit duplex impetigo, secundùm Auicennam. quodam est humida sanguinea, in qua apparet ros, quando fricatur in superficie: talis erat in crure Hæterii nostri. Alia est totaliter sicca; & ista ut plurimum est à phlegmate salso conuerso in melancholiam per adnitionem phlegmatis salis. talis erat in innuene illò organista, cognato Buscopij; quem istis diebus dum hæc scriberem, præ manibus habui; erat autem in parte connexa manum. Post decoctam summiterra in sero lactis, & usum frequentiore eiusdem; deinde post purgationem ex foliis senæ cum foliis sumiterra, acerosa, scabiosa & similibus; deinde lauameto ex foliis maluæ, salicum, ungula caballina, lappa, depositis squamis, facillè hic ab initio curatus fuit. Præterea impetigo quodam est excorticata; & ista est talis propter magnam siccitatem, & habet causam magis profundam. Alia non est excorticata, & ista non habet causam ita profundam vel confirmatam. Præterea quodam impetigo ambulativa est, & videtur mutari & obambulare; & ista propriè vocatur serpigo. alia est recens, alia antiqua, & mala.

Signa

Impetigo cur-
dicatur: &
Serpigo yn-
de sibi nomein
cōparauerit.

Signa ex se
satis sunt
manifesta.

Prognostica
seu indicia.

Canones
vniuersales
ante curatio-
nem particu-
larem prae-
mittendi.

Signa ex se satis apparent: nam in superficie cutis ariditas ad-
est ac si essent parua fissura, & parua crustula sicut farsures; &
adest in loco pruritus & ardor: quia materia ista est aliquando
ardens & ignita, male qualitate & sicca; & ideo ceterum de-
ficcat, ut apparet. Indicia seu prognostica in impetigine: Quan-
do, inquit Gordonius, plus est de cholera, facilius curatur, quan-
do vero humor est grossus, tardius curatur; quando vero aequa-
liter materia eam effecerit, media est curatio, id est, mediocri
molestia curatur. Valescum vero haec adiungit: Primum, inquit,
impetigo humida sanguinea, cum qua quando fricatur apparet
quasi ros, est maioris malitiei. & illa quae est totaliter sicca, est
deterior. Secundum, impetigo excoriata deterior est. Tertium,
impetigo quanto antiquior, tanto deterior & tardioris curatio-
nis est. Quartum, dicit Auicenna, quod impetigo est agriundo ha-
bens acuitatem, ut nasuturium & similia. Quintum si in capite &
in facie pueri vel viri apparet impetigo, & continuauerit per
multum tempus, talis leprosus efficitur, nisi cum optima diata &
purgationibus citò succurratur. Sextum parua impetigo recens,
citò curatur bono regimine ac victus ratione. Ante curationem
particularem impetiginis his quidam canones ab autoribus uni-
uersales proponuntur. quorum primus est: Cum impetiginis cau-
sa sit composita ex materia crassa: & ex materia subtili; ideo
medicina etiam composita esse debet ex rebus incidentibus & sub-
tiliantibus, & ex rebus sedantibus eum accidentia, & humectan-
tibus. Secundus canon: ante localia remedia diata conueniens est
praecipienda, & materia digerenda, & cum appropriatis est ex-
pellenda, atque enacuanda. Sed, quod ad composita attinet reme-
dia, siue ipsa sint vniuersalia, seu topica, seu digerentia, aut al-
terantia; ea ipsa componenda sunt prout materia vel magis
acuta aut magis crassa praedominium habeat; atq; hic canon val-
de generalis est. Tertius, & est ipsius Auicenna: Appositio san-
guisugantium est de melioribus remediis eius. Quartus est eius-
dem: balneum est de subtilioribus curationibus eius, scilicet pra-
cedentibus vniuersalibus. Hinc & Gordonius de apostematibus
calidis part. 1. rubrica 5. de impetigine & serpigine: Mundifi-
cetur corpus in primis iuxta naturam suae complexionis. corpore
autem mundificato, & bono regimine supposito, fiat balneum,
quo-

quoniam balneum subleuat & aperit, & innat ad euacuandum humorem. Quintus, quando impetigo per conuenientes curationes non curatur, imò expandit sese serpendo, tunc recurratur ad curam lepræ. & cum hoc indicio concordat & ipse Auicenna cap. proprio. Sextus est Auicenna eadem forma. Et de eis quæ prohibent venire impetiginem & sanant quod de ea venit, est quòd detur in poru lacca abluta (sicut aloës abluuntur) ℥ j. cum ℥ iij. decoct. myrrha vel myrtill. His præmissis, ad curationem particularem deueniunt: de qua Scholio sequenti agemus.

OBSERVATIO XII.

De impetigine faciei.

NVMANNVS, qui in Haga Comitum numeris re-
giis præerat, pro impetigine faciei, maximè cir-
ca mentum, quæ ei frequens erat (ita ut ab ea cura-
ta tandem in barbam canam adhuc iunior incide-
rit) pro illa, inquam, depellenda, quæ faciem de-
turpabat, infallibili remedio utebatur sinapitecen-
ter mollito, quo loca impetiginosa in facie obline-
bat. atque eo remedio tum ipse curatus est, tum
plurimi alii post eum, quibus hoc consiliū communi-
cavit. quemadmodum & Heuterus noster, qui non
solum crura impetigine frequenter affecta habebat,
sed & faciem ipsam impetiginosam præseferbat,
quæ licet curata subinde reuertebatur. eo tamen
experimento sæpe facie, maximè in fronte in af-
fecta impetigine curabatur. At hoc quidem expe-
rimentum de sinapi non quidem nouum est, sed sæ-
tis antiquum: nam & Gordonius etiam huius me-
minit part. 1. de apost. calid. rub. 5. de impetig. &
serpigne, sic scribens: Oleum de sinapi delect impe-
tiginem: hoc idem facit & oleum de frumento.
acetositas citri & sinapis cum aceto, & sulphur citri-
num cum aceto. At Iohannes ille Heuterus, de quo
Obser. 10. præcedente diximus, anno 1558. mense
Decembri,

Decembri impetigine in facie correptus est, cum gelu ac tempus frigidissimum esset. Cui syr. de fumo-ter. de epith., de cicor. cum rhab. pro digestiuo absque aquis stillatitiis dedimus. deinde id quod sequitur: R. folior. senæ alexand. ʒ β. rhab. electi ʒ β. sem. anisi, spicæ ana ʒ β. infunde per noctem in aq. cicoræ, fumiterræ, borag., scabios. ana ʒ j. facta prius ebullitione manè fortiss. express. adde syr. de fumoterræ ʒ j. misce. inde quinquies aluum deposuit. Postea nescio cuius consilio cinerem ex carbonibus ignitis volatilem apposuit; sed non iuuabat. quare & hoc linamentum illi præscripsimus: R. terebinthinæ Venetæ lotæ in aq. ros. ʒ j. ol. ros. ʒ β. ouorum lutea num. ij. succi duor. malorum aranciorum (dulcium acceperem, sed deerant) acidorum; istis commixtis fiebat linimentum: quo cum duobus diebus inunxisset, incepit pus emanare in magna quantitate. Sed cum facies inflaretur, linamentum statim reliquimus: tunc quoque accito M. Lamberto chirurgo Delpheni, ad maiorem exiccationem linimentum confecimus ex aceto rosaceo, lacte muliebri, & puluere cretæ albæ in sarta-gine prius supra prunas exiccata. lithargyrii, scilicet horum puluerem per pannum lineum cribratorum, adiecta aqua hederæ arboreæ & ros. & plantag. ut ad formam linamenti coirent. quo facies tota oblinebatur. pannis deinde lineis intinctis in aqua plantaginis, ros. aceto ros. lacte muliebri, aqua hederæ arboreæ: quibus & parum pul. lithargyrii, cum cretæ exiccata & puluerisata epithematis modo iniecta erant. illi panni sic immersi desuper apponebantur, & cum exiccarentur, eadem aquâ humectabantur, & eo aspergebantur: illo tempore cum exiccati amouerentur, prius irrorabantur, ne cuti adhererent. Interim duas cucurbitulas cum scarificatione circa iuncturas vniuscuiusque manus, tum duas alias scapulis affigi iussimus, sanguine utcunque extracto.

tracto. Postea ad maiorem exiccationem solo linamento inungebantur; & paulatim postea relicto linamento, dicta lotionem fuit sanatus. Sed hic idem, ne hoc omitamus, ante hoc tempus eodem anno circa principium Decembris crus vsque ad talū exco-
 riatū impetigine habebat. Cui hæc præscripta sunt: R. folior. senæ alexand. ʒ ij. β. rhab. electi ʒ β. sem. anisi, spicæ ana ʒ ss. infunde per noctem in aqua cicoræ, fumiterræ, boraginis, scabiolæ an. ʒ j. manè fiat expressio: adde syr. de fumiterræ ʒ ss. misc. detur vnica vice: habuit autem ex eo quatuor secessus. facilio-
 ris enim solutionis erat. Postea hoc lauacro pedem lauabat: R. fol. salicū, maluæ, lappæ, fol. hederæ arbo-
 reæ an. m. j. coquantur in vino Pictaviensi; & post lotionem appositis foliis lappæ à parte viridiori, fuit breui curatus: quamuis circa finem eiusdem mensis facies facta fuerit impetiginosa: sed remediis paulo antè descriptis etiam perfectè curata. Huius tamē ad præcautionem, cum valdè sanguineus esset, in vere quocannis aliquandā libram vnā, sæpè & duas ferè sanguinis libras, commodè detraximus: adhæc præcedente decocto Maiali ex foliis fumiterræ, cum sero lactis & purgatione conuenienti; & ad minus ter aut quater in anno coxis & brachiis cucurbitulas cum scarificatione, apponi mandauimus.

SCHOLIA.

COMMENDATUR imprimis in curatione particulari im-
 petiginis & serpiginis apud Valescum, iuxta tenorē pri-
 mi canonis dicti Scholio præcedente, si materia crassa est & sicca,
 & magis quā subtilis abundans, fiat hic syr. R. flor. borag.
 rad. petros. apij, scæn. end., scariolæ ana m. j. epithymi, senæ, po-
 lypod. querc. ana ʒ j. anisi ʒ β. mell. sacch. ana lib. j. fiat syr.
 detur cum aqua decoct. cicerum rub. & spicanardi, vel earun-
 dem herbarum iam dictarum, adiecta herba sumaria in maiori
 quantitate. Deinde purgetur cum epithymi ʒ iij. dissolutis in
 sero caprino. Si autem materia magis ad subtilitatem decli-
 net, in digestino ponatur plus endiniae, scariolæ, & portulacæ,
 & ad-

Curatio im-
 petiginis &
 serpiginis ex
 prædictis de-
 sumpta.

& addantur semina frigida: & in purgatione ponatur cassia fistula, rhab. thamarind. elect. de succo ros. & similia. & purgetur cum pilul. de fumo terræ: vel purgetur cum hac decoctione: R. polypod. querc. recens, epithymi, flor. borag. pass. mund. ana ʒ β. fiat decoctio, in qua dissoluatur cass. fistula mund ʒ v i. pul. diatrachid ʒ ij. vel plus vel minus, secundum senectutem virtutis; observato tamen primo canone, cum aliis canonibus universalibus. Deinde in parva, aut puerili corpore, vel nona impetigine, sufficit interdum vel sola fricatio cum salina hominis ieiunii, maxime si sit famelicus. Hinc & Gordonius loco citato inquit: Impetigo recens in primis curatur cum salina ieiunii, si illiniatur. Vel sufficit (inquit Valescius tract. suo de chirurgia cap. 9. de impetigine & serpigine) quod fricetur cum cortice rad. lapathij acuti, maxime si ab homine ieiuno prius aliquantulum masticetur, vel dentibus conteratur. Remedia singularia hac sunt ad impetiginem: Primum est acetositas citri & citranguli, & limonis, & si cum aliquo istorum saepe fricetur. Secundum est Anicenna, estq; gummi pini, gummi amygd., gummi arab. storax liquida, si aliqua ex istis in aceto temperetur, & cum eo curvetur, curabitur impetigo. Ad idem valet sinapis comestibilis; distemperata cum aceto, est ultima, inquit Princeps Anicenna. Similiter aqua sulphurea, aqua salsa, sem. melonis, radix asphodeli. Aliquando humectetur locus, & refrigeretur cum succis herbarum frigidarum, ut est lactuca, portulaca, cucurbita, vel cum mucilagine psyllii, & cum salina hominis ieiunii. postea superponantur alia remedia, linimenta scilicet vel unguenta: ut est hoc quod sequitur: R. succi asphodeli, succi serpentariae, succi lapathii acuti an ʒ ij. axungia porcina lib. ss. coquatur axungia cum succis usque ad consumptionem succorum, & cum axungia proiecta in mortario incorporentur tartari, plumbi, fuliginis camini vel oris furni, viridis aris, cineris cucurbitae ana ʒ ij argenti vini extincti cum salina ieiunii ʒ j. acetiq. s. ad incorporandum. pro recenti impetigine infantum, & aliorum: R. gummi prunorum, vel saltem gummi arab. glutinis quod sit ex coriis ana ʒ j. temperentur in aceto & storace liquida, & fiat unguentum mediocriter liquidum. At istis addi potest, ubi sit aggrando antiqua, sulphur citrinum aut auripigmen-

tum.

Topica.

Aulcenna.

Unguentum.

Pro recenti
& simplici
impetigine
infantium &
aliorum.

gum. Vnguentum Henrici, quod etiam ponitur à Valesco & Gnidone, quo curatus dicitur quidam Parisiensis, qui hanc aggritudinem passus fuerat per quinque annos: R. sem. iuniperi conquassati 3 j. coquantur cum aqua sufficienti, & colatura addatur axungia porcina fusa & colata 3 vi. terebinthine 3 j. dissoluantur omnia super ignem, & deponantur, & quando infrigidatum fuerit, aquositas expellatur, & residuum in mortario fortiter agitetur, addendo sulphuris vini 3 ij. fiat vng. quo unguatur fricando. Vel secundum Gordonium (quod etiam laudat Valescus) unguatur locus sequentii vng. in balneo, vel post balneum: R. farina risi, fabarum, lupinorum & cicerum ana 3 ij. (Gordonius addit & milii, hordei, & ponit praedictorum ana 3 j.) gallarum, osim myrob. (addit Valescus, torrefactorum) mellis ana 3 β. bulliant omnia in aceto & succo betæ, usque ad spissitudinem, & fiat vng. liquidum: & illinatur locus. In antiqua autem impetigine & serpigine, R. lithargyrii, nitri, stercoreis capratum, aris vsti, foliorum agni casti (Valescus addit & foliorum tuta) ana 3 j. vitrioli, sulphuris vini an. 3 ij. (Valescus addit viridis aris etiam 3 ij.) bulliant in aceto usque ad spissitudinem, & fiat quasi vng. & liniatur eo locus. Si autem adueniat pruritus, & squamae, & quasi quedam excoariatio, liniatur locus cum isto medicamine: R. anacardi, costi, ellebori nigri, vitrioli (aliàs atramenti, ut Gordonius habet) aristoloch. combustorum, an. 3 vi. (Valescus habet ana 3 ij.) terantur & cribellentur & conficiantur cum aqua: vel omnia ista qua dicta sunt conficiantur cum modica quantitate cera & olei, & melius adharebit, & fiat vng. quo unguatur locus affectus. ad idem valet, si cum stercore caprino, mixto sale & melle unguatur. Sed & hoc apud Gordonium mirabile vnguentum ponitur, valens ad omnes rubores & infectiones cutis de cholera aut sanguine, ubicunque fuerit, aut utrisque humoribus insipientibus cutem: R. sulphuris vini, antipigmenti rubei ana 3 ij. puluerizentur, & cribellentur in ultimo, & conficiantur cum succo de fumo terra: & si herba ipsa non inueniatur, cum syrupo de fumo terra: & fiant trochisci, & desiccantur in umbra, & cum uti volueris dissemperantur cum vnguento citrino, & unguatur locus, & in crastinum cum aqua sulphu-

Vng. mirabile, quo quinque annis laborans ab impetigine curatus fuit.

Vng. Gordonij.

Vng. ad omnes rubores & infectiones cutis, ex cholera aut sanguine aut hum. simul mixtis.

rea, vel, ut habet Valeſius, cum aqua ſurſuris) abluatur, & hoc fiat toties donec curſtur. Oleum frumenti, pix naualis, ſinapi, & oleum eius, gummi arab. cum aceto, cordumeni, ſem. naſtur-
tij, ſemen ruta, mel anacardinum & ſimilia egregiè conferunt in iſto caſu, etiam cortices mali granati. Vel fiat iſtud: R. un-
guenti citrini, unguenti ſuſci, lithargyri ana ꝑ. ij. miſceantur.
Sed & hoc à ſide digno accepi valere ad ſcabiem ſeram & ſer-
piginem: R. olibani ꝑ. ſ. lithargyri, plumbi vſli ana ꝑ. j. cerni-
ſa ꝑ. ij. terantur omnia, & in olla nona cum aceto coquantur,
addendo cum bullire incipit modicum de oleo & aceto; & ſic
fac ipſum decoqui ad ſpiſſitudinem liquidiffimi unguenti. Eo
feliſſimè utebatur M. Iohannes Tiengius medicus Amſtelroda-
menſis. Sed & puſtulis ſuis impetiginofis egregius ille Iohannes
Heuterus, Delphenſis, cognatus uxoris meæ, imponebat folium
querqus per ſe: hoc enim paulatim madentes impetigines &
ſcabiem illam ſeram in cruribus aſcere faciebat, & exiccabat,
ut ipſi conſpeximus. Alij veniunt foliis alchimilla, nec malè, ut
Reinerus Henrici ille Cereſiſarins, Delphenſis ſe ipſum cura-
bat, ſimul & puſtulas ſcabiſus madentes, ſed pure oppletas
prius acm ſindebat, mox folia alchimilla applicabat.

Conferens
ſerpigini &
ſcabiæ ſeræ.

OBSERVATIO XIII.

*De lichene impetigine & vlceratione ſæda
intercutanea.*

MV L I E R quædam Delphenſis, quæ ad fo-
rum hauenarium Delphis commorabatur;
per multos annos laborauerat lichene impetigi-
ne valdè vlcerofa intercutanea, ſubinde madente,
cum perpetuo pruritu, non ſolùm circa crura, ſed
etiam in partibus corporis diuerſis, etiam in pe-
ctore circa mammas & in facie; eratque ſæda vlce-
ratio intercutanea, ut quaſi pro leproſa haberetur.
Hanc ſubinde purgauimus cum caſſia, confectione
hamech, cum decoct. ſenæ, cum pill. de ſumeter-
ræ, indis, aliſque appropriatis. tandem; cum
multa topica adminiſtrata eſſent remedia, per me,
tum

tum alios chirurgos plurimos, ad extremum quasi deplorata, cum chirurgi eam curare non possent, ex consilio nescio cuius mulierculæ accepit butyrum & ferri squamam, quæ inter cœdendum excutitur, quam puluerizabat & cum pice nauali, Germanicè *teer* vel *ter*, componebat linimentum, inungens crur leniter: & curata fuit. Sed postea, ut ipsamet mihi retulit, loco squamæ ferri accepit carbonem fabriles, eosque puluerisatos cribro excipiebat, illumque puluerem vnâ cum butyro & pice nauali bullebat in olla leniter, donec in linamentum coiret. Quamuis autem fœtorem satis molestum ex se emitteret hoc vnguentum, egregiè tamen ad rem faciebat; adeò ut solo hoc remedio à fœda illa impetigine illa tandem sanata sit.

Ego autem ipse quandam impetiginis speciem habui, seu varos quosdam, dum Romæ agerem, anno 1544 mense Octobri, idque duntaxat in fronte. Cum enim Valerium illum Cordum doctissimum (cuius mentionem ego aliàs feci in lib. meo de impostoribus medicis) sequutus fuissim in conquirendis herbis ac simplicibus, ac cum ille Romæ (proh dolor) moreretur in vlnis meis ex febre hemitritæ pestilenti, ac cum illâ causâ vigilando aliquas noctes insumpissim, in idem ferè malum (quamuis febrem minùs malignam) incidi: cui cum accederet angina, à qua curatus fui septimo die quasi per crissim sudore quodammodo diffuens, tunc mihi pustulæ quædam quasi morbillosæ, vatorum instar, ac pruriginosæ rubræ in fronte ad formatam fabarum per medium scissarum aliquantulum duriores apparuere, & postea meliùs habere cœpi, febre desinente, tum capitis dolore, qui continuò adfuerat. Post diem vnum atque alterum cum Gisbertus Horstius præceptor meus, medicus ille insignis hospitalis Mariæ Consolationis me inuiseret, atque eas pustulas cum vidisset, subridere cœpit, inquires,

Valerium Cordum Romæ mortuum.

Gisbertus Horstius Amstelredamensis, medicum Romæ non insignem.

nisi te cognoscerem, ac pustulas illas criticaſ esse di-
gnoscerem; dicerem luem Gallicam esse. Sed quan-
tum ad earum, inquam, curationem, conclusum est
inter me ac illum, vt incuratas sineremus, ne intrò
repercuterentur, iuxta 20. aphor. Hip. lib. 1. Quæ
iudicantur & iudicata sunt integrè, neque mouere,
neque nouare aliquid, siue medicamentis, siue aliter
irritando. Tandem tamen, cùm me aliquot diebus
domi continuiſsem, licet sanus, nec in publicum ob
pustulas illas fronti insitas & per frontem serpentes,
omnibus quoque perspicuas, procedere auderem;
cùm viderem eas per se non euanescere, sed turpio-
res euzdere, magisq. intumescere ac subleuari, abs-
que tamen dolore; omni manè propria saliuā idque
ieiunè magis, simul etiam in die sæpiùs perfricau-
i: nam hoc contra serpiginem & impetiginem, præ-
sertim hominis ieiuni, valdè commendatur, vt et-
iam superiùs mentionem fecimus. Et ita tandem
cœperunt sanari ac euanescere, absque vllò alio re-
medio aut linamento. Estque hoc consiliū Aui-
cennæ contra impetiginem: sed ipse addit campho-
ram. At ego vsus sum solâ saliuâ absque camphora,
& optimè nutu Dei conualui, nec vllum vestigium
pustularum in fronte remansit, aut impetigo ista
reuerſa est.

S C H O L I A.

L EONVS in methodo sua curandi tumores præter naturam
cap. 42. de impetigine, lichene & mentagra: Impetigo
(inquit) Latine, *λεχνη* Græcè dicitur ille affectus, quem vulgo
volaticam appellant: talem mortuum Romani difficilem factum,
quoniam à memento serè inchoabat, vel præcipuè id affe-
ebas, Men-
tagram vocârunt: Irrepsit in Italiam hic affectus Tiberij princi-
patu, antea vniuersa propemodum Europæ incognitus, sine vllò
dolore, & sine vita pernicio, tanta tamen fœditate, vt quacun-
que mors præferenda esset. Est autem levis cutis infectio, quæ
dum talis manet, cum sola videlicet cutis affredine, ac pruritu,
imperi-

Mentagra.

impetiginis nomen retinet, ut diximus: dum peior fit, nomen sicuti formam mutat. Si enim manifestas squamas facit, satius profunda est, Lepra dicitur: si per extimam tantum superficiem extenditur, & furfuracea corpuscula emittit, & ex a Græcis, a nostris Scabies vocatur. Quod autem impetigines seu lichena in lepram & scabiem degenerent, testis est Galenus, cum multis aliis locis, tum quinto de compositione medicamentorum secund. loc. cap. 5. & 7. Caterum cum de impetigine iuxta Barbaros diximus, nunc etiam quedam hic dicamus iuxta eos qui Latine aut Græce de eadem scripserunt. Inprimis vidoamus Celsum, qui quatuor eius species faciebat, ut Scholio Obser. 10. præcedenti huius libri dicere cœperamus. de cuius speciebus & curationibus quid ipse dicat, eundem nunc audiamus. Impetiginis verò (inquit) species sunt quatuor. Minimè mala est, qua similitudine scabiem representat. nam & rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ab ea, quia magis exulcerata est, & varis similes pustulas habet: videnturq; in ea esse quasi bullula quedam, ex quibus interposito tempore squamulae resolvuntur, certioribusq; hoc temporibus tenentur. Eiusmodi varii sunt illi quos Roma habui in fronte, impetiginis instar, ut in præcedenti Scholio memoravi: quos ex consilio Auicennæ salina propria & nullo alio remedio persanavi: cuius Auicennæ de hac re ista sunt verba 2. Canonis: Salina, inquit, hominis ieiunii scorpiones interficit. Cum eadem & camphorâ fricatur & sanatur impetigo. Et hoc ipsum citatur & ponitur in Horto sanitatis lib. 1. de animalibus cap. 1. de homine. At ego usus sum sola salina absque camphora, & optimè nutu Dei conualui, ut in Observatione præcedente dictum est. Sed ut ad Cornelium Celsum redeamus: Alterum genus peius est, simile papule fera, sed asperius, rubicundiusq; signis varias habens. Squamulae ex summa cute discedunt, rosis maior est, celerius & latius procedit, certioribusq; etiam nonnumquam priori temporibus & fit, & desinit; Rubrica cognominatur. Tertia etiamnum deterior est, nam & crassior est, & durior, & magis tumet: in summa cute funditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit: & latè & tardè eminus serpsit. In temporibus aut oritur aut desinit, neque ex toto tollitur; Nigra cognomen

Celsus lib. 5.

Species impetiginis apud Celsum Rubrica dicta.

est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore: nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile: squamisq; habet pallidas, quasdam subalidas, quasdam lentisculæ similes: quibus rursus nonnumquam profluit sanguis. Alioquin vero humor eius albidus est, cutis dura, atque fissæ est, procediq; latius. Hæc verò omnia maximè genera oriuntur in pedibus, & manibus: atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quàm quod ad scabiem quoque pertinere sibi autore Protarcho retulit. Serapion autem nitri lib. ij. sulph. lib. iij. excipiebat resina copiosa, eoque utebatur. Sed & Amatus Cur. 29. (Centuria 2.) in qua agitur de lichene impetiginæ dicta, sic de illâ scribit: Monachus Divi Domini, natus annos duodecim, impetiginem lichenem dictam indicem digitorum ad os usque exedentem habebat. cui nostro consilio, quum viginti de plumbis optimè concinnatum superimponeret, intra quindecim dies sanus factus est. Lichenes, (idem inquit idem in Scholio,) omnium doctorum sententiâ impetigines sunt; & rectè sanè, quum Plinius lib. 20. Nat. sua historia cap. primo, in quo de cucumere sylvestri & elaterio agit, inquit: Eius radicem aridam cum resina impetiginem, & scabiem, quàm pforam & lichenas vocant, sanare. Ex quibus verbis satis clarum enadit, lichenas impetigines esse, veluti pforam scabiem. Sed unum observatione dignum apud Plinium ipsam existimò, quòd lichenes libro vigesimo sexto, cap. primo, ab eo descripta, longe à lichenibus impetiginibus dictis sunt diversa: quia lichenes impetigines dicta, Græcis & Romanis semper cognita cutaneæ affectiones fuerunt: illæ verò lichenes de quibus libro 26 tractat, numquam ante Tiberium Claudium Casarem visæ fuerunt. Quam luem; Latini Mentagram ioculari nomine, quoniam per osculum à mento ferè oriebatur, appellarunt, & hodie iam non extat: sed illius vice morbum Gallicum subintravit: quem Mentagram nonnulli contestati sunt, ut apud Leoniceum libello de morbo Gallico diffusè legitur. At labem diuinam illam, Mentagram dictam, quæ non nisi causticis curabatur, lichenas medici appellauere, quia cum Græcorum lichentibus similitudinem aliquam & affinitatem habebat. Ex virisque autem his morbis squama decidunt cutanea, quales crustosa squama ex

Medicamentum Celsi ad impetigines.

Amati historia de lichene impetiginæ dicta.

Quæ lichenes fuerunt Græcis & Romanis cognita, & quæ postea irrepierunt.

scitilibus

ficilibus diu salsuginosa seruantibus decidere solent. Propriè tamen mentagra, prurigo morbus est, quem volaticam nonnulli ^{Mentagra} appellare solent. Caterùm imperigines (ut paulo antè quoque ^{proprie dicta.} diximus) ut Galeno placet lib. 5. de compos. med. per loca cap. 5. ex mixto quopiam generantur humore, serosis nimirum ac tenuibus & acutis succis, cum crassis permixtis. Qua propter etiam facile in psoram, ac lepram transit affectio hac. Indigetq; etiam ipsa pharmacis fortiter exsiccantibus seu resiccantibus. Postquam verò in psoram aut lepram transferis, ultra hoc quòd resiccantibus indiget pharmacis, & repurgantia, & extensoria quoque exposulat. Quibus Galeni verbis & Aëtius & Paulus, ^{Galenus. Aëtius. Paulus.} ac omnes post eum medici subscripserunt. Vnde rectè, mea sententia, Corn. Celsus (ut paulo antè retulimus) lib. 5. sua medicina cap. 28. sciens imperiginem cutis infectionem esse, eius quatuor est ausus describere genera: tamen si Græci homines lichenibus suis nunquam tot genera tribuerint, quæ nos apud ipsum legimus. Vtunque tamen Gal. in Introductorio sue medico libro sibi ascripto, imperiginis duas facit species, quæ cutem molestant: quarum una tolerabilior, mitiorq; est; altera fera, agrestis, difficulter eradicabilis, quæ tum sinigmati foris adhibitu, tum intus pituitam euacuantibus medicamentis adiuvatur. Cuius generis lichenas apud Plinium lib. 26. descriptas, & licentiori vocabulo mentagram dictas, Marardus esse credidit: ut ^{Marardus.} apud ipsum quæ legere poteris lib. 18. Epistolarum, Epistol. 3. Qui, ut obiter quoque hoc attingam, pruriginem propriè mentagram infectionem dictam, vulgo volaticam appellatam, imperiginem leuem inibi facit: quam vel solâ salina multi depellere conantur. Caterùm hac de qua sermo etiam Amato agitur, & monachuli digitum fœdabat, exedens erat, profunda, & squamulæ ex se mittens, prædicto unguento tandem domita, & ex toto extirpata. Porro duplicis illius imperiginis à nobis ex Galeno citatæ Cornelius Celsus lib. 5. sua Medicina, postquam de imperiginibus tractauit, sub papularum nomine mentionem facit, ut cuique conferenti notum euadet: vnius quidem lenioris, quæ si reuina salina quotidie defricatur, sanescit; talis & mea erat, de qua paulo antè diximus, licet in papulas paulo altiores & latiores duriorésque serpebat, non tamen cumulatim,

nam distincta erant: alterius maioris, in qua cutis magis ex-
 asperatur exulceraturq; ac vehementius & rodit & rubet, dis-
 ficiliusq; sanescit, quam agriam, id est, seram à Grecis appella-
 ri contendit. Vtrique tamen generi ruinus vitij, quàm impeti-
 gibus iuisse, tradit: adeò ut id quod difficilius sanescit, nisi
 sublatum sit, in impetiginem verti, ac transire affirmes. Cuius
 sententia à Galeni dictis multum abesse videtur, quum secunda
 eius impetiginis species ita grauis & difficilis curatu esset, ut
 non nisi castoreo euelleretur. Adeò ut Mauardus Ferrariensis
 ausus sit affirmare, lichenas mentagram vocatam, illius esse spe-
 ciei, ut supra à nobis notatum est. At nos cum Amaro, ne mul-
 torum sententia varia hinc inde adducta, rem sic indiscussam,
 ac ut potius confusam dixerimus, relinquamus, Galeni genui-
 num sensum ex propriis & germanis libris eius decerptum, in
 praesenti proponemus, ne quum deinceps ampliùs inquirendo fati-
 gemur: sed rei summam paucis potius habeat. Meminit igitur
 Galenus lib. 5. de compos. medicam. per loca cap. 5. lichenes,
 id est, impetigines, facile in psoam & lepram transire: proin-
 de sic habeo. Si lichenes sola leniori cutis aspredine & pruritu
 manserint, impetiginu nomen retinent, ut & antea memini-
 mus: Si autem manifestas squamas excitauerint, & aliis en-
 tem depasta fuerint, tunc propriè lepra dicitur. At si per exti-
 mam tantum superficiem extensa fuerint, & corpora furfuracea
 remiserint, psora à Grecis appellatur, à nostris verò scabies:
 quamquam scabiei nomen (ut & antea diximus) vulgo medi-
 corum latius longè pateat, qui omne cutis vitium scabiem no-
 minant. A quibus infectionibus quum humores profundius &
 aliis carnes depascuntur, pustula, ulcera & huius farinae re-
 liqua vitia nascuntur. Ceterum lichen herba quoque est dicta,
 quae lapidibus in humectis locis haeret, & lichenibus & iccoris
 calidis affectionibus conuenit; ac inde ab aliquibus iccoraria
 appellata est.

Genuinus
 sensus Gale-
 ni de lichene
 ac impetigi-
 ne.

OBSER-

OBSERVATIO XIII.

*De specie lichenis seu impetiginis aut serpiginis,
vulgarî idiomate Haerworm dicta.*

GVILHELMVS Melissæus, vulgo De Bye dictus, vir ferè sexagenarius, qui ad portam Diui Georgii Delphis habitabat, scabie admodùm fœda instar impetiginis seu lichenis cum fissuris valdè manantibus, & squamas emittentibus, quasi lues Gallica fuisset, in palmis, manuum correptus est. erat autem ex illis speciebus malî quæ vulgo *Haerworm* dicitur. Solet & maximè crura occupare, ac alia corporis loca, vt Obser. xi. præcedente diximus de Arnoldo Henrico, poculorum fusore. Hic cum topicis medicamentis tam vnctionibus quàm linamentis ac fomentis etiam ab empiricis adhibitis curari non posset, me consuluit, & tandem post vniuersalia, & totius corporis probam euacuationem, per me præscripta, tum alia communia remedia, quibus in scabie fœda ac fera vtî consueueramus, vnguento infrascripto cum sese inunxisset, egregiè curatus est: ℞. plumbi vsti, minij ana ℥ ij. pul. præcipitati ℥ xij. litharg. auri ℥ iij. antimonij, camphoræ ana ℥ iij. vng. albi camphorati ℥ xvi. omnia commiscendo probè ducantur cum pistillo calido quàm diutissimè in mortatio, ad vnguenti consistentiam. Hoc vnguentum paratum habebatur in officina Hugonis pharmacopœi Delphensis. Vtor felicissimè in scabie illa dicta *Haerworm*, quæ species procul dubio impetiginis ac serpiginis est valdè feræ & agrestis. leuiter autè inûgitur, sed purgationibus tum vniuersalibus remediis semper præcedentibus. appellamus autem vnguentum album camphoratum cum antimonio. Sed & Alcmariæ in officina tale vnguentum paratum habebamus.

M 5

ad

ad hanc serpiginem dictam *Haerworm* : ℞. picis naturalis, idiomate nostro vulgari *Teer* vel *Tar*, ʒ j. butyri maialis, axungiae porcinæ ana ʒ ʒ. mellis, terebinthinæ ana ʒ ij. β. aceti vini ʒ j. β. salis, vitrioli Romani, tartari, carthami ana ʒ j. æris vsti, sulphuris ana ʒ ij. fuliginis camini vel cacabi ʒ iij. misce. & fiat vng. secundum artem.

SCHOLIA.

TALIA vitia proximè accedunt ad lepram Græcorum; unde & impetigines seu lichene in lepram & scabiem degenerant, ut testis est Galenus 4. de compos. med. secund. loca cap. 5. & septimo : & apud Paulum lib. 4. cap. 3. Quomodo fiant, iam in precedentibus dictum est, quarū causa etiā antecedens mala vitii ratio est, ex citis prani succi talem humorem serosum acrem crassoremq; procreantibus. Emergunt impetigines, quemadmodum & lepra & vitiliginēs. Vere potius quam aliis temporibus : quoniam cum ver sit saluberrimum, hoc ipso tempore profundum corporis expurgatur vitiosis humoribus à partibus principalioribus ad cutem pervenientibus. Signa per se patent, tum ex his quæ in precedentibus Scholiis diximus. Quantum ad prognostica, hoc addemus ex Galeno, qui hac ipsa à Critione mutuavit, sic scribens, quod lichene menti sunt molestissimæ affectiones : nam & pruriginem inducunt, & affectuum partium circumtensionem, & periculum non modicum : proserpunt enim aliquando per totam faciem, oculosq; contingunt, & ferme extremae sorditatis causa existunt. Quæ propter diligentiore curâ utendum est, inspicendo tum paroxysmos, id est, irritationes, tum intervalla & remissiones, ita ut etiam ab igne recentēs disparemus. Corpore igitur toto, ut iam sapius diximus, enacnato, simplicia quidem ipsis conferent, etiam teste Paulo, cicer, veratrum, erinaceus saxatilis, pix cerato resinaq; missa, crocodili terrestrius sterces, atque sturnorum, cem orysam solam edcunt. Plerique hoc solo impetigines mentium infestantes, aliâve particulam, aboluerunt : Tritici multum capiteur, incudique ignita chipiam imponitur ; & quicquid inde humoris defluit, calens adhuc impetiginibus illinitur. Puerorum impetigines,

Paulus.

Causa antecedens.

Gal. Comment. 3. aph. 20.

Prognostica.

Curatio.

ius, hominis salina continuè defricantur. His opitulatur etiam pruna gummi illitum. In veritatem incidentibus viticia folia cum aceto detrita applicantur, vel capparis folia similiter. Composita verò hæc: sulphur cum thuris lachryma, aut cum ammoniaco subactum aceto illinitur. vel: R. glutinis fabrilis ʒ iiij. sulphuris vini, thuris ana ʒ ij. aceti ʒ j. β. aceto soluta illinuntur. Aliud: R. chalcitidis, gummi ana ʒ vii. sulphuris ignem non experti, misyos ana ʒ vi. squama aris, acacia ana ʒ ij. aceto, omnia prius bene confusa, delinuntur. Vel sulphuris vini, nitri spuma ana ʒ iiij. cachryos grana 60 lenigantur ex aceto. Ad feras picem Aphricanam cum aceto coctam liquatamq; illinito. Aliud ad impetigines & pruritus: Atramenti snorij, sulphuris vini, nitri, thuris, pari modo, in impetiginibus quidem, aceto adiecto; in pruritu autem, vino vitior. Aliud lichenicon ab impetiginibus curandis nuncupatum: R. gutte ammoniaci, orni farina, lupini farina an. p. a. aceto illinuntur. Plura super hoc affectu pete ab ipso Galeno 5. de compos. med. secundum loca. Aduersus tibias vermiculosas, vulgo Haerworm: Rusticus quidam cum ex fece vini prius in lapidis morem producta & in ignem tosta, deinde coniecta in aquam fluiatilem, sibi balneum parasset, hoc tibias abstergens, curatus est. Valet etiam ad serpiginem & lepram ex sulphure puluerisato, oleo tartari, & aceto ros. linimentum factum donec albescat. Hoc modo & alius curatus est: sed prius hunc bolum deuorauit: R. diapruui solut. ʒ vi. confect. hamech ʒ ij. β. cum sacch. fiat bolus. Vel succus hederæ arboreæ cum axungia porcina in linimentum coëat. eo sanatus est quidā ab impetigine & serpigine intra tres dies. Reliqua quæ ad lepram Græcorum etiam valent, cum de mistis humoribus dicemus, persequemur. & quia aliquando etiam acrem biliosumq; humorem habet impetigo, licet cum crassiore quoque misceatur, hic differendum de impetigine putamus, cum de affectibus externis biliosis loqueremur. Nunc de hydrois sine sudaminibus pauca adiciamus.

Aduersus tibias vermiculosas, vel impetiginem.

OBSER-

OBSERVATIO XV.

De hydrois seu sudaminibus.

PVELLÆ cuidam hydroa seu sudamina habenti instar ulcerum, cutem exasperantia, rubra, mordicantia, biliosiora & cutem pruriginosam reddentia, post purgationem ex decocto senæ ac infuso rhabarb. & cassia, sæpe syrupum ex infus. ros. propinauimus: loca autem pruriginosa cum decocto maluæ, viol., hordei, fœnugræci ac plantag. sæpe abluimus: deinde sana facta sunt, albicantibus deinde squamulis quibusdam relictis. At pustulæ illæ aquosæ, etiã hydroa dictæ, quæ in Margareta Susia in Haga Comitis longo tempore in fronte ac facie emergebant, admodum parvæ, milij magnitudine, aquâ plenæ, sine rubore ac sine dolore, siccioribus medicamentis à nobis curatæ sunt: vsi enim sumus lithargyro in aceto acerrimo longo tempore nutrito & insolato cum oleo ros. Præstat enim in iis papulis magis siccantibus vti.

SCHOLIA.

QVAMQVAM de hydrois seu sudaminibus longiore sermone diximus Obs. 60. de muliere quadam, & 61. lib. 6. quæ sudamina habebat; ac in Scholiis ibidem de iisdem egimus: hic tamen sciendum quod hydroa à quibusdam refertur ad pustulas biliosas, quemadmodum Leonus facit cap. 19. de tumore præter naturam, sic scribens de hydrois sine sudaminibus. Non prætermittam quasdam pustulas biliosi humoris naturæ seruantes, quæ Græcis ἰδρωα, Latinis sudamina, à Plinio papula sudorum, ab Anicennâ Planta noctis, à Rhazâ Alhasaphum, vulgo Fersadure dicuntur. De his Galen. Comment. 3. Apho. 2. 1. in hunc modum fecit mentionem: Sudamina verò è genere pustularum sunt, in summa hærentium corporis parte, quæ instar ulcerum cutem exasperant. proneniunt autem, quemadmodum ostendit nomen, propter multos sudores, qui

De hydrois
sive sudamini-
bus biliosis-
ribus.

1^a spæ.
Sudamina.
Papulæ sudo-
rum.
Planta noctis.
Alhasaphum.
Fersadure.

qui vel biliosiores, vel omnino mordaces existunt. mordent enim
 si cutem, & pruriginosam efficiunt, & per modum ulcerum ex-
 asperant. Hac Galenus. Aestivo tempore hic affectus grassari so-
 let. Caterum facilis est curationis; adeò ut per se absque ullo
 praesidio albicantibus quibusdam squamulis dimissis sanescat.
 Proderit tamen agrum ablueri cum decocto hordei, malvarum
 & scænu-graci. Huius quoque generis esse videntur quæ in febril-
 bus pestilentialibus apparere solent, quæ dicuntur vulgo Root
 hont, aut rectius Root gront, quia sub cute vel in cute
 purpuram imitantur. At pustula illa exigua aquosa, etiam hy-
 droa dicta apud Fernelium lib. 7. de externis corp. affectibus
 cap. 5. de pustulis, longè aliam differentiam habent, de quibus
 ita scribit: Cutis admodum frequens vitium est pustula, cuius
 appellatione comprehenditur quicquid rotundo schemate leniter
 in cute exuberat. Eius duo genera: una est humida, è qua rupta
 vel humor vel sanies vel pus emanat: altera sicca, humoris nihil
 profundens. Humidis continentur hidroa, ephelides, phlyctæne
 seu phlyctides, & quæ ex his ruptis sunt scabiei genera. In siccis
 numerantur exanthemata quadam, pruritus, deinde & vari &
 verrucarum genera. Exigua & aquosa pustula sunt hidroa, id
 est, sudamina. Emergunt repente sparsim toto corpore, sed fre-
 quentius in manibus, pedibusq; milij magnitudine, aqua plene,
 sine rubore, & sine ullo dolore. sunt enim ex sudoribus sub epi-
 dermide coercitis, per cuius spiracula illi digeri minimè possunt:
 unde à quibusdam sudorum papule nuncupantur. His aliquanto
 maiores sunt ephelides, pustula quidem in ambitu rubra ac fer-
 nida, leni dolore, è quarum medio rupta bulla aut vesica albus
 humor insilar lactis exit; scabièsque succedit. Fiunt autem ex
 fernido impuroq; sanguine sub cutem effuso. Caterum de scabie
 postea suo loco. Hidroa itaque descripta diuersa esse videntur ab
 his quæ diximus, maiorique exiccatione in curatione indigere vi-
 dentur. Huc verò pertinent pustula illa parua exigua minuta
 le, maximè in pedibus & manibus, quæ vulgo dicuntur Cirones.
 Confert autem ad Cirones & pruritus primò si locus laesatur
 cum lixivio facto ex cineribus ramorum geniste aut quercus, aut
 sarmentorum vitis, & loco balneato & loto fiat exiccatio: &
 liniatur unguento sequenti: R. lapathi acuti, scabiosa, absin-
 thi,

De hydrois
 & sudamina-
 bus aquosis.

1^a sp. aqu.

Aliquantis.

Ad Cirones &
 pruritus.

thi,

ibij, tanacetij, foliorum persicorum, fraxini, hyoscyami, foliorum
 nucis magna ana m. j. contundantur omnia, & cum succis istis
 sumantur axungia veteris porcine lib. ij. bulliant omnia ad con-
 sumptionem succorum, postea adde picis nautalis lib. j. s. coletur
 totum per pannum. Deinde R. myrrha, thuris, mastice an. ʒ ij.
 pulverizentur subtiliter, & imponantur colatura, & monean-
 tur cum spatula donec modum unguenti acquirant. Et quando
 cum eo operari volueris, tunc in ʒ vi unguenti potest addi ʒ j.
 argenti vini, extingui cum salina, aut cum albumine oui agitato.
 & intra quindenam diem omnem talem scabiem, seu cirones cum
 pruritu, etiam cum vermibus (nam in cironibus putantur esse
 vermes, qui istum pruritum faciunt) curabis. Sed in principio
 inducit magnum pruritum, quia vermes fugiunt ad intra, pro-
 pter unguentum. Aliud ad Cirones & pruritum: R. aloës spa-
 tica; misce cum aceto forti, & adde parum sulphuris cum mo-
 dica axungia veteri; & fiat unguentum: & si adderetur pa-
 rum argenti vini, esset fortius. Sed hic, sicuti in aliis omnibus
 pustulis, & etiam scabie, cavendum erit ne eis utamur ante re-
 media universalia & purgationes, potissimum si argentum vi-
 num recipiant. Hoc quoque experitissimum habetur ad Cirones,
 & humiditates subiles a tibiis excurrentes: R. sulphuris p. ij. sarco-
 colle p. j. incorporentur cum axungia porci q. s. & fiat unguen-
 tum. Verum de pustulis scabiosis, tum de scabie ipsa, latius di-
 cturi sumus postea, cum de tumoribus prater naturam missis
 agemus. At cuidam qui pustulas cholericas in exteriori parte ma-
 nu habebat, hoc unguentum valde contulit: R. tartari, plumbi
 viti. cineris cucurbitae ana ʒ ij. zinzib. ʒ j. succi lapathii quar. j.
 olei viol. ʒ ij. bulliant lento igne ad consumptionem succi, ad-
 dendo cera nona ʒ ss. in fine adde sulphur ʒ j. & fiat unguen-
 tum. Nunc ad ambustos progrediamur.

Ad Cirones &
 humiditates
 subiles a
 tibiis excur-
 rentes.

Unguentum
 ad pustulas
 cholericas.

OBSERVATIO XVI.

De ambustis.

Ad ambustionem utitur mucagine sem. cy-
 don cum aqua ros. extracta; uti in nepotulo
 meo Augustino Teylingio, qui ex igne oculum com-
 bustum

bustum habens, hoc modo pluma admota curatus
 est. Vxor Adriani Dodonij, quondam pharmaco-
 pœi mei Alcmariani, cum inopinatè igne sese circa
 frontem combussisset, applicata ex consilio mulieris
 est hæc mixtura; qua ilicò dolor intensissimus seda-
 tus est, & ipsa ambustio curata: ℞. mellis, fatinæ tri-
 tici an. p. æq. vitellum oui vnius, probè inter se mi-
 xta apponebantur. Amatus Centuria quarta Cu-
 rat. 34. Puella quædam, inquit, aqua ex igne ebul-
 lientè supra ventrem ad vmbilicum adusta fuit; vn-
 de vesiculæ & bullæ ortæ sunt, à quibus postea ru-
 pris vlcera euaferunt. Cæterum puella tunc non
 adeò malè habuit, sed vesperti tota rubea est facta,
 & tamquam mortua iacebat. ad quam vocatus, ex
 populeone vnguento totum eius ventrem illini
 fecit, & folia vitis superaddebat: quo remedio puel-
 la intra quatuor horas ad se rediit: & paucis postea
 diebus ex toto sana euasit. Quod verò intus intesti-
 na ex aquæ ingenti caliditate tumuerint, vnde sym-
 ptomata grauiora ortum traxerunt, pro certo, inquit,
 crediderim: vlcera tamen postea ex vnguento è cal-
 ce sæpè parato, sana sunt reddita. Helideus præce-
 ptor meus in ambustione utebatur, si nihil aliud ad
 manum esset, succo cepæ, quo ambustionem obli-
 nebat; vel hoc sequenti: ℞. olei hypericonis ℥j.
 calcis bene lotæ & extinctæ ℥ij. misce, & illiniatur
 locus affectus donec sanatus sit. Idem quoque ad
 combustionem primùm applicabat albumen oui;
 istud enim facit ne vestigium relinquatur. deinde
 accipiebat calcis decies lotæ ad artem, litharg. aurei
 ana, cum oleo hypericonis faciebat vng. & perunga-
 tur locus. Postea ad delendam cicatricem etiam
 plurimum confert oleum de vitellis ouorum. Item
 succum cepæ multum conferre dicebat combusti-
 onibus à proprietate occulta; atque hæc omnia ex-
 pertissima esse. Idem utebatur illo vnguento supe-
 rius scripto de calce ad perniones vel contritiones
 pedum

pedum ex frigore aut itinere. Bartholomæus de Montagnana in Antidotario suo scribit bonum esse Vnguentum de calce contra adustionem ignis & aquæ in fine status & declinationis: quod ita apud ipsum fit: ℞. olei ros. ʒ iij. olei omphacini ʒ iij. ceræ albæ ʒ j. dissoluantur & coquantur modicum: deinde infundantur in aqua frigida, & cum congelatum fuerit, simul lauetur tribus vicibus cum aqua frigida. postea addatur cerusæ subtilissimè puluerisatæ ʒ j. β. thuris, sarcocollæ ana ʒ j. calcis præp. ʒ j. croci ʒ j. litharg. spumificati ʒ j. vel j. β. incorporentur simul, & fiat vnguentum. Matthiölus linimentum liquoris describit ad combustionem: ℞. vernicis liquidi ʒ iij. ex aqua solatri aut plantag. vitellos oui tres, butyri recentis ʒ ij. olei ros. omphacini, viol. nenuphar. ana ʒ ij. misce omnia hæc, & fiat vnguen. quod locis vtilatis mirum in modum confert.

S C H O L I A.

Paulus lib. 4.
cap. 11. ad
ambusta
ignis.

IPSE ordo quodammodo exposcere videtur, ut de ambustis post ipsos biliosos tumores dicamus: nam quemadmodum bilis inter elementa qualitate sua igni responder, ita & ambusta, vel ab igne, vel à materia ignita excitantur. In eiusmodi igitur affectu moderatè extergentibus vel abstergentibus phærmacis citra manifestam calfactionem, aut refrigerationem opus est. Itaque terra chia, cimolia, cretica, omnisq; lenis illita cum aceto non admodum acri, vel aqua, præclare facit, prohibetq; pustulas excitari: item ouum crndum statim impositum, lana molli exceptum: etenim refrigerat leniter, & citra rofionem desiccât. idem efficit atramentum scriptorium illitum, vel lachryma thuris aqua diluta: vel lenticula cocta tritaq;, vel eruū iniicitur. At ex aqua calente vñsiones prorsusquam pustula oriuntur, oliuatum balmadum aqua continnè superfunduntur ipsaq; balma des cum polenta contrita inducuntur, aut alumen fissile, pertritum cum aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copiosiore liquatum inungitur, aut lixiuium stillaticium superfunditur garo;

aut

aut miria sonetur, aut bulbi liliorum, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosaceo triti, & in sordium spissitudinem coacti delinuntur. Marcellum hoc compositum tradit: Panniculi melle imbuti, Marcelli
compositum
& hordei succo irrigui, combusti; cineris misceantur 3 viii. cernse 3 iij. butyri 3 vi i i, cera, seni capilli, rosacei ana 3 xvi. At p. s. u. i. s. iam ex itate, rhui cum polenta tritum aceto applicant, aut lixinium cum calce vina cerato mixtum illitum. que linteolo imponitur, id quod spharion dicitur medicamentum ambustum uile est: partes exulceratae partibus contritis obducuntur, aut porinlaca contrita cum polentis, aut columba simi linteolo inuoluti combusti; & oleo dilusi, cinere vitior. Mirificè proficiunt & picea aut rada cortex, aut adianthum aridum lenigantur; aut myrtifolia combusti, periritaq; insperguntur. Efficax autem unumquodque horum est & si cum cerato componitur: item quod rubra anchusa rad. sicca & coninsa pondō trientem recipit; cera tracta pondō dodrantem, rosacei unciae duodeuiginti, iam quod cernsa constat cum modica cerni nednlla, laudatum est remedium. Sed & ab aliis istius quoque cum aqua tritum; & bora folia coninsa & cocta ac cum uino imposita, & alumen omne cum aqua & oui candido. Hoc mirificè facit, uidelicet arginis & spuma argenti partes cum uino & oleo tritas cum penna illino Ambustum etiam aliud; calidis affectionibus prodest emplastrum ex plumbagine: Bz plumbaginis 3 ij. spuma argenti, cernsa ana 3 j. cera 3 iij. myrtei lib. j. uino lenigantur arida. Pariter prodest nunc ung. diapalma Paulus lib. 7.
Diapalma. uocatum; cuius compositionem uide in strumatum cura. Ambusta citò ad cicatricem perducit hoc, quod habet cernsa, spuma argenti, hordei usti ana 3 j. cera 3 iij. ros aut myrtei 3 vi i i. hordeum ad ceratum liquidum admisce, & postea spumam argenti ac cernsam in mortario cum uino tritas adice. Nunc ad alia exempla etiam ambustionis ueniamus.

OBSERVATIO XVII.

De combustiis.

ANNO 1559. cum Leidis ageremus in cura Domini prætoris Leidani Berendrechtii, de
N
quo

quò aliàs diximus, mense Februario, filia eiusdem passa est combustionem, decumbens in lecto ex negligentia famulæ lectum calfacientis. Henricus Vergerius & Hubertus medicus atque ego cùm præsens essem eo tempore, consulimus vt crurî combusto folia hederæ decocta in ceruisia apponeret; & ilico optimè fuit curata. Sed & Domino præposito in Campo regio epileptico, cùm cadens in epilepsiam pedem igne combussisset, ego eo tempore cùm commendarem præsente Ericio medico nostro sem. tydon. decoct. tum folia hederæ arboræ, ipse quoque attestatus est se plures folio hederæ appposito curasse. At hoc tempore chirurgus in fine applicabat vng. album, quod sic fit: R. cerussæ in aqua ros. loræ ℥ xvi i i. litharg. albi loti ℥ j. β. ol. ros. lib. ij. ℥ iij. ceræ albiss. ℥ v i aut circiter. confice secundum artem. Vide Valescum. pollet aduersus vlcera, scabiem & adustionem. Amatus inter selecta medicamenta combustionibus facientia, siue ab igne siue ab aqua feruente, siue ab aliqua alia procatartica causa eueniat, hoc priuatum medicamen habuit: quod habet sic: Lauri folia accipies, super quæ porcinam pinguedinem ignitam de alto cadere facies, quousque folia ipsa in cinerem vertantur. Eo verò cinere pinguedine obuoluto, ac in vnguenti formam redacto, combustionem particulam inunges: bisque in die renouabis: & eam intra tres dies sanam reddes.

SCHOLIA.

VALESCVS cap. 23. & proprio de adustione ignis vel aqua in tractu suo chirurgica inquit: Primum quod in isto casu accidit, est dolor, qui fit à mala complexione calida introducta à qualitate rei actuali adurentis. Secundum quod accidit est vesicatio loci propter attractionem humiditatum aquosarum ad locum combustum. Tertium est ulceratio. Primè igitur succurrendum est loco ne vesicetur (sic enim barbari loquuntur:) quod

Dolor.

Vesicatio.

Ulceratio.

quod sic fit secundum Anicennam 4. sen. 4. irac. 3. primo pulvis santalini distemperetur cum aq. ros. & camphora, & liniatur inde locus, & non permittatur desiccari. Ad idem valet aqua solatri; & ad hanc intentionem etiam confert bolus aris. temperata cum aceto vel aqua solani aut ros. incorporata cum pulvere oſtaceorum: & secundum Anicennam lentes elixata cum ros. & oleo ros. Valeſcus prima vocatione locis combusti apponit magnâ cum experientia lutum quod sub urceis vel vasis aquaticis reperitur, idq; frequenter: cui subinde addit albumina ouorum. interim querere iubet solanum, semperuinum, vermicularem, plantag. lentiscalam aqua; & similia, succumq; extractum cum pauco in eo madefactum apponit, continuando donec dolor remoneatur, & locus sit sine vesicatione. Idem præstat cimolia terra cum aqua end. vel ros. aut plantag. contemperata. Postquam autem locus est vesicatus, & adhuc remanet dolor, continuentur res si prædictæ, donec dolor omnino cesset. vel apponatur ung. popul. cum albumine ouorum. Postea & vesicatum ratio habenda. quæ si non triumphat per se, aci perumpenda, ut aquositas consentia expellatur, ut non corrumpat membrum in quo est: nam quanto magis ibidem manserit, tanto magis membrum & caro eiusdem corrumpetur. Quartum quod nobis occurrebat, est duratio ulcerationis & excoriationis remanentis. ad hanc intentionem iubent fieri ung. album camphoratum, incorporatum cum oleo ros. & albumine ouorum. & ung. de calce abluta septies & incorporata cum oleo ros. & aq. plantag. & camphora. vel addatur, secundum Anicennam, cimolia, cera & albumen oui. Vnguentum quoque factum ex litharg. puluerisato & cernsa cum oleo ros. & aqua plantag. contrita. Verum quamuis ista vnguenta sint artificialia, & optima in ulceribus post igneitatē remanentibus, & tamen non possunt bene remoneri, imò adhaerentiâ suâ dolorem inferunt, quæ non minus medico quàm agro ipsi radiosa sunt: & ideo aliqui solum ponunt oleum vitellinum, quo dicta ulcera solo innungunt usque ad finem curationis, quò ipse Valeſcus commodè viſi solebat. Vidi quoque, inquit, fieri tale ung. quod ænipolici oleo supradicto, quando aliis caremus remediis. in hasta lignea tenui frustula lardi tenuis abluta ponantur, ita ut inter duo frusta

Anicenna.

Ne fiat vesicatio, quid sit faciendum.

Experimentum Valeſci.

Si locus sit vesicatus, & dolor remaneat, quid agendum.

Vesicarum curatio.

Curatio ulcerationis & excoriationis remanentis.

Cautio.

Experimen-
tum simile
supradicto
experimento
Amati.

lardi unum folium lauri viridis ponatur, & sic faciendo magna pars hastæ impleatur: & post incende cuspitem hastæ, & ardeat tota hastæ cum lardo & foliis: & illud quod guttatim defluit, in scutellam coaceruetur, & cum ista unguento dicta ulcera liniantur bis in die naturali, superponendo pannum linnenum subtilem: & cum istis vidi frequenter locum sanari & cicatrizari. Ex quibus quoque patet quod illud experimentum Amati, quod se ab Indico medico accepisse testatur, huic Valescoprius non fuit incognitum.

OBSERVATIO XVIII.

De tactu igne aut aqua calida, vel qui coctura ignis, pulueris tormentarii aut aqua calida lesi fuerint.

VIPERARIUS quidam Romæ, insignis experimentator, ad combustionem ignis cuiuscunque generis folia cannæ reducebat in cinerem, & cum lardo antiquo puluerem ad formam unguenti commiscebat. inungebat eo locum affectum: deinde pannis cooperiebat, nec amouebat unguentum donec aliud apponeret. Sed & alius sequenti utebatur remedio: R. corticis viridis sambuci lib. i. olei ros. ʒ iiii. aquæ fontis lib. iiii. ceræ albæ ʒ i ʒ. bulliant omnia simul, & colentur, & lauentur cum aqua frigida. & vtere. Alius decoquebat in aceto, neque abluerebat aqua frigida. Alter vetò tactos igne aut aqua calida inungebat sequenti unguento. capiebat calcem viuam, & extinguebat oleo communij, deinde abluerebat calcem nouies aqua fontis aut cisternæ: & inungebat. Quidam & ad ignem Persicum hoc unguento utebatur: R. succi foliorum hederæ arboreæ lib. i. axungia porcinæ recentis quar. i. liquefacta axungia deinde cum succo coquatur usque ad succi consumptionem, siue quousque non amplius faciat sonum, eo inungito. Ad combustionem

nem aquæ ebullientis & ignis valet oleum nucum cum cera; vitellum oui crudum cum aqua mixtum superlinitur: ac etiam atramentum scriptorium cum aqua & oleo communi si superliniatur. Vnguentum populeon dictum, cum arnoglossa. Mulieres Delphenses in famulis cereuisiariorum applicant folia hederæ cocta in aqua, & sic curant eos quando ab igne aqua calente, quod sæpe fit, adussunt. Alij & emplastrum faciunt ad combustionem ex sero caprino, oleo raparum, adipe arietis, oleo lini & lacte dulci; & aliqui etiam ex sero caprino & supradictis, ex aqua exptessa à rapis assatis, melle & pice nauali, ex cortice mediano sambuci, oleo communi, thure & cera coctis, & colatis, cum optimo vino mixtis. Alij vulnèri per aquam bullientem aut ignem facto calcem viuatam, cum oleo mixtam & aqua loram, vt supra dictum est, inungunt, & desuper ponunt folium sapar haur caulis. Sed & alius quidam ad cocturam ignis pulueris tormenti & aquæ calidæ, (vt in experimentis Gisberti Horstii medici Romani præceptoris mei inueni) libras quatuor aceti ac libram vnam olei capiebat, in qua bulliebat medianam corticis sambuci quantum poterat capere quibus manibus. eaque ligata additis ℥ ij. ceræ nouæ bulliebat duabus horis in dicto aceto & oleo. deinde extrahebat cum suo filo ligatam rasuram sambuci, exprimendo & contundendo bene omnia, ac sic incorporando, vt in formam vnguenti coiret, quo felicissime utebatur. At illi cui pes & brachium combusta fuere, lac acetosum aut potius acidum tepidè admotum est: postea cum vnguento populeo, adiecta pauca ceru, commodè vinctio facta est. Miles quidam, qui in nostris ædibus versabatur, manum & totum fere brachium vsque ad cubitum cum puluere bombardæ combussisset, iussi vt famula meâ vitella ouorum cruda diu concuteret cum oleo raparum, vt

quasi in linamentum molle coiret, & panno lineo raro veteri inculcato bis aut ter in die cum humidum existeret vnguentum, illo vt vteretur: atque eo modo peruenit ad perfectam curationem; nec aliis remediis opus fuit.

S. C. H. I. O.

SCHOLIA.

Gordonius.

CORPVS humanum (inquis Gordonius de solutione con-
nuitatis, parte 1, cap. 29. de incendio ignis & aqua cali-
da) adurit & comburit aliquando cum igne, aliquando cum
oleo fermenti, aliquando cum aqua bulliente, & ita de aliis. Dia-
ta igitur sit subtilis, & si phlebotomia, si particularia conue-
niant. Deinde vinngetur cum frigida, sicut est populeon aut vn-
guentum caryophum, quoniam aliquando non sunt vesicæ, & ea
aliquando sunt cum vulnere, & aliquando sine vulnere. Quan-
do non est vulnus, ponantur frigida & humida: & quando est
vulnus, ponantur frigida & sicca. Materialia autem illorum
possunt esse bombar, flupa canabina, pannus lineus, lana abluta,
pannus de serico, & similia, cum iunguntur cum liquidis, &
ista sunt huiusmodi: aqua frigida, aceti, aqua ros., succus sem-
pernua & lact. & end. plantag. portul. sem. myrti, cerusa, bol.
arm. chimolia, camphora, albumen ouorum, & similia. in-
iungatur pannus uno illorum, vel multis, & desuper apponatur,
& frequenter renouetur. Oportet itaque imprimis vesicationem
prohibere: & si adfuerit, restificare. Vbi igitur combustio est
magna, fiat phlebotomia diuersa. Appone vitella onorum cum
aqua ros. agitata: illa sedans dolorem, vel emplastr. ex leuisculis
coctis in aqua & aceto. valei & pui. solea antiqua combusta,
galla trita cum aqua, cinu foliorum myrti, cum integro oño mi-
xus. poma in aqua cocta, & rosacea mixta: poma corrupta ap-
posita: & si mercurium combustum statim ponatur in vino lepi-
do, non profundatur adnatio pili leporis viti superpositi, mirè
sanant combustionem aqua calida. Sal tritum bullitum in oleo
non sinit locum vesicari. Sed cum locus vesicatus est, incide
vesicas, & emplastrantur hoc vng. albo: R. olei ros. ℥iij. ce-
rusa quart. s. cera alba ℥ij. & in fine adde duo albumina ono-
rum. Vbi ulceratio facta est, ulceri nil melius est quàm hoc se-
quens

Que inhi-
beant vesica-
tionem.

Si locus vesti-
catus est, quid
agendum.

quens ung. de calce: R. calcis alba non extincta lib. 1. abluta cum aqua veri frigoris multoties, donec tota calcis acuitas remoneatur: deinde R. olei ros. 3 iij. unguenti popul. 3 iij. aqua ros. 3 ij. incorporentur, & liniatur ex eo pecia, & superponatur. Conferunt quoque in loco ulcerato porri elixati, si non fuerit in loco inflammatio; aut portulaca cum hordei farina. Circa istam materiam, intelligendum quod cum aliquis combussit sibi digitum cum candela & similibus, tunc docuit experientia, quod si digitus ponatur in aqua frigida, tunc augmentatur dolor, quia partes adusta retinentur: sed si ponatur temperate ad ignem, sedatur paulatim dolor, quoniam partes adusta exhalant. Ex his possumus elicere cautelam, quod populeon & alia frigida non apponantur aen frigida, sed tepida: tunc enim sunt anodyna Hinc & Valescius cap. proprio: Notandum quod in parva aduisione inuas aliquando approximare membrum laesum igni: & ratio est, quia per talem approximationem pori qui fuerant clausi per aduisionem, aperiantur & rarificantur per talem approximationem: & sic caliditas retenta exhalat, quia caliditas inclusa suo simili gaudet, & exterius resiliit & exhalat. Id quoque sciendum, quod actio ignis in corpore derelicta, siue sit cauterium voluntarium, siue sit combustio inuoluntaria, usque ad carnem, nonem dies crescit, si est magna & notabilis: & postea continue minuitur usque ad perfectam curationem. Hoc quoque cautio dignum est, quod si combustio accidat in puerorum manibus, semper unus panniculus ponatur inter unum digitum & alium, & sit madefactus in aliquo unguento vel oleo ex supradictis, ne unus digitus cum alio incarnetur, ut ego aliquando vidi fieri in male curatis, ita ut aliquando oporteat vasorio digitum a digito separare. Præterea, teste Gordonio, licet olenum non competat anthraci, ne inflammet, in combustionem tamen competere potest, maxime rosaceum, quia talis ignis volatilis est, & quasi externus; ideo non inflammat. deinde sciendum quod calida bene possunt conuenire, quando locus est ulceratus. hinc calx abluta cum multis aquis frigidis & dulcibus, & postea cum oleo ros. confert. Ad combustionem ignis egregie inuas, si lithargyrium optime tritum misceatur cum vino albo, & redactum ad formam unguenti molis. Vel R. pomum ponticum, id

que conueniant vlceri.

Gordonius.

Valescius.

Cautio.

Gordonius.

Ad combustionem ignis egregie confert.

est, acerbum, mundum & incisum, & bulliat in oleo compo-
ni veteri; & in ipso bulliant cineres sambuci; & addantur oli-
bani, mastice & cere q. s. & coquantur in aqua, & bene lancetur
pluribus vicibus, & utere hoc unguento, quoniam nullū signum
relinquit. vel R. rad. ulmi q. v. lancetur & coquantur in vino
usque ad sp. siccitatem, de quo viuo super locum combustum re-
neatur: consolidabit brevi tempore, neque vestigium aliquod
post se relinquet. Item R. succum frondium raparum, cum oleo
loto, & inunge locum. Si vero igni fecerit exulcerationem, ca-
pe calcem vivam, & immitte in aquam frigidam per iij. horas,
& proice illam, & in aliam denudò dimittas; & sic facies sexies
vel septies: postea misce cum oleo rosato, & vitello oui, & duc
simul bene; & fiat unguentum: estq; mirabile: vel R. succum
caulium, & misceto cum oleo rosaceo, & vitello. Aliud un-
guentum, expertum ad cocturam ignis seu aqua: R. albumen
oui, oleum & succum summitatū sambuci, etiam corticem vi-
ridem, existentem sub exteriori cortice; & incorporantur simul
ad ignem, & fiat unguentum. Unguentum mirabile, faciens
remanere pulchras cicatrices post combustionem ignis, ut vi-
sum est in puella qua faciem totam excoriatam ab igne habebat:

R. calcis viva, extingta decies 3 ij. melle 3 j. cera, olei ros-
ana q. s. fiat unguentum, & in fine addantur albumina ovo-
rum duorum, & est Genialis. Ad combustionem vero ignis bom-
bardarum, & similium, R. unguenti albi Rhas. optimè tam-
phorati par. iij. vng. populi. par. i. misceantur simul in mor-
tario, addendo mucilaginis psyllii confecta cum aqua plantag.
quartam partem vini. sed & hoc hu addendum putant, quod
in arcanis M. Iohannis. Tiengij, medici An sselvodomij repperi:
quod quidam Forliuensis scripsit de membris per bombardam
lasis: inprimis membrum laesum submerge in lacte vaccino re-
center mulso per quartam unius hora partem: deinde vide si
aliqua pars est conqussata: illam omnino abscinde. residuum
canceriza: deinde superpone masuratum ex farina, oleo &
aqua: deinde mundificatum, quod sic fit: R. mellis ros. lib. ss.
farina tritici 3 ij. incorporentur simul in patella, addendo succi
apij 3 v. succi absinthij 3 ij. pul. sarcocolla, myrrha ana 3 ss.
misce ad lentum ignem. Deinde bene mundificatum consolida-

Si ad sit vlcero-
tio, reme-
dium.

Vng. exper-
tum ad coctu-
ram ignis seu
aquæ.

Vnguentum
mirabile, fa-
ciens pul-
chras rema-
nere cicatri-
ces. post ignis
combustio-
nem.

Ad combu-
stionem ignis
bombarda-
rum, & simi-
lium.

item unice cauendum est, ne supra ponatur reperisissimum; sed circumcirca, ne aggruando sese dilaret: quod sic fit: R. boli arm. ʒj. terra sigillata ʒß. modo cum oleo rosaceo; modo cum aceto fiat incorporatio. Et superponenda sunt aliquando attrahentia venenum, quale est istud: R. galbani, serapini, opopana-cu, asse ferida, myrror, sulphuris ang ʒß. stercoris columbi, anais ana ʒij. dissoluantur gummi in vino, & incorporentur cum melle rosato & oleo antiquo. Item medicina conseruantes principalia, dextror ʒoro, sicni diambra, diamarg. manus Christi, etiam theriaca, & alia theriacalia, ne sumi mali, qui eleuantur, inficiant cor. Mundificantia sanguinem & phlebotomia conferunt; est aliquando etiam procedendum vi in esthio-meno, & ad prohibendam putrefactionem: R. sariuum fabarum, orobi ana, cum syr. acetofo. misce, & lana locum bis in die cum aceto. Postquam caliditas cessauerit, vng. Aegyptiacum apponatur: facit enim cadere putrefactionem, & quod ipsam sequitur conseruat. Aliam modum procedendi, & erat M. Iodoci, duci Philippi chirurgi experisimi. Primum vide si in vulnere est os fractum extra illas pecies, vel aliqua extranea, ut puta fer-rum de lorice &c. lenissimo & optimo modo quo poteris: pos-sica R. albu-men oui, & oleum ros. simul conuassata, & pan-num intinctum eodem medicamento impone si verò sit brachium aut aliud membrum perforatum, impone sentiam aut setonem, quod tutius est, quia non permittit vulnus inuiscere claudi, sed superfluum extrahit, non tamen dimittendo desersum circumcirca, propter materiam antecedentem, quæ etiam debet di-minui phlebotomia, si necesse est. secundum corporis dispositio-nem, tenendo etiam ventrem laxum cum optima vilius ratio-ne, & alia similia diligenzer observando. Postea, cum videri bo-num pus generari, quod effuies cum digestino ex oleo rosaceo, & vitello oui, tunc incipe vulnus mundificare cum mundificatio-de apio novo, vel cum vnguento apostolorum. Aegyptiacum et-iam prodest, si indigeas fortiori mundificatione, cum eductione osium. Deinde cum aliquo cicatricem obducente consolida. Alii, qui verò ita procedunt, ponendo à principio compositum aliquod oleum magis conueniens, ex oleo lini & rosarum, & componitur vii oleum rosarum, quod oleum multi commendauerunt; & non

Alius modus
procedendi,
& erat M. Iodoci, chirurgi
duci Philip-
pi.

Alius mo-
dus.

audiri aliquod medicamen quod magis competat: est humectatiuum, & egregie doloris sedatiuum. Aliqui etiam non sine maximo inuamine huic oleo adinungere trassulam maiorem, aut folia maluarum; & tunc etiam est magis humectatiuum: & magis confert illis quibus maior est coctura ex igne bombardarum, quod discretus chirurgus maximè perpendet, non omittendo dispositionem corporis totius, dietam, purgationem, tum reliqua omnia, simul accidentibus succurrendo per defensiva, &c. Hoc quoque sequens ad arsuram multis laudibus extollitur: R. grana cydoniorum: ponantur in vino. & aqua tepida (nos autem, ut alias diximus, in aqua rosacea posuimus) donec fiat mucilago, & illa ponatur super arsuram, primò tamen (ut alij experti sunt) ponendo semel vel bis pannum madefactum in aqua ardensi, deinde cum dicta mucilagine usque ad perfectam curationem procede, & est mirabile. Nunc ad tertium librum De tumoribus præter naturam accedamus, qui ad pituitosos pblegmaticosq; tumores pertinent: hic finem imponentes de tumoribus biliosis.

Contra arsuram.

FINIS libri Secundi Observationum
Chirurgicarum.

OR-

OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM CHIRVRGICARVM

Liber tertius,

DE

TVMORIBVS

PRÆTER NATVRAM;

D. PETRO FORESTO Alcmariano,
auctore.

OBSERVATIO I.

De œdemate.



ISTI 5 diebus accitus ad illum qui
extra portam Haghensem de-
cumbebat, & crura œdematosa
habebat, præsuppositâ illâ indica-
tione vniuersali, quòd curatio
œdematis consisteret in applica-
tione calfacientium & exiccant-
tium, tamen cùm initium adhuc mali esset, præsta-
re iudicavi in œdemate curando, digerere cum iis
quæ non solùm opponuntur temperaturs materiæ
pituitosæ, verùm etiam quæ ipsa membra roborant,
& innatam caliditatem augmentant. quare hunc
syrupum propinaui: & oxymel. simplicis ʒ j. syr.
de duabus rad. mellis ros. colati ana ʒ β. aquar. sal-
uic, betonicæ, bugloss. ana ʒ j. misce. hoc syrupo
præceptor

præceptor meus Benedictus Faentinus; vt proprio cap. de cedemate in sua Empirica ostendit, per nouem continuos dies utebatur. deum, quibusdam apparentibus signis concoctionis, (non quidem completè, quoniam hoc fieri non potest, propter materiam hanc quæ rebellis est concoctioni, & propter vitiatam caliditatem concoquentem principium membrorum,) purgat cum sequenti medicina, quam & nos propinari iussimus: ℞. diacathol. ʒss. agarici optimi & electi ʒj. ʒ. elect. indi maioris ʒiij. electuarii de succo ros. ʒj. (& recordare, inquit, quod cum qualibet medicina euacuatiua phlegmatis permiscere debes aliquod euacuatiuum cholerae, cum de se phlegma non moueatur ad membra, nisi eo subtiliato & promotò à flava bile) infundatur agaricus cum modico rinzib. & salis gemmae in oxymelit. q. s. per x. horas, deinde facta forti expressione omnia simul dissoluantur in aqua decoctionis hyssogi, saluiae, betonicae & quatuor florum cordialium q. s. & fiat potus, qui exhibeatur patienti per duas horas antè lucem. Si autem cedema fuerit vitio corruptae caliditatis hepatis non bene sanguificantis, sicut in hydrope accidit, vt crura & alia membra corporis tumida & cedemata facta sint (vt latius ostendimus cum de hydrope ageremus) purgabis corpora, post exhibitos syrupos, sequenti medicina: ℞. diacatholiconis ʒss. rhabarb. optimi & electi ʒij. spicae gr. x. agarici præp. ʒij. electuarii de dactylis ʒss. infundatur rhab. cum spica secundum artem per x. horas: & facta forti expressione omnia simul dissoluantur cum communi decoctione flor. & fruct. q. s. & fiat potus, qui patienti exhibeatur modo dicto. Et aduerte, quod omnes medicinae, quae à nobis in cap. de hydrope fuerunt dictae, eadem conferunt in cedematica passione, hydrope coniuncta. Sed facta hac prima purgatione, denuò ob diuturnum malum iterum materiam

riam hoc modo præparauimus: R. syr. de iua Nicolai, syr. de cichor. Nicolai cum rhab. (idem valet vbi timor est de hydropo) mellis ros. colati ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. aq. hyssopi, capill. ven., iuæ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. misce: detur quotidie per quinque pluresve dies: & postea per duas horas ante lucem, sequentem medicinam propinare mandauimus: R. diacathol. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. pul. hieræ simpl. Gal. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. pul. turbith boni & gummosi $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$. pul. rhab. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. spicæ, zinzib., salis gemmæ ana gr. \mathfrak{ij} . omnia simul misceantur, & cum decoct. cornu-
muni flor. & fruct. q. s. dissoluantur, & fiat potus. interim tam extrâ quàm intrâ sunt membra corrigenda, vt innata caliditas vigens reddatur. quare ante cibum per duas horas hunc bolum dedi: huius mixturæ omni manè circa $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. R. diagal. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. trion-
fant. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. diatrion piper. $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. diarrhod. abb. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. \mathfrak{ss} . misce, cum syr. de duabus radicibus. fiat mixtura. Exteriùs manè & vespèri œdemata cum decoctione sequenti vel cum spongia madefacta in prædicta decoctione locum fomentari iussimus: R. saluæ, rorismarini, florum stœchados montani, maioranæ, florum chamom. iuæ ana m. \mathfrak{ss} salis nitri, salis gemmæ, alum. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. bulliant in s. q. aquæ cineris siue lixiuii vsque ad consumptionem tertiæ partis: deinde coletur; & colatura vsui seruetur. Sed & alteri, cui crura maximè œdematosa erant, hanc lotionem fieri mandauimus: R. aquæ cineris lib. xx. flor. chamomill., rad. ebuli ana m. \mathfrak{j} . salis communis lib. \mathfrak{ss} . aceti albi optimi $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$. misce; & bulliant, vsque ad consumptionem medietatis: deinde colentur; & colatura vsui seruetur. Sed & Delphensi mulieri, cum aliis, cum mari propinqui simus, sæpiùs commodè sequens præscripsi: R. aquæ maris lib. xx. aceti optimi lib. \mathfrak{ij} . bulliant vsque ad consumpt. quartæ partis: deinde ipsa dicto vsui seruetur. Hoc quoque sciendû quod omnes aquæ thermarum calidæ, habentes naturam salis, aluminis, nitri, vel salis gem-
mæ;

mæ; quòd si patiens assiduum vsum frequentet in dictis balneis, procul dubio ab œdemate & præcipuè in cruribus existente; sanabitur. Quòd si æger noster istis remediis non fuisset curatus, peruenissem ad extrema illa remedia; quæ præceptor meus Benedictus Fauentinus præscribit loco citato: & primum est, cauterizare membra eiusmodi cum actuali cauterio pluribus in locis: ipso enim non solum extrahetur aquositas pituitosa talem progignens affectionem, verùm etiam membra exonerata confortabuntur, vt inde nutrimentum melius concoquere valeant, & superfluum secernere. Secundum ingenium est, vt membrum tale taliter affectum, siccetur cum applicatione sequentis emplastri, extensi supra corium, ad quantitatem conuenientem, & positum supra œdematosam partem membri affecti: ℞. fermenti ℥vi. cantharidum subtiliter puluerisatarum ℥j. salis communis ℥iij. aceti fortissimi q. s. ad incorporandũ velut vng. quoddam, quod extensum supra corium, membro applicetur: ipsumque non amouebis à membro per spacium decem horarum: quò eleuato apparebunt tibi vesicæ aqua plenæ; supra quas appones folium caulis perunctum butyro recenti. & sic manè & vespere folium mutabis, & videbis copiam aquositatis facile exire à membro œdematoso. Quòd si membrum tale ad ulcerationem deducatur, nimis quidem calore adurente apparente in membro, mox subleuato folio caulis apponere debes sequens vng. ℞. vng. de cerusa ℥j. β. licharg. ℥ij. succi plantag. ℥j. olei rosati ℥β. omnia simul misceantur, & in mortario ducantur, quousq. fiat vng. quod vsui seruetur: eo quippe vnguento vlcera corrigentur, & aquositas pituitosa extrahetur, & œdema sanabitur.

SCHOLIO

SCHOLIA.

CV M de humoribus, qui à succis calidioribus procreantur, satis disputatum fit in duobus prioribus libris, de iis qui à materia frigida ortum habent, primò autem de pituitosis, nunc tractare institimus. Sed antequam ad humorum pituitosorum particularem declarationem & medelam deveniamus, non ab re fuerit de humore à quo originem ducunt, aliquid disserere. Quicunque humor naturâ frigidus atque humidus fuerit, hunc nos Pituitam appellamus: cuius humoris plures sunt differentia: una si quidem eius species est adeò frigida, ut cum in loco aliquo calido obstruatur, dolores maximos excitet: sapimq; multa laxioris intestini incommoda, hoc humore, acuti clysteris vi evacuato (ut de colico dolore aliis ostendimus) statim sedari contingit: hic humor vitri liquefacti similitudinem gerit. Est & alia pituita species, quam plerumque cum sreatu expnimus; sensibilem habens dulcedinem: liquez quòd hanc exquisitè frigidam non contingit esse. Est & alia pituita species tertia; quæ expnentibus videtur acida, & est minùs frigida quàm vitrea; magis verò quàm dulcis. Vltima pituita species salsa apparet, aut propter putredinem aut propter salsa serosa humiditatis missionem. Crudum quoque humorem appellatum, genus quoddam unum pituita constitutere possumus: hic autem humor aliâ pituitâ crassior est, ac minùs flatulentius: qualis in urinis subsidet: iis præsertim, quæ ex edacitate sedimentum fabacea pulicula simile obtinent: quæ & corporibus iis, quæ ab exercitatione abstinent, cibis verò quamplurimis, ac balneis post assumptos cibos utebantur. Sæpe huiusmodi humor conferimus per alnum descendit. Sed una cum hoc humore, perinde ac cum pituitâ, decolor quedam in toto corpore subest albedo: ex pituitâ igitur cruditate, quemadmodum ex pituitâ dulci, homines minimè appetentes, & somniculosi redduntur: nam sentiendi principio humefcente, & frigescente, comatosam dispositionem sequi contingit: at contrâ ex pituitâ acidâ sunt famelici homines, & ad cibos summo desiderio rapiuntur, ut in multis sæpe vidimus, qui irrationabili appetita cibum maximam copiam vorabant: ex pituitâ salsâ redun-

Gal. de diff.
feb. 2. cap. 6.

Gal. de plenitudine
cap. 11.

dant

mæ; quod si patiens assiduum vsum frequentet in dictis balneis, procul dubio ab œdemate & præcipuè in cruribus existente, sanabitur. Quod si æger noster istis remediis non fuisset curatus, peruenissem ad extrema illa remedia; quæ præceptor meus Benedictus Faentinus præscribit loco citato: & primum est, cauterizare membra eiusmodi cum actuali cauterio pluribus in locis: ipso enim non solum extrahetur aquositas pituitosa talem progignens affectionem, verum etiam membra exonerata confortabuntur, ut inde nutrimentum melius concoquere valeant, & superfluum secernere. Secundum ingenium est, ut membrum tale taliter affectum, siccetur cum applicatione sequentis emplastri, extensi supra corium, ad quantitatem convenientem, & positum supra œdematosam partem membri affecti: ℞. fermenti ℥vi. cantharidum subtiliter puluerisatarum ℥j. salis communis ℥ij. aceti fortissimi q. s. ad incorporandū velut vng. quoddam, quod extensum supra corium, membro applicetur: ipsumque non amovebis à membro per spacium decem horarum: quò eleuato apparebunt tibi vesicæ aqua plenæ; supra quas appones folium caulis perunctum butyro recenti. & sic manè & vespere folium mutabis, & videbis copiam aquositatis facile exire à membro œdematoso. Quod si membrum tale ad ulcerationem deducatur, nimio quidem calore adurente apparente in membrò, mox subleuato folio caulis apponere debes sequens vng. ℞. vng. de cerusa ℥j. β. litharg. ℥ij. succi plantag. ℥j. olei rosati ℥β. omnia simul misceantur, & in mortario ducantur, quousq. fiat vng. quod vsui seruetur: eo quippe vnguento vlcera corrigentur, & aquositas pituitosa extrahetur, & œdema sanabitur.

Scrio-

SCHOLIA.

CUM de humoribus, qui à succis calidioribus procreantur, satis disputatum sit in duobus prioribus libris, de iis qui à materia frigida ortum habent, primò autem de pituitosis, nunc tractare instituimus. Sed antequam ad humorum pituitosorum particularem declarationem & medelam deveniamus, non ab re fuerit de humore à quo originem ducunt, aliquid differere. Quicunque humor naturâ frigidus atque humidus fuerit, hunc nos Pituitam appellamus: cuius humoris plures sunt differentiæ: una si quidem eius species est ad eò frigida, ut cum in loco aliquo calido obstruitur, dolores maximos excitet: sapinâq; multa laxioris intestini incommoda, hoc humore, acuti clysteris vi evacuato (ut de colico dolore aliis ostendimus) statim sedari contingit: hic humor vitri liquefacti similitudinem gerit. Est & alia pituita species, quam plerumque cum creatu exquirimus, sensibilem habens dulcedinem: liqueat quòd hanc exquisitè frigidam non contingit esse. Est & alia pituita species tertia; quæ exnentibus videtur acida; & est minùs frigida quàm vitrea; magis verò quàm dulcis. Ultima pituita species salsa apparet, aut propter putredinem aut propter salsa serosa humiditatis missione. Crudum quoque humorem appellatum, genus quoddam unum pituita consistere possumus: hic autem humor aliâ pituitâ crassior est, ac minùs statulentus: qualis in urinis subsidet: iis præsertim, quæ ex edacitate sedimenti multum sabacea pultracula simile obtinent: quin & corporibus iis, quæ ab exercitatione abstinere, cibis verò quamplurimis, ac balneis post assumptos cibos utebantur. Sape huiusmodi humor confertim per alnum descendit. Sed una cum hoc humore, perinde ac cum pituitâ, decolor quædam in toto corpore subest albedo: ex pituitâ igitur cruditate, quemadmodum ex pituitâ dulci, homines minimè appetentes, & somniculosi redduntur: nam sentiendi principio humescente, & frigescente, comatosam dispositionem sequi contingit: at contra ex pituitâ acidâ sunt famelici homines, & ad cibos summo desiderio rapiuntur, ut in multis sæpe vidimus, qui irrationabili appetitu ciborum maximam copiam vorabant: ex pituitâ salsâ edundantq;

Gal. de diff.
feb. 2. cap. 6.

Gal. de plenitudine
cap. 11.

4. de sanit.
tuenda cap. 4.

Gal. 1. de natu-
ra humor. 2.
cap. 10.

Per accidens,
quoniam pi-
tuita semper
est à frigidita-
te.

Gal. 2. de
temperam.
cap. 6.

Paulus lib. 2.
cap. 16.

dante sicculosi. Insuper pituita cruditas (ut bene Galenus in-
nit) non modò album præferri coloremi, sed aliquando cœu mī-
sturam albi & lividi: aliquando lividam solum; aliquando plum-
beam: qui quidem colores quavis crudos dominari succos in-
dicant: qui cū de genere sunt pituita, minus tamen humidi-
tatis habent, quàm ea quæ publicè vocatur pituita. Sanè quod
pituitam expurgat, natura nullum instrumentum condidit; pro-
pterea quòd frigida, humidatq; est, ac vix dimidio coctum
nourimentum. Desiderat igitur talis succus non vtiq; vacuari.
Excrementum verò quod à cerebro destillat, fortasse nec pitui-
tam quis rectè appellat, sed sicut nominari solet, mucum & gra-
uedinem, Græcè κόχχα. Quæ excrementa idè quandoq;e
pituitosa vocari solent, quoniam magis ad pituita naturam ac-
cedunt, quàm aliorum humorum: non quòd vero nomine pitui-
toso sint notanda: & de huiusmodi sic distis excrementis, locu-
tus est Galenus cū multis aliis in locis, tñm comment. 2. aph.
12. quando dixit cerebrum sua natura generandis pituitosis stu-
persuitatibus aptum est: quando refrigeratum, cibum commu-
nem digerere non potest, huius pituita generatio huic inest, ut
qua à forti frigidityte, acida euadat; qua verò à caliditate
repens caput, salsa; sicuti sanè, & qua à parca sit frigidityte,
vel parcam dulcedinem, vel nullam manifestam habet qualita-
tem. Rursum huius humoris maiorem notitiam tradere cupiens:
dico pituitam aliam esse naturalem, aliam alimentum, aliam
excrementum. Pituita naturalis est, ex qua ceteris humoribus
permixta, constat homo à primo semine. pituita alimentum est,
quæ primùm in ventriculo generatur ex cibo, non autem ex cor-
pore nostro per se. Inde in hepate elaborata miscetur sanguini
ad reparationem & conservationem proprij humoris: & illa-
rum particularum, quæ hoc humore magis indigent: hæc quan-
doque vel per cibos, vel per anni constitutionem, vel per ocium,
nimis augetur, & in toto corpore exundans, rigorem, qui agere
excalferi potest, sine febre excitat. quod si computruerit, quoti-
diana febris causa redditur. Pituita excrementum, est veluti
sexta alimentosa pituita: quæ inepta nouritioni; nisi expurgetur;
tumores gignit: habetq; hoc peculiare, quòd ad differentiam ce-
terorum non concreuit; etiam si diutius in ambiana moretur.

Pituitoso

Pituitoso igitur excremento in toto corpore succedit hydrops, leucophlegmatias dictus: cum verò in una insedit particula, tumor excitatur, quem œdema Græci dicunt, de quo mox nosset erit tractatum. Ad tumores itaque pituita, hoc est, œdemata, referuntur nonnulli tumores sub apostematis nomine comprehensi, qui ab Anic. nodi, ab Haly-abbate Selaæ & Dubeleta phlegmatica dicti sunt. Latini Abscessus vocant. Quorum iuxta diversas materias in eis contentas, diversa etiam sunt species. Triasunt Galeno eiusmodi abscessuum genera frequentissima, quorum singula propriam appellationem Græcè sunt sortita, ea sunt atheromata, steatomata, melicerides, à similitudine quidem contentorum in his corporum dicta, ut amplius in sequentibus declarabimus. Est & apostematum, hoc est, abscessuum genus, in quo res alia continentur, quæ non humorum modò, sed & solidorum quorundam corporum proprietates repræsentant: Verùm hæc (inquit Galenus) rariùs: Ac de iis quidem etiam in sequentibus cum de abscessibus sermonem faciemini. Ad hæc autem modò dicta abscessuum genera pertinent, tumori quidam nomina, à recentioribus excogitata, & nusquam apud antiquos scriptores reperta, ut testudo, mollis tumor calvaria inherens, & talpa: hæc ad atheroma, illa ad meliceridem magis spectare videntur. Ad steatoma verò ferè pertinet tumor, dolore carens, quem natam appellant, de quo suo loco dicemus. Huc quoque spectant vocata à Græcis Ganglia, ab Anicenna Glandula, quæ à vocatis nodis differunt. Scrophula quoque à vulgo vocata, à pituita sunt, proinde ad œdemata reducuntur: hæ Græcis Chærades, Latinis Struma dicuntur. Galenus tamen alicubi, inter scirrhus, ob duritiem, annumerat. Ad œdema etiam refertur Galeno ea hydropis species (ut etiam annotavit Tagantius) quæ leucophlegmatia Græcis, & hypofarca nuncupatur. Sic & Ferneliu inter tumores tuberculos pustulas à pituita refert, œdema, tumorem œdematosum, aquosos tumores, ut ascitem, hydrocephalon, hydrocelen, & etiam his finitimos flatulentos tumores, ut tympanitem, ramicem flatulentum, & quemvis alium sub cute aut sub osium membranæ aut in musculis collectum. Scirrhum aliqui hunc non ad pituitam sed melancholiam referunt. quibus annumeratur & ganglion, bronchocèle, glandula, parotis, struma.

Gal. sympt. caus. 3. cap. 2.

Tumores pituitosi & œdematosi.

14. Therap.

Tumorum nova quædam apud recentiores medicos nomina.

Testudo.

Talpa.

Nata.

Ganglium.

Glandula.

Schrophulæ.

Chærades.

Strumæ.

Leucophlegmatia.

Hypofarca.

At Leoni, ad tumores pituitosos seu oedematosos, inquit, accedunt, alheroma, steatoma, meliceris, testudo, talpa, ganglion, id est, nata, bronchocele, charades. & hydropis species leucophlegmatia & hypofarca, hydrocephalon & hydrocele, multiq; alij. Incipimus autem ab ipso oedemate. Oedema, Græci idem vocatur. Quemadmodum autem ex biliosa fluxione erysipelas, ita ex pituitosi humoris confluxu oedema excitatur. Est autem oedema (definitore Galeno) latus quidam atque indolens tumor, seu rara quedam atque experta doloris molis, ex pituitoso humore in partem aliquam insidente exurgens. Ita quidem Galenus censuit lib. 14. Therap. p. de oedemate, quod morbus est, & non symptoma. Equidem scimus (inquit) aliter quoq; (quam ex pituitosi scilicet humoris fluxione) oedemata provenire. Nempe ex pituitoso humore aut spiritui aëreoso, in parte aliqua collecto, & in eadem aliquando genito, ut in capite & pedibus eorum, qui aquæ subiectæ affectu laborant, uti & alias de hydropæ diximus: & phthoe, id est, corporis habitus contabescens: & cachexia, hoc est, malæ habitus corporis. In illis quippe periculosus (ut multis exemplis locis propriis ostendimus) oedema, affectus eius qui hominem premit, symptoma est, hoc est, accidens necessario consequens, nullam propriam, præcipuamque curationem postulans, ut alias diximus, & in sequentibus dicetur. Nam satis erit (si modo curatione egebit) ipsa tum crura perfricare aliâ oxyrrhodia aliâ oleo cum sale, aut etiam oxyrrhodino sal habente. Oedema, uti & phlegmone atque erysipelas, in duas chirurgis dividitur differentiâs, in verum scilicet oedema & non verum seu illegittimum. Oedema verum & legitimum est, quod corrupta & inepta voce undiciam appellant, & sit, ut diximus, ex pituitosa materia. Vel verum oedema sit ex pituita naturali, quæ certè nihil aliud est, quàm sanguis crudus aut diminutè coctus, qui in massa quidem sanguinaria inuenitur, membris pituitosis nutriendis accommodus. Non verum seu illegittimum oedema, sit ex pituita non naturali. Est autem pituita naturalis (ne quid obscurum relinquamus) humor frigidus & humidus, substantiâ crudus, colore vergens ad quandam albedinem (ut paulo antè recensuimus) sapore verò, & (si licet dicere) odore ad dulcedinem. Non naturalis

pituita

Oedema
quid.

14. Therap. &
a. ad Glapc.

Oedema ut
symptoma
est; quibus
maximè acci-
dat.

Oedema du-
plex.

1.
Verum.

2.
Illegittimum.

Pituita quid.

pituita, ea est, quæ à modò descripta degenerat; intra tamen suæ latitudinis terminos. quos si forsitan pertransseat, non iam amplius phlegma pituitivum, sed alius humor dici debet. Contingit autem visariam pituitam ipsam à propria sua natura degenerare: uno quidem modo (ut loquuntur) in se, quando scilicet in propria sui ipsius substantia, citra alterius admixtionem, permittitur. Quod sanè multifariam accidit. Aut enim in substantiam aquosam convertitur; aut in flatuosam, aut in admodum tennem. Diciturque tunc phlegma aquosum, flatuosum aut tenue: aut crassum ac viscosum redditur; idg. tunc phlegma crassum & mucilaginosum efficitur, & per maiorem, seu (ut dicunt) ulteriorem indurationem; gypseum seu vitreum. Aut ipsum putrescit, & alteratur, efficiiturque tunc salsum, nitrosum & corrosivum. Altero modo pituita efficitur non naturalis, per admixtionem; quando scilicet alius quissiam humor illi existitsecum accedit; verbi gratia, vel sanguis, vel bilis flava, aut atra. Si sanguis pituita permisceatur, hæc dulcis efficitur; si flava bilis; salsa: si vel ancholia, pontica & acida.

Pituita quæ
dicitur quo
dò à pro
pria natura
degeneret.

Sunt ergo pto. species phlegmatis non naturalis, iuxta Anicenna, pto. species: Hely. abbas tamen quatuor duntaxat constituit: Galenum autem (linguis Guido) videtur duo genera assignare, nempe salsum & acidum. Tamen si lib. 2. de diff. febrinum & 2. de dolorum affectu, atque in multis aliis locis, mentionem faciat de vitrea, de quo & paulo antè diximus, quod subinde sub acido (propter eam; quam cum eo habet affinitatem ac convenientiam) reponitur. Ex his igitur colligitur quòd ex pituita generantur: octo species; seu differentia humorum præter naturam, primò enim ex pituita seu phlegmate naturali; sit œdema verum, ac certum seu legitimum. Secundò ex pituita non naturali per admixtionem generantur tres alia differentia humorum: quippe quòd tres alij humores cum ea possunt commisceri. Nominantur autem œdema phlegmonodes, œdema erysipelatodes, & œdema scirrholes. Tertiò ex pituita non naturali per alterationem propriæ substantiæ quatuor alia exurgunt differentia, primò namque ex flatuoso & vaparoso phlegmate sit tumor is, qui propriè latens in flatu, vulgo autem medicorum apoplexia viscosum aut flatulentus tumor dicitur: Secundò ex

Avic. 8. species pituitæ; Haly. abbas, 41 Galeus autem duntaxat in genera pituitæ posuit.

Octo differentia humorum præter naturam ex pituita.

aquoso, aquosum : Tertio ex crudo phlegmate, crasso, mucoso, procreantur immores illi, qui leues nodi quibusdam dicuntur, & abscessus pituitosi, quos vulgo exituras phlegmaticas appellant. Anicenna verò interpreti Dubelet frigida nominantur. Cuiusmodi sunt steatomata, atberomata, & melicerides. Ganglia quoque (quæ Anicenna Glandula dicuntur) & id genus alia, quæ in sequentibus declarabuntur. Ex duro verò, seu magis indurato, & (ut sic dicatur) gypseo phlegmate, fiunt nodi omnes duri, qui in iniectionis maxime reperiuntur, & struma, quæ vulgò scrofula nominantur. Quarto ex corrupta & putrefacta pituita generantur fistula, & ulcera, quæ scrofulosa vocant. Hinc etiam Fernelius : Ut pituita alia tenuis, aquosa aut mucosa exilis, alia crassa & glutinosa, cuiusmodi est quæ vitrea aut gypsea appellatur : ita necesse est varios ex hac collecta nasci tumores. Ac primum quidem œdema tumor est frigidus, laxus ac mollis, doloris expers. Nec calor nec rubor, sed vel generis vel albidus duntaxat color inest : tumor saepe magnus, & qui pressu digito, vel nullo vel exiguo dolore cedit. Est autem duplex : unus collectus & circumscriptione definitus, qui propriè ac simpliciter œdema nuncupatur : alter diffusus & expansus, qui rectius tumor est œdematosus. Hic ex crudiore pituitosoq; sanguine, aut iecoris aut assumptorum vitio progignitur, qui in nutriendas partes illapsus, nec in datum substantiam conversus, sensim cumulatim redundat ; partemq; tumore distendit, ac ferè retinet prementis digiti vestigium. Ita sanè in tabe, in cachexia & in leucophlegmatia, modò pedes, modò reliquæ corporis tumidam evadit. Verum autem & exquisitum œdema non ex sanguine pituitoso, sed ex pituita sit superflua, quæ solum vel aquosa vel mucosa sit, undecunque illa in affectam partem deferatur. Ferè tamen è capitis distillatione huic origo est, quæ sape in genna, interdum in humeros aliasq; partes decumbit. Causæ itaque œdematis, ut & aliorum tumorum præter naturam, sunt triplices : Primitiva, ut sunt casus ab alto, percussio, depravata vivendi ratio : Antecedentes, ut exuberantia humoris pituitosi in partem aliquam decurrant : Coniunctæ, ipsa pituita, in membro tumore obfesso iam infecta & accumulata. Signa œdematis hæc sunt, tumor laxus & mollis, qui premen-

Fernelius.

Tiliandus.

Oportet videtur
periculis.Causæ œde-
matis.Signa œde-
matis.

tic digito cedit, & sonea modo canatur, nec amoto digito resistit, sed prementis vestigium retinet. Dolor aut exiguus aut ferè nullus. Calor modicus vel nullus calor adest. Color vergens ad albedinem, hoc est, subalbidus, sen (ut volunt alij) inter album & pallidum medius. & alia id genus, quæ pueris dominium restantur. Valeſco zimia dicitur apostema phlegmaticum molle, ex phlegmate generatum, vel ventositate aut aquositate. sub frigido phlegmatico apostemate ventosum & aquosum comprehendit, & sub uno cap. de iisdem affectibus tractat. Vide & Gordonium cap. de apostematibus phlegmaticis exiſtentialibus.

At Tagantius, tum alij, seorsim de iſtis tractant. Sed quantum ad signa prognostica œdematis pertinet; Oedema, ut ceteri tumores, quatuor habet tempora; principium, augmentum, statum & declinationem. Hoc genus tumoris ut plurimum terminatur per resolutionem seu exhalationem; raro per suppurationem; sæpius per conversionem seu permutationem in nodos, & alias (ut vocant) excrescentias, quæ Græcis apostemata, Latinis verò abscessus dicuntur. Hæc autem terminationum nota, & agnitiones, superius in tractatu vniuersali dictæ sunt. Tumores hi œdematosi hyæne magis, quàm alij temporibus excitantur. plurima enim tunc in corporibus colligitur pituita. Senes quoque & crapula deditos magis ac sæpius infestant. Alij & hæc addunt. presagium semper bonum, nisi sit œdema cum gangræna, vel inflammatione vel hydrope, quoniam sit à miti & benigna fluxione. Verum œdema tarda maturationis & terminationis existit. Si in locis ossuosis, ut est tibia, vel coxa, vel in locis caernosis, ut est circa pectus, aliquando terminatur in fistulam, quia longa mora, materia & ipsa pigrities nature est causa corruptionis membri & loci vicini. Si apostemata phlegmatica cum solis exiccantibus & resoluentibus longo tempore curentur, ad nodos vel duritiem aut lapideam materiam conuertuntur. Apostemata quæ sunt de phlegmate, quædam mollia, humida, tractabilia, & sine calore, quædam dura & solida, & quanto duriora, tanto frigidiora. Nunc ad curationem venimus, sequenti exemplo prius interposito.

Iudicia seu
prognostica.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

O 3

OBSER-

OBSERVATIO II.

De vero œdemate in femore, longo tempore perdurante; & postea de illegitimo œdemate.

AD adolescentem illum, qui è regione Campi regii Delphis longo tempore decubuerat ex œdemate legitimo, quod femur occupauerat, cum Petro Frederico Delphensi chirurgo accersitus cum essem, primò autoritate medicorum veterum, & potissimum Auicennæ, ut egregiè etiam docet Valeriscus de Taranta cap. proprio, consului ut optimo vitæ genere tum victus ratione vteretur, cauendo ab omnibus quæ phlegma generare possent, ut sunt omnes fructus, maximè recentes, pisces nimiusque potus & nimius cibus. Abstinencia iuuat eos: nam cibi tenuitate nàmquam humores coaceruantur & debitè resolvuntur. Victu itaque exiccante & ad calidum vergente præscripto, materiam pituitosam commodè præparauimus: mox & purgauimus cum polypodio, agarico, turpetho, aliisque quæ materiam antecedentem remouent, ut residuum materiæ commodiùs resolveretur. Tandem ad localia deuenimus, iuxta Auicennam, qui incipit curationem à frictione cum panno aspero vel mantili: ponitque exiccantia super apostema, ut spongiam nouam, adhuc retinentem virtutem aquæ marinæ salis, infusam aceto, commixto aqua idque calidè. in ea enim spongia, teste Auicenna & Galeno 2. ad Glauconem, virtus inest exiccatiua & resolutiua. Hæc autem à principio sunt. In augmento adduntur fortiora resolutiua, ut spongia alia noua infusa in lixiuio cineris vitis & modico aceto. In declinatione adhuc fortiora adduntur, ut salis gemmæ exiguum, baurach & lixiuium cineris fici & quercus, cum alumine, sulphure, & similia.

lia. Sed cū non resolveretur, chirurgus nostro consilio apposuit emplastrum diachylon super altam extensum. hoc enim mihi, inquit Valescus, loco resolutionis maturavit apostema. idem, inquit, feci de oxycroceo, & ex toto per resolutionem euauit. Verū cū supradictis non resolveretur, & videretur quod apostema aliquo modo cleuabatur, & dolor crescebat, ad maturatiua scopum conuerimus. Vt ℞. rad. althææ, liliorum alborum, cæparum albarum, foliorum brancæ vrsinæ, summitatum lapathii acuti, an. p. æq. omnia ista inuoluta in stuppis madefactis coquantur sub caldario: deinde addantur caricarum pinguium num. x. axungie porcine q. s. frumenti ad quantitatem aliorum: incorporentur, & fiat emplastrum. dicit enim Valescus quod res bullitæ in aqua non tantum maturant apostemata frigida sicut coctæ sub prunis, vel frixæ in patella cum sola pinguedine. nam virtus earum remanet in aqua, aut in fumum conuertitur. Potest & his addi farina fœnugræci & seminis lini. Vel ponatur hæc massa supra ceratum quo D. Decanus Sancti Petri Louanij quondam felicissimè vsus est, cū haberet apostema œdematosum ℞. ammoniaci, galbani ana ℥ j. serapini, myrrhæ ana ℥ j. ceræ ℥ iiij. cinerum truncorum cauium, pul. ireos ana ℥ ij. croci ℥ ij. olei iuniperi q. s. distemperentur gummi per noctem in succo caulium, deinde fiat massa secundum artem. Sed & hoc apud Valescum expertum maturatiuum est, quod citò apostema phlegmaticum latum efficit ac suppurat: ℞. rad. bismaluz, ceparum lilii, summitatum maluz, senecionis, lapathii acuti ana m. j. iuciantur minutissimè & contundantur: postea in patella cum sanguine frigrantur, & calidè hoc emplastrum applicetur. Cæterum vbi iam maturum videretur apostema, hîc nullo modo tardandum erat, vt in Scholio latius dicturi sumus: quia multa parit

incommoda tardatio apertionis saniosæ collectio-
nis, ut dicit Arnoldus de Villanova, quia conglu-
bata sanies, maximè quæ in scirrhosis vertitur, can-
crum, lupum, aut fistulam machinatur, aut
transit in bocium. Aperto itaque apostemate fa-
cta est mundificatio cum mundificatio ex suc-
co apii & melle. Valet & vnguentum apostolo-
rum: deinde ut rectè curaretur & perfectè, & cica-
trizaretur locus, chirurgus perito commisit. Et
non expectetur, inquit Valescus, opinio fatua, quo-
rundam chirurgorum & barbitonsorum, qui stant
per duas aut tres septimanas sine apertione aliqua:
& per magnum tempus ante apertionem. Sed &
alteri hoc experimento œdema resolutum est, quo
Benedictus præceptor meus commodè uti solebat:
ut ℞. salviæ siccæ, roris marini, betonicæ ana ℥ss. car-
ui, dauci, anisi, sceniculi ana ℥ij. puluerizentur om-
nia subtilissimè, & prædictus pulvis superaspersa-
tur spongiæ siccæ ad quantitatem membri œdema-
tosi; eumque illi superalligabis: & sic manè & vespè-
ri continuando, videbis dissolutum œdema. Multa
quoque exempla posuimus œdematis curati, si pro
symptomate habeatur: & quomodo pedes œdema-
tosi curentur in hydropicis, ostendimus multis in
locis, & potissimum Scholio Obs. 23. & 24. lib. 19.
Obs. & Curationum medicinalium, itemque Obs.
26. & vide Obs. 60. de mola, & Scholia Obs. 43.
de vteri hydropè lib. 28. curat. medicinalium: &
Obs. 54. quomodo topico quodam remedio œde-
matosum crus dextrum persanauimus: & de puer-
pera, quomodo ab œdemate cruris illegittimo sit
curata.

SCHOLIA.

QVONIAM œdemata, ex humorum in aliquam partem
fluxione, aliorum tumorum more suscitantur, duplex etiam
eorum curandi scopus erit. Alter, ut horum humorum, qui iam
partem

partem occupant, substantia dissolvatur: alter, ut fluxio cogatur, restringaturq;. Atque prout alter scopus alterum superat, remedia sunt miscenda, alterum quidem cum altero copiosius aut parcius. Vbi igitur restringendi indicatio, eam quæ vacuandum seu digerendum esse suadet, superabit, augenda restringentium vis erit. Vbi verò plus vacuandum quam restringendum erit; discutientium seu digerentium ac exiccantium materia & facultas præpollere in mixtione debet. Porro maiorem restringentium vim miscendam esse ostendit tum copiosior fluxio, tum parcius in affecta parte materia. Contra exiccantium ac digerentium uberiores modum adhibere oportet, ubi copiosior materia locum obsidet, & fluxio minor est. In inveterato autem oedemate, & quod non adhuc in gignendo est, non amplius hac curandi ratione, missam facultatem quasi scopum habente, sed ad digerendam dissecandamque materiam declinante utendum erit. Quod & in omnibus ferè diuturnis affectibus observandum est. Caterum oedema quod symptoma est, periculosos affectus sequens, ut tabem, aquam intercutem, & vitiatum corporis habitum, quem Græci cachexiam vocant, nullam seorsum (ut supra diximus, & aliàs cum de hydrope ageremus) propriam, præcipuanq; curationem desiderat. Curari enim, nisi affectu ex quo nascitur, profligato, non potest. Aliquid tamen ex eo remittendum est, siquidem vires demoliantur, aut primarius affectus augeat, aut curationem impediat. Satis ergo fuerit, si quidem curatione egebit, ipsum tumentem locum perficere, aliàs oxýrrhodino, aliàs oleo cum sale, aut etiam oxýrrhodino salem habente. Eiusmodi enim frictio tumorem remittit & dolorem, si ex nimia distensione (ut aliquando contingit) excitetur, demulcet. Oxýrrhodinum fluxionem arcet, oleum cum sale vim habet digerendi, & vacuandi quod impactum est: oxýrrhodinum verò cui sal admixtum est, partim digerit, & exiccat, partim restringit & humorum affluxum prohibet. Sed præmissa hac universali methodo, ad propriam ipsius legitimi oedematis, quod ex tenuis pituita influxu ortum habet, curandi rationem, sermonem convertamus. Hac autem in rebus quatuor (sicuti de phlegmone & erysipelate etiam dictum est) posteriori huius atatis chirurgis, consistit. Nempè in debita vivendi ratione, in pi-

Curandi
oedematis
scopus du-
plex, cum ad-
huc gignitur.

Oedematis
inveterati
curandi ra-
tio.

Oedematis ve
symptoma est,
curatio.

Quatuor sco-
pi particula-
res in curan-
do legitimo
oedemate ob-
servandi.

in iussu humoris preparatione, & quam aequationem vocant, & eiusdem expurgatione: influxi & iam particulam occupantis humoris repressione, dissolutione & exiccatione; & postremo in symptomatum seu accidentium ipsam cedema consequentium correctione & summotione. Haec itaque sunt quatuor intentiones particulares, quibus duae illae generales suprapositas indicationes assequimur. Prima igitur intentio perficitur, debita ac cōgrua sex terum non naturalium administratione. Porro ritē ac commodē res ipsa non naturales corpori laborantis adhibebuntur, si ad caliditatem & siccitatem, cum quadam attenuatione, declinaverint uniuersa. Ergo tenuem & siccum aërem deligito, preparatō. De. Vinum deferatnm, pellucidum, album vel subrubellum (quod claretum vocat) in suo genere optimum, & modicē aquā dilutū, in potu assumito. Panis probē coctus & ritē preparatus esto. Carnitum ouillis; aut ex montanis & campestribus aniculis maximē vescitor, iūq; asis potius quā elixis. Insulis, oleribus & offis parē vitior. Ab azymis, id est, non fermentatis, erudio quoq; & prabumidis, abstinetō. legumina, casenm, fructus, praesertim horarios & immaturos, pisces quoq; (nisi forsax saxatiles, eisque vel assos vel vino incoctos) ne gustato. Assa in uniuersum meliora sunt elixis, & ite qua piscioris industria preparantur. Patram comedito ac minui bibito. Summatim, victus sit attenuans & exiccans. Radicula ex aceto: carnes assae, & aromatatum usum confert. In summa, vita luxuriae atque ingluuiem fugito. Si aluus non respondet, eam ficibus & carthamo soluito. Ergo ficis aridas quinque vel sex numero accipito, easq; medulla carthami impleto, & manē vel prima mensa comedito. Vel aluus clysteris aperiat: aut aliis ventrem subducensibus. Corpus moderatē exerceto, si tamen particula laborans circa noxam id admiseris. quare motui sit frequens, nisi cedema occupet crura vel pedes. Somnus brevis esto: nam & somnus ususq; Veneris parum esse debet. Balnēum atque omnia humectantia prorsus vitato. Secunda intentio compleretur preparantibus seu aequantibus (qua vulgo digestina vocant) & vacuantibus materiā illam pituitosā, qua scaret corpus laborantis. Ergo genus aliquod oxymelitis offerendum est, quod pituitam in corpore delitescētem possit incidere & detergere. Deinde preparata hoc modo expulsiōni antecedens materia,

1.
Prima inten-
tio.

Aer.
Potus.

Re. Dietio.
Inauitio.

Motus.

2.
Secunda in-
tentio.

materia, medicamento atq; phlegmagogo, id est, pituitam expur-
 gante, ex periti alicuius medici praescripto, vacuanda est. Quod si
 (inquit Guido à Cauliaco) plethora adest, iudè vena aperiri
 posset: non citra tamen periti alicuius medici consiliū. As vix
 unquam in corpore plethorico visuntur œdemata, saltem legiti-
 ma: Nam in eo non magis pituita, quàm ceteri humores abun-
 dant. Proin vix sola, & non aliis humoribus remixta, in particu-
 lam aliquam corporis plethorici influere potest. Quare vena se-
 ctio in œdemate, saltem legitimo, nequaquam ex usu esse vide-
 tur. Sic Leonus etiam testatur cap. 22. & proprio: Curationem
 exordiemur non quidem à sectione venæ, quoniam materia adest
 frigida, cum cacochymia: nisi forsasse esset œdema compositum
 cum inflammatione, vel occuparet guttur. Sed potius in princi-
 pio demum aluum cum manna, syr. ros. solutius, vel similibus.
 Postea digeremus materiam huiusmodi syr. R. syr. de succo end.
 3 j. cœymell. conpositi 3 ss. aquar. scabiosæ, fœniculi, cicoreæ ana
 3 j. misce pro haustu. Velin sola materia pituitosa oxymelite & Digeſtio.
 calidioribus utemur. hæc dosiſ reiteretur per quinque vices. Inde
 preparato humore vacuabimur vel cum agarico, turbiti, colo-
 cynthide, vel cum pilulis scætidis aut de enſorbio aut de hermo-
 dactylis, vel tali compos. R. agar. trochisc. pill. scætid. de her-
 modactylis, de euphorbia ana 3 j; misce: & cum aqua fœniculi
 fiant pilula v l i. vel R. cassia 3 iij. elect. indi maioris, dia-
 phœniconis, diacathol. ana 3 i. ss. misce, & cum decocto com-
 muni fiat potus. Quod si alius non respondeat, utero scrubis cum
 caribamp; idem præstabit aloë pura vel lota, cum infusione Rhab.
 Fasta evacuatione ad reprimenda trāsimus, quæ simul siccandi &
 digerendi facultate præditi sunt. Et sic tertia intentio perficitur
 in principio, ad moris repercutientibus; non iis quidem quæ urina
 sua frigidityte vehementer stringendo repellunt, sed quæ non in-
 valide siccandi, & modicè digerendi vim habent: ea aggregantia
 exiccationem & resolutionem vocant. In augmento verò disci-
 uentibus paulo fortioribus utemur. At in statu, circa eius finem
 præsertim, & stata iam fluxione, puris inq; fortissimis digerentibus
 seu resolventibus. In declinatione autem absumentibus &
 exiccantibus; si resolutione saltem terminari debeat. Si verò de-
 goneret in abscessum, quem aliqui exituram vocare solent,
 maturan-

De venæ sec-
tione.Lenientia
aluum.

Digeſtio.

Pillulæ.

Potus.

3.
Tertia inten-
tio.

maturantibus, & reliquis quæ in curandis abscessibus propofita sunt auxiliis, curabuntur. Porro auxilia reprimentia, ficcandi finem & digerendi facultate prædita, quæ compertunt initio ædematis ex pituitosi humoris influxu creati, tribus præsertim formulis comprehenduntur. prima est Gal. lib. 14. Method. cap. 4. & 2. ad Glauco. cap. 3. ubi inquit: At si ex pituitoso humore in particulam influente ædema constitit, abunde aliquando satis facis spongia, quæ ex aqua, in qua sit aceti aliquid, maduerit. Porro hæc ita attemperabuntur, ut vel bibi possint: vel ut non multum supra hoc aceti habeant. Deligare verò spongiam debet, ab inferiore parte incipiens, ac supra finiens. Illo autem spongia, modò conductura sit, omnino nona. Huius si occasio non est, (hoc est, si nona copia non sit) hanc detergebis expurgabisque, exquisitè ablundo nitro & aphronitro, & aqua lixinij. Secunda formula est ipsius Anicennæ, qui iubet ut loco spongia aliquando admoneatur pannum linem duplex, aut quid simile: R. decoct. baurach, id est, nitri vel spuma nitri, & cinerum, & aceti ana q. s. Tertia formula est à Rhaze descripta ad hunc modum: R. aloës, myrrha, lycij, acaciæ, stes memithæ, id est, de glancio, cyperi, croci orientalis, boli arm. ana part. æq. (alij ponunt ana 3 j. β.) pulverizentur, & cum succo caulium, hoc est, brasivarum & aceto misceantur. & fiat emplastrum. Porro eadem nuper commemorata auxilia in huius ædematosi tumoris incremento etiam bene faciunt: adiecto saltem illis aceto copiosiore, vel modico alumine, in corporibus præsertim robustioribus, & censem duram habentibus, atque ubi aquosior posca non profuerit. Ergo si sub his paulo antè memoratis auxiliis ædema non subsidat, quiescat ve, ubi rursus deligabis, paulo pluri aceti miscebis, ut posca valentior sit: vel pusillum aliquid aluminis conicies, ac novam spongiam admonebis. Hæc enim & copiosum medicamentum excipis, diuq; continet, & sua substantia affectam partem exiccat. Si nona copia non sit, melius est, inquit Galenus, eo quod vulgus vocat ellychnion, utare. Id verò ante omnia molle esto: quod genus Tarsicum est; cuius si facultas est, andacter visitor: utilius enim experire quàm spongiam. Madeat verò ex posca, quæ & aliquid habeat aluminis. Tum (ut præscriptum est) deligetur ab inferiore sursum: hoc est, ligatura incipiat

Auxilia in principio ædematis admo-
nenda.
1.

Posca aquosa.

2.

3.
Emplastrum
Rhazæ.

Remedia in-
crementum
poro admo-
nenda.

Lib. 14. The-
rap. & 2. ad
Glaucon.

ra incipiat in imis partibus, & desinat in altioribus, sit autem arctatio mediocris: velut in ossis fractura. Ac prima quidem iniectiones fascia, qua scilicet infernè incipiunt, magis arctanda: qua deinceps sunt, sensim remittenda; ceterum non adeò, ut laxa sit aliqua deligationis pars. Porro idoneum medicamentum ad hac glaucium est, & collyrium ex eo paratum: sordes item lucernarum aqua mulsæ diluta utiliter adhibentur. Remedia autem, quæ post vigorem status, ubi iam constitit fluxio, & in declinatione vniuersali adiuuenda sunt, si œdema tendat ad resolutionem, sub triplici etiam formula describi solent. Prima est Anicenna; nempe spongia imbuta aqua lixiuii, ex cinere fici, vitæ & ilicis, quæ species est quercus; & particula admosa: si quidem huic magna vis inest exiccandi ac detergendi. Secunda est Bruui, quam vsuhypanit & Theodoricus. Recipit enim aluminu, sulphuris, myrrha, & salu, singulorum pares portiones: misceantur hæc omnia cum rosaceo & aceto, & fit linimentum, quod præcedenti remedio potentiùs adhuc exsiccat. Tertia rursum est Anicenna, cuius descriptio est talis: R. stercoris vaccini lb. ss. olivani, styracis, vsuea, (id est, musci arborum, qui Græcis bryon dicitur,) calami aromatici, spica, absinthij ana ʒ ss. confice omnia cum aceto & decocto caulium, sine brassica; & fiat emplastrum. Atque hæc quidem ratio est curandi œdemas; quod resolutione terminatur. Si verò digestionem non cedat, sed ad suppurationem spectet, unguentum è succis diachylon nominatum, atque id maximè, quod à Rogerio compositum est, perquam utiliter componitur. Ad id etiam confert vel magnopere & sequens emplastrum, quod recipit malnam, brancam vrsinam (vel si mauis dicere hircinam, quæ & acanthus dicitur) radicem althææ, radicem lilij, cepas assas, limaces, fermentum, & semen lini, cocta & subacta, & cum axungia & butyro mixta, rediguntur in formam emplastri seu potiùs cataplasmati. Alij hanc formulam ita præscribunt: R. malua, branca vrsina, rad. althææ, liliorum ana ʒ ij. ss. cepar. assarum ʒ j. ss. limaces num. iij. fermenti ʒ ij. sem. lini parum cocta & subacta cum reliquis coquant in emplastrum. Aliud ad idem summè efficax: R. succi ebulli, sambuci, oxylapathi, id est, lapathi acuti, lenistilicis, marathi seu feniculi ana q. s. coquantur una cum dialthæa, melle,

1.
Status & declinationis remedia.

Spongia lixiuii imbuta.

2.
Linimentum.

3.
Emplastrum Anicennæ. Vinca quid.

Concoquentia seu maturantia.

Hoc ad Theodoricum refertur.

Aperdo.

melle, oleo & bmyro; atq; ex iis emplastrum conficito. Maturato apostemate, non expectetur, donec sponte aperiatur, quoniam tarde admodum, vel fortasse nunquam id contingeret: sed ferro candente, aut caustico aliquo medicamento fiat aperitio, qua pus excernatur, iuxta modum & formam superius expressam. Deinde

Vng. ap-
polorum.

sordes detergeantur unguento vulgò Apostolorum dicto: quod recipis terebinthina, cera alba, resina pini ana ℥ xiiij, opoponacis, floris aris, vel viridis aris ana ℥ ij. ammoniaci ℥ xij. aristolochia longa, thuris masculi ana ℥ vi. myrrha, galbani an. ℥ ij. bdellii ℥ vi. litharo, ℥ ix. ol. lib ij si fuerit aestas (in hyeme lib. iij) aceti q. s. ad ammoniacum, galbanum, opoponacum dissoluenda, confice secundum artem. Vel mundificatione utere ex apia & succo absinthij: vel unguento subscripto, quod pus crassioris substantiae attrahit & mundificat. Accipit autem id galbani, ammoniaci, resina terebinthina, picis, seu vaccini, olei antiqui ana partes aequales: dissolvuntur gummi ex aceto, & liquefunt ad ignem cum reliquis. Et fit unguentum. post deiectionem vero & mundificationem curatur ut reliqua vlcera sordida. Ceterum quartam intentionem assequimur, pro ratione &

Quarta inten-
tio.

natura accidentium (supervenientium, ut si accidat dolor, ille in primis sedandus erit, admodum iuxta Aesculapii doctrinam) aethyopo humida, vel vino collo vel cerato composito ex chamamelino, oleo de absinthio, oleo de spica & cera. Si vero durities adfuerit, dissolvenda, atque emollienda est medulla butyri, vel cerniva, vel quaspiam alia simili, ut in sequentibus latius patebit. Galenus autem in diuturno oedemate partem oleo liniens, spongiam ex lixivio apponebat, atque stringens, arctius, affectum perfecte curabat. Idem & Aetius praecipiebat. Discutit item, eodem anihore, ac compositi hos tumores terra omnis, illisa, ad solem adhibita:

Lib. 1. ad
Glauc.
Oedemati in-
uecrato.Aetius lib.
15. cap. 1.

pariter argilla aceto macerata & sole exiccata: item creta collecta circa molis accentes culips, cum aceto chalybeato; item sordes reperta in alneoso fabrico, in quo extinguunt ferrum. Possunt etiam applicari lincola tali decocto in adfecta, modo resolvi possunt: Et solorum chamomill. ros. myrrill. absinth. scordiad. ana m. ℥. balust. nucis cupressi ana m. j. salvia, roris-mar. squinanthi, calamenti montani ana p. j. aluminis rocha, salis nigri ana ℥ j. ℥. misce, & cum s. q. lixivij vel aceti decoque, & vire.

Et utere. Suffitus huius decocti multum etiam facit. pariter suffitus resina thuris, lapidis pyritidis, omnia in pulnerem redacta, & super prunas imposita. Si digeri non potest, ad suppurantia, ut iam dictum est, veniendum. Relinquitur aliud genus oedematis tractandum, quod compositum vocatur: cuius curandi scopus variatur, pro ut varia erit eius compositio & nomenclatura: nam si constituerit ex pituita & sanguine, tunc erit oedema phlegmonosum; si ex pituita & bile, erit oedema erysipelatosum; pariter si ex pituita & melancholico succo, erit oedema scirrhum: siq; in curando habebimus semper intentionem ad geminum humorem alterandum & euacuandum: & topica quoque respectum habebunt ad humorem magis prepolentem. Ceterum nunc capta curationis oedematis hic apponamus. Oedemati quod symptoma est, hoc est, accidens, aliis morbis superveniens, ut aqua intercurrentem, tibi, & cachexia, medicamenta, qua discutunt & sine molestia desiccant, adhibeto. Ergo tumens locum oxymelite, vel oxyrrhodino, aut oleo cum sale, aut etiam oxyrrhodino salem habente, perfricato. Hac enim frictione & dolorem (si quis ex distensione exciteatur) mitigatis, & tumorem remittes. Oedemati vero ex tenuis pituita influxu excitato, si nondum restitit fluxio, medicamenta que parum digerant, partim vero cogant restringantq; adhibeto. Ergo spongiam novam vel aliam lixivio ablutam, initio posca dilutiore, in mollioribus praesertim corporibus, madentem alligato, vinculaque (si artus tumor occupet) ab inferiori parte ad superiorem, ut in fracturis, ducto, & mediocriter constringito. Quod si per hac tumor non remittatur, subsideatve, posca, id est, oxycrato, austinis momentum addeito. At si iam in vetustatem affectus devenerit, non amplius remedia mistam hanc facultatem (digerentem scilicet & restringentem) habentia, sed digerentia ac discutientia potius adhibeto. Igitur, parte oleo prius inuncta, spongiam qualem supra diximus, lixivio delibutam, imposito, ac fascias artius deligato.

Oedema compositum quomodo curetur.

Capita curationis oedematis.

1.
Oedema morbi accidens.

2.

3.
Oedema morbus.

4.

5.

6.
Oedema in veteratiori.

7.

7.

OBSER-

OBSERVATIO III.

De apostemate ventoso in genu.

CVIDAM inflationem instar apostematis in genu habenti, post vniuersalia remedia consulu, vt hoc cataplasma resolutiuum (etiam valens in materia phlegmatica) apponeretur: R. sem. anisi subtiliter puluerisati, sem. fœniculi, cumini, carui ana quart. β. farinæ fabarum ʒj. succi ebuli & sambuci, vini arom. ana q. s. decoquendo fiat emplastrum seu cataplasma. Quo apostema illud ventosum resolutum est.

SCHOLIA.

AD flantentos tumores, in quibus vapor aliquis flatusve præter naturam concluditur, referuntur hydrops tympanias seu tympanites, ramex flatulentus, de quibus suo loco diximus, ac curationes in propriis capitibus posuimus. Sed & quinque tumores aut sub cute, aut sub ossium membranis, aut in musculis ex collecto vapore attrahuntur; hi admodum raro videntur: vixque vsquam potest solus flatus citra humoris permissionem colligi. Tumor indolens est, nisi cum membrana magna vi diuellit atque distendit, œdemate mollior minusc; teniens, nec prementis digiti vestigium retinens. De tumoribus præter naturam, qui inflationes dicuntur Latinis, vulgo autem apostemata ventosa, cap. XI. lib. I. de tumor. præter naturam egimus. Hæc autem Tagautius ex diuersis authoribus collegit, sic scribens: Nunc tempestinum est, vt de inflationibus disseramus, quibus diuersa ab œdematibus curatio est. Illa namque, vt Gal. ait lib. I 4. Therap. ex pituitoso succo ortum habent: proinde prementibus nobis cedunt, digitiq; admodum altè in ipsa descendunt. Inflationes verò ex flatuoso spiritu collecto nascuntur, alias sub cute, alias sub membranâ, quæ ossibus circumdantur, aut musculos, viscerumve aliquod includunt. Porro colligitur aliquando non parum etiam in ventriculo & intestinis, itemq;

Apostemata
ventosa.

Inflationis &
œdematis dif-
ferentia.

in medio spatio horum & personarum, ut in aqua (inquit Paulus) subterrenum generis, cui nomen est tympanus. Differunt quoque hæc ab ædemaribus: quod & presse digitis non retinent vestigium, & sonitum veluti tympani reddunt: itemque quod in canitate sensibili subinde continentur, atque hæc nonnunquam maxima. Causa huiusmodi inflationum est caloris naturæ imbecillitas, in materia pituitosa, ad flatum excitandos disposita. Calor namque eiusmodi suscitare quidem vaporem ex humida materia potest, sed non discutere. Quemadmodum enim (inquit Galenus) in externis rebus videmus, ut frigidissima constitutio, maxime spirante Borea, aerem sereniorum reddit, ac calidissima per æstatem constitutio ambientem nos aerem primum efficit, media verò constitutiones nebulas parit: ita in animantibus accidit. Neque enim calor per extremam imbecillitatem, neque cum vehementes sunt ei vires, sed cum medium inter has affectiones obrinet, flatum gignere potest. Retinetur autem flatum eiusmodi in loco quopiam (ut dicit Avicenna) vel propter densitatem, seu spissitudinem membri, vel propter ipsius vaporis seu spiritus crassitiam. quod & iis verbis Paulus ex Galeni sententia testatus est. Membrorum (inquit) densitas, tum spiritus si- mul crassities, efficit, ut idem spiritus non dissipetur. At signa inflationum sunt, tumor veniens tactui, cum lucido quodam splendore, sonum, ut vier, vel tympanum, dum percutitur reddens. Ad hæc per sæpe sentitur flatum per totum corpus modò huc modò illuc discurrens, ac dolorem extensivum pariens. Quod autem ad indicia pertinet, flatulentus seu vaporosus spiritus, qui non discutitur, multa parit incommoda. Halitosus verò huc atque illuc per corpus discurrens cum dolore & anxietatibus, magnopere verendus est: quippe qui à materia aliqua venenosa attolli videatur. Cum tria hæc, materia humida, caloris imbecillitas, & meatuum densitas, ad inflationis generationem (ut in præcedentibus ostensum est) concurrant; quod ad curationem attinet, curationis ipsius scopus erit, caloris substantiam roborare, vaporem seu flatulentam materiam extenuare, & meatuum corporum (in quibus vaporosus ille spiritus collectus continetur) densitatem recludere. Porro posteriora duo, nempe densi corporis rarefactionem, & crassi spiritus extenuationem, iisdem omnino

Lib. 4.

Inflationum
causa.Lib. 6. de
morb. & sym-
ptom.

Lib. 4.

Inflationum
notæ.Inflationum
prognostica.De inflam-
mationum
seu flatulen-
torum tumo-
rum curatio-
ne.

auxilijs assequimur, medicamentis scilicet tenuitate partium pol-
lentibus, sine extenuantibus, & calfacientibus, magis aut mi-
nus, pro partium inflatione afflictarum densitate, vel raritate,
& vaporum quoque crassitudine, vel tenuitate. Pro horum
namque differentia facultas medicamentorum, quæ admonen-
tur, intendi ac remitti debet. Itaque raræ partes & vapor seu
spiritus non admodum crassus, minus; densæ vero, & vapor mul-
ta crassitie præditus, magis extenuantibus, & calidis egent. Ca-
loris autem subtilantia, si perit, aut imminuita est, pro ratione ia-
ctura eius, resarcienda erit. Si verò alterata fuerit, ad mediocri-
tatem reducenda. Quid si una dolor excruciet, ad anodyna

Tres scopi cti-
randarum in-
flationum.

1.
Prima inten-
tio.
Cibus.

Potus.

2.
Secunda in-
tentio.

Drageta co-
actionem adiu-
uans.

transcendendum erit. Non absurdè igitur inflationum (quas ven-
tosa apostemata vocant) curationem eritis intentionibus perfici
dixerunt posterioris ætatis nostri chirurgi: prima in debita vi-
uendi ratione, secunda in proba concoctione, & tertia in statu-
lenti spiritus, qui in particula collectus est, discussione consistit.
Itaque vitæ institutio talis erit. Abstinentium imprimis ab om-
nibus crassis, viscosis, crudis, pituitosis, flatuosis: cuiusmodi sunt
dulcia, legumina, fructus crudi, rapum, castanea, & alia id ge-
nus, quæ spiritum flatuosum procreant. Utendum autem cali-
dis & siccis, item attenuantibus, & flatum discutientibus, ut est
pauis bordeacens, qui aliquid salis & cumini receperit. Labo-
rantis potus sit vinum album vel subrubellum (quod Clareum
vocant) aut vinum Græcum. Utatur decocto cicernæ alterato
cum cepis, apio hortensi, quod vulgo petroselinon appellatur,
calamintha, ruta & cumino. Carnes sint assæ potius, quàm eli-
xæ, & præsertim ex volatilibus, ut de ædemate dictum est. Ut
autem secundam intentionem assequaris, roboranda est tibi vir-
tus concoctrix bonis quibusdam speciebus aromaticis, & confe-
ctionibus, atque (ut vocant) electuariis ad hoc dicatis, ut sunt
diacuminum, diacalaminthe, aromaticum rosatum, & sequens
confectio, quam dragetam appellant: R. anisi, marathri, carui,
danci, cimini, baccarum lauri tritarum ana ʒj. glycyrrhizæ,
quam liquiritiam vocant, galangæ, zinzib. albi ana ʒß. ca-
ryophyllorum, cubebarum, piperis longi, sem. ruta ana ʒij. ani-
si sacch. incrustati ʒiij sacch. lib. ʒ. fiat pulvis. Extrinsicus
vero inungatur ventriculus oleis de spica, de costis & ruta: vel

fiat

fiat epithema, quod ea recipiat quæ & flatus discutiunt & iuvanda coctioni dicata sunt; atque hoc stomacho admoneatur. Sed hæc ad medicinam magis quàm chirurgiam pertinere. Tertia intentio completur medicamento, cui mixta facultas sit, hoc est, quod simul concoquat, digerat, & modicè adstringat, nec dolorem augeat. Ad hæc autem consequenda instituantur tres formulæ auxiliorum, lib. 14. Therap. prima ad hunc modum posita est à Galeno: In artubus (inquit) & musculis, qui sub cute aut etiam membranis, quæ ossa vestiunt, inflammatione orta, si citra dolorem sit, liquor aliquis tenuissimam partem, cuiusmodi est lixivium nona sponsia exceptum, satis fecerit. Si dolor quoque urget, ungenda pars est oleo, quod relaxandi, remittendique vim habeat. Incidunt porro ex percussione eiusmodi affectus, ubi vel musculus vel membrana quæ os circum, est confusa. At super membranam quidem quæ os ambit, antedicta imponenda est sponsia. Secunda formula ibidem ita descripta est. Ad musculos verò (namque hi aliquando dolent) medicamentum quod magis mitiget est adhibendum. Quò sit ut ad hoc solum lixivium non utantur, sed immixsa ei tum sapa, tum pauculo oleo. Satius autem fuerit in principio, non addidisse lixivium, sed sapam cum vino & exiguo aceto uti, ac quod mediocre sit, olei adducere. Vbi mixta sunt, modicè excalfacere, ac lanam non loram, quam succidam vocant, ipsis inbutam imponere. Quòd si eiusmodi lana facultas non sit, ipsius æsopus, miscella supradicta est iniiciendus. Vbi verò æsopus præsto non est, aliquid cerati, quod ex æsopo componitur, rectè admisceris. Debent enim confusi musculi leniri medicamento cui mixta facultas sit, quippe quæ simul concoquat, digerat ac modicè adstringat; nam si nihil habet adstrictionis, aget aliquando phlegmonas, ac maxime in iis corporibus, quæ sunt plethorica. Ergo trium iam comprehensarum indicationum (concoquenti scilicet, digerendi & modicè adstringendi) in inflatis ex plaga musculis memor, ubi dolor maior urget, mitigativa magis ratione uteris, (nam dolor plerumque magnam copiam humorum ad partem affectam trahit: ideoque ille anse omnia leniendus est, alioqui frustra digerentia & concoquentia remedia adhibebimus)

Tertia intentio.

Ad inflammationem ex contusione in artubus, musculis, & membranarum quæ ossa contingunt.

Ad musculos cum inflammatione dolentes ex contusione.

Sapa.

Lana succida.

Æsopus.

Ceratum ex æsopo.

Aceti, vini
& lixiuij col-
latio.

3.
Pro lixiuio
aphronitrum.

Si inuetera-
uerit inflatio.

Si flatuosus
spiritus vene-
natus fuerit.

Victus ratio.

Theriaca.

plus olei & vini adiciendo; ubi abest, maiore vi instabiles. Maiorem vim intelligo, cum breui via properatur ad finem. Porro brevis via sit, per ea qua valentes habent vires. Ha autem maxime in lixiuio & aceto habentur; post hac in vino. Quoties igitur de mitigando non laboras, horum (lixiuij, inquam, & acetii) plus in mixturam conicies. Rursus ubi repellere studes, vini plus quam horum immittes. Porro id optimum in hunc usum fuerit, si nigrum anstermij sit. At si digere malis, lixiuij plus indes. Acetum vero si his miscebis, ad ambo utilis erit mixtura, propterea quod acetum mixtas habet facultates. Ubi vero musculus sine dolore est, licet sanè in lixiuij penuria pro ea aphronitrum immittere. Eflo autem id minime lapidosum, sed magis spumosum. Tertia formula est emplasticum, quod sit ex strigmentis gymnasiarum, id est, sorditus, qua à corporibus luctantium desergebantur, & calce uina ex aqua & vino simul coctis. Galeni verba hac sunt lib. 14. Therap. Quae verò huius generis inflationes inueterarunt, primo quidem loco his, ea qua ex lixiuio componuntur (ut praedictum est) adhibeas. Secundo loco emplasticum aliquod. Dicam autem & horum exemplum. Strigmenta gymnasiarum seruesacta, percola primum, sic ut pura sint; deinde rursus in cacabum immisis, calcem uinam in farina speciem insam insperge, ad luti usque consistudinem. Salutare hi est & medicamen, quod ex sycomoro componitur, aliq; id genus. Caterum si huiusmodi flatuosus spiritus, qui inflationem committit, fumosus, malus, corruptus, a materiaq; venenosa excitatus, cum dolore intolerabili & vehementi calore per membra discurrens, nullum tutius ac melius consilium dari potest, quam quod ubi in parte quāpiam subititerit, pars ipsa protinus infra supraq; deligetur, ac in medio nonacula vel ferro candente tumor aperiatur, ita ut facile vapor ille venenosus egredi possit. Deinde hians plaga implenda erit aloë & bolo armenia, ex rosaceo & aceto dissolutis. Transactis verò diebus tribus aut quatuor, vulnus carne opplendum erit, & ad cicatricem perducendum. Porro in venenosis eiusmodi inflationibus, victus ratio tenuior esse debet, egerq; corpus medicamento purgatorio. Quod si theriace sumenda daretur laboranti, rectè illi consultum esset. Caterum capitaurationis tumoris flammulenti hac sunt.

sunt. Imbecillam caloris affecta partis substantiam roborato, deperditam instaurato, alteratam ad mediocritatem reducito.

Capita curationis tumoris flatulentis.

Vaporosum seu flatulentum spiritum crassorem, unde tumor eiusmodi suscitatus est, extenuato. Deussatos cutis ac totius laborantis particula meatus, medicamentis tenuitate paritum pollentibus, recludito: deinde flatuosum spiritum discutito. Pro locorum autem affectorum differentia, & vaporis ipsius flatuosi crassitudine, vel tenuitate, medicamentorum quae admoventur, tum materiam tum facultatem intendito ac remittito. Porro si cum dolore & inflammatione tumor eiusmodi flatulentus inciderit (ut contingit in musculis ob confusionem flatu repletis) mitigatoria initio admoneto: procedente vero tempore, quae discutendi vi polleant, eorum copiam paulatim augendo, adhibeto. Inflationes quae ob negligentiam antiquatae fuerint, primo quidem lixivio foвето, deinde emplastrum quodpiam ex his quae molliunt, & discutunt, admoneto. At tympanites cum sit ex tumoribus flatuosis, ut diximus antea, quibus modis curetur ostendimus. Observat. 42. & Schol. eiusdem lib. 19. Obser. & Curation. medicinalium nostrarum: & Obser. 44. de tympanite seu mola ventosa usuri. Praeterea cum & hernia ventosa seu pneumatocoele etiam ad tumores ventosos pertineat, ut paulo ante ostendimus, quomodo etiam fiat, cognoscatur & curetur, exemplo curationis ostendimus. Observat. 16. & Scholio eiusdem, lib. 27. Observat. & curationum medicinalium nostrarum, ut non opus sit eadem hic repetere, quae ipse legere poteris, nam & ad hunc locum explicandum egregie faciunt, & conferunt. Nunc ad apostemata aquosa nosster conuertatur sermo.

OBSERVATIO IIII.

*De apostemate aquoso pedem circa iuncturas
occupante.*

ISTIS diebus cum quidam quasi tumorem aquo-
sum in pede circa iuncturas haberet, stercus bu-
bulum cum citrino pulverisato, prius spongia cum
lixivio perfusa, apposui, præcedentibus univër-
sibus remedijs & egregiè contulit. Tumores enim
aquosi sæpius in pedibus, testibus, capite & iunctu-
ris accidunt, quam in alijs corporis partibus: tum
quod humor eiusmodi in eas partes promptius ir-
ruat, tum quod caliditas in ipsis sit modica: quippe
quæ in calidissimis absunt partibus. Denique quem-
admodum flatusos tumores raro inveniuntur absque
humore aquoso, ut diximus, ita vix unquam aquo-
sus tumor, siue serosus, in particula aliqua conclu-
ditur absque flatu. Huic igitur victum attenuan-
tem, calefacientem & exiccantem præscripsi, qua-
lem antea in vero oedemate institueramus: & ut pa-
rum dormiret ager, imperavi; somnus enim lon-
gior plus aquo humectat: & ut aerem præcipue sic-
cum eligeret iussi: curamque incepti ab aquoso hu-
moris per alium & per urinarios meatus euacua-
tione; prius materiâ aquosâ præparatâ per syr. ab-
sinthij, eupatorij, byzantini, & similes. mox ca-
tapotia ex agar. rhab. & hiera commodè exhibui-
mus. postremo ad topica illa resolventia & exic-
cantia, serosasque humiditates consumentia, com-
modè devenimus.

SCHOLIA.

HVC pertinent aquosi tumores, quibus vel aqua citrina,
vel sanguinis serum comprehenditur: quod genus hydrop:
ascites, hydrocephalon, hydrocele & quodcumque horum simi-
ludine

litudine sub eam prominet. At de omnibus speciebus hydro-
 pis diximus abunde, maximè de anasarca seu leucophlegmatia,
 etiam de ascite (quæ etiam ad tumores aquosos pertinent) dixi-
 mus lib. 19. Observat. & Curationum medicinalium nostrarum,
 etiam de hydrocele, id est, hernia aquosa, Observat. 18.
 lib. 27. at de hydrocephalo mox dicemus. Ceterum Tagauius
 lib. 1. Instituta. Chirurg. de tumoribus præter naturam cap. 12.
 de tumore è serosa substantia creato, quod aquosum apostema
 nominant, sic inquit: Pituitam, si per universum corpus in-
 creverit, ea species aqua intercutis, quam Leucophlegmatiam
 vocant, comitatur, ut Galenus annotavit lib. 6. de symptom. Leucophleg-
matia.
 causis. Cum verò in una duntaxat parte pituitosa hæc substan-
 tia redundat, œdema enascitur: ita enim appellant tumores
 laxum ac doloris expertem. Serosa autem excrementa si abun-
 dant, aquam intercutem (quam ascitem nominant) genera-
 re solent. Quæ si in unam aliquam partem incubuerint, in
 ea phlyctænas, id est, pustulas, excitant. Porro serosum eiusmo-
 di recrementum, recentiores aquosum phlegma nominare con-
 sueverunt. Quemadmodum etiam & pituitam illam, quæ re-
 peritur in pedibus & cruribus eorum, quos aqua inter eam
 vexat, & in tabidis, & aliis qui malo habitu (Græci cachex-
 iam vocant) laborant. Ad hæc, tumores ex eiusmodi aquoso
 phlegmate, aut seroso iam dicto recremento procreatos, illegiti-
 tima ac non vera œdemata vocitant. Leonus verò cap. 24.
 de apostemate aquoso aliquam particulam obsidente, aposte-
 mata aquosa potissimum vocat tumores illos in testiculis, ut
 est hydrocele; in capite, ut est hydrocephalon, cum & in his
 partibus, ita quoque & in pedibus & iuncturis magis sunt.
 Ceterum in periculosis illis dispositionibus seu affectibus, tā-
 be, inquam, hydrope, & cachexia, œdema (ut superius ex Ga-
 leni sententia dictum est) symptomatis rationem obtinet;
 non morbis nulla quidem propria præcipuæque curatione indi-
 gens. Sola enim frictio ex oxyrrhodino, aut nunquam ex
 sale & oleo, vel etiam ex sale & oxyrrhodino, sistit ipsum,
 aliæque huiusmodi multa. Horum autem tumorum cause sunt,
 alteratrix facultas non humiditate solum nimia, & copia su-
 persuitarum crudarum, sed præcipue algere & frigida intempe-
Ascites ex
seroso recre-
mento.

Phlyctænz.

Methodus
curandi tu-
mores.

Cause tumo-
rum aquoso-
rum.

Cause tumorum aquosorum.

Aquosorum tumorum notæ.

Iudicia.

Ascites à maiori frigiditate generatur, quàm tympanites.

Quas partes maxime prehendat aquosi tumores.

Aquosi tumoris curatio.

Curandi aquosi tumoris duplex indicatio.

tie vitata, & alimentorum prauitas, ad aquositatē declinans, ut ex lib. 6. de symptomatum causis facile est colligere. Signa & iudicia serè eadem sunt, quæ & veri œdematis. Hoc tamen differunt, quòd in istis aquosis tumoribus latus magis tumor est, quàm in œdemate legitimo: atque idè non tantum renititur tactu, sonatq; non ut flatus, sed ut aqua potius. Ad hæc aliquo modo splendere videtur, cum ad lucem quis ipsum innetur. Quod verò ad huiusmodi tumoris iudicia attinet, aquosus haud dubiè tumor à maiori enascitur frigiditate quàm stenosus, ut Galenus auctor est, Commentario undecimo lib. 4. aphor. super hunc aphor. Quibus tormina, & circa umbilicum labores &c. Videtur autem (inquit) à maiori frigiditate generari aquosus hydrops, quem ascitem vocant: à minore verò tympanias, quæ ab Hippocrate aqua inter cutem sicca nominatur. Neque enim humida substantia in stenosum aërem sine calore aliquo potest transmutari. Tumores præterea aquosi sæpius in pedibus, testiculis, scroto, capite, & in uulnibus accidunt quàm in aliis quibusvis corporis partibus: tum quòd humor (ut diximus) eiusmodi in eas partes promptius irruat, tum quòd caliditas in ipsis modica sit: quippe quæ procul à calidissimis absint partibus, ut secundo Prog. ait Galenus. Quemadmodum etiam stenosus spiritus raro inuenitur absque humore aquoso, ita vix unquam aquosus sine serosus humor in particula aliqua concluditur absque flatu. Hactenus de generatione, causis, signis & indicij aquosi tumoris, nunc de curatione. Cum aquosi tumores, & serosi (ut diximus) recrementi fluxione excitentur, non aliâ certè curandi viâ & ratione saltem uniuersali, in illis profligandis utendum est, quàm eâ, quæ in aliis supra memoratis tumoribus, qui ex humorum in partem aliquam influxu procreantur, persanandis, à nobis supra explicata est. Duplex igitur curandi indicatio per initia in eiusmodi tumoribus erit: nempe vacuandi quod influxit, & fluxionem inhibendi. Quocirca & composita fuerit de talibus affectibus (veluti & de reliquis morbis omnibus, quicunque in generatione adhuc sunt) medentis sollicitudo, ex ea scilicet quæ curat, & ea quæ prouidet. Itaque prima indicatio ei parti Artis medicæ subiicitur, quæ morbos curat: secunda verò ei parti subiacer, quæ futurum morbum præcauet. Porro ut

geminum

geminum hunc scopum vniuersalem assequamur, aliis quinque particularibus intentionibus est opus, quæ nosler Guido à Canliaco in curatione tumoris agnoscit hoc ordine & modo, qui sequitur, expressit. Prima, in probâ vitæ institutione atque obseruatione consistit. Secunda in concoctionis emendatione, seu (ut ait) rectificatione. Tertia, in agnoscit humoris per aluum expurgatione. Quarta, in eiusdem serosi recrementi per urinarios meatus eductione. Quinta & vltima, in coniuncta (ut loquuntur) seu contenta in particula humiditatis agnoscit, enaporatione, atque exiccatione. Caterum cum prima quatuor intentiones magis ad medicum spectent, quàm ad chirurgum, quem hoc opere instituendum suscepimus, atque etiam ex illis quæ in præcedentibus dicta sunt, satis innotescant; consilium fuit, tantum de postrema quæ topica desiderat auxilia, hoc loco agere. Quinta igitur intentio perficitur cum exiccantibus & resolventibus huiusmodi aquosas ac serosas humiditates, quæ in particula laborante continentur. Horum autem tres communiter formulæ statuuntur. Prima est Galeni lib. 2. ad Glanc. & 14. method. medendi: nempe quæ constat oxyrrhodino & sale, ut superius dictum est. Secunda est eiusdem: sponsia scilicet noua, lixiui perflusa, & reliqua alia auxilia, quæ supra ad œdemata scripta sunt. Quibus, ut potentius exiccet & discutiant, addenda sunt aphronitrum, alumen, sulphur. Tertia formula est cuiusdam empiastri ab Auicenna descripta in curatione scrophularum, quod Galeno attribuit in libro de compositione medicamentorum *κατὰ γέν.* Hoc autem (ut ille prædicat) intra hebdomadam unam ad summam, plerumque vero intra triiduum, omnem duritiem resoluit. Porro tamen si empiastrum hoc apud Galenum libro nuper citato non reperitur, eo tamen commodè uti possimus ad aquosam & flatuosam duritiem dissoluendam. Eius autem descriptio talis est Auicenna: *℞. sem. sinapis, sem. urticae, sulphuris, spuma maris, aristolochia (rotunda) & bdellij ana ℥ j. ammouiati, olei antiqui, cera ana ℥ ij.* Quod si hoc empiastro non discutitur, non aliud auxilium melius ac præsentius excogitari potest, quàm ut ferro aperiatur, deinde detergeatur, & aliorum sordidorum ulcerum more curetur. Ex istis constant capita curationis agnoscit tumoris. Vltimum attenuantem, calfa-

Quinque particularibus intentionibus curationis agnoscit tumoris.

Empiastrum Auicennæ discutiens aquosos tumores.

*Aorium, & desiccatorium laboranti instituito. Ut corpus mo-
deratè exerceat, parçè edat & bibat, non multum dormiat, ven-
trèmque & vesicam sapiens ad excretionem exuscitet, imperato.
Ut probè alimenta concoquat, & status minimè gignat, curato.
Serosas humiditates, quibus laborantis corpus scatet uniuersum,
per aluum & urinarios meatus expurgato. Serosum illud recre-
mentum, quod in affecta parte continetur, desiccato, & per ha-
litum digerito. Quod si discuti non possit, scalpellum vel po-
zitis ab igne candens ferramentum in tumorem, si artus occiper,
adigito, atque eius parte procliniore (quò faciliùs inde humor
emanet) resecato. Humore qui tumorem committebat, per emis-
sarium vacuato, reliqua quæ ad sordidum & aliorum con-
similis natura ulcerum, curationem pertinent, sine mora per-
finito.*

OBSERVATIO V.
De hydrocephalo.

CVM in superiore parte capitis paulo supra
frontem Fredericus infantulus, nuper natus, fi-
lius Petri Frederici chirurgi Delphensis hydroce-
phalon haberet, quem ego è sacro lauacro seu fon-
te susceperam (solet autem & hic aquosus tumor in
capite puerorum vt plurimum à primo ortu colli-
gi:) pater, qui egregius chirurgus & mihi amiciissi-
mus erat, ex communi vtriusque nostrum consilio,
(cùm robustior alioqui videretur infans,) facta in-
cisione, effluere fecit aquosam illam materiam, ac
vulnere postea vlceris instar absterfo leniter pueru-
lum breui sanitati restituit. Eodem etiam modo
istis diebus in infante illius mulieris quæ in insigni
Diui Oberti habitabat Delphis, curationem hy-
drocephali administramus solâ incisione: nostro
enim consilio per eundem Petrum Fredericum com-
patrem meum in tumente cute, ad modum crucis
factâ puncturâ, aqua omnis paullatim effluxit, & in-
fans similiter curatus est, solis absterforiis, vt in præ-
dicto infantulo, ad puncturæ mundationem vsur-
patis.

patis. Sed postea per me & eundem chirurgum experientia ipsa manifestè paruit, quòd facilius & tutius eiusmodi hydrocephalo laborantes infantiuli cum exsiccantibus & resolventibus medicamentis exterius admotis & circumpositis curentur, etiam sine incisione; quam incisionem nunc quidam pro extremo remedio habent, & non immeritò, ut in sequentibus Scholiis & Obseruatione sequenti manifestius euadet.

SCHOLIA.

AD apostemata aquosa (ut dictum est) refertur hydrocephalon; hoc est, Aqua extra cranium, Auicenna; Apostema vero intercutaneum Hali-abbati vocatum. Congregatur autem interdum (inquit Manardus Epistol. Medicinalium libro 7. epistola 2.) in caputibus præsertim puerorum, aqua in medio aut cutis aut pericrauii, aut huius & ossis, quam ὁφθαλμοφάλορ Græci vocant. Sic Galenus aquam in capite extra cranium interdum esse admittit; tunc quoque tumorem apparere mollem: aut quandoq; sub cranio consistere, neq; iam foris comparere: aut quandoque utrobique inesse. Qui verò intra cranium consistit, hunc quidam exponunt, interdum sub cranio consistere, videlicet supra meningem, duram à barbaris matrem vocatam; ut & Leonus de tumoribus præter naturam cap. 25. ex mente Galeni asseruit, dicens, quòd tunc est tumor agnosus qui in capite puerorum, ut plurimum à primo ortu colligitur: vel est humoris agnosi, aut sæculenti sanguinis in parte aliqua corporum eorum quæ caput concinnant collectio. Hydrocephalon igitur quatuor species habere videtur: unā, cum intra cerebrum & involucri eius humor subsidet: alterā cum intra membranas & ossa: tertiā, cum intra os & pericrauii: vltimā, ubi os & cutem interiacet. Eiuscemodi morbum nequaquam fieri, neque inchorari nisi in recens natis puerulis G. Placentinus asseruit: nempe quòd ex causis morbi istius optimè pensculatis, rem ita se habere, certius conslet. Id nos tamen vidimus in puero septem annorum, qui etiam curatus est absque incisione,

Hydrocephalon.
Aqua extra cranium,
Auicennæ.
Apostema in
tercutaneum.
Hali-abbatis.

Gal. in Fini-
tionibus.

In sequenti Observatione ostendemus. Verum in puernlo nostro,
 de quo in precedenti Observatione loquebamur, etiam antequam
 nasceretur, vel in ipso partu malum originem traxerat, nam sta-
 tim à partu pater animadvertit caput hydrocephalo affectum:
 ita quoque non solum in hoc puernlo, sed & istis diebus etiam
 in infante illius mulieris qua in interfignio Dini Oberi habita-
 bat Delphis conspeximus, & nostro consilio per eundem chirur-
 gum factâ puerntâ aqua effluxit, & infans curatus est. & no-
 ster Fredericus factâ incisione instar crucis per partem sanatus est:
 quamquam & postea per me & eundem chirurgum experienciâ
 compertum sit, quod facilius & tutius (ut etiam superiori Obser-
 vatione meminimus) cû exsiccantibus & resolventibus medica-
 mentis curentur, nullâ factâ incisione: quod remedium extre-
 mum esse debet. Ex istis iam supradictis manifestissimè liquet,
 istiusmodi congregationis aqua causam in capite infantium,
 plusquam in aliis membris, interdum intra, interdum verò extra
 calvariam, potissimum reperiri. Cuius quidem rei idem Placen-
 tinus in lib. 1. suæ Chirurgia cap. 1. duas inducit causas. Pri-
 mam scilicet, respectu aliorum membrorum, immensam capitâ
 capacitatem: alteram verò infantis in utero materno posituram,
 qua capite inclinato propendeat: quare facilius ad eum aqua
 humiditas defluat, ex mensibus retenta suspensis, quam nec ma-
 ter ipsa, neque puer evincere, seu corrigere potuerint, sed tan-
 tummodò istiusmodi materiam retrudere, capitâq; infantis de-
 mandare. Ad quam quidem operationem proculdubio & causa
 superius ex eodem autore citata, nonnihil adiuvant, eandemq;
 efficaciter promonent. Constat enim iuxta eundem autorem,
 infantem utero & renibus maternis communicari, atque ex ve-
 nis uteri tum hepate matris, sanguinem, ministerio umbilici, nu-
 trimenti gratiâ, adieci suum, attrahere: ob faciliorem itaque
 illud fieri attrahendi dispositionem, occasionemque: ventrem
 præterea infantis, eiusq; partem anteriorem, circa renes mulie-
 ris collocari, qui manus super genna teneat oclusas, ut capite
 propenso super manus in concavo oculorum manus occultentur,
 naribus inter duas manus consistentibus. Quibus causis fit, ut fa-
 cile materia confluentis spontanea promptitudo in caput infantis
 derinetur. Sunt autem qui istiusmodi duas causas, essi Gnil-
 helmi

Causa.

Causa dux,
iuxta Placen-
tinum.

Infantium in
utero mater-
no positura.

Causa alie.

helni sententiâ approbatas, reiciant aut non admittant, eiusque sententiâ planè refragentur, tamquam improbabili, quum venter ipsius infantis multo sit capacior, decliniorq; ipso capite, ad quem potissimum eiusmodi materia rapi deberet. Ob quam rem, alias tres eiusmodi aqua in capite coacervata adducunt causas. Primam videlicet ipsius membri, scilicet cerebri, naturam, tamquam humidi & aquei, inter reliqua nostri corporis membra, præcipuè vero in exortu initio. Alteram verò tegmenti sui imbecillitatem, hoc est, osi sine cranii, unde humiditates non tam faciliè exhalare possint, neque in vaporem mutari, sed potius retineri. Tertiam vaporum adsignant pronentium ad ipsius cerebrum, qui tunc ibidem ex frigiditate coacervati in aquam convertantur, ut ex Aristotelis verbis lib. 2. de partibus Animalium, cap. 7. liquido deprehenditur, recitanti, fluxiones etiam ob eam rem ex capite oriri, in iis corporibus, quibus cerebrum sit frigidius, quàm temperamentum postulet. Quum enim alimentum per venas sursum respiret, ubi excrementum ob eius loci vim refrigeratum sit, fluxiones pituita, sanieiq; monet: quod simile generationi imbrinis euenire, intelligendum sit, si magnum conferre cum parvo liceat. Cum enim ex terra vapor exhalet, efferaturq; in sublime à calore, ubi supremum aërem subierit frigidum, consistat denuò in aquam, propter refrigerationem, atque in terram desinat. Talis est Aristotelis sententia. At Avicenna cap. 11. Canonis 3. Fen. 1. tract. 3. aqua congregata extra cranium hanc recenset causam, obstetricis scilicet male & inconcinne caput infantis tractantis, componentis, effigiantis, sine fingentis, comprimētisve: ita ut ob suturarum reclusionem, venarum oscula referentur, ad quæ deinde aqueus ille latex sub cuticula decurrat. Cuius auctoritate nonnulli permoti, alias tres aqua extra calvariâ corrinatæ recensent causas, videlicet facultatis expultricis cerebri potentiam, retentricis verò impotentiam, atque aquei nutrimenti copiosam administrationem, quæ faciliè capiti inter cutem calvariâmq; surrogetur. Causa itaque efficiens erit (ut etiam Léonus annotavit) vel fluxio ipsorum humorum, ortum ducens ab universo corpore, & ab utero (præsertim in ipsis nuper natis puerulis) ipso male affecto: à quo materia transmittitur ad ipsum fœtum. Vel erit

Causæ hydrocephali, secundum Avicennam.

Causa efficiens.

VENATUM

venarum apertis ipsius capitis, à qua effluit sanguis, & cum eo aquosa substantia; qua depulsa, & in unum locum congregata, talem causat tumorem. Vel erit confusio cum disruptione aliquorum vasorum in capite: quæ affectio frequentissimè fit in infantibus, cum obsestrix functionis in experta, & dariores manibus tractans, corpora aliqua in capite infantu attrinierit. Causa materialis solet etiam esse aquositas menstrualis inconcocta, expulsa ab utero ad sætum: itemq; materia serosa, pituitosaq; contenta in sanguine. Notandum tamen est, quòd quamvis hæc materia vocetur aquosa, tamen lentorem in se quemdam habet.

Causa materialis.

Signa.

Signa habemus quòd statim erupto puero ex utero videmus aliquam partem capitis prominentem & tumorem concolorem. Sed si rubor aderit, & dolor, dicemus esse hydrocephalon à confusione. Quòd si autem materia fuerit inter corium & pericranium collecta, faciliè tumor cedit & recedit: si fuerit inter cranium & membranam, non ita faciliè cedit, & erit aliquantulum doloris: si autem fuerit inter os & membranam cerebri, nihil cedit, nisi validè comprimamus; & tunc puer valdè vagiet: & forma capitis erit deterior, & frons prominens; oculos non aperiet, sed lachrymantes habebit: & videbuntur puer stupidus & quodammodo languidus. Sic etiam Sebastianus Astrucius in lib. suo de puerorum morbis loco proprio. Signa congregationis aqueæ intra calvariam, ubi scilicet membrana dura mater vocata adhaerit, sunt grævedo, quam infans faciliè explicaret, si verbis exprimere posset: oculi præterea difficilis & quasi impossibilis oclusio, quare oculis ad apertis in unum tantummodo inveniuntur locum: oculorum præterea lachrymæ ex resudatione illius aqueæ materiæ ad ipsos derivata: porro & capitis magnitudo insueta, ut aliquibus videtur, respectu colli, reliquorumq; membrorum. Signa verò eius sub calvaria, hoc est, sub membrana, pia mater vocata, consistentis, sunt oculi prominentes & rubei & dolorifici. ex causa enim immensa repletionis prominent; ex vaporibus verò calidis ad oculos confluentibus, rubent; ab exilibus verò, subtilibusque, dolitant. delirium nonnulli adinungunt, quod ex inordinatis & variis ipsorum infantium dignoscitur actionibus. Nota verò illius quæ supra calvariam consistat, sunt calvaria depressio, vel ex materie ossi incumben-

Aqueæ coaceruatæ intra calvariam notæ.

Aqueæ coaceruatæ sub calvaria notæ.

is gravitate, vel quod comprimendo locus ille affectus, reliqua
 fonsa, tactui facile cedat: ob quam rem & Galenus hoc aposte-
 rna molle esse ad tactum indicat. præterea & fletus infantilis, ob
 laesa partícula nocumentum: item & vigilia ex fletu & obla-
 sione suborientes: similiter cuticula color non mutans; aqua
 enim minimè, veluti alij solent humores, cutim inficit, colores-
 que subinde innuat. Cuticula autem istiusmodi aqua compre-
 hensa, nonnihil in fastigium attollitur: aqua enim dum sit sub-
 tilis, exilisq; substantia, facillimè erumpit, & ad cutim foras
 se diffundit. Verum si huiusmodi aquea collectio intra calva-
 riam contineatur, Auicenna decreto, minimè curabitur: me-
 dicamenta enim istiusmodi aquam egerentia, infantes adhuc
 tenerrimi, mollesq; existentes, ferre non possunt: neque alia
 medicamentosa remedia, caliditatem aliquam præse ferentia,
 quibus materia peccans absumi debeat. Sunt autem quidam
 qui ex materia eiuscemodi in cerebro consistentis malitia, cura-
 tionem hanc nequaquam attentandam esse velint. Quamvis è
 diuerso reperiantur, qui cauteris, osse tamen capitis non perfo-
 rato, atque medicinis diaphoreticis hoc malum fuisse curatum,
 vidisse se attestentur. Quod tamen in pueris experiri volenti-
 bus, cum cautione non parua, admoliendum esse, admonemur.
 Haud minùs hinc diligenter observandum est, an huiusmodi
 aqua fuerit copiosa, aut ab exterioribus ad interiora violenter de-
 trusa: quod quidem immedicabile plerumque foret malum, ob
 ingentem in cerebro malitiam. Nec minùs ubi infantes aquea
 istiusmodi collectione laborantes, spasmum inciderint, pernicio-
 sum est, quod ex redundantia nervis communicata eneniat: ob
 lationem non parua, qua in principio fit nervorum, videlicet
 cerebro, quare huiusmodi spasmum exitum portendit. Solent ali-
 quando etiam in epilepsiam incidere, quemadmodum diximus
 lib. 8. Obs. 30. de infante post hydrocephalon epilepsiam leth-
 alem incurrente. Sed & Leonus ex mente Galeni ita scribit: Præ-
 sagium erit bonum, cum hydrocephalon partes exteriores occu-
 paverit: quod autem intra menyngem cerebrumq; incidit, insa-
 nabile. Nunc ad curationem veniamus, hoc sequenti interposito
 exemplo.

Prognosticæ

Galenus in
introduc. seu
medico c. 36.

OBSERV.

OBSERVATIO VI.

De hydrocephalo curato absque chirurgia.

FILIVS Ottonis Tielmanni Delphenſis, ſeptem annorum, cū in ſuperiore parte capitis hydrocephalo laboraret, ac mater vnā cum puero ad me conſultandi cauſa acceſſiſſet, eum ad chirurgum Petrum illum Fredericum compatrem noſtrum ablegauit: cumq̃ue non ſatis tutum videretur ſtatim inciſionem facere, ſola olei hypericonis continua inunctione, addito puluere myrtillorum, puer hic cōualuit: quemadmodum & alius infans illius Houtunij dicti, viri Delphenſis admodum proceri. Venit tunc mihi in mentem curatio illa 69. primæ Centuriæ Amati de tumore aquoſo in capitibus puerorum, quamprimū in lucem editis plerumque apparente. quam hīc libet apponere. Puer (inquit) quindecim dies natus, derepente in tumorem magnum in capite tactu mollem lapſus eſt, quem morbum Græci hydrocephalon appellant: cui occurrens hoc uſus ſum medicamento, quo intra tres dies ex toto inflatio illa euauit: ſic autem medicamentum habet: ℞. pulueris abſinthij, camomillæ, meliloti ana ꝑ ij. butyri recentis, olei camomill. ana ꝑ iiij. ceræ parum, ad ignem fiat vnguentum, quo inungatur locus, & eo, vt dixi, intra tres dies ſanitati fuit reſtitutus. Cæterū in hoc caſu expertum hoc quoque habetur, quod ita habet: ℞. mellis lib. ꝑ. ſalis ꝑ ꝑ. pul. origani ꝑ iiij. miſce, & repidē locus inungatur: ſi quis verō huius morbi exactam deſideret curationem, legat Paulum lib. 6. ſuæ medicinæ cap. 3, quo nullus meliūs rem, vt mihi videtur, pertractat. Hiſ adde hīſtoriam de duobus puerulis curatis Obſ. 19. libri 4. curationum noſtrarum medicinalium.

SCHOLIA.

CVRANDI ratio (ut Sebastianus Aſtruc annoſuit) Curatio per
 in tres diuiditur partes, ſcilicet dietam, potionem & chi-
 rurgiam. Dieta verò nutriceſt in iungenda, ne humectantibus
 veſcatur: aërem inhabitet ſiccum, boreali ſtati obuium: aut aë-
 rem liqui contemperi aridi: nonnihil mediocris & anxia,
 vigilis, frictionibus, capitis peſtinationibus, balneis aſeſcienti-
 bus ſaſtigata indulgeat. Cibis verò exiccantibus, ſine aſu, ſine
 frixu viatur. A potu abſtineat: famem ſufferat, redundanti-
 rum molem egerat. Potio verò (ſub qua & reliqua medica-
 menta intelligimus) tribus dimittenda erit modis, videlicet ex-
 inanitione, reſolutione & cerebri confortatione, ne materia re-
 gignatur. Exinanitio innumeris ſit modis, iuxta ipſius corporis
 euacuatione indigentis neceſſitatem. Semper tamen hic memo-
 riā tenendum eſt aureum iſtud Hippocratis dictum, Digere me-
 dicanda eſſe, cruda verò minimè mouenda. Quo ſaſto deinde ſa-
 cilius ad alios exinaniendi modos pergendum erit, qui ſub forma
 ſternutamenti, aut emplaſtri, aut gargarismiſ aut capui purgij
 alicuius à medicis moluntur. Quorum omnium paradigma ex
 ſerie ponere non libuit, quum hac in periti & exercitati medici
 induſtria, iuxta delinquentis corporis naturam ſolummodo ſint
 ſtatnenda. Sternutamenta autem hoc in caſu optimè ex eiſmodi
 componi medicamentis traditur: ut ſunt gruiſ vel vulturis ſel,
 caſtoreum, ruta ſilueſtris, macis, crocus, omnium ſimul equali-
 bus partibus ſumptis, & cum ſaccharo ſubtiliſſime trito, deinde
 cum pſyllij viridis ſucco incorporatis, impactisq; in formam gra-
 norum lenis: quibus induratis, ſine ſub umbra exiccatis, omni
 die vnum in aqua roſarum maceratum naribus infantium per
 dies tres inſtillaretur. Eiſmodi enim ſternutamentum à medicis
 ipſis pterorum naribus toties intruſum, pro experimento quo-
 dam laudabili habetur. Ad hoc emplaſtra etiam his conferentia
 ex ſemine naſturtij in aqua agitato conſciunt, in qua demum
 linteolum maderaciunt, atque capiti adponunt. Reſolutio cum
 diaphoreticis ſit medicinis, quæ in forma linimenti, vel empla-
 ſtri, vel embrocharum adminiſtrantur. Sic quidam accipiunt
 origani, calamenthi, ſanina, ſticados, ſerpylli, gallatini cupreſſi

Curatio per
dietam.Potio tribus
conſideratur
modis.Exinanitio
quot ſit mo-
dis.Sternuta-
mentum no-
bile & exper-
tum.

Emplaſtra.

Reſolutio
cum quibus
ſit medica-
mentis.

ana

- ana ʒ ij. cinamomi, nucis odorata, corticum citri, macis, ana ʒ j. cera ʒ iij. olorum de lilio, de costo ana ʒ ss. succi maioranae ʒ xij. & tali modo concinnant emplastrum. Aquea quandoquidem concnationi (nisi supra modum & plurius in flo. copiosa foret) eiusmodi diaphoretica, more emplastri adhibita, solummodo mederi posse, autores concedunt: nisi quod nonnulli fortiora quadam supradictis designant, ut sunt: aristolochia, lupinorum farina, & id genus alia. Alij curationem temant per ea quae habent quoque vim discussoriam, ut oleum anethinum cum sulphure: seu cum repellentibus, ut oleo rosaceo, myrrino, & praecipue in hydrocephalo factio per anastomosin, hoc est, per apertionem venarum. ideo accipimus folia cupressi & absinthii, confusa cum oleo rosaceo: vel emplastrum alabastrinum. Puto & ego ungu. alabastrinum conferre. Cum autem usi fuerimus diu his repellentibus, & remanserit aliquid, utemur discussoriis. Cerebri autem confortatio, ne materia repulsalet, cum odoramentis exiccatoriis, & cerebrum excalfaciens fieri solet, musci nempe, vel ruta. iidem cum electuariis & confectionibus, ut sunt diacorus, plirisarcoticon Nicolai, theriaca, mishridatum. Sunt qui odoramentum in hunc conficiant modum: accipientes castorei, ruta sicca partes aequales, & cum glutino tragacanthae, pomum odoriferum conficiunt. Sed tamen omnia odorifera per se & simplici modo administrata, compositorum odoramentorum gerere vices satis abunde valent. Quod si res ex voto minime succedat, ultimo deveniemus ad sectionem, ut in Frederico puero factum est Obser. precedenti, vel ad punctiorem (ut in infante in inter signio Dini Oberti) in loco procliviori, imponendo vinum austerrum, & oleum rosatum, vel pulverem ex aloë, vel oleum abietinum. Paulus libro 6. cap. 3. huius affectus curam tractans, inquit quod hydrocephalo inter cerebri membranas & os, ceteris desperata salutis, non est manus adhibenda. Aëtius autem libro 6. cap. 1. de hydrocephalis, ex Leonida. scribit quod cum redundaverit humor, & sutura fuerint disparata, fistigatum locum dissecare oportet, & consequenter facere velut in capitis suturis disparatis. At si intra cutem & membranam, quae sub cute calvariam cingit, humor sit collectus, tumore quidem exiguo substante, una linea per medium transversa caput incidendum.

Incidendum. Si membrana calvaria inuolucriti, & ossi col-
lunies interseniat, magisq; caput inturgescat, duabus videntur li-
neis per medium se mutuo secantibus: si magis adhuc sit turgidū,
etiam tribus lineis, ad similitudinem H literæ. Vbi manu humo-
rem exemeris, inferis linamentis commodè partem deligabimus,
& usq; ad tertium diem anelao perfundemus: inde solutam me-
dicamentis in lineolum illis persanabimus, quòd si longiore spa-
tio os carnem non recipiat, leniter ipsum rademus. Chirurgia, se-
cundum antiquiores, auctoritate Placentini, istiusmodi absoluitur
mediis. Nam quidam ex capite aquam secernere studentes,
incisionem, inquit, iustar lineæ in parte anteriori capitis, hoc est,
fronte moluntur, ubi ossa in quibusdam pueris non facili, nisi pro-
lixiori temporis intervallo, coalescant. Alij verò eiuscemodi inci-
siones sub forma triangulari admoluntur. Alij in formam me-
dicæ crucis incidunt. Alij incisionibus istiusmodi inhiantes, in par-
te aliqua decliniori id imitantur, vel in parte capitis posteriori:
ut quocunque modo permittant aquam ipsam faciliore modo ef-
fluere. Omnes præterea in hoc convenire videntur, ne incisione
peracta, aqua omnis in unumsum simul, sed sensim certisq; mo-
ra interposita intervallo, egrediatur. Quam quidem curandi
rationem ipse non approbare possit, nec velit, cūmodò neminem
sua aetate, eiusmodi curandi ratione attentatum, eussisse incolu-
mam viderit: namq; ait, cūm consilet infantes solum, & recens
natos, plerumq; huicemodi laborare malo, eò etiam minus fieri
ut hac incidendi forma, pueri adhuc imbecilles & molles, feliciter
curentur. At tamen hos duos puerulos, de quibus diximus paulo
ante, unum ex incisione, alterum ex punctura, curatos vidimus:
& hoc tempore sanissimi ac validi videntur. Præstat tamen ut
sine incisione curemus, si possumus: & ideo idem chirurgus postea
in plures infantulos hoc vitio affectos incides, matris discussione
& resoluentibus remediis & repellentibus curare. Verum Pla-
centinus se puerum vidisse asserit, nullius medici auxilio, sed ipsius
naturæ operâ, per temporis diuturnitatem curatum, qui mul-
tos adhuc annos superstes fuerit. Ex quo quidem natura
ipsius instinctu, in puero isto tantum naturali auxilio curato,
ipse tandem edoctus sit, in eiuscemodi affectus medela, paulatim
exsiccativis medicamentis, etiam diuturnitate adhibita, agendum

Incisionum
modi varii &
differentiæ.

Historia.

Experimen-
tum à ratio-
ne naturali
inventum.

esse. Quod quidem ipse demum expertus sit in alio quodam amico sui puerulo eodem malo graviter affecto : cuius primum inungere caput uniuersum exordiebatur, cum oleo chamamelino, & sulphure, in hunc modum commistis & preparatis. Acceperat enim olei chamomillini ℥ iij. sulphuris ℥ j. quibus commistis bis in die pueri caput calidè oblinebat. Quo facto lanam calidam & siccam capiti superponebat, vel pannum de lana calida & sicca. Et ab istiusmodi instituto per integri mensis spatium non desistens, donec natura non parum confortaretur, euincendo morbum, humiditatem ipsam euidentissimè exiccabat. Innotuerat verò ipsi, humiditatem illam intercalariam & cutem exteriorem consistere; quare fortioribus innitebatur medicamentis. Ad hac praescitum est, membra eiusmodi robustiora consuetioraque esse. Ob quam rem adurentium quippiam medicamentorum (quæ καυστικά dicuntur) nequaquam violentiorum, sed (ut ipsi vocant) potencialium, adfecta parti, hoc est, anteriori capitis, & fronti adinonebat: cui quoque id imprimebat usque ad aquæ coactionem: quo facto, scyssimè hæc promanabat. Addidit post hæc duo adhuc alia caustica annilia in parte posteriori, ex quibus eodem modo distillabat aqua, semper adiungens olei superioris usum, donec ex radice, ut ita dicam, ipsa desiccaretur aqua. Quibus mediis, sub dimidij. spatio anni, puella ista ad vnguem sanitati restituta fuit. Canebat autem, ne ex istiusmodi causticis medicamentis, aqua uniuersim sed tantum destillando efflueret. Circa autem intra cranium atque membranas cerebrum amplectentes contingens aquæ collectionem, maiorem inuinit cautionem esse habendam, ob virtutis scilicet imbecillitatem, & caustici medicamenti impressionem, & aquæ prope cerebrum propinquitatem viciniam. Quam ob rem sternutamentorum, gargarismatum, caputpurgiorum superius enarratorum, usum in nutritibus potius, quàm in ipsis infantibus admolendum esse.

Caustica medicamenta, fortiora & potentialia,

Caustica sentinam adhibenda, & interquiescendum.

OBSERVATIO VII.

*De phlegmatica excreſcentia valdè magna inflar-
nata vel talpa aut ſtruma, vel potius hydroce-
phali, in collo poſteriori circa nucham apparen-
te in infante puella duorum menſium.*

CVM in pago Maellandia prope Moſam anno
1563. ruſticum quendam dolore capitis ex
contuſione cum vulnere præ manibus haberemus,
quem etiam curauimus (cuius hiftoriam habes li-
bro 9. Obſervationum & Curationum noſtrarum
medicinalium, Obſ. 17.) eo quoque tempore ad nos
adfertur infans puella circiter duorum menſium,
quæ ſtrumam in collo; vel potius nartam, vel tal-
pam; in parte poſteriori circa nucham ferè, propen-
dentem habebat, ad magnitudinem oui anſerini.
Strumam hanc ab initio natiuitatis ſuæ ceu glandu-
lam habuerat, vt ad hydrocephalon ferè pertine-
ret, quamquam hydrocephalon non ita in rotun-
ditatem excreſcat. Videbatur autem tranſpàrens
quaſi glandula ſeu tumor aquâ plenus: vulgares au-
tem ad nodum ſeu glandulam referebant, ſuo idio-
mate *een Wen* appellantes. Cæterùm hæc excre-
ſcentia phlegmatica quòtidie increſcebat in maio-
rem molem. vnde parentes conſultabant vt incifio
fieret: ſed quia infantula erat debilis, id mihi mini-
mè conſulrum videbatur. & quia erat de genere
apoſtemaſum aquoſorum, aut excreſcentiarum
phlegmaticarum, ego potius curationem reſoluen-
tibus & exiccantibus perficiendam eſſe, propoſui.
licet & tunc mihi in mentem veniret de tuberculo
antiquo, vulgo narta dicto, altam frontis partem oc-
cupante, extracto, & ſola aqua frigida (apud Ama-
tum Centur. 3. Cur. 100.) curato. cuius hæc eſt hi-
ſtoria. Reuerendus Thomas, monachus ordinis

Prædicatorii, vir crassus & rubicundus, tumorem antiquum in frontis alta parte habebat, magnitudine nucis, tactu mollem indolentemque. Cæterum monachus hic quum tumorem sibi naturalem haberet, ac idcirco illum medicorum consilio extrahi ritteret, ecce forte fortuna Nursinus quidam ad eum venit, ex iis præcipue qui dextrè ramices & rupturas & ex vesica lapillos per sectionem extrahere solent: qui quum tuberculum hominem fœdans contemplaretur, eum ad curationem hortatur, promittens se illum intra octo dies curaturum. Monachus verò cupiens eam turpitudinem fugere, homini paruit: & eo magis, quia Prioris officio tuncungebatur, & sæpe extra domum cucullam deponere, eum salutantes aut honorantes se resalutare vellet, cogeatur, ac ea deposita tuberculum eminens appareret, ipsum omnino dedecorans: igitur homini sese concredidit, & illi quidem chirurgo. chirurgus curationem aggrediens, super tumorem scissuram in crucis aut decussis formam facit, ac vnguibus suis, cum folliculo suo integrum extrahere proponens, eum dirumpit; ex quo sanies quædam aquosa viridis exiit: qua deposita, & folliculo extracto, sola aqua frigida spleniis quibusdam madefactis, & desuper admotis intra octo dies ita liber & sanus fuit, ac si nihil prorsus inibi habuisset: bis autem in die aquâ illâ vlcus curabatur. Sed & eodem tempore mihi in mentem venit illa historia eiusdem Amati, posita Centuria 1. Curat. 76. de abscessu in capite apparente, quem Græci atheroma, recentiores vero talpam appellant, quam & hîc recensere, cum maximè ad rem faciat, liber. Nicolaus monachus, ædituus, temperatura atrabilarius, ætate quadraginta octo annorum, vlcerebus in collo fœdabatur, nec minùs abscessum in capite patiebatur: quem quum primùm viderem, talpam esse deprehendi, & eum inter atheromata Græcis nominata adnu-

adnumeravi. Protinus igitur chirurgus accersito, ab-
 scessum duobus magnis vulneribus in crucis for-
 mam adhibitis, secari iussi: ex quo sanies alba in
 pauca quantitate exiit: tunc verò chirurgus confu-
 luit, ut membranam caluariam tegentem, pericra-
 nium dictam, quo ad fieri posset, à caluaria, siue cra-
 nio separaret, tametsi corrosam nonnullis in locis
 cum ipso cranio prædixeram, id quod in ipsa cura-
 tione visum est. Erat enim caluaria multis & cre-
 bris foraminibus perforata corrosione, quæ uò tan-
 tum in prima lamina, sed in secunda quoque con-
 spiciebatur. Scalpello igitur os ad duram usque
 menyngeam perforare iussi. Tandem curatione ut
 expedit adhibita, ossa exempta sunt; & ille ex toto
 intra quinque menses sanitati fuit restitutus. In me-
 dio tamen curationis, corpore rectè purgato, & op-
 tima victus ratione instituta, ad linimentum sudo-
 rem euocans eum traxi. quod ita habet: ꝛ. thuris,
 mastiches, myrrhæ, cinamomi, zinzib., pipetis lon-
 gi, sandarachæ Græcorum, minii ana ꝑij. rad. pyre-
 thri, floris salis, nitri antiquorum ana ꝑß cineris
 thamarisci ꝑij. butyri recentis ꝑvi. pinguedinis
 porcine lib. j. argenti viui extincti cum succo li-
 monis ꝑij. misce. & omnibus his in mortario be-
 ne pistis, fiat unguentum; quod vires habet tum
 exiccandi & abstergerendi, tum subtiliandi & con-
 fortandi: quo semel in die, ieiuno stomacho, eius
 iuncturæ ac corpus, dempto capite, pectore & alis,
 ac ventre illinebantur. Fuit autem hic sexies illitus,
 & multa pituitosa & mucosa per os emisit, in quo
 ulcera (ut iis plerumque eueniunt qui inunguntur)
 florere: sed lauacro seu gargarismo ex rebus sty-
 pticis confecto, ut ros. rubris, balauatio, malicorio,
 myrto, sumachio, summitatibus leuistici, foliis oli-
 uæ, galla, mastiche, rhure, alumine & similibus, sa-
 na facta sunt, & ipse (ut dixi) ab orci faucibus liber.
 Cæterum quamuis in istis incisionibus profuerit, in hac

tamen infantula imbecilli minimè faciendam esse existimavi, & parentibus ne eam admitterent, consului. Sed cùm isthinc discederem, quidam chirurgi ibi præsentes resolucentia, alij & maturantia applicare: sed nihil profecerunt. Post tres deinde septimanas infantula hæc Delphos ad Iohannem Poterium Geometram delata est: & ad eius ædes conuocatur Theodorus Nosocomii Delphensis chirurgus: deinde & me vocant, vt communi consultatione concluderetur quid in hoc casu faciendum videretur. Cùm infantem viderem, struma illa vel potius natta, vt appellare libet, erat iam duplo maior, quàm fuerat, cùm illam priùs vidissem: & quia occupabat partem posteriorem capitis circa collum & nucham, & infans debilis erat; ideoque, vt ingenuè fatear, cùm malum videretur portentosum, curationem omnino abhorruì. Sed chirurgus similem se habuisse casum referebat, & infantulam posse curari sperabat, non quidem incisione, sed ligatione, minori quoque periculo, vt ipse affirmabat. Ego tamen vix quippiam in hac infantula nos eo modo profecturos esse sperare audebam, quamquam id in natu grandioribus fieri potuisse non dubitabam, quemadmodum refert ille doctissimus Beniuenius medicus De abditis morborum causis cap. 14. de struma ingentis magnitudinis & ponderis, sic scribens: Mulierem Otiavam nomine struma coxæ innata multos annos miserabiliter vexabat. Ad eam iam magnitudinem excreuerat, vt occupante eâ coxam ipsam actus, ambulare non posset. Quo factum, vt iam quinquennio misera in lecto iaceret. Nec ex medicis ullus inueniebatur, qui aut ferro aut alio quouis medicamento tollere tam ingens malum auderet. Quare omni spe destituta, me, cùm iunior adhuc essem, ad se vocans, operam nostram deposcit. Lachrymis vrget & precibus, vt quamlibet miserabile, aliquod tamen præsidium ei afferam:

ram:

ram : mori se malle, quàm in tanta miseria & calamitate vitam ducere. Moverunt me, fateor, infelicitis mulieris lachrymæ : ac propterea rem sanè arduam, & quam nullus qui saperet attentasset, aggressus, strumam ipsam, ea potissimum parte, qua coxa pendeat, vinculo deligo. Et quoniam rescanda crassitudo palmo plenior erat, singulis quibusque diebus vinculum ipsum arctius necto : donec pars media rescicaretur. Tum candenti ferro quod superest scindo, sanguinem supprimo, & mulierem ferè mortuam resumens, molli cubiculo recreo : accuriosa dein observatione, idoneisque medicamentis ritè procedens, diuino tandem auxilio eam in pristinam sanitatem reduco. Tanta autem fuit præcisæ carnis moles, vt pondus sexaginta librarum excederet. Cæterùm quamquam isti mulieri ligatio profuerit, in hac tenella vix tentandam eam esse censebam. Chirurgus tamen, cum se plures hoc modo curasse diceret infantulas simili malo laborantes, atque amici valdè instarent, cum quotidie maior incretceret natta, (quamuis difficulter tamen ob infantulæ teneritatem) tandem in suam sententiam me traxit chirurgus, cum hæc via adhuc tutior esset quàm incisio. Cum autem medicamentâ rescantia & resoluentia non iuuarent, malo quotidie crescente, postremò chirurgus manualetm curationem aggreditur. Strumam itaque illam, vel potiùs nattam aut talpam, quæ ad lumen candelæ translucida apparebat, ita vt manifestè aquam in se continere videretur, filo serico paulatim ligabat, duplici ligatione successiuè paulatimque sine dolore constringendo : & de quarto in quintum diem strictiùs constringebat cum altero filo ; vel de quinto in quintum diem, ne magis accretceret. Interim visum fuit vt tali fomento, quod extenuaret, doloremque sedaret, & simul exiccaret, ac partim etiam resoluereet ac roboraret, vteremur : R. rad. ebulli, rad.

Q s

althææ

althææ ana $\frac{3}{4}$ β. corticum quercus quibus vtuntur
 calcearii, florum chamomillæ, meliloti ana m. j.
 florum anethi m. β. cumini p. j. coquantur in vini
 Pictaviensis partibus tribus & vna parte aceti acer-
 rimi, pro lib. j. Bis in die fiebat forus. Postea & chi-
 rurgo vtile videbatur, vt ad maiorem exiccationem
 aliquid vitrioli in fine adderetur. pannus lineus in
 hoc fotu intinctus & expressus, tepidè bis in die
 apponebatur. Videbatur autem infans post ligatio-
 nem ita adhibitam, & fotum, de die in diem melius
 habere: ita vt vires viderentur non solùm, sed & ca-
 ro (nam priùs macilenta erat, antequam Delphos
 ferebatur) accrescere: bene quoque fugebat, minus-
 què quàm antea vagiebat, vt spes optimæ curatio-
 nis futuræ appareret. Sed tandem in acuminata par-
 te strumæ facta est levis eschara, & 14 die à ligatio-
 ne in parte acuminata ipsius natiæ, & non in parte
 vinculo excepta, per se rupta est; & incepit effluere
 pura aqua: quare cùm ad eam accederem, imperavi
 vt molliter ac leniter aquam exprimeret chirurgus,
 non vnica vice, ne copiosè efflueret, & vires ita pro-
 sterneret. paulatim itaque effluxit. Tamen statim à
 perruptione infans peius habere cœpit, ita vt pau-
 cis interiectis diebus mammillam non fugeret: qua-
 re statim ego de curatione desperabam: nam postea
 per se profluente aqua ex abscessu perrupto, licet
 non subito, non alleviabatur infans, quod pessimum
 signum fuit. Eo autem tempore quo apertus est hic
 abscessus absque manuali incisione, pessima quoque
 constellatio erat, nempe Solis tum Martis opposi-
 tio; Marte taurum occupante, & Saturni quadratus
 aspectus ad Solem, & eodem Saturno quadrato fe-
 riente Martem. Cùm infans itaque magis ac magis
 flaccesceret, neq. ampliùs fugeret, nocte altera sub-
 sequente, nempe 20 Octobris die, sub noctem obiit.
 Ideò & ego eiusmodi excrementas phlegmaticas in
 utero materno abortas curatu multo difficiliors
 esse

esse iudico ; & posthac consultius à talium curationibus, siue ligationibus, siue incisionibus fiant, abstinebo ; quamquam ille chirurgus profiteretur se similes curasse ; & Doctor Hugo Hagensis, cùm de hoc casu mentio fieret, se etiam plurimas eiusmodi phlegmaticas excrecentias incisione curasse retulerit : quam ego in adultis facillè concessero, in nuper natis puerulis aut paulo grandioribus, præsertim debilioribus, hoc exemplo edoctus, non concessero.

SCHOLIA.

HIC tumor procul dubio abscessus erat ex materia pituitosa & aquosa : nam post aquam puram limosa pituitosaque materia effluebat, cùm abscessus perirumpereur : & propterea neoterici tales excrecentias phlegmaticas vocant : ita & prior ille tumor apud Amatum erat ex genere eorum quos Anicenna Nodos vocat, Ἀνικεννα Selaas, qui iuxta varia in eis contenta, varia etiam nomina sortiuntur. Si enim velut adeps sit quod continetur, *σάτυρος* Græcis, Romanis verò Nodus adipinus vocatur ; si veluti mel, *μελικερὶς*, Romanis meliceris & Melles nodus : si veluti pulicula, *ἀθήρωμα*, Romanis quoque atheroma dicitur. Sed præter hos tumores varia alia apostemata & tubercula comperiuntur, in quibus res alia inveniuntur : ut cornu, trunbus, nuncus, ossa, ungues, pili, lapilli, lapides, arena, ostraca, ligna, cinis, carbones, & ut urina liquor, qui in tumore illius monachi inuentus est, & viridis coloris ingrati erat. pediculi quoque aliquando in eiusmodi abscessibus inuenti sunt, ut exemplo ostendimus lib. 8. Obs. & curationum medicinalium nostrarum Scholio Obs. 15. de phthiriasi. Quod ad talpam attinet, quo aliter monachus laborabat ; hunc quoque affectum ipse Amatus ad atheroma spectare dicebat. Caterùm hic affectus nostræ infantula, siue ad hydrocephalon, siue ad glandulam seu nodum referre velis, mihi perinde sit, cùm semper ad abscessus illos (quas excrecentias phlegmaticas vocant) referri debeat. atque ii tumores de quibus nunc diximus, ad Anicenna nodos, quos dubletos pituitosos definis (inquit idem Amatus) in quibus & di-

Excrecentiæ
phlegmaticæ.
Nodi.
Selaas.
Nodus adipinus.
Melles
nodus.

Talpa.

Dubletos
pituitos.

nerse

versæ res inveniuntur, referendi sunt : de quibus per amplè Galenus loquitur lib. 14. method. med. At Tagantius lib. 1. Instit. chirurgicarum, de tumoribus præter naturam cap. 13. de glandulis, nodis, strumis & cæteris abscessibus, quas excrescentias phlegmaticas vocant, inquit ; Græcorum ganglia, chærades, id est, strumæ, quas etiam scrofulas vocant, bronchocele, quod bocinum, & herniam gñituris nominant, melicerides, steatomata, atheremata : adhuc testudo, talpa, & nata sine nupta, tumorum nomina à recentioribus medicis inuenta & nusquam apud antiquos reperta : item fucilla Avicennæ : nodi quoque & vulgaris bubo, aliæq; id genus multa, quacunque corporis parte nascantur, ferè ex pituita generationem habent : atque ob id merito ad pituitosos humores referuntur. Ceterùm tametsi nonnulli ex iis nuper memoratis abscessibus in tephaceam dritiem & fibrillosos affectus aliquando degenerent, radix tamen & origo illorum parte maiore pituita exitis, ut voluit Avicennas : quamquam non imus inficias quin & alius humor ipsi pituita (cuius eiusmodi abscessus propriè soboles sunt,) interdum admisceatur : atque ita compositi & heterogenei nascantur abscessus. Verùm de simplicibus solum nobis hic sermo erit, ex quorum analogia compositiorum etiam cognitio facile habebitur. Hæc enim ad illa, veluti ad quosdam certos canones, semper redigenda sunt, ut alibi quoque diximus. Itaque prædicti omnes tumores sub genere abscessuum pituitosorum, seu (ut vulgare chirurgicorum more loquar) excrescentiarum phlegmaticarum, reponuntur, habentique speciales quasdam inter se differentias, ut ex sequentibus patebit. Glandula enim (ut Guido putavit) à glandis formæ, quam præ se ferre videntur, nomenclaturam accepit : estq; (inquit) vicumque mollis, unica, mobilis & separata à partibus circumiacentibus : in emunctoriis plerumque nascentis. Avicenna Glandula nascuntur vel in manu, vel in pede, vel in loco aliquo nervi & tendinitis coniuncto, & hæc quidem tum veras extirpari, ne scilicet laborans in spasmodum incidat. Eneuiuat quoque (ait) summa volæ manus & frontis : vocantque eas modò apostemata glandulosa, modò nodos. De iis enim inconsideratè tractat in diversis capitibus, utpote in capite de nodis ad finem, & capite de glandulis. Itaque videntur Glandula Avicenna

Enumeratio
abscessuum
pituitosorum.

Simplicia
sunt regula
compositiorum.

Glandula
Guidonis.

Glandula
Avic. que
exdem sunt
cum gangliis
Græcorum.

cenna diversa esse à glandulis Guidonis; & Græcorum ganglia illis (Auenenna, inquam, glandulis) eadem esse, ut paulo post ex Paulo quoque ostendemus. Ista, inquit, apostemata (ut & Valescus tract. suo de chirurgia cap. 11. de Glandulis) principaliter à phlegmate generantur: sicut dicit Auenenna 3. distinct. 4. lib. tract. 2. idè reponit ea in tract. apostematum frigidorum. Glandula igitur (inquit & Valescus) à glaude dicitur, quia primò ad magnitudinem glandis apparet: quamvis in magnitudine & paruitate plurimum discrepent à paruitate cicoris, usque ad magnitudinem melonis, sicut dicit Rhasis. Est ergo glandula excrecentia facta à phlegmate caseato & indurato, & fit sæpe (secundum Auenennam) super volam manus, id est, in dorso manus, in fronte, & ista apud modernos vocatur lupia: & in principio quando super ipsam fit impressio & foris fricatio, separatur, & quasi annihilatur; & aliquando non separatur, quia materia est iam multum indurata. Hæc Valescus. Guido quoque, Lupia veluti lupulus, mollis, rotunda, in locis duris & siccis suam sedem præcipuè deligit, ut in palpebris, & locis nervosis, vulgus Gallicum vocat (inquit Tagarini) vne Loupe. Itaque si eius descriptio, atque etiam curatio, quæ in sequentibus habetur, cum Ganglij Græcorum descriptione, & curatione conferatur, affectus tibi videbuntur non admodum inter se dissimiles. Verùm magno errore tenentur, qui eiusmodi lupiam eandem faciunt cum affectu, quem recentiores lupum appellant. Est enim Lupus malignum vulnus, partes inferiores sed præcipuè crura infestans, celerrimè depascens, & quasi lupus (à quo nomen accepisse videtur) famelicus, proximas sibi carnes exedens: quod vitium dubio procul de genere est phagedænarum. proinde affectus sunt longè inter se diversi, quamquam in nomine quandam affinitatem habeant. At Glandula doctioribus, ut Fernelio, est adenis tumor obdurate, à nodo ganglii vel solo sinè distans. Hæc enim è solis adenibus, illè è nervis aut articulis emergit. Quinque adenès variè sparsi sunt in omne corpus, maximè ad venarum arteriarumq; diffusiones, in multis quoque partes glandula incidere solent: quibus nonnumquam corpus vniuersum (quod multa pituita redundaret) scatere deprehendimus. Ad hoc etiam genus pertinet parosis frigida, buboq; frigidus. Glandularum alia resoluuntur,

Valescus

Glandula Rhasi à paruitate cicoris usque ad magnitudinem melonis.

Lupia glandula species apud modernos.

Lupia species glandula magnam similitudinem habet cum ganglio Græcorum.

Lupus creobus.

Glandula apud Ferneliū.

resolvuntur, quarum humor non admodum crassus sensim digeri
 dissipariq; possit: Alia suppurant, factoque & erumpente pure in
 abscessum desinunt. Et hæc quidem sanguinis calorisque sunt par-
 ticipes. Alia dura persistunt, veram scirrhi speciem adeptæ: ca-
 rum origo è gypsæa pituita est: alia uti inue: erantur, contra-
 cta tandem malignitate in vlcus desinunt: illa struma simplices
 sunt, hæc verò exulcerata. Sed de strumis postea. Ex istis constat
 quòd Glandula inxia barbaros & doctos diversimodè capiuntur,
 & quòd glandula Avicenna eadem sit cum ganglio Græcorum.
 Quod sequentia Pauli verba ostendunt aperte. Ganglion ner-
 vorum concretio est, ex icthi aut lasitudine oboriens, in pluribus
 quidem corporis partibus, præcipue motui dicatis: nempe manu
 summa, & pedibus. Rarius cubitum & caput occupat, Aëtio;
 ac raro, eadem, spontè pronenit. Et rursum idem Paulus lib. 6.
 cap. 39. quid sit Ganglion, unde nascatur, in quibus maxime
 partibus proneniat, quæ denique nota ipsum comitentur, ape-
 riens: id ipsum quod diximus confirmat, inquires: Ganglion
 nervi est concretio, ex icthi aut labore proficiens, plerumque
 verò in manus iunctura, quæ cum brachio committitur; talis &
 articulationis absolutur: quamquam in aliis quoque partibus
 proneniat. Hæc comites sunt nota: tumor concolor, veniens, in-
 dolens. At si violenter premas, stuporis sensum exhibet, non in
 alio, sed ipsa sub cute radices agens, & ad latera spectans: sin
 autem vi adigas, tum ante tum post, nequaquam id facit. Ha-
 ctenus Paulus Aegineta de gangliis: quem & sequitur Ferne-
 lius. Ganglion tumor est concolor, durus, veniens, & indolens,
 nisi quòd vehementer pressus stuporis sensum exhibet. Oritur
 circum nervos, & articulos sæpe in carpo ex crassa lentaq; pi-
 tuita, vel ex naturali melancholia, quæ in eam duritiem concre-
 scit. Qui extra articulos nervosq; nec non extra adenes passim
 exoritur, discriminis gratia quibusdam nodus appellatur. Sed de
 nodis postea. Huius generis est & bronchocele, seu hernia gurgu-
 ris, de qua & postea. Nunc ad strumas & scrofulas sermo con-
 nertatur. Scrofulæ à vulgo vocata, nihil aliud sunt, quàm indu-
 rati, & intra membranam contenti adenes, id est, glandula: in
 collo, axillis & inguinibus præcipuè consistentes, uti glandula
 vasis subilata collocantur. Nonnunquam tamen, quammis
 rari,

Ganglion
 quid.

Ganglii no-
 ta.

Tumor etiam
 est inæqualis
 Philagrio &
 Actio.

Scrofulæ.

tatò, ex carne eorundem locorum sunt, qua affinitate quadam ad strumarum naturam vertitur, & materia adiectione adaugetur, ut visum est Leonida: Has Latini Strumas vocantur: à Græcis verò Chærades dicuntur, vel à chæradibus quidem peiris per marinas aquas transparentibus, vel à snibus multiparis animalibus (numerose enim sobolis existunt, ut snes) & eo morbo frequenter affectis. Scrofa etenim, id est, snes, colla habent glandulosa, & magnâ ex parte strumosa. Struma autem, Celsi morus est, in quo subier concreta quadam ex puro & sanguine quasi glandula oriuntur. Nascuntur eidem maximè in ceruice, sed etiam in aliis & inguinibus & in lueribus. In foeminarum quoque mammis se eam reperisse, chirurgus Meges auctor est. De iis etiam Paulus libro 6. in hunc modum: Oriuntur (inquit) struma in priori ceruicis parte, aut in altera, aut vtriusque vna, aut dua, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata & melicerides. Sic etiam Feruilius de glandulis: Vehementer quidem dura sunt struma, & propriis membranis, ut glandula omnes, obducuntur; sed earum materia acrior tandem euadens, adenem ipsum, circumscriptam carnem, cutemque exedit, vlcusque efficit malignum, serpens, exedens, ut filio Iohannis de Meer quondam pharmacopœi mei Alermariani. His saepe oritur in ceruice, in qua plerumque longa serie disposita glandularum modo cernuntur. Hinc & nonnumquam in pectus aut in alas, aut in mammas prorepunt. Vidi ego pauperem mendicantem Delphis, qui ipsius pectus struma eiusmodi maligni exesum serè habebat. Defluit autem earum materia è capitis parte externa, per ceruicis tendones & adenes; idq; sensim ac lento adedò cursu, ut saepe obscura sit origo. Ea verò materia non simplex pituita est, sed que iam caloris vi ac putredine excandescens acrimoniam conquirat. Quòd si pituita atra bilis permissione ferocior sit, struma carcinomatosis vim & conditionem emulabitur, nuncupabiturque struma carcinodes. Caterùm nodus ad glandulas quoque refertur. Nodus enim tamquam sanis nodis plenus, eidem quidondiciuntur, rotundus, durus, & eodem in loco permansens, circa laica nervosa maximè (que quidem sensu, acutissimo, prædita sunt, dolorem tamen non sentiunt, nisi nodos valde premissi) apparent.

Struma,
Chærades
Græcorum.

Struma
Corn. Celsi.

Struma
carcinodes,
n. v. p. p. p. p. p.
n. d. d. d. d. d.
n. d. d. d. d. d.

Nodus.

Nodi Auicennae.

Testudo.

Talpa.

Bocium.

Bronchocele.

Nata.

Nata vel nata ad steatomata spectat.

apparens. Auicennae autem nodos definit alicubi duboleta frigida; facitq; hoc nomen genus ad steatomata, quae à nostris adiposi & adipini nodi appellantur; & ad meliceridas, id est, meliticos nodos; & ad atheromata, quae materiâ constant pulvi (quam Graeci atheram vocant) simili. Sed de his abscessibus paulo post seorsim dicemus. Testudo ipsi Gnidoni abscessus est magnus, humoralis, mollis, latiore forma, in modum testudinis: unde nomen accepit. Quae si in capite (inquit) nascatur, talparia vel talpa dicitur: in collo bocium: in testiculis hernia. interdum autem cum purè vel squammis vel fistula reperitur. Ceterum testudines & talpa, apud antiquos, neque proprium nomen, neque tractatum inuenerunt. Quidam autem ex recentioribus testudinem definiunt tumorem mollem, vel non valde durum, satis autem magnus, in quo pinguis materia, tunica quadam obiecta, continetur, quae calvaria ita haeret (est enim cutis capitis affectus) ut ipsam plerumque vitiet. Hanc non dubium est de numero esse abscessum, & sub meliceride, vel atheromate contineri: videntur tamen ad meliceridem magis inclinare. Talpa verò cum albam materiam contineat, ad atheroma potius quam meliceridem refertur. Guido tamen testudinis speciem, in id verò testudinem ipsam, ut modò diximus, esse affirmat, quemadmodum & herniam, & bocium, quod vocat: sed varia haec nomina sortiri, pro varietate locorum, in quibus reperiuntur. Ceterum quod vulgus bocium, Graeci propriè inuentio ab interiore parte nomine, bronchocele appellanti; nostri verò herniam putant; & gutturosos, qui eo morbo dehonestantur. Est autem colli tumor grandis & rotundus, inter cutem, & asperam arteriam, in quo modò caro hebes, modò humor aliquis, meli, adipi, pulvi, aquaeve similis includitur. Interdum etiam, ut ait Celsus, in eiusmodi tumore pili minutis ossibus immixti reperiuntur. Nata (ut scribit Guido) est excrescentia magna, carnoja; veluti caro nativum, vel anchorum, diversa quidem forma & magnitudinis: cuiusmodi sunt meloppon & encubita: itaque diversa sortitur nomina, pro forma & membri in quo est, varietate. Porro tumor hic, qui nata vel nata recentiorum turba appellatur, dolore caret, nisi forte adeo magnus existat, ut partes membri trahendo, soluta continuitate, aliquem dolorem circum-

circum-

circumstantibus inferat. Est autem & de numero abscessuum, & ad steatomata (ut supra in enumeratione humorum præter naturam diximus) serè spectat. Bubo, Galeno auctore, laxatum Bubo. paritum seu glandularum (quas Græci adenas vocant) est affectus: nempe simplex inflammatio. Quare vel malè hic inter abscessus putulosos a Guidone annumeratur; vel Guido enim aliud quid esse putat, quàm Galenus. Porro bubones, qui prolapsi aut aliis visceribus, aut doloribus constabuntur, periculo vacant. At qui in febribus pestilentialibus incidere consueverunt, deteriori sunt, siue senora, siue alas, siue cerni em inuaserint. Sed, ut diximus, Bubo frigidus etiam ad glandulas refertur. Engilla (inquit interpret Anicenna) sunt de genere apostematum glandulorum. & quasi hoc nomine (ait) appropriatur illud quod fit post autem. Ex qua descriptione non leuis est coniectura, Engillas Anicenna, enim tumorem esse, qui Græci Parotis dicuntur, affectus quidem glandularum sub ipsis auribus. Quibusdam autem idem esse putantur Engilla, quod bubo; verum tunc illis aliud erit bubo, quàm Galeno & Paulo: nempe excrecentia, multum (ut dicunt) infiltrata, & radicata: ut plurimum sine cysti, id est, folliculo seu membrana eam inuolente, dura in ipse scrofularum: & in eo significati (ut & Tagantius scribit) sumitur bubo à Guidone: quando bubonem Engillinum numerat inter abscessus putulosos. Ceterum longè adhuc plura nomina putulosorum huiusmodi abscessuum reperiuntur. Verum de nominibus ipsis non magna cura habenda est: modo id unum de in cognoscamus & intelligamus, quòd propter eiusmodi nominum diuersitatem, curationem & iudicium euariari contingit. Itaque eiusmodi abscessuum alij quidem peculiari quadam membrana seu tunica (quam cystin vocant) includuntur: alij verò in carne sunt vasis implexi & inserti: quidam basim, seu radicem habens gracilem, quidam verò latiore: quidam item sunt resolubiles, quidam verò minime: quidam magni, quidam parui: aliqui ad suppurationem spectant, aliqui non: alij etiam sunt squamosi, fistulosi, & cancrofi, alij verò nihil horum respiciunt. Causæ huiusmodi abscessuum sunt triplices: nempe primitiua, ut casus, percussio, vitæ luxus, siue intemperantia, ac deprauata viuendi ratio: antecedentes, ut sunt humores non naturales, præ-

Engilla.

Bubo quid
apud Guido-
nem, & alios
recentiores.

Differentiæ
absceduum
putulosorum.

Causæ absces-
sum putu-
loforum.

R

seritum

Materia pi-
tuitosorum
abscessuum.

Signa.

Notæ absces-
sus velamen-
to inclusi.

Iudicia abs-
cessuum pi-
tuitosorum.

Duplex abs-
cessuum pi-
tuitosorum
curandi ra-
tio.
1. Vniuersa-
lis.
2. Particula-
ris.

farim pituitosi, & vera ædemata qua in abscessus degenerant:
& coniuncta, qua sunt varia substantia, & proprie cuiusque
abscessus materia, in parte affecta contenta. Continentur au-
tem in huiusmodi abscessibus, quandoque quidem humores, vel
ferosi, cuiusmodi est urina, vel putridi & corrupti, vel cœnosi,
vel mucosi; vel melli, pulvi, aut adipi similes: quandoque ve-
rò carnes phlegmatica, & spongiosa, atque glandulosa: inter-
dum quoque (ut antea diximus) lapides, arena, ostraca, ligna,
carbones, & id genus alia solida corpora. Frequentissimè au-
tem (secundum Galenum 14 Therap.) sunt horum abscessuum
tria genera, quorum singula propriam appellationem Græcè
sunt sortita. Ea sunt atheroma, steatoma, & meliceris, à simi-
litudine contentorum in his corporum dicta. Est enim aliud eo-
rum veluti senum aut pingue quiddam: aliud veluti mel, aliud
pulvicula tenni, quam atheram vocant Græci, simile. Signa &
indicia eiusmodi abscessuum, que ad pituitam pertinent, ex eo-
rum descriptionibus & differentiis suprà positis faciliè deprehen-
duntur. Iudicium autem quòd velamento includantur, hoc est,
cysti seu pellicula, quam & antiqui tunicam nominabant, est
mobilitas & cuius separatio. Quando verò fixa sunt, id est, eo-
dem in loco permanentes, & carni adherentes, nulla eas in solui
membranaula iudicium est. Porro recentes & tractabiles discuti-
ti, seu resoluti possunt; dura verò & iam inneterata, nequa-
quam. Rubor autem, dolor & caloris incrementum, ostendunt
ipsos abscessus, vel suppurandos iri, vel in fistulas, aut cancerum
degeneraturos. Reliqua cum de singulis seorsum tractabimus,
& maximè de strumis, manifestiora enadent. Nunc pauca de
curatione abscessuum ex materia pituitam referente creatarum,
quas excrescentias phlegmaticas vocari diximus, adiiciamus.
Curatio itaque eiusmodi abscessuum, qui ex pituita ferè ortum
habent, gemina est retentioribus chirurgis: vniuersalis scilicet,
atque omnibus ex aquo communis, & particularis, hoc est, sin-
gulis differentiis propria. Itaque vniuersalis curandi ratio erit,
saltem, tamq; accommodam laboranti vitam insinuerere, ut mate-
ria, quæ tales abscessus committit, in corpore minimè coacerue-
tur: & materiam (ut vocant) antecedentem, & iam in agro-
to corpore collectam, modis omnibus auertere, ne tandem vniuersa-

contin-

condante, hoc est, ei qua iam morbum creat. Porro priorem huius universalis curationis intentionem assequemur, si laborantes eam vivendi rationem diligenter observent, qua in precedentiibus capitibus prescripta est; hoc uno dempto, quod paulo tenuiorem victum, & qui incidendis humoribus crassius magis sit accommodus, amplecti debent. Proinde, si Avicenna consilium sequantur, cibos omnes pachychymos, id est, crassioris sacci vitabunt, frigida item potionem, nimiam satietatem, immoderatamve repletionem, & qua nauseam pariat. Toleranda autem illis est quam maximè fieri poteris, inedia. Bona coctio imprimis erit procuranda. Vitanda habitatio humida, in valibus, paludosa, & vitiatis aquis irrigata. Potus sit vinum aliquod generosum atque optimum, vel aqua aluminosa aut sulphurea. Aqua enim eiusmodi minerales, praesertim qua vini seculum sapore representant, non solum internos hos strumosos ac pituitosos abscessus, sed externos quoque & summa corporis occupantes immittunt ac discutiunt, ut Arnoldus affirmavit. Ceterum alteram partem prioris processus, nempe materiam antecedentem auertere, ne tandem addatur conuncta, quadruplici genere evacuationum assequimur, ut pote medicamento per alium pituitam expurgante, & quandoque vena sectione. Item iis, qua urinam cient, & demum iis, qua collectum in alto corpore humorem in halitum resolvant, tum digerant. Ad vacationem qua fit per alium, laudatur à valde multis pulvis turbit, qui apud Avic. recipitur turbit, zinzib. & sacch. singulorum pares portiones. ex eo autem exhibet ʒ ij; asseritq; praeter hoc, quod resolvit pituitam crassam, nequaquam calfacere neque abradere intestina. Razes pulverem conficit, ex viginti partibus turbit, decem zinz. & trizinta sacch., offertq; ex eo vice una ʒ ij. Sed haec, tum qua sequuntur, non nisi in adultis datus. infantes enim quo modo curentur, etiam supradictis observationibus colligere licet, qui lenissima remedia requirunt; & evacuationes si qua danda, potius univerticibus exhibenda. Loquimur autem nunc de adultis. Benedicta quoque & hiera picra: item pilula de agarico, & de hermodactylis maiores appellata, eiusmodi affectibus magnopere conveniunt. Ad ciendam urinam Guido à Cauliaco sequenti utitur potione; qua recipitur scrofularia partes tres, stipendula

Vit ratio
quali esse
debeat in
abscessibus
pituitosis.

Aque alumina
nosc. vis.

Vacuatio ma-
teriae anteceden-
tis.

Vacuatio
per alium.

Pulvis tur-
bit.

Razes.

Benedicta,
hierapicra,
pill. ex agar.
de hermo-
dact. maio-
res.

Quae urinam
ciant.

R 2

partes

Potio Guidonis vetricans in abscessibus pituitosis.

Quæ per habitum digerant.

Quæ particulare in hisce abscessibus curationem curant.

Tempus quid insinuet.

partes durs, pimpinella, seu bipinella, pilosella, tanacetum, tanul. rub. qui nonnullis brassica veterum creduntur, rubia maioris, singulorum partem unam: radice aristolochia, spuma foetida, radice raphani ana partem dimidiam: concassentur, & decoquantur in vino albo, & melle, usque ad consumptionem medietatis, & fiat colatura; ex qua tertio quoque die hora matutina sumat æger quadrantem, id est, ℥ iij, & potio sit tepida. Caterum pro omnibus his auxiliis, sicuti & pro vena sectione (si aliquando fieri debeat) consulendus erit peritus aliquis medicus, qui & qualitatem & quantitatem, ac modum usus eorum præscribat. Ad resolvendum autem per habitum & digerendum humorem, qui in alto corpore collectus est, & internas glandulas (quæ externarum sunt causæ) excitat, Gal. lib. 14. Therap. consulit Theriacem, athanasiam, ambrosiam, & medicamentum, quod ex Cretica calamintæ est compositum; Græci diacalamintion vocant: cuius compositio requirenda est ex lib. 4. de sanit. tuenda. Multa alia auxilia ad huiusmodi affectus instituntur: nempe potiones, electaria, & etiam olea quæ in aures iniiciuntur Empirica quoque per multa à veteribus descripta & celebrata sunt, quorum usus Tagantio non probatur; & proinde ea suis Commentariis non inseruit. Atque hæc quidem in omnibus supradictis abscessibus communia sunt. Quæ verò sequuntur, particularem ac propriam cuiusque differentia curandi rationem concernunt. Hanc autem curandi rationem propriam ac particularem, in hisce abscessibus diversam efficiunt, atque immutant, tum materia ex qua ortum habent, substantia; tum verò eorum quantitas vel minutula, vel qua in molem valde magnam excrevit: ad hæc partis ipsius laborantis, atque etiam totius corporis natura. Temporis autem duratio licet non indicet curationem, indicat tamen nobis aliquando, atque insinuat, qualis sit ipsa dispositio, ut Galenus annotavit lib. 4. de morb. curandis. Itaque tametsi à prædictis multa sumi possint curandi indicationes, ac intentiones; eas tamen, quantum ad rem præsentem attinet, ad sex cum Tagantio reducemus, quas & iis sex sequentibus velint exprimemus canonibus. Quorum primus ad hunc modum habet. Pituitosos abscessus, molles, & parvos, quæ lapiæ vulgò, & Arabica factionis principi Anicenna glandula appellantur.

pellantur, si in particulis firmioribus constituerint, & (quia nondum inueterauerunt) tencellam adhuc cystin, id est, membranam qua incinduntur, habuerint, comprimito, & aperito, postea deficcato. Secundum: maiores, non multum duros neque inueteratos, more tumorum cedematosorum (de quibus supra egimus) emollito, discutito, consumito. Tertius: pituitosae eiusmodi excrecentias, saniosas & apostemosas, hoc est, quae ad suppurationem spectant, maturato, aperito, deergito. Quartus: firmas, quae ex praedictis auxiliis curationem non recipiunt, & mobiles sunt, blanda, morigera, ac tractabiles, incidito atque extrahito. Quintus: immobiles, infertas, irreversasve, seu (ut loquuntur) infiltratas, hoc est, venis & arteriis multum implicatas, ad radicem, & iniis latas, corrodito, deergitoq;. Sextus: tenni ac gracili radice innixas, deligato ac enellito. Hos canones singularem in sequentibus magis explicabimus.

OBSERVATIO VIII.

De glandula, ac etiam de nodo.

QVI glandulam seu potius nodum in fronte habebat, huic consului ut conteresetur fortiter ac confricaretur, deinde lamina plumbea desuper fortiter ligaretur, ut & Valescus cap. proprio, ex mente Auicennae, fieri iubet. At Prior Carthusianus, qui supra frontem glandulam habebat, vel lupiam, si ab ea liberari optaret, consilium dedi ut chirurgus experto curationem committeret, quia cystin habere videbatur, & ut cutis exterior scinderetur rasorio, & digitis excoarietur, & cum cysti sua vel membranula extraheretur, & si aliquid de cysti remaneret, puluere asphodeli consumeretur, deinde vulnus curaretur ut alia vulnera solent, cicatricem tandem inducendo. Verum Prior iste cum non haberet dolorem, voluit hoc malo potius coedari, quam manulem curationem experiri. At nodi eodem modo curantur, primò per frictionem con-

tinuam & frequentissimam, & constrictionem cum plumbo, & resolutionē. & si non, extrahatur eodem modo ut dictum est. Videndum tamen ne huiusmodi tumores sint infiltrati in nervis aut arteriis, ut dictum est. Refert ipse Valescus, quod in Vasconia quidam sunt chirurgi, qui glandulas manu curent feliciter, experimentis tantum sine ratione exercitati, qui utuntur chirurgia sicuti viderint eorum genitores circa eam operari. Sed & hæc peritia, sicuti & herniæ curandæ aut lapillos excidendi ars, & mendedi peritia, nostris temporibus apud Italos ad Nursinos delata est, ut etiam Leonus meminit de hydrocele. Aleyda Rodeburcha, monacha & cognata M. Iohannis Tiengij, medici Amstelrodamensis percelebris, cum anno 1532 glandulam in genu magnam pateretur per tres menses; tandem mense Ianuario hoc modo idem feliciter curationem tentavit: ℞. florum chamomillæ, meliloti, ros. ana m. j. maioranæ, origani, rorismarini, seluæ ana m. ss. sabinae p. j. salis communis ℥ ij. aluminis rochæ ℥ j. sulphuris ℥ ss. aceti boni lib. j. lixiuij cineris clauellatarum lib. j. ss. bulliant ad lib. j. ss. & eo fomentetur locus cum spongia. Facta fomentatione applicetur hoc cataplasma: ℞. oleorum chamomillæ, anethi ana ℥ ij. mellis ℥ iij. axungia porcinæ ℥ ss. aceti fortis, & lixiuii dicti ana ℥ iiij. bulliant modicum: deinde adde cineris truncorum caulium rubrorum ℥ ij. farinæ lupinorum & fabarum ana ℥ j. fiat bona permixtio in forma solida: addendo parum ceræ. istud cum non proficeret, sequens commodè apponebatur: ℞. sem. sinapis, viticæ, sulphuris, lapidis pumicis ana ℥ ss. aristolochiæ longæ & rotundæ, iteos an. ℥ ij. cineris truncorum caulium rub. ℥ vi. bdellii, ammoniaci dissolutorum in aceto ana ℥ j. olei anethini ℥ iij. ss. ceræ q. s. fiant emplastra duo, extensa supracorium; ponendo modò vnum modò alterum de quarto in quartum diem,

SCHO-

SCHOLIA.

VT autem illos sex scopos seu canones, de quibus sub finem Canon 1.
 Scholij precedentis dicere cœperamus, explicemus, de
 primo canone incipiamus, qui erat ut pituitosos abscessus molles ^{Compressio & attritio.}
 purnos (ut lupiam) senellam adhuc cystim habentes, inueteratas
 nequaquam (nam in illis frustra laboraremus conterendo aut
 comprimendo, ut quamplurimi doctissimi viri unanimiter affir-
 mare solent) cœpiueremus, attereremus & postea desiccaremus.
 Hic primus canon, iuxta Auicennæ sententiam, & eos (ut Gui-
 donem, Valscurum, Gordonium) qui eum sequuntur, absolue-
 tur, si ubi molles, ac minutos eiusmodi abscessus, quos Auicenna <sup>Lupiz cura-
tio.</sup>
 glandulas, & recentiores lupias appellant, contrinueris, ac vehe-
 menter compresseris, laminam plumbeam tumori æqualis su-
 perponas, & ne hinc inde labatur, arcibus vinculis in medio con-
 stringas. Hac enim huiusmodi excrescentias digerit. Primum
 igitur lupia tamdiu manu molliter perficitur, usque dum ali-
 quantulum incalescat, & se ipsa mollior quodammodo fiet:
 postea laborans particula firmiter manibus apprehendatur, &
 fundo scniella, aut re aliqua solida lignea, toties ac tam vehe-
 menter percussatur, ut dispareat, & interior eius cystis, id est,
 membrana, qua includitur, dilaceratur, disrumpatur ve, atque
 ita materia consentia ibi dispergatur. Quo facto protinus lamina
 plumbea supra locum applicetur, & fascia duarum extremita-
 tum seu (ut dicunt) duorum capium, æstusumè deligetur, nec
 amoueatuz ante nonem aut decem dies. Lamina autem, ea sit
 magnitudine (ut modò dicebatur) qua proportionem respondeat
 lupia. Sunt tamen qui ante lamina eiusmodi plumbea applica-
 tionem, unguentum admonent, ex plumbo visco, fuligine satru-
 buci, aut siccæ arboris, oleo & aceto. Alij prius utuntur emplastro
 composito ex alcœ, acacia, myrrha, olibano, sarcocolla, adiecto
 aceto, vel oui candido, quantum ad alia excipienda satis esse vi-
 debitur. Hænticum superponere salschat parvus (ut ipse & alij
 eiusdem farinae chirurgi, qui paruum nostrorum memoria chi-
 rurgiam maximâ cum laude & agrorum salute exercue-
 runt, loquuntur) plagellas, ex stupis confectas, oui candido
 R. 4. . . lignore,

Lamina
plumbea.Vnguentum
Rogerii.

Discussio per
digerentia
medicamen-
ta.

liquore, sale & alumine zucharino insufflato delibuit. Se-
cundus canon completur (ut interim taceam medicamenta pi-
uitiosis, hoc est, adematosis in moribus dicata, qua supra posui-
mus, ad hoc etiam, de quibus nunc agimus, abscessus & hernia-
rum omne genus, apprimè, unà cum sequentibus remedijs uili-
lia) aduocatione cuiusdam emplastri, quod a Galeno descriptum
est libro 6. de compos. medic. & y&in: hoc enim, ut ipse testa-
tur, per balneum digerit, & phlegmonas propuliat, valet ad
strumas, panos, paronidas: confert etiam podagricis, & nitis
alijs vitis resistit. Recipit autem olei vetero denarium pondo

Galeni
compositio.

centum, argenti spuma denarium pondo quinquaginta; picis sic-
ca denarium pondo quinquaginta: ladani denarium viginti
quinque, aruginis rasa denarium pondo octo; galbani denarium
pondo quatuor. Argenti spuma (quod luhargyrum vocant) ex
oleo irita coquitur. Cùm autem cœunt, id est, insufflata sunt, pix
& argo immittuntur: deinde ladani galbani q. aique sic
in mortarium transfusa subiguntur & molliuntur, atque vsui
referuantur. Quidam, ut boni coloris sit, & fuscum, miscent
etiam squamam denarii pondo octo: nam alioqui sit nigerrimum.
Aliter inuenitur descriptum in Guidonis commentarijs, nampe
sub hac forma: R. olei antiqui ℥ xij. viridis eris sine aruginis
℥ xij. picis sicca ℥ v. ladani ℥ iij. libargyri ℥ xij. galbani ℥ iij.
Ad idem bene facit diachylon commune, & irecum nominatum;

Diachylon.

quorum formula describuntur 6. lib. apud Tagantiam. In Dia-
chyl. autem ireati libra 1. malaxanda est ℥ j. pul. rad. iris.

Razes.

Idem efficit diachylon magnum Mesues. Razes quoque, vir ma-
gne experientia, ad digerendos huiusmodi abscessus antiquum
stercus caprillum, cum melle & aceto supra ignem in unitatem
ad formam emplastri redactum dolenti loco esse admoendum
dicebat: item emplastrum de scorozaco, semine lini & tr. sicca,
cum viscilagine seu mucilagine rad. alibae confectum.

Stercus ca-
prillum ve-
tale.

Halv-abb.
Emplastrum.

Hoc etiam, si suppurationis spes adfuerit, pulchre maturat. Ha-
ly-abbas quoque subsequens emplastrum ad eundem usum plu-
rimum commendat: R. farina fabarum & bordei ana ℥ x.
rad. glycyrriz. rad. alibae, picis ana ℥ v. cera alba, adipis an-
serini ana ℥ x. terantur & in unum redigantur ex oleo vete-
ri & urina pueri nondum Venerem experit, & supra modera-

eum ignem fiat emplastrum. Aliud Aniceana, quo Guido utitur: R. scorcus bubuli ℥ ij. rad. caulium, id est, brassica, rad. capparam, squilla, succum pringium ana ℥ ss. lupinorum, bdel-
li ana ℥ ij. aceti, mellis, excoctia succa, fers olei antiqui ana q. s. fiat emplastrum. In omnibus davis immorilis Fructus hoc se-
quens remedium approbavit, cuius sententiam & secutus est Theodoricus: R. ammoniaci, idellij, galkaniana p a maceren-
tur triduo in aceto: quibus dissolutis & igni iam appositis, ad-
datur sorsatus subtilis quantum satis esse videtur, & fiat em-
plastrum. Rogerius hoc auxilio utebatur ad strumas quas vulgo
serofulas appellant: R. rad. filicis, asphodeli, & (si vis) ebulo-
rum ana quantum libet: coquantur in vino optimo, & mundan-
tur in mortario, addendo sulphuris vini momentum, & fiat em-
plastrum. Qui Guidoni contigit preceptor in Montepessulano,
efficacissimum saepe expertus est emplastrum, quod constabat ex
duodecim cochleis (quos & limaces vocant) vino incoctis aut
lixinio cinerum, dictorum vulgo clauellatorum, aut ex capitello
ut dicunt. In ò (quod valentinus erat) quotidie cochleam unam
vel siccam vel aliter preparatam & (ut loquuntur) confectam,
ipsis l. borantibus per os sumendam offererat. Terti canonis in-
tentionem committunt etiam allequimur, usu auxiliorum pra-
cedentium: omnia enim mollientia & resolventia, si locum aut
materiam inueniant resolutioni contumacem, materiam ipsam
hand dubie maturant: praesertim si mitis ac benigna satis fuerit,
aut sanguini permixta. Haly-abbas autem ad maturandos hu-
iusmodi abscessus, admonet emplastrum compositum ex farina
hordei, pice & olibano, ex pueri impuberis lotio, in unum cor-
pus reductis. Antenna vero ad infrenandum caliditatis vehe-
mentiam consuli decoctum coriandri, praefata farinae esse re-
miscendum. Quod si parum hac proficiant, & efficacius medica-
mentum desideres, accipe myrrhae partem unam, lycii partes
duas, & misce cum praedicto decocto. Strumas ad suppuratio-
nem perducit, aut diffundit interscriptum medicamentum à Paulo
Aegineta lib. 4. relatam: myrrha ℥ x. amaron. thymiamatis
℥ vii visci quercini ℥ vii. galbani ℥ iij. propol. ℥ j in
pila contunduntur. Ceterum ipsis iam maturatis & ad suppu-
rationem perductis (quod ex nominis ipsius puris facile deprehendes,

Emplastra
Aniceana.

Brui &
Theodoric
emplastrum
ad strumas.

Rogerijem-
plastrum.

Emplastrum
ex limacibus.

Terti ca-
non & accla-
ratio, a quo-
modo inue-
tur suppurat-
tio.

Suppurantia
seu maturan-
tia.

Pauli medi-
camentum ad
strumas ma-
turandas.

Detergentia.
Vng. apollo-
lorum.

Vnguentum
Aegyptiacū.
Diachylon.
Diapalma.

aperiri debent & detergeri. Deterſio autem optimè fiet admo-
to vng. apollolorum vulgò nuncupato. hoc enim magna eſt ef-
ficacia in ſtrumis malignis & ulceratis. Ad idem multum effi-
cacia ſunt vng. Aegyptiacum Rhafis, emplaſtrum de ſuccis (dia-
chylon nominant, & diapalma, quod Græcis *φοινικίων* appella-
tur: quorum deſcriptiones ex lib. 6. Taganti requirenda. Quod
ſi eiſmodi abſceſſus locum aliquem occupaverint, in quo caries
& quadam corruptela oſium ſubſit, aut prauum aliquod ſym-
ptoma illis acceſſerit, ea vicerum curandi ratione tractentur, cum
quibus affinitatem & commercium habent. Ceterum de quarto
carone, quomodo incidenda ſint ſtruma, & extrahenda, tracta-
biles, blanda, morigera & molles, poſtea proprio loco de ſtrumis
ſeu ſcrofulis curandis dicemus, quibus & quintum canonem,
quomodo infiltrata ſint corrodenda, & detergenda, adiciemus,
& ſextum ac vltimum canonem, quomodo tenui ac gracili ra-
dice euellamus. Nunc iuxta Græcos Ganglij curacionem ſubi-
ciamus.

OBSERVATIO IX.

De Ganglio.

CORNELIA, iunior filia Theodorici Tey-
lingii ſoroꝝ mei, quæ cum matre vnà ad nos
accedeſſet, cum in carpo manus Ganglion haberet,
imperauimus vt quotidie manum oleo amygdal-
dulcium fortiter fricaret; ac demum poſt menſem,
ad maiorem emollitionem emplaſtrum noſtrum
de ammoniaco apponeret, quo remedio ganglion
tandem diſparuit. Similiter & plurimos vtriuſque
ſexus ganglio laborantes eiſdem remediis tum Del-
phis tum Alcmariæ curauimus: nec memini vm-
quam malum iſtud in quoquam qui iſto emplaſtro
de ammoniaco vſus fuerat, rediſſe.

SCHO-

SCHOLIA.

QUOD sit Ganglion, abunde iam ostendimus Scholio Obs. 7. precedenti, & quomodo ea ipsa à vera glandula cum strumis seu chæradibus differat, & quod maximam similitudinem habeat cum lupia vulgo dicta. & est ganglion, ut breuiter dicamus, nihil aliud, quam nervi præter naturam nodosa coactio ac tumor. Causa quidem varia esse potest: nam ut bene dicebat Galenus sexto Epidem. Comment. 3. text. 14. Ganglion aliquando à frigido in nervis generatur; nam quandoque natura in gangliis & huiusmodi passionibus deponit quod est inutile: præterea ex ictu, lassitudine, & laceratione oritur, ut in pudendo priapismo laborante, quod dum vi distorquetur, fit ut nervus dorsum ipsius priapi percurrrens disrumpatur: quod ego semel vidi Alcmæria in puero seu iunene nondum pubertatem egresso, filio Nicolai Adriani Niropæi, qui è regione socrus meæ habitabat. huic pudendum erat nervosum, intantum, durum, cui simile in puero numquam vidi, ganglio affectum. quem duo chirurgi Paracelsiani frustra curare tentabant, cum affectum ipsum minime cognoscerent quamquam iactabundi. Erat autem ex illis gangliis quæ sapiunt naturam cancerosam, & sunt ex materia atrabiliari, quæ & minime sunt tractanda. Sic anno 1584, mense Decembri vidi ganglium in pene, de quo egi alibi, à quo ager tandem obiit. Finis autem & ganglia ob nimiam salacitatem & usum Veneris. Quæ omnes causa duobus modis talem affectum inducunt, vel refrigerando materiam in loco congestam, vel quando materia sapit nervi naturam, hoc est, pituitosa, tenax & per se frigida fluit. Sunt & ganglia (ut iam diximus) quæ referunt naturam cancerosam, quando fiunt à materia atrabiliari, quæ nullis medicamentis & multo minus scissione aut manu chirurgi sunt tentanda aut tractanda. Quantum autem ad notas attinet, ganglium tumor est inæqualis, parvus, dum comprimitur stupidum sensum exhibens, in cachymis maxime corporibus proveniens, præcipue in feminis aut pueris, prava victus ratione uti consuevit. Differt à meliceride & atheromate tumoris inæqualitate & renisu, & quod non articulatum, velut illa, transferitur, sed dextrorsum solum,

Ganglion
quid.

Causa.

Ganglium
referens na-
turam can-
cerosam.Signa &
Actio.

solum, ac sinistrorum pro veris sita flectuntur. In pluribus quidem corporis partibus præcipue motui dicata, nascitur, ut in carpo (ut in nostra hac cognata Cornelia puella 15. annorum carpum maris occupabat) metacarpo, in talis & in articulis pedum. quandoque etiam in capite, & in pudendo, & in membrana vestiente ipsum membrum. Quantum ad præsagia, dicere possumus quod in pudendo difficilis erit sanatio; in reliquis corporis partibus non aequè difficilis. Cura duplici via perficitur: chirurgia scilicet & medicamento. chirurgia probatur in gangliis ipsius capitis aut frontis, cute scilicet scalpello divisa: & si quidem ganglia parva fuerint, & velia comprehensa ex basi præciduntur: si maiora, hamis transfixa, excoriataque tolluntur: oras futuris commissas, medicamento ad cruenta apta persanamus. Ganglia autem in cruribus aut brachiis aut summis partibus excindere tutum non est; periculum enim, ne particula reddatur mutila. Medicamentis igitur solummodo curabimus, emollientibus scilicet & dissipantibus, & discutientibus. Emollientem tentamus, locum manibus fricando, cum oleo amygd. dulcium; vel eiusmodi emplastrum imponendo quod recipit mucilaginis psyllij, maluarum ana ʒ j. picis nalis, mastice ana ʒ ij. stercoris columbini ʒ ss. tere in mortario, & emplastrum confice. Ad hanc rem ammoniacum emollium facit, cum cera & oleo, & impositum. item styracem siccam albam emolimus, & cum oleo amygd. dulcium madefactam imponimus. Inde ad dissipantia & discutientia convertimur, ut laminam plumbeam. Porro Philagrius (ut & Tagantius annotavit) ratione non admodum dissimili à lupæ curatione necotericorum, apud Aetium ganglia curare solebat: inquit enim ad hunc modum: A gangliis chirurgicum opus (id est, sectionem) arcemus, præsertim si in manibus aut pedibus exuerint: sed medicamentis tantum curabimus. Ammoniacum enim prope ignem ad emplastri consistentiam emollium illinimus: deinde laminam plumbeam inuicem æqualem superponimus, & ne hinc inde labatur, artus vinculis in medio constringimus. Tam vero diebus aliquot transactis, ubi ganglion emollium nouerimus, nihil agro præfati, statim sublaris vinculis, dum adhuc locus incalescit, pollicem dextræ manūs ganglie infigimus, ac reliquis quatuor digitis membro innitens;

Prognostica.

Curatio duplex.

Chirurgia
Paul. lib. 6.
cap. 39.Medicamen-
ta.Ganglii cu-
ratio ex Phi-
lagrio apud
Aetium lib.
15. cap. 9.

attentibus, vehementissimè comprimimus; & ganglion confestim dissolvitur. ¹ attenus Philagrius. Itaque ex hac curandi ratione, facile est colligere, recentiorum lupiam, Auicenna Glandulam, & Græcorum Ganglion eundem omnino affectum esse: quod & præcedentes etiam eorum descriptiones aperte satis ostendunt. Archigenes in hoc vitio calcem unà cum adipe anserino & cerebuthina, apponi iussit. Idem verò & medicamine quod lapinem achatem recipit, sapius utebatur, ut refert Paulus. At Oribasius eo frequenter usus est, quod recipit cerussæ, resinæ piceæ, olei veteris ana ℥ j. ammoniaci thymiamatis, galbani ana parum modum, cera ℥ iij. Extat idem medicamentum apud Aëtium, sed in quibusdam pondera evariant. habet enim cerussæ, olei antiqui & resinæ piceæ ana lib j cera ℥ ij ammoniaci thymiamatis, chalbani (id est, galbani) ana ℥ j cerussam enim oleo decoquito, quousque inquinandi finem fecerit: deinde eritum ammoniacum, postea resinam piceam & ceram: postremo galbanum præmolitum convulso. Porro insignis ille Græcæ familia medicus Oribasius, non laminam plumbeam, ut Philagrius, Auicenna, & recentiores: chirurgi, sed plumbæum orbiculatum crassiorẽ, ad instar spordylorum, id est, verticillorum quæ fusi mulierum appenduntur, ganglio ipso ampliorem imponerebat, deligabatq; Si quidem (inquit) pondere suo longiori temporis spacio ipsum dissolvit. Itaque sanus est multo eimodi emollientibus & discutientibus medicamentis vti in gangliis curandis, quàm chirurgico opere, id est, excisione; præsertim cum in cruribus aut brachiis, aut summis partibus oriuntur. periculum enim est, si ea excidentur, ne particula multa reddatur. At quæ caput aut frontem occupant, manu tutò curari possunt, hoc est, præcidi aut enelli, ut paulo antè diximus. Hoc modo mulierem curaram nonimus, quæ paulo supra frontem ganglion habebat: quod opus chirurgicum etiam spectat ad quartum canonem; quem de strumis mox declarabimus: hoc unum adicientes remedium, quo in gangliis pendendi vti solemus. In ganglio pendendi vti frictione, & deuenio ad slyracem, & ad laminam plumbeam, & ad emplastrum de mucilaginitus, quod habet mucilaginis althææ, fœnigraci, sem. lini, cydoniorum ana ℥ j sem. olei amygd. dulc. pinguedinis gallinæ, anseris ana ℥ iij. slyraci.

Lupiam & ganglion eundem esse affectum.

Archigenes. lib. 4.

Oribasii medicamentum nollitori ex ad Ganglia.

Verticillum plumbæum.

Ad ganglion pendendi.

eis *sicca* ℥ j. *plumbi loti*, *cervissæ lotæ* ana ℥ ij. *ß. cera parum*,
misce, & *visor*. Nunc deinde ad *strumas seu scrofulas curandas*
revertamur.

OBSERVATIO X.

De strumis seu scrofulis.

MV L I E R quæ scrofulam seu strumam circa
 furculam pectoris habebat, cum consilii causa
 me accederet, caput illud *Guilhelmi Rondeletii* 1.
 de strumis lib. 2. de morborum curandorum me-
 thodo in mentem mihi venit. Cum enim strumæ
 fiant à materia valdè viscida & crassa, ob id parum,
 inquit, differunt à curatione scirrhi. ideo iubet ut
 ante omnia utantur pilulis sine custodia; postea ut
 humor coquatur attenuantibus, incidentibus, ab-
 tergentibus, ut est *mel ros. syr. de byzantiis*, de
hyssopo, de *stœchade*, de *quinque rad.* *mel scyll.*
syr. de pomis compositus, cum *aquis helenii*, *hyssopi*,
capill. Ven. martubii, *betonicæ*, vel *melissæ*,
sceniculi, *apii*, *petros. graminis*, *asparagi*. Purge-
 tur pilulis fœtidis, *cochiis*, assaieret, *diaturbith*, *aga-*
rico infuso in oxymelite. Poterit autem fieri & hic
syr. concoquens: *℞. mellis rosati*, *syr. de byzantiis*
 ana ℥ j. *syr. de stœchade* ℥ ij. *aquat. sceniculi*, *apii*,
capill. Ven., vel *helenii*, *hyssopi* ana quart. 1. *misce.*
 fiat *syr. arom. cum* ℥ j. *zinz.* Vel potest fieri deco-
 ctio, & misceri syrup. Sed melius erit in principio
 uti syr. & aquis tamquam lenioribus remediis. Post
 syropos paulo fortius vacuare oportet, quàm fa-
 ctum sit per pilulas sine custodia. Ut *℞. massæ pil.*
 assaieret, *turbith* ana ℥ ij. *salis gemmæ & zinzib.* ana
 gran. iij. cum *succo iocos vel gladioli* fiant pilulæ.
 Vel sic: *℞. massæ pil. cochiarum*, *turbith* ana ℥ j.
salis gemmæ, *zinzib. pil. fœtid.* ana ℥ ß. fiant pil.
 cum *aqua hyssopi*. Vel fiat decoctum ex conco-
 quantibus

quentibus pituitam: in cuius colat. infundatur agar.
trochif. \mathfrak{z} j. vel ponatur in decoct. Quod si vomitum
timens, infundatur in oxymelice diaturbith \mathfrak{z} j.
elect. de citro solut. vel diacarth. \mathfrak{z} j. syr. capill. ven.
 \mathfrak{z} j. vel mellis ros. \mathfrak{z} β . fiat potio. Numquam in cu-
ratione huius morbi debent omitti agar. & turbith,
addendo semper zinzib. & salis gemmæ tertiam
aut quartam partem, alioqui purgaretur tantum
quod est subtilius, & crassius remaneret. Post pur-
gationes detur theriaca vetus, pul. ros. nou. mi-
thrid., diatrion pipereon., diagalanga, pliris cum
musco, & alia quæ cerebrum siccant & roborant, &
materiam præparant ad digestionem & resolutio-
nem. Interpositis igitur aliquot diebus fiat tale apo-
zema: \mathcal{R} . rad. ireos, galangæ crassæ, rad. petrosf.
gram., asparagi, apii, olusatri ana \mathfrak{z} ij. rad. batrachii
& chelidonæ minoris, & cucumeris agrestis ana \mathfrak{z}
 β . (caue ne accipias apium risus pro batrachio) me-
lissæ, betonicæ, capill. Ven. adianth., marrubii, ce-
terach, polytrichi an. m. j. scabiosæ m. β . sem. petrosf.
apii, anisi, fœveli, fœniculi, carui, vel cymini ana \mathfrak{z} j.
passul. mundatarum \mathfrak{z} ij. sem. iuniperi, polypodii,
helenii ana \mathfrak{z} j. senæ \mathfrak{z} β . cretæ marinæ (vulgo fœni-
culum marinum vocant) summitatum thymi ana
m. j. turbith & esulæ maceratorum in melle ana
 \mathfrak{z} ij. fiat decoctio in lib. j. β . dissol. oxymellis scyl-
lini, syr. de stœchade ana \mathfrak{z} ij. syr. de pomis com-
positi \mathfrak{z} ij. fiat syr. perfectè coctus. arom. cum \mathfrak{z} β .
vel \mathfrak{z} ij. zinzib. vel \mathfrak{z} ij. cubebarum. capiat quarto
quoque die \mathfrak{z} v. cum aqua decoct. cicerum rub. vel
cum decocto guaiaci. Si sufficienter non mo-
ueat ventrem, quiescat aliquot diebus, & pilu-
las accipiat: postea redeat ad syrupos: atque ita va-
riando, materia paulatim concoquetur, aut dissipa-
bitur. Poterit & loco syruporū lohoch conficere, in
hunc modū: \mathcal{R} . syr. præscripti \mathfrak{z} iiij. diaireos simpli-
cis \mathfrak{z} j. mis. fiat lohoch: capiat lambendo, maximè si
stumas

strumas habeat prope asperam arteriam aut gulam. Nam concoquit & digerit materias, & ad euacuationem præparat. Corroborentur interea internæ partes & exiccantur, vt dictum est, theriaca, mithridato, vel opiata sequenti: & conseruæ hellemi, vel ireos vel gladioli, vel rad. apii ζ iij. conser. capill. Ven. ζ j. conseruæ anthos, stœchados ana ζ ss. (vel loco stœchados, si desit, florum betonicæ) pul. diagal. arom. ros. ana ζ j. ss. pul. ros. nouellæ & pliriscum mosco ana ζ j. tyr. conseruationis citri q. s. fiat opiata. capiat bis in hebdomada ad quantitatem auellanae, superbibendo parum vini. Extrinsecus sunt vntiones, cataplas. emplast. emollientia, & digerentia. Emolire prius oportet, postea digerere, vt in scirrho faciendum docet Gal. 14. method. Hoc est intelligendum de scrofulis iam factis & induratis. Nam, vt monstrauimus cap. de inflammatione tonsillarum, modicè exiccantia & astringentia in principio strumas curant, absorbendo paucam illam materiam. Sed cum iam factæ strumæ incipiunt apparere, nec multum intumescunt, mitiora remedia accipere oportet, quæ sine attractione digerunt & emolliunt, vt oleum amygd. amar., de lilio, ex decocto malua, farinae sem. lini & fœnugræci, ficuum, & asungia porci, & fiat cataplasma, cum diachylo communi. Ista sæpe sufficiunt in principio. Sed postquam glandulae imbutæ sunt humore frigido & coagulato, digerentibus magis & emollientibus opus est, vt oleo lilior. antiquo, de kerua antiquo, irino, sicyonio, & aliis eiusmodi. Pinguedines quæ sunt partium subtilium, & magis digerunt, vt anatis, anseris, gallinae, tunc sunt accommodæ: sic etiam vulpis, tæxi, leonis. Magis emollientia erunt radix bismalua, liliorum, cucum. agrestis. Nam hæc emolliunt & valenter digerunt. Radix iari, dracunculi, ireos, gladioli, medulla cruris vituli, aut cerui. adde bdellium. Ex his
fiat

fiat cataplasma sic: ℞. bismaluz cum toto, liliorum ana ʒ ij. flor. chamæm., meliloti ana p. j. fiat decoctio. in colatura dissolue, & adde farinæ fabarum, lini, fœnugræci an. ʒ iiij. axungia porci sine sale lib. j. fiat cataplasma, contusis prius herbis. Addi potest oleum antiquum, vel oleum amygd. amar. vel liliorum, vel irinum. Interdum apponetur mel in cataplas. quod vim habet digerendi & concoquendi. Hæc in principio fiant. Postea fiat talis vnctio: ℞. olei lilior., chamom., irini ana ʒ ij. mucilag. sem. lini, fœnug. ana ʒ j. flor. chamom. meliloti ana p. β. propoleos ʒ j. ceræ citrinæ q. s. fiat vng. addendo pingued. gallinæ, & anseris ana ʒ ij. vel apponatur diachylon magnum iteatum. Postea reiteretur cataplasma. Sed ut fortiora recipiat, sic parandum erit: ℞. rad. cucumeris agrest., ireos ana ʒ j. rad. bismaluz, acanthi, lilior. ana ʒ ij. scillæ ʒ β. flor. chamom. meliloti, sambuci ana p. j. sem. lini, fœnug. bismaluz an. ʒ j. fiat decoctio in aqua & pauco aceto. omnia contundantur; & contusis adde pingued. gallinæ, anseris, medullæ cruris vituli ana ʒ iiij. misc. fiat cataplasma. Si velis addere oleum, adde ex fortioribus; & fiat sic: ℞. opopanax. bdellii, galbani, ammoniaci diss. in aceto scill. ana ʒ β. quod si non reperiatur acetum scill., adde scillæ assatæ sub cineribus ʒ j. olei cimini agrestis, vel succi narcissi, vel rad. eiusdem ʒ ij. muccil. sem. lini & fœnugræci, medullæ cruris vituli, propoleos ana ʒ iiij. contundantur omnia, & confusa reducantur in formam vng. Continuet donec resoluantur. Quod si essent in aliquo loco, unde possent faciliè extrahi sine periculo neruorum descendantium aut venarum aut arteriarum, extirpandæ sunt: postea vlcus diligentissimè siccatum ducatur ad cicatricem. Sed extirpare parum tutum est, ob accidentia, quæ sequuntur, maximè si in profundiore parte delitescant. Præterea ad suppurationem ducere est periculosum.

sum: nam periculum est, ne interiùs rumpantur, & sanies defluat in pulmones, & agram suffocet. Strumas pungere radio pastinacæ, easdem curat, vt ingruentes prohibet. Præterea idem facere os ranæ piscatricis, scribit Plinius: sed cùm nullum habeat os in cauda, id dictum putat Rondeletius de Raia. Sunt & multa alia, quæ à tota substantia magis videntur facere, quàm à manifesta causa, vt & hoc vng. ℞. cineris agni casti flore cæruleo, senectutis serpentis ana ℥ j. ceræ parum. incorporentur simul: fiat ad formam vng. addendo parum olei amygd. amar. Multi credunt tale vng. valere à proprietate occulta: sed id mihi videtur præstare facultate exicatoria, qua pollet agnus castus, & spoliū serpentis. Additur verò oleum amygd., ne affatim exiccando, tenuis substantia tantum absumatur. Spoliū viperæ efficacius est, vel cinis viperarum, vel trochisci viperarum, quia digerunt, siccant, materiamque consumunt & intrà & extrà. Efficacissimum ad illas absumendas est medicamentum paratum ex rad. gladioli, quæ vel contunditur cum melle, & comeditur; vel siccata in puluerem reducitur. vel fiat talis opiata: ℞. gladioli conditi, vel exiccati ℥ j. cineris viperarum ℥ j. β. cineris spongiarum marinarum non lotarum ante vstionem ℥ β. pul. de gemmis ℥ j. cum syr. de byzantiis fiat opiata, de qua capiatur ad quantitatem castanæ horis quatuor ante prandium. Vtatur puluere præscripto cap. de suffus. apud Rondeletium, addendo salis torrefacti ℥ ij. vel eiusdem puluere præscripto in consilio scrophularum, qui talis est: ℞. cinerum viperarum ℥ ij. cornu cerui vsti ℥ β. rad. galangæ, iridis, cinamomi ana ℥ j. salis vsti ℥ iiij. piperis nigri ℥ ij. fiat pul. tenuissimus, de quo capiatur alternis diebus mande horis quatuor ante prandium vnum cochlear: & in condimentis augeatur salis quantitas. Si suppurantur, fiat vt dictum est in consilio. Si his remediis non

non curentur, remittatur ad regem Gallia. Hæc consulebat Rondeletius, quæ & nos cõsulimus, cū examine Medici præsentis insignis & periti. Vel fiant hæc remedia quæ M. Iohannes Tiençius, medicus Amstêlæodamensis magnæ auctoritatis præscripsit quondam anno 1524. in æstate pro vxore Iacobi Verhoeuij habente scrofulâ in furcula pectoris: R. oxymellis simpl. ʒ j. syr. de byzatiis, syr. de stæchad. ana ʒij. aq. hyssopi, sconiuli, absinthii ana ʒ j. nuc. pro digestiua. Pro purgatione autem interpolatis vicibus capiat ʒ j. diaturbith, ex descripto. Rhaf. ex turbith elect. zinz zach. ana p. aq. vel dentur pilule foetida; & iuxta Mes. sumentes turbith cauere debent ab esu piscium, & ab austro. detur aqua destillationis flor. genissæ, ad præseruationem vel curationem scrofularum, ʒ ij. omni manè, ex mente Argillatæ: eodem enim autore, vt ipse Petrus Argillata expertus est, delet scrofulas & omnes nodositates gutturis. sed & semen eius exhibitum, permixtum tamen (vt monet Philagrius) ne vomitum prouocet, cū pauco melle ros. vel cum pul. ros. & mastice, & flores eius contriti propinantur cum melle rosato aut ouo forbili. Consulo igitur vt per septimanam omni manè sumatur cochlear vnum istius aquæ destillatæ cum modico mellis ros. & pulueribus dictis, præterquam in die euacuationis. Rhases quoque & Serapio, auctoritate Dioscoridis & Auiennæ, acetosam decoctam in vino & contritam apponunt: curat enim scrophulas, vii & radix collo suspensa. Interim roborabit caput, ne multiplicentur materiæ catarrhales descendentes ad loca affecta. idèd fumus sandaracæ bullitæ in aceto recipiatur per os: extrahit enim materiâs excellentes: & lauetur sæpius caput lixiuiio vitis, decoctionis hederæ arboreæ. flor. chamomill. & folior. sennæ, & exiccetur bene cum peplis calidis, &c.

SCHOLIA.

Scrofulæ.

Ætiologia.

Strumæ.

Causa.

Gal. Com-
ment. 3. aph.
36.

Signa.

Differentiæ
Strumarum.

QUOD sint scrofula ac struma, iam diximus Scholio Ob-
ser. 7. huius libri. Scrofula quoque vñgo vocata à pisui-
ta sunt: quæ nihil aliud sūt, quàm indurati adenes, in collo,
alis & inguinibus præcipuè consistentes. videtur etiā in pectore,
ut in illo mendico qui Delphis ante Templum sibi emendica-
bat, qui totum pectus, collum & humerum strumosa habebat,
adeò defædatus, ut omni vite mea tempore simile malum non
conspexerim. Dicuntur à Græcis *χοιρινός*, ut antea quoque di-
ctum est, vel à *cheeraditus* petru, per marinas aquas transpa-
rentibus, vel à subus multiparis alii auctus, & eo morbo fre-
quenter afflicti. Latini, ut diximus, Strumas vocant. Vñgo
apud nos carnoffelen dicuntur. Scrofula, inquit. Valescius
cap. proprio, sunt apostemata quæ veniunt in molli carne, ut
14. Therap. cap. 8. vel sunt apostemata dura in molli carne
existentia, à phlegmate & melancholia generata & dicitur Anic-
cenna quòd scrofula dicitur à porcis, propterea quòd porci eb gu-
lescitatem hoc malo afficiantur p'vniūm. Valescius putat etiam
scrofulam à scrophæ nomen accepisse seu porca: quia sicut scro-
fa parit multos porcellos, sic una scrofula videtur contrahere
multas alias circa ipsam: nam prope unam & alia plures gene-
rantur, autore Aniccenna, ita ut congregentur ut nodi: & repe-
ritur vñm nodus ac si esset tacēmus. Scrofula ergo sunt glandu-
le scirronica, ut dicit Anic. Causa est ipsorum humorum con-
gestio, congestioni autem fluxus fluxionis mala videtur ratio: un-
de virum impotens in coquendo multitudinem humorum, trun-
dit superflua ad partes debiliores, hoc est, ad ipsos adenes: qui
apti sunt natura ad has superfluitates propiè excipiendas.
Struma igitur erit adenum passio non ex calida materia, neque
ad supurationem properante, sed potius pituitosiore & frigidio-
re consistentes. Quotiescunque igitur videbimus in axillis, ingui-
nibus, in collo & in iis locis glandulosis tumores duros & scir-
rhosos, dicemus strumas esse: qui tumores nunquam soli, sed
semper associati proueniunt, & omnes suis membranis inclu-
duntur, quemadmodum featomata & melicerides & athero-
mata. Differunt struma inter se magnitudine, natura, loco, or-

Aëtius lib.
15. cap. 5.

tu, multitudine, & vasorum complicatione. Magnitudine, quia alia parva, alia magna, alia mediocres sunt. Natura, quoniam aliqua mansueta, aliqua maligna comperiuntur: mansueta, circa inflammationem, circa dolorem, moderatam duritiem habent: neque enim molles sunt. velut tubercula adiposa, steatomata appellata, neque dura, sicut tumores indurati, sed mediam quandam tactus proprietatem habent, & tumorem circumscriptum aequalem. Maligna verò struma, inflammationes ac dolores pulsantes inducunt, & tumorem inaequalem praeseferunt, in quo vasa prominent, & ad manuum contactum ac medicamentorum impositionem effrangentur. Loco autem differunt, quoniam quaedam in anteriori colli parte, quaedam ab altera ipsius parte, quaedam ab utraque oriuntur, quaedam item statim sub cutem superficiali habent, quaedam circa magna ac nobilia vasa penitus insident. Ortu, quod quaedam velut eleata, quaedam inserta oriuntur: & eleata quidem facilius huc illuc moventur; inserta verò ad contactum veniuntur. Multitudine; quia plures & pauciores generantur. Vasorum complicatione: quaedam enim venas ac arterias implicatas habent, quaedam omnino non habent. Quod ad prognostica attinet; primò omnes strumae seu scrofulae sunt difficilius curationis: attamen quae infantibus accidunt, sunt salubriores; quae verò senibus, grauiiores curari, quia eueniunt cum disconuenientia (ut aiunt) particularium. Secundò scrofulae quibus non coniungitur dolor, sunt difficilius curationis. Tertiò maximè ad strumam in partibus colli aut capitis, sunt obnoxij & dispositi habentes colla curta, & sunt humidarum complexionum, teste Anicenna. Quartiò refert idem Anicenna, loca in quibus plurimum generantur scrofulae, sunt collum, axilla, cùm ibi sint carnes molliores, ac eorum spacia venis implicata: ut patet etiam 14. method. cap. 4. Quintò, numerosa strumae partes externas occupantes, & sede subinde mutata, huc atque illuc per corpus vagantes, cum aduentitiis quaedam caliditate, planè testantur, ac indicant, easdem germina esse ac sobolem chæradum internarum, ut Arnoldus de Villanova in Parabol. doct. 6. annotauit. Proinde quae forinsecus illis admoventur auxilia, parum aut nihil proficiunt. Haec autem, ut putauit Anicenna, ex casu & offensione, seu allisione fiunt: Anicennas.

Arnoldus à
Villanova.

& ita in nostris corporibus multiplicatur. Sexto, secundum
 eiusdem Auicennae sententiam, scrofula seu struma quibus con-
 iungitur dolor & apostema calidum cum materia calida tenden-
 te ad maturationem, sunt magis curabiles, ut & Valescius etiam
 refert ex eodem Auicenna, quia in sanem permittuntur, & ma-
 teria purgatur & mundificatur, modo diligenter tractentur, &
 apertio loci diuturna conservatur cum maturatione rei duræ,
 hoc est, induratae. Septimo, conducunt vel magnopere strumosis
 ipsis, medicamenta purgantia, potiones diureticae, atque electua-
 ria (ut vocant) resiccantia, item aëtis mutatio in patulis. Cæ-
 terum pueri ipsi propter voracitatem & gula intemperantiam,
 ac corporis varietatem, strumis frequentius corripiuntur: senes
 verò ob causas contrarias rariùs. ad hæc qui breui atque ar-
 guta sunt fronte, & compressa habent tempora, ac maxillas am-
 plas, strumis sunt obnoxii: in talibus enim materia promptè deri-
 vatur ad collum, ut ex recentioribus chirurgis annotant Hen-
 ricus. Oltand, strumæ præcipue (ut Celsus ait) fatigare medicos
 solent, quoniam & febres movent, nec unquam facile manes-
 cunt: & siue ferro siue medicamentis curentur, plerumque ite-
 rum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post, medicamen-
 to est opus. quibus quoque accedit, quod longo spacio detinent.
 Nonò: incisio eiusmodi abscessuum, itidem & correctio, magno-
 pere verenda est, circa ventrem, collum, & commissuram, pro-
 pter propinquitatem venarum, arteriarum, & nervorum ac
 internæ etiam capacitatis. In incisione quoq; magnarum glan-
 dularum, summopere vitare oportet venam, qua ad radicem ea-
 rum sita est, & illis alimoniam deferit. Sepe enim magnam hæ-
 morrhagiam, id est, sanguinis profusionem excitat: unde non
 mediocriter tandem sequitur periculum. Decimò, cum strumæ in-
 ter se differant (uti diximus) magnitudine, natura, loco, ortu,
 multitudine, & vasorum complicatione, ut ex Leonida anno-
 tavit Aëcius: itaque parvæ strumæ maioribus facilius curantur;
 sicut mites inflammatae. & sic Undecimò malefica sanari non
 possunt. Cùm enim omnes eiusmodi strumæ cancrose, ac vasis re-
 ferre sint, dum curantur, profusionis sanguinis periculum adse-
 runt: præterquam quòd cùm plerumque periculosiores inveniantur,
 minime abscindi possunt. Vasa enim notabilia, venas inquam

ingula-

Quæ ætates,
 naturæ &
 corporis cõ-
 structiones
 strumis ma-
 gis sint expo-
 nitæ.

Celsus.

Magnitudo.

Natura.

iugulares, & arterias, quæ carotides appellantur, malefica stru-
 ma tamquam radices habet. Dnodecimò: pro loci ratione, super-
 ficiliaria quidem struma profundis curatu faciliores sunt, deinde
 quæ in collo enerviunt; ubi tamen vocales nervos diligenter vi-
 rare oportet. Multi enim strumam circa asperam arteriam inci-
 dendo, vocalibus nervis simul excisis, reliquis deinceps vita tem-
 pore agrum sine voce reddiderunt: Nam præter eum nervi exci-
 sionem, vocalia instrumenta denudata, & inter curandum re-
 frigerata, vocis functionem viclârunt. Decimotertiò: pro
 multitudine strumarum, constat unam pluribus facilius curari
 posse. Sicut Decimoquarî, quantum ad ortus rationem attinet,
 longè citius sanescunt suspensa, quàm quæ insertæ fuerint. Ad
 actum igitur curandi propius accedendo; tres dicimus habendas
 intentiones: quarum prima versatur circa victus regulam: se-
 cunda circa enacuationem materiae antecedentis: tertia circa re-
 motionem materiae coniunctæ. Victus sit tenuis: abstineant agri
 ab omnibus crassos generantibus succos: edant cibaria facilis di-
 gestionis, & boni succi, in quibus aliquid fœniculi & oreoseli-
 ni sit admixtum: carnes veruecis, vituli, pullorum, animum in
 montibus degentium, potius assas, quàm elixas: fames & sitis
 quàm maximè fieri potest, tolleranda: abstineant à vino non
 penitus, sed diluentem bibant. Aëris mutatio multum confert: hinc
 enim plerique sanantur. cuius si eligendi deest facultas, sicciore eli-
 gatur. Fugiant pluviam & ventos. Caput non ablatur, sed fur-
 furibus fricetur, vel lixivio in quo rasura cupressi, rosa & sinisi-
 lia sint cocta. Motus & somnus sit moderatus. Alvus si non re-
 spondeat, lubrica reddatur. Secunda intentio est, materiam an-
 tecedentem euacuare: quam tenacem & pituinosam huiusmodi
 syrupis per quinque vel plures vices (prout opus erit) exhibitis
 preparabimus & digeremus: R. oxymelitis simpl. syr. de dua-
 bus rad. mellis ros. ana ʒvi. aquar. sanic. sumoteryæ, cicorca-
 ana ʒj. misce. Preparatam materiam infra scriptâ vel simili po-
 tione vacuabis: R. elect. indi maioris, diaphœniconis ana ʒij.
 diacath ʒj. syr. viol. ʒß. misce, & cum decocta communî
 fiat brevis potio. proderit etiam singulo mane ante cibum ʒj. ad
 minum huius confectiois sumere: R. diacatholiconis ʒj. mellis
 ros. ʒx. diatrubi ʒß. agar. trochis. ʒij. zinzib. ʒjß. misce.

Locus.

Multitudo.

Ortus.

Curatio.

Victus.

Medicamen-
torum ratio.

Preparatio.

Euacuatio.

- Seſſio venæ.** & cum Zacch. fiat confeſſio ſecundum artem. Seſſio vena in pueris non multum, ſed in adultis quandoque probatur. Conſert exulcerare caput circa commiſſuram coronalem & ſagittalem, quando videlicet ſtruma occupant colli partes. In pueris tenellis ſolent innugere commiſſuras, & impoſuere ſolia caulium, vel hydropiperis, vel ſambuci, quæ ſine dolore exulcerant: vel ſolia flammula ſonis: item ſaponem nigrum cum butyro In adultioribus tentant enacnationem per maſticatoria ex pyrethro, vel ex ſimili paſtillo: R. piper. albi ʒj. ꝑ. pyrethri ʒij. hyſſopi, origani ana ʒj ſinapis ʒij. zinzib. ʒj. maſtiches ʒi ꝑ. irita excipiantur melle, & formentur maſticatoriꝝ paſtili. Et quoniam in his malignis affectibus varia tentare et plurimum ſalutare eſt, poterit æger ex infra ſcribendis pilulis per quadrageſima dies ſingulo manè, ex monitu Iohannis de Vigo, unam deglutire: R. euphorbii, zinzib., turbiſh, ſucci rad. ireos, agarici ana ʒj. conuſa miſce: & formentur pilula num. 40. Item ſunt ad in diluculo ʒ ꝑ. huius confeſſionis: R. mell. roſ. ſyr. è ſtæcha de ana ʒij. Zacch. ʒiiij. agarici irochiſc. ʒ ꝑ. ſalis gemmae, ſpica, cinamomi, galanga ana ʒij. garyophyl. maioris ana ʒj. polypod. ʒj. ꝑ. elect. indi maioris ʒj. ꝑ. turbiſh præparati ʒij. piperis longi ʒij. miſce. & cum vino cydoniꝝ ſumatur fiat confeſſio: quæ in diſpoſitionibus pituitosis mirè conſert. Tertia intentio verſatur circa materiam coniunctam: quam curamus per medicamenta repellentia, exiccantia, diſcutientia, per pꝑu monentia, & tandem per chirurgiam. Incipientibus ſtrumis repellentia conveniunt: inde exiccantia & diſcutientia applicamus. Quæ autem emolliunt, diſcutiunt, conſumunt, diximus ſecundo canone, Scholio præcedente. Paulus lib. 7. dicit in p'laſtrum diaſtrubini ad ſtrumas diſcutiendas facere. habet argenti ſpumæ, id eſt, liſbargyri, rad. lanaria, ariſtolochia ana ʒiiij. galbani, ſquama æris, aloës ana ʒj. manna thuris ʒij. gutta ammoniacæ lib ꝑ. reſina picea ʒ xvi. aceti ſcillini q. ſ. ad ariſtorum lenigationem. Probè etiam diſcutit, eodem autore, calce viva, id eſt, aqua non extincta, melle vel gymnaſtorum ſorditus ſeu balnearum ſtrigmento excepta, vel oleo vel adipe ſuillo. idem præſtat Aërio ſola palatiſtra ſordes, à parietibus deſaſa, & probè ſubacta, ſuper linſcolo exſenſa, & emplaſtri modo applicata.

Strumas diſcutientia.

cata. Ad id etiam efficaciter auxiliatur calcis nitridi per modum, carilamomi & feniculi quadruplus, cum melle malagmaris modo inpositus. Strumas quoque discutit, lupinorum amaro-rum farina, ex oxymelite cocta, & illa. Ad idem praclare facit bubulini sterus a.eto incoctum & delinitum: id enim tumores citrulosos omnes instar cataplasmae appositum mirifice dissipat. Crassi etiam, praecipue caprifici, cum axungia appositum nemum tumorem discutit. Vnde et praeterea hoc ceratum, quod habet sulphuris, sem. nasturtii, urticae ana ℥ j. nitri ℥ j. s. myrrhae, galbani, ammoniaci ana ℥ j. olei veteris ℥ iij. s. cum cera & resina terebinthina quod satis est, formetur ceratum. Hac curandi ratione struma nondum inneteratis medeberis, tum in pueris, tum in his, qui manuum opus refugiunt, medicamentis scilicet dissolventibus ac per halum discutientibus. Porro si digerentia medicamina nihil in eiusmodi abscessibus profecerint, vel ad suppurationem ducendi erant; vel exedendi, vel manu curandi, ut in sequentibus dicitur. Quomodo autem struma ad suppura-
 tionem fiat perducenda, diximus Scholio Obs. octava: & quae
 detergnat post aperitionem, cum tertij canonis declarationem po-
 neremus: & inter caetera diximus ibidem vng. quod ex chalci-
 didis, seu diapalma, egregie detergere strumas malignas &
 ulceratas. quod habet adipis veteris, hoc est, axungiae pondo duo,
 olei veteris, lithargyri ana pondo tria, chalcidius trientem, id
 est ℥ iij. adeps ad ignem liqueatur & per colum destilletur: cui
 reliqua admiscantur: hinc contexta in racabum ramulo palmae
 arboris moventur: oportet autem ut ramulus sit recens, habens
 hinc inde portinentias foliorum confusas, ut pharmacum succo
 suo inficiat: proinde tenuia palmae fragmenta iniicere oportet,
 ubi medicamentum cerato consilientiam similem habuerit: nam
 si inter initia immittas, succus ipsorum quem manere volumus
 ex decoctione consumitur. At si struma ita sit maligna, ut ne-
 que discutii neque suppurari possint, ad chirurgiam devenien-
 dum, hoc est, ad quartum canonem, quem posuimus Scholio
 Obs. 7. qui ita erat generalis. Strumas, quae ex praedictis auxi-
 liis curationem non recipiunt, & mobiles sunt, blanda, morige-
 ra ac tractabiles, incidito atque extrahito, hunc canonem (vbi
 Scholio Obs. octavae proposueramus) hic explicabimus. Quod

Suppurantia.

Detergentia.

Vng. ex chal-
cidiae seu
diapalma.

Quartus ca-
non scholio
obf. 7. decla-
ratur.

Modus inci-
dendi & eucl-
lendi stru-
mas, ex Albu-
casi, & apud
Aetium ex
Leonida.

Hæc eadem
& Tagautius
& Leonus
de strumis
exscripserit:
quæ & Gui-
do ex Albu-
casi aut Aetio
detumpserat.

Paulus.

ad quartum itaque canonem attinget, blandas, morigeras, si-
perficiarias & sanabiles strumas, sic optimè ac brevissimè tracta-
bis. Aegrum in primis prostratum recubere iulatio. sedens enim
animi deliquio facillimè corripitur. Vbi laborans sic decubue-
rit, cruribus inter se invicem & ad lecti fulcra innixis, caput à
ministris firmius detineri imperato. Deinde cum tumori adia-
centem, rectâ, vel subobliquâ sectione incidito. Quæ enim in
collo per transversum sit scitio, prorsus inutilis est. In eo siqui-
dem vasa & nervi rectâ porriguntur. Ceterum non assatum,
neque unico impetu, totam cuius crassitudinem secabis: nihil
enim violenter in hoc opere fieri volumus. Atque in parvis qui-
dem tumoribus, hoc est, strumis minoribus, simplicem sectio-
nem facito, hoc est, simplici linea cutem dividito: in maioribus
verò, cutim ad myrti folii figuram incidito: tum vasa, id est,
venas & arterias, paulatim & blandè denudata seponito. Post
hæc verò sectionis labra, seu oras cuius incise, velsellis, seu ha-
mulis distendito, ac dilato, ac membranas digito, & scalpri ca-
pulo, vel spatula, excoriat, strumamq; ubi nudata & expli-
cata membranis apparebit, paulatim eximito. Ceterum si stru-
ma inserta, seu vasis implexa fuerit, strumâ attentione opus tra-
ctandum est, ne per incuriam copiosa sanguinis profusio sequa-
tur. propterea in agendo, unum duntaxat sectionis labrum: vnl-
sellâ protrahatur, & ita sensim à connexis corporibus scalpelli
acie separetur. Cumq; ab uno latere connexio diuulsa, ac solu-
ta fuerit, in altero idem penitus repetatur: deinde tota basis pro-
pter nervos, & sub-ea vasa excidatur. In strumis verò, quæ
circa alas & inguina contingunt, ob cuius reduplicacionem se-
ctio transversa ducitur. Porro in sectione, quæ fit in strumis col-
lum occupantibus, summa cura adhibenda est, ne vel arteria,
quas carotidas vocant, vel recurrentes nervi attingantur vio-
lenturq;. Si autem vase aliquo inter secandum diuiso, sanguinis
profusio tum opus remoretur ac obturbet, vas ipsum funiculo
excipito, vel nisi magni admodum fuerit, penitus (ut Paulus
consulit) abscindito, vel præsidia sistendo sanguini (si non ma-
gno impetu prorumpat) dicata, applicato. Deinde ad inceptum
opus revertitor. Itaque ubi in artum struma basis venerit, dextrè
ac peritè ipsam præcidito, immissaq; in tunc locum pertractato, ac
diligenter

diligenter scrutator, num & alia sint struma adiecta, quæ & eodem quo supra diximus modo, si qua inuenta fuerint, extrahito. Porro modicum sanguinis sinorem faciliè compescet, ad motus iis, quæ facultatem habent exiccandi: ut stupis, spongiâ aut linamentis ex xylo, id est, cotone scilicet, in aquam frigidam vel acetum, aut in miscellam ex viroque (quam oxyrracon vocant) infusus. & postea expressus. Si seorsum incruentia perfricaverit, thuris polline eam repleto, linamentaq; impenito, ac pro linamentorum custodia, linam vino madentem alligato: postmodum permixtis ligamentis, locum vino & oleo persundatur: & hoc usque ad tertiam aut quartam diem fiat. deinde solvatur, & suppuratio procuretur, & curatio reliquis ulceribus communis fiat. Ad repurgandum autem & incarnandum, & ad cicatricem inducendam, theriaca efficacissima est. Quod si vena aliqua amplior & effata digna, cum radice seu fundo glandule, vel strumæ, aut consimilis excrescentiæ pituitosæ convexa sit, non ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere ac constringere convenit, quo particulatim circa periculum sua sponte excidat. Quo in casu per linamenta postmodum curatio adhibenda erit. Est autem vinculum ex materia aliqua non faciliè putrescibili, cuiusmodi sunt fila, quæ serica nuncupantur, aut graciles chordæ testudinum. Quæ enim faciliè putrescunt, ea citò ab iis quæ exceperunt decidunt. Caterùm si peracto opere, aliquid ex folliculo, seu membrana materiam prædictorum abscessuum obvolvente, vel aliud extraneum quidpiam remanserit, iubet Albucasis illud absumendum esse, implendo vulnus primis diebus xylo, id est, cotone: vel alio consimili, aqua sal'a imbuto. Guido autem, ut reliquias illas absumeret, hiantem sinum implebat, primum quidem oui candido, alumine resperso & inspissato: postea verò unguento Aegyptiaco, vel aliquo ex erodentibus, quæ in antidotario describuntur. Porro in omnibus eiusmodi operationibus apponenda sunt, quæ dolorem leniunt. Inter cetera autem communiter admonent stupas oui candido liquore & rosaceo imbutas. Quinti canonis scopum ita assequeris: cutem cavillio, id est, vrente aliquo medicamento pro ratione magnitudinis abscessus abrumpero. Nam & medicamento caustico strumas etiam auferre possumus (ut sæpe feliciter fieri vidimus: cisi interdum cicatrix sæda relinquatur)

Si vena strumæ sit annexa, quid faciendum.

Albucasis.

Guido.

Canon 5.
Corrolio & mundificatio.

&

& abscessus picrostos, nisi sint profunda, nam tunc pronun-
 ciandum strumas insanabiles esse: assequuntur scopum, si aperta
 sint, imponendo aliquid trochisci de minio Iohannis de Vigo:
 vel medicamentum ex auripigmento & sandaracha: R^r auri-
 pigmenti vlli, sandaracha vlla ana ʒi misce cum: axungia q. s.
 Si verò non sunt aperta, abrumpimus cutim aliquo vrente me-
 dicamine, pro ratione magnitudinis excrecentiæ. Verùm dum
 id moriis, summa cura observandum est, ne partes alias circum-
 iacentes medicamen adurens attingat: perbellè autem opus hoc
 absolues, admodò caustico ex calce aut sapone. Hac effectum
 suum intra duodecim horarū spacium feliciter adimplent. Quod
 si diutius permanserint, nihil inde tamen periculi aut incommodi
 sequetur. Itaque caustico iam abrupta cute, & indurata eo in
 loco eschara, id est, crusta, per mediam ipsius crustæ abscessum
 recta linea in longum dividito (intus autem versus profundum
 ferè ad vnum vsque) & in sectionem, seu hians vulnus, lin-
 amentum, aliquo excedente medicamento (cuius generis est pulvis
 asphodelorum) respersum imponito. Porro tamen si plerique va-
 de multa admonent, quæ in lib. 6. apud Tagautium recensentur;
 arsenicum tamen in hac re primum obtinet, modò quæ non e-
 rit eo rectè uti. Vtus autem ipsius certus modus describi non po-
 test, ut lib. 3. Therap. Gal. annotavit. Proinde non temerè eo
 utendum est. Quandoquidem medicamentum est supra modum
 vehemens ac violentum, febres excitans, & multa alia prava
 symptomata inducens. Adde quòd minima etiam quantitate ad-
 hibitum, mirum, & ferè incredibilem effectum præstat. Com-
 munis tamen eius modus seu quantitas est, medietas grani unius
 frumenti triticeï, in corpore quidem robusto & particulis à prin-
 cipibus membris longè remotis: in debilibus verò naturis, & locis
 inxia principes partes sitis, minor quantitas admonenda erit. Va-
 autem in univèrsam pronuncietur, melius ac tutius est parum &
 sæpius ex eo offerre, quàm semel & vice una quantitatem im-
 modicam. Eius autem operatio, seu effectus durat tres dies inte-
 gros. Quare toto eo tempore, laborans v. At febricitantium vii
 debet. Membrum verò affectum, & partes circumiacentes ad
 curelam sui, & fluxionem (quam immoderatus calor excitare
 possit) prohibendam, unguento quod populeon appellatur, aqua
 quoque

Causticum ex
 calce & sapo-
 ne.

Arsenicum.

Quantitas
 arsenici.

quoque vel succo solani & aceto, alijsq; id genus refrigeranti-
bus illini, ac perfundi debent. Quando autem certò tibi constabit,
glandulam iam corruptam esse, atque absumptam (quod ex du-
ritie & tumore crassa inducta deprehendes) tunc crassa à vi-
mo resoluenda erit, admoto scilicet bnyro loto, & momento fa-
rina iuuicea inspersa, vel aliquo alio pingui & unctioso non
salio, ut arungia suilla: Vbi verò crassa exciderit, si quippiam
adhuc ex glandula, lypia, aut struma remanserit, id absumendum
erit erodente medicamento: ut pulvere ossihodolorum, vnguen-
to Aegyptiaco, aut alio consimili. At si nihil amplius supersit,
more aliorum ulcerum ad cicatricem perducetur. Ut sexti cano-
nis scopum assequaris, vinculo serico aut seris equinis deligandi
sunt eiusmodi abscessus, vel etiam struma, quæ bases seu radices
habent in arguñum venientes, atque indies magis ac magis
prioribus vinculis, aut nouis adhibitis, stringendi, donec scilicet
resiccati appareant, & sponte sua (ut de infectis, ac maioribus
vasis implexis diximus) excidant. Adinuandum autem erit vin-
culum aliquo exedente medicamento & desiccante. Demulcen-
dus quoque erit dolor oni candido liquore, rosaceo, vnguento po-
puleo, aut quouis alio dolori mitigatorio: Vbi autem sponte de-
ciderint funiculi, locum emplastro Barbara forando sanabit; vel
eo modo quem supra explicauimus, persanentur. Illi Canones iam
dicti non solum ad strumas curandas faciunt, sed & priores alijs
res, quos explicauimus Scholio Obs. octaua in vniuersum ad
abscessum toto genere præter naturam consistentes, à pituita præ-
sertim ortum ducentes, faciunt; quemadmodum & Tagaueus
de excrescentiis phlegmaticis annotauit, quem & Leonus sequen-
tis est, quæ parum ex Paulo, & Aëtio, parum etiam ex Guidone
decèpta sunt.

Quando cras-
sa resoluenda.

Canon 6.

Ligatura
& euulsio.

OBSERVATIO XI.

De quodam scrophulam habente in collo.

Cum quidam scrophulam in collo haberet, vtile
mihi visum fuit, ut ab omnibus frigidis abstine-
ret, quemadmodum eidem lingua vulgari scripsi: de-
inde

inde vt omni septimana semel sumeret ex sequenti puluere pondere vnius floreni Rhenensis, in diluculo: \mathcal{R} . turbith electi \mathfrak{z} iij. zin \mathfrak{z} ., mastice ana \mathfrak{z} j. zacch. albi \mathfrak{z} vi. fiat. pul. manè bibat sæpius ex decocto rad. scrophulariæ, filipendulæ & pimpinellæ. Bis in die inungat se cum isto vng. \mathcal{R} . emplastri oxycroci \mathfrak{z} β . olei chamomill. liliot. alb. ana \mathfrak{z} j. misce. Quidam lolium cum furfure, sem. lini & stercore columbino, cum modico vino decocta pulvis instat apposuerunt: quod duritiem mirabiliter resoluit. & à proprietate valere voluit agrimoniam collo suspensam: radicemque asphodeli contusam & impositam. sed egregiè confert pinguedo destillans ex ansere, inuncta. At & hoc vnguentum quoque mirabile habetur ad scrophulas: \mathcal{R} . arsenici rubri \mathfrak{z} ij. argenti sublimati \mathfrak{z} β . rad. serpentariæ, rad. betonicæ, panis porcini ana \mathfrak{z} β . aloës epaticæ \mathfrak{z} j. omnium fiat pul. & cum axungia fiat vng. dissoluit enim scrophulas: ego tamen cum cautione, si in collo sint, vel sub axillis, eo vtendum suaderem. Sed potius hoc sequenti vti vellem, quod ad scrophulas, glandulas & nodos duos facit: \mathcal{R} . medullæ crurii vituli \mathfrak{z} ij. butyri recentis, dialthææ ana \mathfrak{z} β . misce. fiat vng. & ad glandulas in collo valet egregiè farina siliginis cum melle apum, emplastri modo. Sic cum iuuenicula quædam pateretur scrophulas in collo circa furculam; Laurentius Bruninck chirurgiæ doctor ad eam accitus istud emplastrum apposuit: \mathcal{R} . cineris caul. rub. combust. salis communis tostæ part. æqual. & cum melle communi fiat emplastrum supra ignem. Diu admotum fuit, sed parum aut nihil profuit. quare præscripsit fortum partim maturatiuum, partim resolutiuum: mox eodem emplastro appositò, citò suppuratæ sunt, natura faciente duo vel tria foramina, quæ tandem per concauitates intercutaneas in vnum congregatæ sunt. hoc viso, forcipe aperuit in modum crucis,

ac labia deinde abscissa cœpit primò mundificare cum vng. ægyptiaco, deinde cum dulcibus, & bene valuit cum populeone vel alio ex succis cum butyro parato. Vnde facta est incarnatio, & per alumen vltum superflua caro corrola, & nimium excreveret. vbi parum, cum pulvere ossis sapiæ incarnatum est. & etiam cicatrice obductum est vlcus; & putabatur curata. sed tandem in angulo vnus vlceris parua quædam albedo apparuit, quæ cum tangeretur ac cannula probaretur, ad cannulam gutturis videbatur quasi intrare: at postea tamen exiccatū est: quanquam postremò abscessus pithirofi alii supervenerint, vnde valdè debilitata est: quia in omnibus quasi iuncturis magnis supervenerunt; & sic diu permansit languens, neque exulcerationes poterant exiccati, corpore ad vltimū valdè exhausto. & ideo rectè dicebat Rhases, Qui patiuntur serophulas, nō viuunt securè: nam, eodem teste, aded aliquando excrefcunt, vt melonem superent. Hic in mentem mihi venit puellæ apud Amatū, quæ iam diu strumis in collo & alis torquebatur, curata melius habebat, imò à multis earum sana euaserat; sed nunc denuò illi duæ circa tempora natæ sunt, quæ ad mollitiem ita pervenerunt, vt aperture indigere viderentur. At quum medicus in earum incisura sœgnior factus esset, ex se resolutæ sunt, nullum inibi relinquentes vestigium: ab hoc verò vno vel altero interposito mense inincipite altera nata est, quæ vt reliquæ mollis erat: medicus verò credens hanc vt cæteras ex se quoque resoluturū q̃i & distillatū, ad tempus aperturam distulit; & eo magis, quia minor indies veniebat. At quum puella de loco quæreretur, illicò strumâ aperiri fecimus, eam in cute secantes, à qua nullum pus aut sanies exiit; in ea tamen crassa quædam membranula liquidò conspiciebatur, & ea quidem carnosâ, cuius portiunculam extraximus; sed sequenti die versus eam partem frontis vbi pili à fronte

fronte separantur, cranium totum corrodum comparuit, quam cranii corrodionem cariemve, neoterici chirurgici talpariam appellant, & eam scalpro radendo ad duram vsque meningem extrahi fecimus. Postea verò humore ad expulsionem parato per syropos de epithymo, de betonica & fumoteræ, cū decocto senæ dilutos, per catapotia cum expulimus: ac postea puellam illini fecimus eo unguento, quo ad morbum Gallicum aliptæ uti sæpe consueverunt. Porro interea dum puella inungebatur, struma quædā in pectoris alta parte comparuit, cui emolliens emplastrum, quod officinæ publicè parant, & alterius luminaris autor Venetiis in maximo & frequenti usu habitum refert, applicitum fuit. Ut tamen puella hæc ex integro sana fieret, ne ampliùs in morbum recideret, post syr. de elleboro cum decoctione senæ exhibitum, ac per catapotia de nitro Alexandri & fœtida repurgatum corpus ligni guaiaci decoctum epithymo, sena, carthamo, polypodio & hermodactylis compositum, illi obtulimus ad quadraginta ferè dies: quo puella sanitatem adepta est, nec morbus grauis & sæuus ampliùs recrudit. Ita & nostro ægro, cui scrophulæ collum occupauerant, decoctum guaiaci cum iam dictis feliciter propinauimus.

SCHOLIA.

QUIDAM (ut Valescū quoque refert) ante particularem curationem scrophularum, aliquos canones, præter eos quos antea diximus, etiam ponunt: qualis ille primus canon est Anicecna; quòd radix super qua est fiducia in curatione habentium scrophulas, est euacuatio & subtilisatio regiminis, ut loquuntur; in quo canone continentur due intentiones. Secundus canon est si signa sanguinis appareant, phlebotomia ex cephalica, Anicecna autoritate commendatur. Tertius, & est Arnoldi de Villanova parabol. doct. 6. Thyra scrophularum colli securiùs extirpantur corrodione medicinali, & per sanicem, quàm ferro. Quar-

Canones vniuersales observandi in curatione strumarum seu scrophularum.

cus, qui ab eodem ponitur, eodem loco : qualibet extirpatio pestis inguinaris vel subaxillaris, & praesertim scrophularum, in pueris ac debilibus est verenda, maximè in aestate, ne corpora febribus aut nimia purulentia concalescant. Quintus : usus aquarum mineralium, & maximè saporis tartarei vel acuti, non solum interiora bacia, sed extrinseca valet attenuare. Sextus, vii & quintus, ab eodem Aruoldo ponitur ibidem : glandulosa collectio non inhaerens nervis aut magnis venis, ut nodus extirpari debet incisione cum cyli sua. Septimus, & est Auic. cap. proprio : de euacuationibus laudabilibus in scrophulis, est vomitus : & hoc dicit eò quòd euacuat materiam antecedentem.

Octavus : euacuare pituitam crassam praeter ceteris iuvat cum turbitis, ipsum enim purgat phlegma grossum (ut dicunt) sine calfactione, & sine rasura intestinorum. Novus : quando scrophula magnitudine valde excedunt, caveant chirurgi à curatione earundem cum ferro aut medicamine acuto, quem canonem & Auic. posuit. Decimus est Gal. 14. artis par. si scrophula fuerint in loco ubi non sint multa vena nec arteria, & sunt quasi separata, & non possunt resolui cum resolventibus, oportet tales cum putrefactione putrescere, aut cum chirurgia incidi. & tunc caveamus venis & arteriis & nervis, ne simul cum incisione patiantur. Vndecimus : propterea quòd rheuma capitis aliquando causa existit scrophularum colli, ad caput effumans, ideo rheuma exiccandum est, & tollendum, quo scrophulosi deinde commodius iuvare possent. Cum itaque strumosa agnitudines sint valde suspecta, & sapius ad peiores agnitudines convertantur, ut de signis prognosticis aliàs diximus, ideo scrophulas patientes sollicitè studere debent ut particularis curatio à docto medico & perito chirurgo inveniri possit. Curatio itaque particularis scrophu-

Curatio particularis

larum in se primam continet intentionem, iuxta tenorem secundae partis primi canonis, ut regimen subtilietur. At Anicenna non intellexit de regimine tantum cibi ac potus, sed totius vitae institutionem circa res non naturales : quare aer illi commodus ac utilis erit clarus, mundus, siccus, & in caliditate temperatus. ideo neque in aëre nebuloso, crasso, turbido, paludoso, aquoso aut multum frigido immorandum : non versetur sub radiis lunae : vitandum erit somnus diurnus, & is qui statim à cibo fit, vel

Vitæ institutio.

T

solitio

solito longior. dormiat verò cernice flexili, non super faciem incumbendo aut collum premendo, aut caput. Tristitiam quoque declinet, sollicitudinem, mororem, fortem locutionem, canum, clamorem, seu vociferationem, ut admonet Anicenna; tum maxime ab his omnibus caveat, quæ concitant humores versus caput. Sit eius exercitium temperatum, ante cibum & coctionem eiusdem in ventriculo ambulatione utatur, frictionibus matutinis titiarum, pedum, brachiorum. abstinat à peccationibus. Cibus eius sit attenuans, optima digestionis, ut sunt carnes muttonum, vituli, caponum, gallinarum iuvenum, perdicum, phasianorum, anicularum maxime in campis & nemoribus degentium, potius assarum quàm elixarum. Caveat sibi à carnibus porcinis, vaccinis, leporinis, cerninis, & potissimum multum salitis, & à carnibus avium in aquis degentium, maxime à capitibus animalium & interameis, etiam à carnibus fumo induratis, caprinis: similiter à leguminibus, pisces, fabis, phaseolis, etsi pisorum iuscula & cicernum concedi possunt. Vitanda quoque oryza, frumentum, panicum, milium. Cavere enim oportet à pane azymo & miliaceo, & omnibus quæ crassum generant humorem, ut omni leguminum substantia, frumento cocto, caseo: canles quoque dimittantur, & quacunque humorem aquosum generant, ut sunt species frumenti recentis, fructuum omnium recentium; pisces crassi, glutinosi, viscosi, belua marina, & singulariter salita, offa, iura ex herbis humidis, ut cucurbita, fructus crudi. herba quoque cruda, calida, vaporosa, sicut allia, cape, passinaca, & quacunque ad caput effumant, ac multum calida aut frigida. Panis eius sit ex frumento optimo, parum salis, & momentum fursuris habens. Omnia iuscula, offa, & pinguedines declinet. Caveat insuper à rebus omnibus replentibus caput, & rheuma generantibus, ut est nimia comestio, superfluum potus, crapula, usus caparum, alliorum crudorum. Bibat vinum subtile album, vel clarettum, in parva quantitate, & misceat ei (inquit Valescus) aquam mineralem saporis tartarei vel aluminis. Caveat pomaciam, cernisiam, & aquam turbidam, & aquam frigidam, iuxta doctrinam primi canonis. Potest tamen, ob consuetudinem, concedi cernisia bona, bene cocta & clara, parum sumpta, idq; solum ex consuetudine: alioquin vinum eius sit subtrahendum.

claretum.

Sibus.

Potus.

clarum, non fumosum, neque filicinum: & fumositas eius reprimitur admixtione aqua bullita. Viuet magnos haufum, & repletionem ad satietatem: si sobrius, & famem patiatur. Semper procurei sibi bonam digestionem, & utatur indifferenter rebus usualibus, & herbis calidis, ut est petroselinum, fœnic salvia, serpyllum &c. & studeat quotidie deponere alium, si possit, naturâ vel arte. Sed quantum ad primam partem primi canonis, scilicet enacuationem; duplex enacuatio intelligenda est, nempe una qua resspicit materiam antecedentem, & una qua coniunctam. Pro materia antecedente dicebat Rhazes 13. Continent. non vidi vtilius in exterminatione scrophularum, quàm laxationem frequentem: & hoc clamant omnes doctores, & commendant purgationem de turbitis: quam & nos quoque commendamus post vniuersalem purgationem, scilicet phlebotomiam, iuxta canonem secundum, modo signa sanguinis aliquo modo appareant, quam & laudauit Auicenna; qua fieri potest ex cephalica, saltem ad ℥ iij. vel plures, ceteris omnibus consentientibus ad vena sectionem requisitis. Secundo die post vena sectionem, iuxta tenorem primæ partis primi canonis, primò digeratur materia antecedens cum oxymelle diuretico, vel squillitico, vel si fuerit composita cum additione aqua mineralis, & erunt meliora. Vel utatur hoc decocto, vel sinili: R. foliorum filipendula, pilosella, pimpinella, betonica ana m. j. rad. urtica, rad. rubia maioris, rad. aristolochia longe ana m. ss. sem. fœniculi, anisi ana ℥ ij. sem. end. portulaca, cicorea ana ℥ j. fiat omnium decoct. ad lib. j. colatura adde syr. de byzantiis, & stœchade ana ℥ j. ss. misce. Deinde purgetur iuxta tenorem octauæ canonis, capiendæ pilulas v i i. R. pill. de agarico ℥ ij. pil. cochiar. de Rhab. ana ℥ ss. cum aqua fœniculi fiant pilula v i i. Vel dentur pilula descripta cap. de paralyti, & pil. de agarico vel asula, memorata cap. de asthma: vel dentur puluis diasturbis: aut hic bolus: R. turbitis albi & gummosi intus & exterius bene mundati ℥ j. ss. zinz. viridis ℥ j. ss. zatch. ℥ ij. fiat bolus cum conferva eiusdem zinzib. detur bis in septimana, vel ad minus semel, si patiens aiatem commodam habeat. Quod si venter stringatur, capiet aliquo manè cum iure cicurum vel pisorum ad quantitatem medijs cyathi, ℥ j. pul. infra scripti; vel capiat ℥ ij. & continuando teneat ventrem lubricum. Hinc fiant

Medica-
mentorum
ratio.

Phlebotomia.

Digestio
materiæ
antecedentis.

Purgatio.

Sternuta-
toria.

sternutatoria cum oleo persicorum aut nigella, tempore quo nul-
lum aliud medicamentum adhibeatur. & possunt tunc fieri fri-
ctiones, & pectinationes capitis lenes, ad euaporandam partem
materie antecedenti, & ad diuertendam. Eo tempore potest &
exhiberi posio illa ad scrophulas & strumas, descripta à Guidone
de Cauliaco, quam posuimus scholio obs. 7. huius libri. Isti igitur
adhibitis poterunt applicari remedia ad causam coniunctam,
qua duplicem requirit intentionem: unam qua curat scrophulas
à proprietate occulta tam intus quam extra: alteram, qua ad
mollificationem & resolutionem materie coniuncta facit; aliis
tamen canonibus prius completis. & ita, quemadmodum &
Valescas dicebat, quantum ad resolutionem scrophularum, duos
modos habemus. Vnus est, quod si materia est multum dura,
ut mollificetur quantum possibile est, modò mollificando, mo-
dò resolvendo: & fiat sic ad maturandum, resolvendum &
emolliendum: R. ceparum lilij albi, rad. alihæ, ireos, ebuli ana
℥ ij conquassata coquantur sub prunis, incorporata & pista cum
sece olei, & adiecta ℥ j sulphuris vini, fiat emplastrum. conti-
nnetur per xij. dies. His adinunge ea que diximus & digerere &
suppurare scholio obs. 8. Sciendum autem quod in istis & in
multis aliis apostematibus frequenter credimus maturare, &
natura cum illis maturatis resoluit apostemata: & aliquando
credimus resolvere, & maturamus; propterea quia ista medi-
cina calida calefaciunt & subtiliant materiam. & hoc fit maxi-
mè quando cum istis resolutiuis misceatur aliqua humiditas vi-
scofa, sicut fit in emplastro Guilhelmi Placentini, ut R. lithar-
gyri triti ℥ ij olei communis ℥ v. mucilaginis fœnugraci, sem-
lini ana ℥ iij. mucilag. alihæ ℥ ij. lithargyrum ponatur in
caciola cum oleo super ignem, & bulliat, semper agitando cum
spatula: deinde addantur mucilagines, & bulliant ad ignem
iterum, usque ad spissitudinem emplastri: & in fine addantur de
pul. ireos quasi ℥ ij. & fiat emplastrum super alutam, & tenean-
tur super scrophulas. Laurentius Bruvnick pro materia coniuncta
supra locum magis eminentem emplastrum sequens ad quanti-
tatem loci, supra corium extensum apponere inebat, dimittendo
tribus diebus, absque remotione: R. diachylonis magni ℥ iij. pul.
rad. ireos ℥ j. mucilag. alihæ ℥ β. simi columbini exiccati ℥ β.

Resolutio
& emollitio
materie
coniunctæ.

Nota.

Emplastrū
Guilhelmi
Placentini.

olei vini q. s. ad incorporandum: fiat massa. & quando remoruns erat, inebat lauari cum spongia madefacta in decoctione infra-
scripta, repide fomentando locum, scilicet manè. R. corticum sa-
licis, rad. urticae ana ʒ ss. sem. lini ʒ j. fiat decoctio cum aqua sa-
brorum & vini albi ana lib. ij. ad consumptionem tertiae partis.
Postea exiccato loco applicabitur aliud nouum emplastrum
eiusdem substantiae sicut primum fuit, & hoc continuabitur per
mensem, si videatur emendatio; si non, fiet aliud subsequens em-
plastrum fortius, quod etiam poterit continuari: R. rad. cu-
cumeris asinini ʒ j. stercoris caprini ʒ ij. bdellij dissoluti in aceto
ʒ j. pul. rad. capparis, cineris truncorum aut radicum cau-
lium rubr. an. ʒ j. terebinthinae q. s. ad incorporandum: fiat
massa emplastri. Postea hic pulvis, qui sequitur, valens à Pulvis va-
lens à pro-
prietate occulta.
poterit eo patiens vri in processu post continuationem empla-
strorum, capiendo manè ʒ ss. cum modico vini albi, habendo re-
spectum etiam semper ad radicalem agri temperiem: R. rad.
pentaphylli, filipendulae, agrimonie ana ʒ ij. sacch. albi ʒ iij. fiat
pul. in modum pul. ducis. Sed & haec sequentia egregie inuant:
R. scrophulariae, filipendulae, pimpinellae; florum genistae, pilosellae, Potus.
caulium rub. agrimonie, rubiae maioris ana m. j. aristoloch. ro-
tunde, rad. spatulae foetidae, raphani ana ʒ j. enula ʒ ss. sem.
coriand. ʒ j. ss. (mihi satis sufficere videtur ʒ j. ss.) fiat decoctio
ad lib. ij. ss. in ij. partibus vini albi & una parte aqua, & dulco-
retur cum saccharo, & fiat potus. R. ammoniaci, galbani, disso-
lutorum in aceto ana ʒ ss. bdellij ʒ ss. medulla cerni, axungia
anatis ana ʒ j. ss. mucilag. althaeae, saenigraci, sem. lini ana ʒ ij.
lib. argyri ʒ ss. pul. ireos ʒ j. olei aneth. cere ana q. s. fiat empla-
strum. deinde valet & haec embrocha, cum spongia: R. rad. Embrocha.
ebuli, viticellae, lapathij acuti, raphani, ireos, althaeae ana ʒ j. ss.
sem. coriand. ʒ ij. chelidoniae, agrimonie, scrophulariae an. m. j.
sulfuris tritici ʒ ij. bulliant in tribus mensuris aquae ad tertiae
partis consumptionem, & fiat embrochatio cum spongia. Sed &
hoc remedium mirabile habetur, valens à forma specifica in qua-
libet specie scrophularum: R. succi rad. ireos, euphorbij ana. confice Pilula.
xxx pilulas ad quantitatem cicerum; & da unam omni die,
triginta diebus: nam mirabiliter valet ad eas remouendas; sed

adde de spica & de mastice q. v. est enim correctorium euphor-
 bij, ego tamen cum magna cautione, ob enphorbinum, iis utendum
 suadeo. sed & pul. rad. pentaphylli exhibitus per aliquot dies,
 observato regimine convenienti, præservat hominem à scrophu-
 lis, & sumatur cum optimo vino. idem præstat radix filipendula,
 & agrimonia. Aliud præstantissimum ad omnes scrophulas de-
 lendas valens, & ad omnia alia apostemata scirrotica antiqua.
 R. rad. ellebori nigri, aristoloch. rotunda, farina graminis, cum
 melle conficiantur, & sepe ponantur super locum; & expertum
 est. Mulier quaedam dabat omni die puella cuidam strumosa de
 euphorbio pulverisato ad quantitatem, quam potuit elenare
 unus denarius parum, per os; & miraculo quodam eam libera-
 vit à scrophulis. Sed illo cum cautela utendum est, uti diximus,
 quia facit mala accidentia. Oleum sequens optimum quoque est,
 quo mediante scrophula nona & recies inprimis curantur: R.
 rad. rapsæ, raphani ana ℥ j. olei communis veteris ℥ ij. ponatur
 hoc oleum cum ipsis radicibus tritis in aliquo vase aut ampulla,
 & illud vas in caldario pleno aqua bulliat, quousque medietas
 aqua consumatur. & de hoc oleo tepido dua gutta vel tres in-
 fillantur in aurem patientis ab illa parte in qua sunt scrophula.
 Hoc fac pluribus vicibus, secundum Arnoldum de Villanova.
 At quando materia est benigna, nec multum dura, & si non re-
 solvatur, nec suppuretur, cum incisione aperitur cutis exterior,
 & scrophula cum folliculo extrahatur, ut dictum est latius
 scholio præcedente. hanc curationem præsentè Valeasco, uti & is
 refert, chirurgus Guillelmus Sagarriga perfecit in Gerunda pul-
 chra quadam muliere. Si autem aliqua ex scrophulis venerit ad
 maturationem, incidatur, si sibi non fuerit vulnus ab una parte
 ad aliam, ita ut tota scrophula cōprehendatur ab incisione facta.
 & impleatur totum alumine vīto, cum vitello oui, deinde in-
 zende ad mundificationem cum ung. viridi vel apostolorum: &
 si sibi aliquid remanserit, destruaturn cum pulvere asphodelorum.
 Et si maior corrosio est, necessariò addatur aliquid antrypigmenti
 rubri. In omnibus dictis & dicendis observentur canones illi ge-
 nerales supradicti. facta autem mundificatione perfecta, incarne-
 tur vulnus, sicut cetera vulnere aut ulcera. His aliqui addunt
 Empirica permulta, quorum usus cum non adeò mihi probetur

Præstantis-
 simum ad
 omnes scro-
 phulas de-
 lendas.

Historia
 mulieris.

Oleum mi-
 rabile ad
 scrophulas.

Si non re-
 solvatur,
 aut suppu-
 retur, quid
 agendum.

um Tagautio, proinde neque duci illa nostris commentariis esse inferenda. Hoc unum tamen confidenter affirmat Tagautius, Christianissimo Francorum Regi, diminutus peculiari dono esse indultum, ut quam plurimos strumosos, seu (ut vocant) scrophularios solo manuum attactu, integra sanitati restituat. Rex etiam Eduardus (ut referunt historia) solebat diminutus solo tactu sanare strumosos. Quod immortale munus inter veluti hereditario ad Reges posteriores manavit. Nam Reges Anglia etiam nunc, ut quidam referunt, tactu, ac quibusdam hymni, non sine ceremoniis prius recitatis, strumosos sanant. Atque hac iam superius scripta in univsum de abscessibus toto genere prater naturam consistentibus, à pituita præsertim ortum ducentibus, tum strumum seu scrophulis, dicta sufficiant. Post quæ, non ab re fore putamus, si propriam ac peculiarem meliceridum, steatomatum ac atheromatum curandi rationem subicerimus: hac enim & frequentissimè nostris corporibus incidunt, & alias quasdam sub se tumorum prater naturam species seu differentias, nonis quibusdam, atque apud veteres prorsus inauditis nominibus, à neotericis appellatas, complectuntur: ut calpam, testudinem, natam, & id genus alia, quæ in præcedentibus à nobis explicata sunt.

Galliarum
Reges diu
no quodam
munere
stromaa
curant.

OBSERVATIO XII.

De steatmate, atheromate & meliceride.

CUM vir quidam in capite abscessum pituitosum haberet, cum chirurgus Petrus Fredericus compater meus statim incidit: & ex eo humor seuo similis exibat: quemadmodum & alteri in pede etiam abscessum habenti quasi medulla vitulina exibat. Vterque abscessus procul dubio pertinebat ad tumores pituitæ crassioris & magis mucilaginosæ, qui etiam abscessus dicti, sub apostematis nomine à Græcis comprehensi, ab Halyabbate Se-læa, ut antea diximus, & ab Auicennâ nodi vocati sunt, de quibus etiam meminit Manardus lib. 7. Epistolar. epist. 2. quorum iuxta diuersas materias

in eis contentas, diuersæ etiam sunt species. Si enim veluti adeps sit quod continetur, steatoma à Græcis, à nostris adipinus nodus appellatur; si veluti puls, ab illis atheroma dicitur; si veluti mel, meliceris ab illis, à nostratibus melleus nodus. Cæterum hic abscessus pertinebat ad steatoma. Steatoma enim nihil aliud est quam tumor præter naturam, concolor, & tactu lenis, in principio quidem exiguus, sed temporis progressu augetur & amplior factus: in quo humor seuo per similis, membranulâ inclusus subest. Hoc à meliceride & atheromate distinguitur duritie. Nam plenum ac solidum est, tactuique renititur aded, ut digitis prementibus minimè cedat. Cum autem illum abscessum ob duritiem chirurgus neque discutere posset, neque ad suppurationem ducere, sectione aperuit, & tota extracta pinguedine, & adhibitis linamentis quæ pus generarent, curationem ut in reliquis vlceribus compleuit. At in viro illo qui in platea Rietveldia longo tempore abscessum frigidum piruitosumque habuerat, in capite tandem facta incisione, post suppurationem effluxit pulticula caseata instar lactis concreti ex quo caseus fit, quod nostri vulgari idiomate *wrongel* appellant. Spectabat autem hic abscessus procul dubio ad atheroma, quod atheroma etiam est tumor concolor & indolens, in membrana seu nervosa tunica humorem lentum continens, atheræ, id est, pulti similem, quæ ex farina decocta conficitur. Interdum quoque in atheromatibus simul cum humore pultaceo lapidosa quædam, duraque corpora, & alia tamquam sulphuris ramenta inueniuntur, nonnumquam veluti mansa gallinarum ossicula, sæpe etiam tamquam pili complicati tactui occurrunt. Tumor atheromatis, specie & figura oblongus & aliquantum sublatus visitur; qui digitorum appressu ob humoris lentorem & crassitudinem tardè retrocedit, & amotis digitis,

steatoma
quid.

Atheroma
quid.

digitis, tardè quoque regreditur. Cæterùm hic abscessus post sectionem, admodum difficulter postea, tandem tamen, à chirurgo curatus est. At alteri, cui similis tumor in capite, sed rotundior, apparebat, facta sectione humor mellis instar effluebat: sed hic postea medicamentis exedentibus facilè curatus fuit, ne malum rediret. Erat autem hic abscessus Meliceris quid. meliceris; qui nihil aliud est quàm tumor, simili modo dolore carens, sed rotundus, in quo nervosâ etiam tunicâ, quam cystin appellant, inclusus reperitur tenuis humor, mellis substantiam repræsentans; vnde & mellisauium Latinè quibusdam dicitur. Itaque meliceris ab atheromate differt figurâ & humoris substantiâ. Nam & figura rotundior est, & humoris substantia tenuior. Proinde melleus hic tumor magis quàm atheroma extenditur, pressuque digitorum celerrimè cedit, & amoris digitis pari celeritate ad situm pristinum redit. Vide Antonium Beniuenum de abditis morborum causis, quomodo ab imperito medico meliceris carbunculus iudicata sit, cap. 67.

SCHOLIA.

A THEROMATA & melicerides in capite magna parte Celsus li. 7. cap. 6. oriri solent: steatomata verò & in cernice & in alis & in lateribus: licet hæc in capite tum in pede quoque apparuisse constat. Omnes autem hi affectus ex paruo incipiunt, & diu paulatimq; increscunt, & tunica sua includuntur. Finit autem Causa. abscessus seu apostemata, ex vaporoso spiritu aut humida materia, aut utraque mixta. quocunque autem modo isti abscessus fiant, id spacium quod abscedentes partes interiacer, humoribus illis efficientibus impletur: qui si diutius aliquando maneant, in varias formas mutantur. etenim lapidibus, areis, testis, lignis, carbonibus, luto, strigmento, amurca, faci, multiq; id genus similia sæpe in abscessibus contenta reperiuntur, & præcipuè in atheromate, ut diximus. Sed & iâ signa abunde patent ex superius adductis. Signa. Hæc autem, inquit Fernelius, in reliquis partibus

corporis rarissime, crebro in capite progigni solent, quod huius cutis densa materiam diu cohibeat, dum in alienam externamque substantiam concedat. Ad hac quoque genera pertinent capitis tumores, iunioribus testudo & calpa dicti, nisi quod foris distens magnitudine. de quibus schol. obs. 7. ad longum diximus. Quoniam autem lenti sunt hi abscessus, ac sensim multoque tempora gignuntur, aut nullo aut obscuro dolore exercent, nisi cum foris acrius suppurant. In iisce tribus abscessuum generibus, quae frequentissime incidunt, steatoma, inquam, atheroma & meliceride, unum commune curationis consilium est, ut quod tunica illa quam cystin appellant, continet, discutiat, aut medicamentis totum una cum tunica exedatur, aut sectione auferatur.

Curatio.

Quot & quibus modis curentur prædicti abscessus.

Quidam autem ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur: si nimirum qui liquidiores humorem continent, qualis est meliceris: aliqui duplici tantum, ut est atheroma, quod & sectione tollitur, & medicamentis exeditur. Steatoma verò nec discuti nec exedi potest: sed sola manu operâ, hoc est, sectione duntaxat curatur. Curationis itaque eorum sunt communes indicationes, nempe ut id quod continetur, vel digeratur, vel totum pure reddatur, vel excidatur. Sed ut res clarius fiat, non gravabor uniuscuiusque prædicti abscessus separatim curam proponere.

Steatomatis curatio.

Quoniam steatoma, uti diximus, distinguitur à meliceride & atheromate duritie ipsa: nam plenum ac solidum est, tactuque renititur, adeo ut digitis prementibus minimè cedat ob craffitudinem. Ideo nec discussionis, nec suppurationis spes relicta est: ad chirurgiam igitur deveniendum. Sed quantum ad chirurgiam communem, quæ omnibus abscessibus istis fieri potest; si tales abscessus (ut etiam annotavit Tagantius) sectione curare voluerimus, in ea quidem curandi ratione, sine pultaceo, sine melleo, sine adiposo, sine cuiusdam alterius substantia humor in eis contentus fuerit, una nobis intentio perpetua est, ut scilicet tumorem qua humor concluditur auferamus. Sed dum hoc molimur, impenso studio cauendum est, (ut de strumis supra diximus) ne temerè membrana vulnere, aut dilaceretur: unde humor, qui in ea continebatur, effusus, operationem impediat, & portio ipsius relinquatur. Si enim dissecta tunica, ac humore profuso, tumor subsederit, difficulter admodum tunica excoriari

Curatio per chirurgiam communis.

cura-

curarique poterit. Si verò humoris aliquid relictum sit, periculum est, ne morbus renascatur, quemadmodum & struma, cum portio eius relicta sit. Quod si tale quid incidit, melius est non consuere, & exedentibus medicamentis postea dicendis aut consimilibus reliquias absorbere. Caterum quod ad steatoma at-
tinet, quia non discutitur nec suppuratur, ut diximus, statim ad
chirurgiam deveniendum, sectione pro tumoris magnitudine
facta: simplici nimirum, aut ad myrtei folij similitudinem. At-
que hic liberè cutim incidimus. non enim, sicut in atheromate
& meliceride, sectionem formidamus: nam pinguedo adiposa
etiam si secerur, non effluit. Verùm illud negligendum non est; si
steatoma elevarum fuerit, in circuitu, & subter excoriari opor-
tere: in circuitu per scalpellum, subter verò digitis: insertum ve-
rò in ambitu, & subter incidendum esse. Peracto opere, vulneris
labia suturis constringantur, ut melius glutinentur: aut lina-
menta profunda indantur; & curatio ad parvis generationem
accommoda adhibeatur. At verò si steatomata apicem amplius
& basim angustam habuerint, omnis reliquis aliis supernaca-
neis auxilium, totum à radice ipsa seu basi amputandum est. ita
enim chirurgicum opus expeditissimum erit, & vulnus parvis-
simum, plavumq; reddetur, & curatio brevissimè absolvetur.
Atheroma verò & sectionem & suppurationem admittit. Quæ
autem suppurant, in præcedentibus diximus. Sed ob humoris len-
torem discuti minimè potest. Chirurgiam itaque aggressuri,
agrum in sella locabimus: & quod si parvus fuerit tumor, sim-
plicem sectionem faciemus; si verò maior, ad myrtei folij figu-
ram, pro tumoris ratione, cutem incumbentem rescindemus. Sed
neque hic uno impetu tota sectio fiat, ne pellicula humorem con-
tinens disseceatur, & humor enacuetur. Si enim enacuatæ fuerit,
& tumor ceciderit, trunca difficulter excoriari, ac curari poterit.
Summâ itaq; diligentia pellicula paulatim excorianda est; nihilq;
de ipsa circa basim relinquendum, ne malis regeneretur. Post ab-
latam pelliculâ, labia sectionis cõmittimus: & si nimis laxa fue-
rint, redundantè cutim refecamus; deinde suturis labia cõnectimus.
Illud porro animadversione dignum est, ut si in capite huiusmodi
tumor fuerit, post ablata pelliculam, membranam os ambientem se-
cemus, & calvariâ diligenter deradamus. Peracto opere, in parvis

Quomodo
steatoma
per sectio-
nem cure-
tur.

Aëtius lib.
15. cap. 82

Atheroma-
tis curatio.

Aëtius loco
præallegato,
cap. 7.

SUMMO-

tumoribus, cum parvam sectionem fecerimus, nulla difficultas imminet, & statim post suturam, medicamentum glutinatorium, & inflammationibus arcendis idoneum adhibemus. Qui vero adhuc cruenti sunt, & glutinari non possunt, in his ex maioribus internallis suturas fieri oportet; ut scellianis figura oblonga sit, deinde linamenta indere, & puris generationi studere per tetrapharmacum, & similia rosaceo diluta. Caterum suppuratione facta repurgantibus attendendum est, ex quorum numero præstat emplastrum Aegyptiacum, quod recipit terebinthina liquida, & mellis ac rosacei portiones æquales simul liquatas. Sed in robustioribus corporibus, ac in huiusmodi ulcere impuriori, terebinthina ac mellis par mensura absque oleo liquatur: mirifice repurgat. Repurgato ulcere, ad incarnantia transeundum. Inter quæ probatur Isis emplastrum, multo rosaceo dilutum. quod est tale: Res. squama aris, aris combusti, aristoloch. rotunda, salis ammoniaci, thuris, gutta ammoniaci, succi rad. dracunculi ana ʒ viii. alum. scissi ʒ v. vel vi. cera lib. j. resina colophonie lib. ij. olet veteris ʒ iij. myrrha, aloës, galbani ana ʒ xij. aceti q. s. Quicumque recta via medicandi procedet, ubi agri naturam consideraverit, statim dignoscet quo medicamento ulcus indigeat. Itaque has compositorum formulas pro exemplo apponimus, ut facilius sit studiosis quippiam addere inuentum. Quod verò ad meliceridis curationem attinet, præsupposito debito victus regimine & humoris convenienti præparatione simul & evacuatione, meliceridis cura triplici via comprehendi potest; discussione nimirum, putrefactione, seu medicamentis exedentibus, & sectione. Nec putandum concoctionem, dissolutionemq; ita pugnare invicem, ut idem medicamentum utrumque non possit efficere: sicuti neque fatendum suppurationem per res calidas, dissolutionem per res frigidas perfici: nam cum utraque operatio res calidas desideret: suppuratio æqualiter; discussio exigit magis calida. Ad eos igitur qui chirurgiam recusant, medicamentis tumorem discutientibus utemur. Porro medicamentorum quæ discutienti ac dissipandi vim habent, in huiusmodi affectibus materiam, inter hæc quæ de strumis supra edocuimus, reperies. Præterea verò ac propriè meliceridas dissipat Paulus lib. 4. cap. 34. medicamento quodam quod continet unas passas (exemplis acinis)

Aëtius lib.
14. cap. 32.

Meliceridis
cura.

Manardus
lib. 8.
epist. 1.

Curatio per
digerentia.

nis) viginti, squama 3 iij. parti fomentis prius nutrita imponitur. Aliud emplastrum ad meliceridas, quod ad Leonidam retulit lib. 15. Accius, accipit passularum destrictis vinaceis lib. j. cumini minutissimè triti 3 vi. nitri 3 iij. omnia simul in mortario subacta conficito, & alligato. Aliud eiusdem discussorium ad meliceridas; quod habet salis ammoniaci, spuma argenti, id est, lithargyri, cerussa ana lib. j. cera, terebuthina, chalbana, opopanax ana 3 j. rubrica sinopica 3 vi. aceti heminam, hoc est, 3 vii. s. spumam argenti, cerussam, sal ad exactum lenorem tritum, simul decoquito, deinde rubricam, prius aceto tritam iniicito, & cum vniuersis liquabilia misceto. postremò omnibus simul confectis & refrigeratis, opoponacem & chalbana aceto soluta admisceto, & vtere. Ceterum si medicamentis excedentibus, quæ Græci septica vocant, humorem in eiusmodi abscessibus absumere volueris, eos (sicuti etiam & strumas) medicamentis adurentibus cute superpositâ partem prius deuudare expedit: è quorum numero (inquit Paulus lib. 4.) simplicium quidam est quod constat calce vina, id est, aqua non extincta, sapone & cinere lixiii stillatio. Aliud varium magis, quod reconditum diu seruari potest: R. calcis vine 3 iij. species, id est, fecula vini combusta, nitri liquidi, tostii ana 3 ij. minij seu rubrica sinopica 3 j. cinere lixiii stillatio teruntur: ubi ad mellis liquidioris crassitudinem redacta fuerint, reseruesfacito: ut mediocrem consistentiam habeat, & pyxide plumbea reposito, lixinium desuper distillans, ne citò nimis exarescat. Ergo circumfusam euentem eiusmodi medicamentis crustam inducentibus, primum abrumpito: postquam verò crusta deciderit, exedentia adhibeto. Erodit autem validè circa vellecationem & morsum, quod habet squama aris 3 iij. sandaracha (id est, arsenici rubri) 3 ij. ellabori nigri tantundem: cum rosaceo vitior. Aliud ad idem valde efficax: R. erinaceorum combustorum, teste sepie, anri-pigmenti ana æquale pondus, rosaceo miscentur. Sed quæ adiacent, atque in ambitu sunt partes omnes, prius cerussa cum oleo delinito. At ubi talem abscessum sectione curare volueris, eandem curationem communem per chirurgiam, quam paulo antè diximus, adhibeto. & hæc de steatomate, atheromate & meliceride satis dicta sunt. Nunc ad bronchocelen seu locum gula, vel

Curatio per
exedentia.

Medica-
mentum
validè ex-
edens abs-
que morbo.

Curatio per
chirurgiam.

gularis

gutturis tumorem, qui etiam ad hos abscessus pituitosos referunt,
veniamus.

OBSERVATIO XIII.

De Bronchocele, bocio, seu hernia gula.

RVSTICVS quidam ex proximo pago, anno
1546. Iunio mense Alcmariam veniebat, ut à
chirurgo à bocio gulæ curaretur: ad hunc & ego
accitus sum, ut medicamenta etiam interna præ-
scriberem. Huic omnium primò hunc syrupum
bibendum quinq̃ue diebus præscripsi: R. syr. è stœ-
chade ʒ j. syr. ex quinque rad. ʒß. aquar. betonicæ,
saluæ, hyssopi ana ʒ j. misce. Deinde, cùm esset ru-
sticus valdè robustus, iuuenis annorum viginti sex,
pro magna parte pituitosus, cucurbitulas cum sca-
rificatione scapulis admouimus, pauco extracto
sanguine ad diuersionem. deinde reiterato digesti-
uo pilulas sequentes longè à cena exhibuimus: R.
pil. cochiar. agarici trochis. pil. de hiera simplici,
ana ʒ j. diagridij gr. j. cum syr. è stœchade fiant pi-
lulæ vii. tantùm bis eduxerunt. Postea descripto
decocto betonicæ, saluæ, maioran., fumiterræ, &
adiectis folliculis senæ ad lib. j. ß. addendo syr. è
stœchade, mellis ros. colati ana ʒ ij. syr. de epithy-
mo, de fumoterræ ana ʒ j. misce. Cùm autem ex
hoc decocto senæ ventrem satis lubricum haberet,
has pilulas tandem dedimus: R. pil. cochiarum, ag-
greg. agar. trochis. ana ʒ j. diag. gr. iij. fiant pil. x.
dentur tres tribus continuis diebus: quibus quotidie
ad minus ter quaterve aluum deponebat; ita ut ma-
teria antecedente satis purgata, ipsa coniuncta per
chirurgum faciliùs topicis remediis resoluta fuerit.

SCHOLIA.

Bronchoce-
le quid,

BRONCHOCELE appellatur tumor in gutture oriens.
Omnis enim tumor apud antiquos Cele nuncupatur. No-
men

men igitur commune est, sed species tumorum differunt. Nam *Αἰσιος* *Græcis* (quemadmodum scholio obser. 8. lib. 27. Obs. & Curationem nostratum medicinalium diximus) hernia sen-
 tem Latinis, *ὑψηλὴ* & *στέφανη* Barbaræ medicina scriptori-
 bus dicitur. Est enim *ἰκμή* nomen commune inflammationibus *Κῆς* nomen
 arteria, umbilici, scroti & inguinis, sed varias propter affectio-
 nes materiae sine partis accipit appellationes: & quia variis sit
 modis, varias quoque propter adiectiones accipit appellationes.
 Si enim in aspera arteria fiat tumor, ut plerisque accidit ex potu
 aqua ex liquefactis niuibz, quæ alpinis & aliis montanis in usu
 est, *Βογγοῖκμή* *Græcis*, Gutturis heruia *Gallus* dicitur. At de
 aliis herniis diximus loco iam citato. Caterum tumor hic, de quo
 nunc agimus, scilicet *Bronchocele*, *Bocium* gula & *Gossium* *Bocium*
 vulgo dicitur. ita & *Valescus* tract. chirurgica cap. 13. de *Bocio* *gula*.
gula sic scribit: *Bocium gula* est apostema phlegmaticum in
gula generatum; & est quasi carmen, sine dolore, & vocatur
ἡμῖα. *Leono* teste de *Bronchocele*, id est, gutturis tumore, cap.
 30. hic tumor vel ad *steatomata*, vel ad *atheromata*, vel ad *me-*
liceridem referri poterit: vel potius referatur ad illum tumorem
 quem vulgo sen recentiorum chirurgorum turba uatam vel
ἡμῖα antea appellari diximus. Generatur autem (ut idem *Causa*:
 refert *Valescus*) ex phlegmate grosso per viam rheumatismi, cui
 adiungitur materia melancholica coadiuvans, faciens ad indu-
 rationem phlegmatis cum sua siccitate: & quamvis istud *Bo-*
cium in pluribus locis possit generari, ut dicebat *Galenus* 14.
 artis parva, & quamvis à multis causis possit fieri; tamen de
 illo quod fit in gula, intendimus hic agere. Et ita constat (in-
 quit *Valescus*) quod materia eius est phlegmatica, cum melan-
 cholica mixta ad gulam descendens, & ibi incrassata, congelata
 & indurata. & ad hoc inuat plurimum longus usus rerum
 phlegmaticarum, & frequens potus aqua frigida, qua trans-
 eundo per œsophagum congelat phlegma, quod ibi cadit. Alij
 duplicem causam ponunt, ut *Leonus*: unam ex hereditate; nam
 parentes hoc modo laborantes filios sic affectos procreare solent.
 Alteram verò vel ex ambiente aëre, vel ex ipsa aqua, præ-
 ferim nivali, quæ aërei ac terrei plurimum continens, ve-
 nit & arterias, ac musculorum inanitates valde inflare solet,
 (ut

Κῆς nomen
commune.

Bocium
gula.

Gossium;

Causa:

Duplex
causa.

(ut nos sapiens in montibus alpinis accolae eiusdem loci vidimus, cum Italiam versus iremus, tales humores habentes) pariter cibo potusq; , qua à solo talem contrahunt qualitatem occultam: & hac qualitas communicatur plantis, herbis, aquis, fructibus. Fernelius tamen hoc negare videtur, cum & ipse bronchocelen ad ganglion referat; sic statim subiungens, postquam de ganglio scripserat. Huius generis est bronchocele, nostris Hernia gutturis appellata, inter asperam arteriam cutemq; congesta: non, ut plerisque visum est, ex immodicis clamoribus, aut ex potu aqua liquesfactarum nimium, qua Alpinis alijsq; montanis in usu est: sed ex crassa lentasq; pituita, qua eò sensim è capite eiusque partibus externis per auris posteriora demoluntur. Ego tamen, quod cum tanti viri pace dixerim, experientiâ contrarium inveni: nam post duos annos, postquam hunc rusticum unâ cum chirurgo crassemus, & alius mihi se se obrulit rusticus ex Waterlandia, qui cum latio ad me descebat, ut hoc ipsum spectarem (ut apud nos pessimus mos inolevit:) id quidem album ac valde cridum & sincerum esse repperi, aqua instat transspatens. Hic autem bronchocelen habebat, seu immorem non valde magnum in gutture, paulatim tamen incrementem, cuius causa is ad me quoq; consilium venerat. Tempus quo me accessit tunc vernum erat, hyemsq; asperissima praecesserat. Cœpi rusticum interrogare quo victus genere usus esset: is autem cum valde pauper esset, se piscibus usum esse perpetuò dicebat, tum per totam hyemem nihil aliud quàm aquam frigidissimam bibisse: ex qua statim malum fuisse (non aliter quàm in accolis alpinum, qui aquam gelidam perpetuò bibunt) contractam existimavi. neque mea opinio me fefellit, nam cum huic aquâ prorsus in potu interdixissem, & post purgationem discussorii remediis usus fuisset, brevis admodum hic curatus est. Ceterum quod ad signa attinet, ex iam supradictis ea etiam per se admodum manifesta sunt, & omnibus facile conspicua, per visum & tactum lippis & tonsoribus nota. Quod ad prognostica attinet: primò ex Valefco bronchocele hereditaria & naturalis curam non recipit, nisi cum ferro, ut idem refert. Secundò bocium magnum & inueteratum est incurabile. Tertiò, authore Arnaldo de Villanova, in Parab. doct. 6. Bocium colli verendum est incisione vel corrosione dissolvere sem

exur-

Fernelius.

Historia de
altero rusti-
co habente
bocium gu-
la seu bron-
chocelen.

Signa.

Prognos-
tica.

extirpare. Quarto, Bocium incipiens & circa annum unum bona victus ratione & dissolventibus medicamentis ac resolventibus curari potest. Quinto, bocium est morbus proprius aliquibus regionibus sicut est Sanaria (inquit Valesius) in comitatu Fuxii & hoc est ratione regiminis, aut ratione aquarum frigidarum quas bibant, & ultra hoc aliquando est hereditarius in successione magis tamen si utantur malo regimine. Quod ad curationem attinet, primo universalem ipsius bocii genera; canones universales prædicti in curatione abscessuum pituitosorum scholio obs. 7. & 10. & potissimum 11. etiam hic sunt observandi, & victus ratio in aliis moribus pituitosis, & locis iam dictis hic quoque quam diligentissime observentur. At curationis particularis medicamentis persequitur; vel chirurgia. Medicamentis vero (præmissis tamen universalibus remediis, ut digesta materia cum oxymelise scilicet, in quo sit virtus pyrethri & piperis, deinde purgata cum bolo dicto in capite de scrophulis seu strumis, etiam peracta phlebotomia, si opus sit) vel discussoris vel causticis perficiuntur. Conferunt autem tale resolutivum seu discussorium: Res. florum chamomilla, meliori ana ℥ j. rad. ireos, accris sic, sem. anisi, tura ana ℥ j. st. stercoris anseris & columborum siccorum, salis gemma ana ℥ ij fiat conqussatio, de quolibet p j. st. ponatur & bulliant in liquore facto cum cineribus clavellatis: & in isto liquore bullienti intingatur sponsa nova compressa, ac calide loco applicetur bis servae, & ultimo fascia ligetur, & ibidem detineatur. Sed & hoc emplastrum utile habetur: Res. diachylon, magni apostolici ana ℥ j. incorporatis hic pul. addantur: Res. pigami, rad. ireos sic salis gemma ana ℥ j. terebinthina q. s. fiat emplastrum seu ceratum supra alutam, & non cooperiatur: continetur nocte dieq. & supra membrum affectum portetur. nec amoveatur nisi cum fiat foris cum suprascriptis. Potest & fieri similiter emplastrum ex solo gummi ammoniac panca cera & pul. suprascriptis; vel ex pul. & diachylone. Inungi potest & locum arumg. u. oleoq. calido, deinde emplastrum apponi. Quod ad medicamenta discussoria attinet, Græcis præponitur aqua marina; ut ager quousdie bibat tres uncias huius aquæ, qua pariter os abluat: vel si huius non deint facultas, conficiat aquam mistic. Proderit ex hoc electuario cum tenere in ore, & paulatim deglutire:

Curatio vni-
versalis.

Curatio par-
ticularis.

Resolventia
seu discussio-
ria remedia;

Discussoria
iuxta Græ-
cos.

deglutire: R. rad. bryonia nigra, & alba, cyclaminis, polypodij, rufi, radici asparagi, aristolochia rotunda, serpentaria minoris, verbasci, spongie marine vsta, algæ vsta, añ q. s. contundantur, & fiat pul. misce cum melle, & viitor. Vide apud Valescum cap. proprio aliud Electarium huic valde conforme, deinde & alterum hoc ipso multo efficacius, & magis solutivum: cui & sal gemma, rad. scrophular. filipendula, turbit, hermodactyli, chelid. cyperi, rad. zinzib. & pyrethri ingrediuntur. Alij & iij. ℥ huius decocti propinant: R. rad cyclaminis, verbasci, polypodij, foliorum betonica, rad. branca ursina añ q. s. misce; & cum vino fiat decoctum. propina. omnia gargarismata qua habent vim educendi salinam, conferunt: ut ex pulvere pyrethri, piperis, staphisagria. Sed & pulvis hic ad bronchoelen & gutturosos egregie commendatur dum malum adhuc recens est, & est Arnoldi de Villanova. quod ipsum refertur etiam ad Constantinum cap. 8. de medic. R. spongia marina, palea marina, ofis sepia, piperis longi, & nigri, zinz. cinamomi, salis gemma, pyrethri, gallarum, spica rosarum, id est, spongia ros. sylvestrium añ. 3j omnia pulverizentur excepta spongia marina, qua comburi debet, & cinis eius prædictis commisceri, ac omnia cribrari. De hoc sæpius interdum & noctu in ore teneat: & quotidie sæpe & parum sumas. Conservandus pulvis in lignea pyxide, vel sacculo ex aluta, ne vis evaporet. Ad discutiendam bronchoelen, vide Galenum in lib. de medicam secundum genera. Inter localia discit hoc Aëtij, quod habet calcis vina, ammoniaci, bdellij, testa elibani vsta, aruginis, sulphuris vini añ partes æquales. Cum aceto terito, & acungia aut terebinthina excipito, ac imposito. Multa alia huius generis ab Aëtio pete, ut emplastrum è cupresso, superius in cura aneurismatis recitatum. Unguentum ad idem, quod etiam à Valesco ponitur: R. enforbij 3j sulphuris, sandaracæ añ 3ß. cera & olei q. s. fiat unguentum, quo ungatur collum & bocium: & superponatur emplastrum superius positum: & possunt fieri multa alia remedia, qua dicta sunt in cap. de scrofulis. Nos enim in bocis (inquit idem Valescus) ab uno anno incipientibus per viam resolutionis, ut immediate dictum est, operati fuimus, & inde honorem habuimus & utilitatem consequuti sumus. Si autem cum istis non curatur,

Gargaris-
mata.

Pulvis ad
bronchoce-
len & gut-
turosos.

Aëtius.

Valescus.

nec resolvitur; tunc ad putrefactiva aut excrementia veniendum est. Nam, ut dicit Galenus i. q. artu par. cura boij fit cum resolu-
tivis. aut cum putrefactivis, aut cum chirurgia, nempe ferro.

Galenus.

Et dicitur ibidem quod putrefactiva & corrosiva cum multo
tempore operantur, & cum hoc sunt molesta membris; & in-
firmis, & cruciatum afferunt. Bonum est ergo, idem inquit, ut
superficietenu incidantur, & cum fasculo, si fieri potest, extra-
hantur: & si aliquid de sacculo remanserit, ut ibidem ponantur
corrosiva & putrefactiva, postea mundificativa & carnis cura-
tiva, & vulveris sanativa poni possunt. At caudicis summa cu-
tus, cum superiecta tunica exeditur. quo facto, siue humer est,
profiit; siue quid densius, digitis educitur, tum vlcus sub lin-
amenti sanescit. Sed hac cura est semichirurgica, & minime
periculum fistula, ut etiam annotavit Leonus. Verum cura qua
perficitur chirurgia, educendo incisione materiam in tumore con-
tentam, & hac brevior est, sed difficilior, & qua raro bonum
finem sortitur. Rogerius autem iubet fieri duos sciones cum ferro
ignito; unum secundum longitudinem boij, alium secundum
transversum: & iubet eos bis in die moveri, donec sit totum
evacuatum. Sed hoc magis (teste Valesco) videtur habere locum
quando aquosa materia consingit in sacculo, vel alia purulenta
qua posset fluere. Sed hac de abscessibus tum tumoribus puru-
lensis præter naturam dicta sufficiant; quibus tertium hunc librum
Observationum Chirurgicarum & Curationum de tumoribus
præter naturam siniamus.

Curatio per
putrefactiva
& erodentia.

Quomodo
cauticis cu-
retur.

Curatio per
chirurgiam.

FINIS libri Tertii Observationum & Cu-
rationum Chirurgicarum, de tumori-
bus præter naturam.

OB'SERVATIONVM
ET CVRATIONVM
CHIRVRGICARVM

Liber quartus,

DE

TVMORIBVS

PRÆTER NATVRAM;

D. PETRO FORESTO Alcmariano,
auctore.

OBSERVATIO I.

De duritie quadam scirrhusa sub poplite, post malignorum ulcerum curationem manente.



GERARDI Harstij filix, Wey-
næ nomine, quæ Delphis in in-
terfignio elephantis prope forum
habitabat, post ulcerum maligno-
rum in crure per decoctum hagio-
xyli curationem à nobis factam,
durities sub poplite, posteaquàm
longo tempore curata foret, remansit, vt difficulter
incedere posset. Sed inunctio crebra olei vermium
terrestrium, & olei chamomillini & vini Rhenen-
sis optimi ita profuit, vt postea rectè quò vellet in-
cedere posset, neque alio remedio opus fuerit.
Quod si ad rem non fecisset, emollientibus tum re-
soluentibus, vt in scirrhuso fieri assolet, vsi fuisset.

SCHO

SCHOLIA.

HACTENVS de tumoribus ex sanguine, flaua bile, & ex
 pituita excitatis dictum est: nunc de iis tumoribus agamus
 quibus atra bilis generationis materiam præstat. qualis est scir- Tumores qui
 rhus; & qui etiam sub vocato scirrhus continentur, ut canceri, ad atram bi-
 carcini, carcinomata, elephantiasis, lepra Græcorum, psora seu lem referun-
 scabies, varices, polypi, verruca, quæ vulgo porra dicuntur: tur, & tumo-
 myrmecia, hoc est, formicantes verruca, acrochordones, id est, res scirrhosi.
 pensiles verrucæ: item calli, clavi, thymi, dracunculi seu vena medeni, ab Halyabbate vena saniosa dicta: de quibus omnibus
 singulatim in hoc libro dicemus. Sed ut res clarior fiat, pauca
 de succo melancholico. & de atrabili, tamquam de eorum
 causa efficiente, in medium adducamus. Est igitur melancholicus Succus me-
 succus naturalis, veluti fex sanguinis, parsque illius terrea, & lancholicus
 densa, qui nobiscum simul cum ceteris humoribus à primo semi- naturalis.
 ne originem habet, præstatq; ut sanguini permixtus solidiora no-
 stri corporis membra, qualia sunt ossa, alar: tum ut sanguinem
 ipsum crassitie sua densando, quasi restringat & roboret, fir-
 mioremq; faciat: altera. verò illius portio, quæ sanguis ad eos
 usus non eguit, in lienem. (quemadmodum de affectibus lienis
 alias diximus) transfunditur, eius visceris nativa facilitate hu-
 morem eum irahente. Angitur autem hic succus & conseruatur
 simul cum sanguine, à cibis ipsis ingestis: nam, quemadmodum Gal. de na-
 ex vino recens ab uis expresso & feruore alterascente, ex eo, tural. facult.
 quem in se habet calore, duo excrementorum genera proueniunt, 2. cap. viti-
 alterum lenius, magisq; æreum; alterum grauius ac magis ter- mo.
 reum, quorum illud florens, hoc sæcem nominant: sic sanè secun-
 dum hanc exempli similitudinem intelligendum distributum à
 ventre ad hepar χυλόν, hoc est, succum, à visceris caliditate, ve-
 lut vinum ipsum musteum feruere, concoqui, alterari ad sangui-
 nis uilis generationem. In hac autem ebullitione, hanc quidem
 eius superfluitatem subsidere, quantacumque est lutosæ & cras-
 sæ: hanc autem, quæ est subtilis & lenis, velut spumam quan-
 dam supernatare sanguini: horum igitur alteri si flauam bilem,
 alteri nigram assimilés, minimè pecces. Talis humor melanco- Gal. de loc.
 licus secundum substantiæ varietatem non obscuras habet diffe- aff. 3. cap. 7.

venia: nam quem supra descripsimus, est spissus & veluti sanguis: quo alius est essentia multo tenuioris, & quodammodo præter naturam, atque vomentibus vni, & olfacientibus alius videtur, qui etiam terram radit, attollit & fermentat, atque ampullas, quales fermentibus insculis supernatant videmus, excitat. Sed is quem crassa sæci similem esse dixi, in terram effusus non inducit fermentationem, nisi forte in ardenti febris ignis maxime præassari contingat: neque ulli acida qualitate participat. hic enim non recte adhuc atra bilis appellari potest. at tamen quando supra modum plurimum augetur, vel à tempore ab initio comparata: vel à cibis (qui cum in venis concoquuntur, in huiusmodi humorem transmutari solent,) morbus comitialis, ut crassus pituitæ succus, ubi in meatibus ventriculorum cerebri retinetur, sine is medius, sine postremus, efficere solet. Vbi vero in ipso cerebri corpore abundat, eam insania speciem, quam Græci vocant melancholiam, causat. Differt itaque melancholicus succus ab atra bile, quoniam hic fit actione natura chylum immitantis, & in sanis corporibus semper inueniuntur. Atra bilis verò & præter naturam est omnis: ob idq; morbofo & nusquam sano degente animali inueniri potest. Gemina atra bilis existit generatio, ex flava bile supra modum exalta, assataque, & ex sanguine ipso crasso, hoc est, succo melancholico, qui supra modum assant propter vehementem caliditatem à putredine, aut à febre contractam: Bilis flava cum supra modum essatur, primo migrat in vitellinam: secundo in porraceam: tertio in eruginosam: & tandem in atram. Atram bilem igitur nullum animal, ne ipsi quidem mures gustant: & (sicut diximus de tenuiori ipso melancholico succo) terra quoque raditur ab ea: ac partes quæ raduntur, omnes in altum attolluntur, vocaturq; is affectus (ut Plato quodam loco inquit) tum fermentatio: est namq; u humor salis, quale esse acetum diximus: proinde quibus corporis partibus pura, impermixtaq; adhaeruit, eas prorsus exedendo ulcerat. Acetum namq; ut quod tenuissimum sit partium, permeat: atra autem bilis crassitudo, cum sedem sibi stabilem firmamq; præbeat, erosio- nis fit causa. Sicuti autem à nigris sine humoribus sine deiectionibus, sine edulis dicere malis, bilis atra ex positis non divini- entur, ita in eo quoq; quod ne musca quidem, aliudve quodvis ani- mal

Gal in pri-
mum Pro-
phet.com.5.
sec.4.

Gal. meth.
24. cap.9.

Gal. de atra
bile cap.3.

mal gustare eam velit, vii neque moram salsedinem: neq; enim in ea degit animal, ut mare, quod mortuum vocant, argumento esse potest: atque idcirco eius generatio exitialis esse videatur, ut que atro humore superaffato contingat. Multo verò hac profectò perniciosior censenda ea bilis atra, qua à flava bile superaffata progignitur; quanto nimirum & humor humore efficacior est, nempe flava bilis, quàm ea, qua sanguinis veluti subsidentia exiit: & hac atra bilis quando in cerebri corpore abundat. serina deliramenta induit, modò sine febre, modò cum febre. Sed inter ea dubium insurgit, an videli. et atrabilis ex pituita superaffata conflare possit. Auicenna fuit huius opinions, quòd pituita possit per incinerationem in atram bilem conuersi, cum nussiam tamen ea de re quicquam à Galeno sit proditum: qui si fieri posse id atrabilis esset, id profectò prætermisurus non fuisset: præsertim eo in libro qui de atra bile inscribitur. imò ipsemet Galenus 2. Præfagiorum, de pituita exaffata in pectore loquens, fieri ex ea spiritum album, tenax, & rotundum, non autem nigrum affirmauit. Adde quòd cum plurimum pituita ab atra bile & colore & substantia distet, magnas variasq; fieri ea in transmutatione alterationes, tum in colore, tum in substantia pituita oporteret. Quin nec ipsa reuera unquam, etsi maximè, vel per asationem, vel congelationem crassescat, à sua ipsius natura, & forma degenerat, ita ut pituita non sit, & dicatur: ac proinde Galenus lib. de tumor. præter naturam. scirrhus à crassa & teraci pituita factos ab eis distinxit, qui à succo melancholico sunt: quasi sentire id voluisse sit visus, à pituita quantumvis crassa, scirrhus melancholicos numquam fieri; sed sui generis, hoc est, pituitosos scirrhus. Hanc questionem Manardus lib. 9. Epist. epist. 2. fusissimè tractat: in ea igitur diutius nobis non immorandum: pro defensione tamen ipsius Auicennæ dicimus pituitam superaffatam fieri atram bilem, non colore (quem semper album retinet) sed aliis qualitatibus; induit enim sibi & frigiditatem & siccitatem, proprias ipsius atrabilis qualitates. Ad insiliendum redeundo, atrabilis præter naturam ex asatione genita, innumeros eosq; exitiales morbos creare solet; caneros, elephantes, scirrhus, & iis similes; de quibus agere proposuiamus.

Gal. de loc.
affect. 3. cap. 6.

OBSERVATIO II.

*De apostemate duro lapideo, scirrroso, in femore,
crure & genu.*

IN quodam, qui durum apostema lapideum scirr-
rhosum, quæ habebat in femore, post vniuersalia
remedia lapidem marcasitam seu lapidem mola-
rem candentem accepi, & asperso aceto locum vt
sudaret suffraginaui: postea emplastrum de mucci-
laginibus, deinde de ammoniaco communi appo-
sui. Videbatur hoc apostema maximam materiam
pituitosam habere, & vix paucum melancholicæ,
quare cutis color naturalis erat, & non plumbeus.
Materialia autem, vt dicit Gordonius cap. proptio,
tam vnguentorum quàm emplastrorum sunt ea
quæ materias duras resolvunt & emolliunt, vt
axungia gallinæ, anatis, vulpis, lupi, leonis, vulturis,
aquilæ; medulla vituli, cerui; semen scenigæci, lini;
gummi opopanacum, galbanum, serapii um, bdel-
lium, storax calamita, mastix, ladanum, pix naualis.
Et de omnibus istis quanto recentiora tanto me-
liora gummi temperentur in aceto aut fecce eius,
quando est in loco nervoso, & fiat compositio ex
vno vel ex multis secundum quod videbitur expe-
dire, per modum olei, emplastri, vel vnguenti; cuius
rei electio medico perito relinquenda est. At si scirr-
rhus magis sapiat naturam melancholicam, diffici-
lius curatur, vt nuper nobis euenit in seniore quo-
dam, qui uisi diligenter tractatus fuisset, facile ad
cancerum deuenisset. Vide egregium exemplum
apud Amatum centuria 2. curat. 82. in qua agitur
de scirrholo tumore ob calum, postea aucto & ni-
gro facto, ac demum suppurato, & in vlcus versò;
ex quo mors subsequuta fuit. Sed & ego Alemariz
Æmilium medicum vidi iam seniore, scirrhosum
tumorem magnum habuisse in genu; qui tumor
licet

licet euanuerit decocto ligni guaiacani, is tamen senex eo utens, cum morbi Gallici suspicio esset, valde exsiccatus ex ligni decocto, quod in lenedissuadebam, tabe tandem consumptus obit. At pulchrum ponit exemplum quoque A. natus centur. primus, curat. 26. de scirrhoso quodam tumore Gallicano; sic scribens. Christophorus Almeida, morbo Gallico correptus erat, & scirrhosum quendam tumorem in crure habebat, à quo maximum patiebatur dolorem, cui doloroso loco post exactam medicamentorum bibitionem, cerotum hoc admouimus: R. diachilonis albi, ammoniaci, bdellij, sagapeni ana partes æquales, argenti viui extincti ʒ j. misce. fiat cerotum membri figuræ & magnitudini conueniens: cum quo dolor quieuit, & Venetias iuit cum illo homuncione omnium hominum quos naturæ conditio hucusque videre permisit minimo. At paulo ante hoc tempus cum hæc scriberem, anno 1570. mensè Iulio adolescens ad me consultum venit, conquerens de duritie quadam scirrhosa, quæ in tibia in parte minus carnosa apparebat, sine dolore, nisi cum paulo longius ambularet. Sanguinem cum extraxissem, valde corruptus erat, ut de Gallica lue suspicionem haberem: quare huic linimentum ex pinguedinibus præscripsi. Sed quorū affectus euaserit, nescio, adolescente non amplius ad me redeunte. Cæterum de istis tumoribus Gallicanis atque gummi aliàs latius diximus.

SCHOLIA.

QUAMQVAM de istis tumoribus duris lapideis, tum de scirrho aiàs egimus Obser. 12. & 13. de scirrho iecioris, & scholiis eiusdem obs. lib. 19. Observationum & Curationum nostrarum medicinalium, tum serè per totum lib. 20. cum de scirrho lienis ac scirrhoso malo ageremus, & maximè obs. 8. 9 & 10. de scirrho lienis: & obseruatione 11. & 12. de scirrhoso lib. 20. Astamen cum ibidem potius dixerimus de scirrhis

Scirrhus
duplex.

Barbaris scir-
rosi, Aui-
cenna se-
phiros.
Scirrhus le-
gittimus.
Melancholia
naturalis.

Scirrhus
illegittimus.

Melancholia
non natura-
lis.

Non natura-
li melan-
cholia qua-
tuor differe-
ntia.

Bilis atra
exquisita.

qui in partibus internis sunt, quamquam etiam de cure scir-
rho in febribus diximus, hic tamen magis ex proposito agen-
tes de humoribus præter naturam in partibus exterioribus appa-
rentibus, hic rursus de scirrho verba faciamus. Itaque scirrhus,
sicut & phlegmones, erysipelates & œdemas, gemina est re-
centioribus chirurgis differentia, uno scirrhii nomine compre-
hensa, nempe scirrhus verus & non verus. Barbari verò
(ut Valescius) scirrosi appellant duxim apostemia: &
apud Auiennam vocatur Sephiros. Porro verus scirrhus seu
legittimus, recentioribus quoque chirurgis appellatur, qui ex
melancholia naturali procreatur. Est autem melancholia na-
turalis, ut diximus, boni sanguinis sex, ac veluti limosa qua-
dam superfluitas, hoc est, crassior, quam sanguis, cuius color
niger est, sapor verò acerbus vel acidus, ut vomentibus enim
non raro innotescit; in massa quidem sanguinaria (in qua hu-
mores universi continentur) existens, aëdu partibus melan-
cholicis à natura factus. Scirrhus verò non legittimus, iuxta
vetericorum placita, is est, qui ex melancholia non naturali
procreatur. Est autem melancholia non naturalis, qua à modò
descripta naturali degenerat, intra tamen limites sua latitudinis
permanens: quos si prætergrediatur, non iam amplius (in-
quimus) melancholia, sed alius humor dicitur. Vera melan-
cholia, si in univrsum definitur; humor est frigidus & siccus,
ex crassiore (ut ait Gnido) ipsius chyli portione progenitus.
Cæterum non naturalis melancholia quatuor differentia com-
muniter statuitur. Prima est, quando humor ipse melanchol-
licus, qui naturalis dictus est, & quondam gignitur in corpore
dum animal sanitate fruitur, in propria sua essentia adurit
& putrescit; siq; bilis atra exquisita. Talis enim (ut ait Ga-
lenus 14. lib. Therap. & lib. de atra bile) ex humore atro seu
sanguine melancholico supra modum assato, adusto seu com-
busto constat, habetq; splendorem aliquid, veluti bitumen &
pix. Hæc autem bilis atra, sapore est acida (ut diximus) & in
terram effusa velut acerrimæ fœnet, & ipsam fermenti ritu
elevat, tum omni animanti inincunda, adeo, ut ne mores qui-
dem ipsi, aut muſca, eam gustaverint, non magis quidem,
quam copiosum salem, in quo nullum animans vitam petiit.

ut mare quod morinum appellatur, indicat. Porro tum igitur huiusmodi nigra bilis, cum ille veluti sanguinis limus (qui à melancholicam naturalem dixerunt) diutius moratur in corpore, & neque per aliquem fistulilem effluxum, neque oculum excernitur: Verum ita immutatur, corrumpitur, & putrescit. Si quidem (inquit Galenus) hic humor ubi amplius incaluerit, aut propter putredinem, aut febrem inflammantem, nigram efficit bilem: quæ quidem frigida est, quia terrestris, sed tamen caloris non expers, quemadmodum & cinis, & acetum; apparetq; dum per alunas (ut contingit aliquando dysentericis) excernitur, splendidi ac nigrior ipso sanguine crassiore & nigriore, quem humorem melancholicum appellamus. Splendet enim veluti mortui maris biumen, quod Iudæicum vocant. Secunda species seu differentia bilis atra non naturalis, est quæ ex aduisione aliorum humorum nascitur, ut illa quæ fit ex flava bile vehementer vitiata: quæ etiam nimis tanta est malitia, ut & terram tadat, & eam more bilis exquisitè atra, in altum attollat. Sed & muscæ ipsam non secus quàm verè nigram bilem, refugiuunt. Si sanguis quoque aut pituita in corpore vehementer incaluerint, & exsiccantur efficitur cum melancholicus humor non naturalis per aduisionem dicitur, ut voluit Auenenna. Hinc & Valesius felivosa seu apostema durum inensile & indolerosum fieri dicebat à phlegmate vel melancholia, vel ex sepe sanguinis. & ipse Gordanius inquit, Apostemata dura causantur ex materia phlegmatica aut melancholica, aut utriusque. & si est ex melancholia, color ad plumbentatem vergit: si est de phlegmate, naturalis est. & si ab utraque, mediò modo se habet. ita & Valesius. Quandoque fit apostema istud à pura melancholia naturali seculenta, quæ est sex aliorum humorum; & tunc color eius est cinereus vel plumbens: aliquando fit à melancholia mixta cum phlegmate, & tunc color eius est sicut color totius corporis. Et si fit à solo phlegmate quod iam induratum est, tunc color tendit ad albedinem. Verum due istæ postremæ species (quæ scilicet per sanguinis aut pituitæ assationem sunt) Auenenna tum eius sequebatibus mitiores sunt. Scribit autem Galenus illam bilis atræ speciem, quæ ex flava bile vehementer assata generatur, deterrorem esse, & multo consummatiores morbos generare, quàm

Galen. com.
21. lib. 4.
aphor.

Lib. 14.
Therap.

2. bilis atra
ex aduisione
aliorum hu-
morum.

Commēt. 24.
lib. 3. Pre-
dict. Hipp.

eam qua ex crassiore sanguine generationem habet : qui subsi-
denti in dolio secula aut amurca, hoc est, feci olei proportionem
respondet. Hac enim mior est, sed potissimum quoties nondum
traxit in animali moram cum aliquo calore abundanti prater
naturam. Verum priusquam in exactam aitam bilem transmi-
tetur, primò in viscidam (ut diximus scholio precedente) se-
cundò in porraceam, tertio in arginosam transit. Tertia species
melancholia non naturalis est, qua originem sortitur à lapidosa
quadam concreione, ut cum ab imperitiis medicis vel chirurgis
erysipelata & inflammationes (quas Græci phlegmonas vo-
cant) aut quibus alijs tumores ex naturalibus humoribus pro-
creati, ad moris extrinseci præsidis, nimis vehementer refrige-
rantur, astringunturq; : vel cum iisdem humoribus, ea quæ va-
lenter nimis trahunt, digeruntque medicamenta adplicantur;
hinc enim toto quod in eo subtilissimum erat, dissipato, id quod
reliquum est (nempe crassum) plus in se desiccatum lapidis du-
ritiem consequetur, atque in melancholicum humorem conuer-
tetur. Hinc & Valescus capite proprio de scirrosi seu scirrbo,
inquit : Vt prius sciendum est, quod scirrosis, hoc est, scirrhus,
duobus fit modis, quando ista materia iam dicta simpliciter vel
composita mittuntur ad aliquem locum, non præcedente aliquo
apostemate : & quando ista materia non maturatur nec resolu-
tur, fit scirrosis per viam congelationis, aliquando per viam
resolutionis partium subtilium, & indurationis crassarum : ali-
quando post alia apostemata, cum materia fuerit in parte reso-
luta, & residuum fuerit induratum, ac in scirrhum mutatum;
& talis scirrhus remanet post multum tempus. Quarta melan-
cholia non naturalis differentia exurgit, quando alius humor ipsi
melancholia naturali permiscetur. Quod dum fit, dulcoratur ac
muescit magis, nisi dum alterutra bilis adusta, hinc commisce-
atur : si quidem tunc vel acescit, vel amarescit, & erosionis non
modice particeps efficitur. Ex præcedentibus igitur colligere li-
cet, quatuor tumorum præter naturam differentias nasci ex me-
lancholia seu atrabilario humore. Primò namque ex melancholia
naturali (quam quoties gigni in sanis diximus) fit verus ac le-
gittimus scirrhus, apud Arabes Sephiros nominatus, Græcis verò
καίψις & εκλυσὶς οὗ ἀκαθάρτου, hoc est, scirrhus non exquisi-

Bilis atra per
congelatio-
nem (ut vo-
cant) & in-
durationem.

Bilis atra ex
admixture.

Quatuor tu-
morum diffe-
rentias neci
ex melan-
cholia.
Verus scir-
rhus non ex-
quisitus.

aut non exactus, qui tumor quidem est prædurus, & doloris
 expers, non tamen omnino insensibilis: Anicena impurus ap-
 pellatur. Galenus tamen lib. 14. method. medendi tumorem ex
 humore melancholico conflatum tunc propriè scirrhum, his qui
 de nominibus contendunt, condemat esse appellandum, cum omni-
 no sensus est expers: cum verò nondum omnino factus est insen-
 sibilis, scirrhosum potius tumorem, quàm scirrhum (si velius)
 nominari. Secundò ex melancholia non naturali dicta per ad-
 mixtionem, tres alia tumorum differentiæ enascuntur: nempe
 scirrhus phlegmonodes, œdematodes, & erysipelatodes, quæ pro
 una tantum differentiâ hic numerantur. Tertiò ex melancholia
 non naturali facta per lapidosam quandam concretionem, gene-
 ratur scirrhus exquisitus, durus quidem, & omnino sensus atque
 doloris expers; ab Anicenna purus nominatus; qui curationem
 non admittit. Quartiò ex melancholia non naturali per densio-
 nem omnes cancerorum species procreantur, iam ulcerati scilicet
 quàm non ulcerati, de quorum genere est scirrhus cancrifusus no-
 minatus. Itaque scirrhus propriè dictus, tumor est durus & in-
 dolens, non tamen omnino sine sensu, ab humore melancholico
 naturali & minime corrupto procreatus, ut reuerti res desistant
 chirurgi. Cum itaque duplex sit scirrhus, unus velet incipiens
 nec confirmatus, nec legitimus, in quo pressio doloris sensus inest;
 aliter confirmatus & exquisitus, qui omnis doloris omnique sensus
 est expers: utriusque materia est crassus viscosusque humor, qui
 particula impactus in eiusque spacia inferius ita obduruit, ut non
 nisi agere solui dissiparique possit. Hic autem humor (inquit Fer-
 nelius) aut statim tumori initio talis existit, ut quum purita
 vitrea vel gypsea vel naturalis melancholia quæ sex est sangui-
 nis, in parte aliqua seu fluxione, seu congestione cumulat. Aut
 ex malè curato erysipelate vel phlegmone talis evasit, ut quum
 eius materia immodicè refrigeratur & astingitur, aut diapho-
 reticis dissoluta tenui portione crassior subsistit ac manet. Ut
 enim iecoris scirrhus ferè omnis qui ab iectero reünquuntur, ex bile
 sensim crassesciente sit, ita & nonnumquam in externis quoque
 partibus eandem habet originem. Ex quibus dictis iam faciliè con-
 stant causæ scirrhi, cum fiant, teste Galeno, ab humore crasso &
 frigido, quales sunt in animalium corporibus duntaxat duo, bilis
 scilicet

3.
Scirrhus
phlegmono-
des, œdema-
todes, erysi-
pelatodes.

3.
Scirrhus ex-
quisitus.

4.
Scirrhus
cancerifusus.

Scirrhus pro-
priè dictus
quid?

Materia
utriusque
scirrhi, ex
Fernelio.

Causæ.
Gal. 5. de
simpl. med.
facult. cap. 9.

scilicet

scilicet atra & superexsiccata pituita : proinde tumores scirrhusi omnino aut pituitose sunt substantia, aut atrabilia, aut ex utraque mixti : & hi vocantur scirrhi ab initio. Ceterum aliquando generantur ex lapsu & coincidentia aut inflammationis, aut erysipelas, aut œdematis, cum immoderatius refrigerata sunt, ut testatur Gal. de tumor prater naturam cap. 9. Sic & Tagautius Causa scirri, ut & aliorum tumorum prater naturam, triplex est : primitiva scilicet, ut est prava vivendi ratio, crassum & melancholicum sanguinem generans, coacernansq; : antecedens, ut succus melancholicus in corpore collectus, à lieure, (cuius officium est, hepar à crasso illo & luto sanguine expurgare) malè attractus & extra corpus minimè ut debebat expulsus. Continētē, humor ipse melancholicus in laborante particula impactus. Signa ipsius scirri presentis, Guidoni sunt tumor durus, & valenter renitens, color inter rubrum & nigrum medius : cuiusmodi color fuscus est. Hanc, cum in corporis partibus sepe incidat, plerique medicorum (ut Galenus 14. Methodi med. inquit) pelit non, hoc est, linidum vocant. Adhuc si venas evidētiōres membrum laborans habet, exaltatas eas à crasso & nigriore quodam modo sanguine, cuiusmodi per alium aliquando non pauci hepaticorum excernuntur, videre licet : sed iam scirrhū impurū & canerosus erit. Haec enim nota, quas hic ad scirrhū accommodat Guido, canceri propriè sunt nota apud Galenum lib. 14. Methodi medendi : non ineptè tamen scirrhus adaptari possunt, hoc uno dempto, quod venas tumentes, & exaltatas non habet scirrhū, ut cancer, nisi scirrhū (ut diximus) fuerit canerosus. Quippe non rarò scirrhū in cācrum degenerat, cum ab eadem fiant materia, succo scilicet melancholico. Propriè igitur scirri legitimi nota sunt tumor durus, pertinaxq; ac tāctui resistens, in quo & hebes sensus adeit. Adde quod & alia nota appārent quæ melancholicum humorem in corpore subesse testantur. Tumores verò scirrhusi ab initio dum adhuc prima rudimenta concipiunt, magna ex parte exigui apparere solent : procedente verò tempore, paulatim augentur & maiores sunt. Exis quidam unum dumtaxat membrum occupant : alij verò eo membro quod prius infestabant, relicto, ad aliud postea transferuntur. quod dum fit, nominatur tunc vitium sermos Ant-

cennas

Scirrhi ab
initio.Scirrhi
lapsu.Causæ scirrhi
legitimi
occs.Nota scirrhi
legitimi.Guido notas
canceri tribuit
scirrhusi.

Indicia scirrhi.

tenna: præterea huiusmodi tumores melancholici, ut plurimum, si rite tractentur, resolutione terminantur, nonnumquam indurata manent, & non raro in cancerum (quod primum est) degenerant ac transmutantur. At de scirrho illegittimo aut non exquisito, ex vehementi refrigeratione aut exiccatione originem sortito, sciendum est (ut paulo antè diximus) quando medicorum imperitia, inflammationes (quas Graeci phlegmonas appellant) aut erysipelata impendio refrigerantur, aut ad moris medicamentis vehementer trahentibus & per baculum digerentibus, temerè resolvuntur, tunc totum id quod in eis tunc magis erat, dissolvitur, quod verò reliquum est, velut congelatur atque impensius resuscitatum, lapideam duriem assequitur; sitq; tandem affectus, qui Graeco scirrhosus vocatur. Ceterum contingit quandoque particulam aliquam indurari, propter tensionem, quam sustinent ex fluxibus, aut humore quopiam aquoso, ut supra dictum est, dum de tumoribus stultis & agnoscis ageretur. Nonnumquam & tephacea duriem in particula quibusdā oboritur, propter privationem humiditatis, & nimiam desiccationem, ut in duriis inunctarum in articulis morbis ac doloribus procreatis. Verum enīquidē hic duntaxat legimus de scirrhis seu induratis tumoribus, qui ex phlegmone aut erysipelate, paulo antè commemorato orti sunt, aut etiam ex adematē impendio refrigerato & adstricto. Atq; eos non absurdè scirrhos ex coincidentia procreatos nominabimus. Scirrhī illegittimi & non omnino exacti, nota sunt tumor durns, vix sensibilis, id est, quasi sensus & doloris expers, corporis colorem ad vugnem representans, ex melancholia non naturali ortum ducens. Hic nec prorsus incurabilis est, nec facilem sanē curationem admittit. Si quidem humor, unde huiusmodi vitium contrahitur, lentius seu glutinosus crassusq; est, aut (ut Galenus ait) utriusq; rationis particeps, qui particulis induratis infartus, solui contumaciter repugnat; ubi praesertim resoluta ex ipso subtiliori humiditate, quod reliquum est, exiccatum lapidosumque efficitur. Scirrhos verò exquisitus, & qui omnino sensu vacat, curationem non recipit. Si tamen aliquo modo immari possit, humectandi ratione id praestari debet. Duriem quoque ex nimia exiccatione & metastasi, hoc est, consummata prorsus siccitate,

Scirrhos illegittimus, quomodo generetur.

Duritiem in particulis, 2 causas.

Signa scirrhī non legitima.

Iudicia.

Scirrhos ex quo curationem non recipit.

inf.

in auxiliis est: satis enim est prohibere, ne ultra siccitas procedat. Sed & scirrhī in quibus pili nascuntur, quique magni sunt, ac vehementer duri, & corporis colorem referunt, nec sanantur, nec umquam perturbantur, ut scriptum reliquit Anicetas. Prasagia itaque in his tumoribus (scirrhosis) bona esse non possunt: nam difficilē resolvuntur, & nonnumquam magis, dum tractantur, indurescunt. Scirrhī cancrosi medicum sanguant, & per medicamenta sanire oīent. Hæc de scirrhī oriū, causis, signis & indicis sufficiunt: nunc igitur ad curationem veniamus, & primò verū ac legitimum, non tamen exquisitū.

OBSERVATIO III.

De scirrho legitimo, non tamen exquisito.

QVI in crure scirrhū legitimum habebat, non tamen exquisitū, huic victum tenuem boni succi & probi sanguinis generariū præscripsimus: & quia aderat sanguis melancholicus, & vit hirsutus erat ac niger, sanguinem quoque detraximus ex vena lienari: nam in crure sinistro scirrhū erat. deinde exhibito syrupo, de fumo terræ, de epithymo, cum decoctis appropriatis, postea & adiecta sena, humorem melancholicum sæpius expurgauimus. Deinde hoc cerotum ut applicaretur, mandauimus, forū tum inunctione præcedente: R. rad. inulæ, lapathij acuti recentis, rad. althææ, rad. brancæ vrsinæ, rad. lilior. albor. ana ʒij rad. ellebori nigri m. j. folior. b. sinaluæ, maluæ, lapathij, meliloti ana m. j. ʒ. furfuris triti & bene cribrati m. ij. hordei mundati m. j. bulliant simul omnia in f. q. aquæ, & fiat fofus. A forū inungatur: R. olei lilior. amygd. dulcium, pingued. anseris, gallinæ, cer. plastri de meliloto ana ʒij. misce. fiat inunctio. deinde ceratum hoc apponatur: quod est resolutiuū, mollitiuū in tumoribus omnibus duris & scirrhis: R. pinguedinis anatis, anseris, gallinæ ana ʒij. ammoniaci in aceto dissoluti ʒj. bdellij, galbani ana ʒj. dialthææ, empla-

stri

stri de meliloto ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. bulliant in mucilaginis sem. lini, fœuigræci, althææ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ β . quo ad formam cerati induant. valet in omnibus scirrhis & duris tumoribus ex melancholia nō naturali grossa congelata: quale hoc quoque est ceratum à nobis expertum: & diachilouis albi gummati, dialthææ; vng. Agrippæ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. olei lilior. albor. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. pingued. anatis $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. dissoluantur: & misce ad ignem, addito ammoniaci, bdellij, ladani ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. dissol. in aceto; fiat ceratum. Curtius in resoluendis duris tumoribus & duritiibus utebatur saepe triapharmaco Gal. ex litharg. oleo veteri, & aceto: addebat interdum salem & baccas lauri. Fertur & hoc emplastrum expertissimum esse ad resoluendum omnem duritiem in vna septimana: & sem. sinapi, sem. viticæ, sulphuris, spumæ maris, aristoloch., bdellij, ammoniaci, olei anethini ana cum cera & modico aceti fiat emplastrum. At sequens expertum habetur ad scirrhum canerosum: & ruticæ alexand $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$. antimoni, plumbi vsti, litharg. argenti ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. succorum plantag. centumnodij, solatri ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ bulliant simul omnia ad consumptionem succorum: deinde conterantur diligenter in mortario plumbeo, quoad colorem fulcum induant.

SCHOLIA.

CÆTERVM absolutam induratorum huiusmodi tumorum, præter naturam, qui veri scirrhi, non tamen exquisiti, nominantur, curatiōnem tribus intentionibus assequemur. Prima convenientem vivendi normam præscribit. Secunda materiam antecedentem (id est; quæ parata est, statim morbum efficiere) tollendam monet. Tertia coniuncta (ut vocant) materia & morbum iam committentis vaccinationem molendam esse nobis insinuat. Itaque (ut in uniuersum dicatur) victus rationem eorum, qui scirrhis laborant, sobriam & moderatam, & quæ ad calidum & humidum declinet in robur (ut dicunt) non naturalibus insitit. Ergo alimenta euchymia, id est, boni

Tres intentiones in curatione legitimi scirrhi observandæ.

Vivendi ratio.

Euchymia

X

fructu

Panis opti-
mus.

Vinum.

Oua.
Carnes.
Olera.Carnes me-
lancholicae.

Limaces.

Pisces.

Olera.

Olerum, fit
ex aceto &
sale.

Legumina.

Panis.
Typha exile
est triticum,
specie. gligini
non disti-
nctum.
Vinum.

Caseus.

Sanguinem
adurentia.Animi asse-
tus.

sacri, & probum sanguinem generantia exhibeto. Panem itaque
triticeum, probe subactum & moderato igne in furno coctum,
quique fermenti aliquid habeat, & salu quod satis est, praesentito.
Vinum substantia tenne, & odoratum deligito: crassam veru
nigruque vitato. Oua sorbilia, pullos, capos, gallinae & eorum
iura prabeto. Perdices, phasiani, coturnices, capreoli iuvenes, vi-
tuli lactantes, & amniculi vernece, laboranti in deliciis sunt.
Ex oleribus id quod Arabes Aspanac, nos vero nomine panisum
mutato, spinaciam dicimus; lactucas item, lupulum, boraginem,
& buglossum, atque id genus alia, qua sanguinem expurgant,
& puriorem reddunt, ne aspernator. In summa, ea omnia qua
sanguinem melancholicum suapte natura parviunt, fugito: ea au-
tem Galeno lib. 3. de locis affectis cap. 6. fere sunt caprina, bu-
bulaque caro, magisque hircina, iaurina: sed maxime asinorum,
camelorumque carnes: item vulpine caninaque: leporem quoque,
sed multo magis aprorum: praeterea limaces, si frequens sit eo-
rum usus: atque omnes terrestrium animalium carnes sale con-
dite. Aquatiliu quoque carnes, ut thynni, balana, vituli ma-
rini, delphini, canis, atque cetaceorum omnium. Ex oleribus au-
tem brassica fere sola huiusmodi sanguinem gignere consuevit.
Quemadmodum & arborum germina, ubi vel myria vel oxal-
is conduntur; praecipue lentisci, terebinthi rubi, & rubi canini,
qui Graece cynosbatos appellantur. Leguminum vero omnium
maxime lentus, inter melancholicos cibos numerantur: mox pa-
vis fursuraceus, & qui ex typha atque vitatis seminitis factus
est, quorum apud quasdam nationes usus loco framenti habe-
tur. praeterea vina crassa, nigraque aptissima sunt: ut ex ipsis
melancholicus humor fiat: praesertim, si quis abunde ipsa inge-
rens, oblata occasione in multo calore corpus contineat. Verus
denique caseus, ubi forte fortuna in corpore fuerit supercalfactus,
facile huiusmodi parit humorem. Hac ex Galeno habemus.
Canendum insuper est a rorridu, asu quoque & fixis vche-
menter exiccatis: item salis, acidis & acritus (veluti sunt
allia, cape, piper, sinapi) & aliis id genus omnibus qua sangui-
nem adurant. Vitare etiam oportet iram, maestitiam, vigiliu,
solicitudines, atque immoderatas exercitationes. Animi tran-
quillitas, ac letitia magnopere est expetenda: summaque ope ni-
tenda.

rendum ut quotidie ventrem delicias. Hactenus de primo scopo. Excretio.
 Ut autem quod secundus scopus nobis proponit, consequamur,
 precipit Auicenna, corpus vniuersum vacuandum esse tum ve- Inanitio.
 na sectione, si sanguis niger admodum & crassus apparuerit:
 tum medicamento purgante, quo bilem atram exeat: cuiusmodi
 sunt Mesua epithymum, senna, polypodium, funis terre, lupu-
 lus, volubilis, item casta fistula, myrobal. indi, lapis lazuli, qui
 Græcis cyanens, Romanis caruleus dicitur: diase, diacatholi-
 con, biera Russi. Alij, ut Leonus, materiam antecedentem ena-
 ciunt, si fuerit pituitosa, per medicamenta in superioribus inuo-
 ribus pituitosa descripta: si atrabilis sit, & a sanguine nigro
 & crasso, à vena sectione exordiantur vacationem, dummodò
 cetera consentiant, & exhibent syrnpos humorem atrum præ-
 parantes, quales sunt de epithymo, de fumo terre, de lupulis: præ-
 paratum vacuant cum casta, senna, & aliis iam dictis, quæ hu-
 mores melancholicos per aluum expurgant. Sed hæc quæ ad
 pharmaceuticæ & dieteticæ attinent, chirurgiæ metas exce-
 dunt. Hæc igitur medica artis professoribus relinquentes, ad ter-
 tium scopum properabimus, qui versatur præcipue in euacuatio-
 ne materie coniunctæ: quem sanè vos assequemur, si quod præter
 naturam in particula est, totum vacuetur. Quæ communis qui- Vacuatio
materie
concurrentis.
 denti ac prima indicatio est omnium, qui præter naturam confi-
 sunt tumorum: in quibus utique adhuc non sunt geniti pori. Mo-
 dus autem vacationis eius proprius est, circa quem circumspe-
 dam & maxime attentum esse curantem oportet. Si quidem
 materia eiusmodi tumorum, naturæ iam maligna est, ut in du-
 ritiem veluti lapideam abeat, si temerè resoluantur. Si verò plus
 quam par est, iam emolliat, periculum sanè imminet, ne ipsa cor-
 rumpanitur, & scirrhus in cancerum degeneret. Sequendum igitur
 in hac re Galeni ac Pauli (qui de eâ ante Auicennam scripserunt)
 consilium est: Nempe ut scirrhus ipsi affectibus, nullum vehe- Materia scir-
rhorum cau-
tè tractanda.
 menter excoalsaciens, siccansq; medicamentum applicetur: nam
 item quod duntaxat emolliendi atque humectandi vim obtineat.
 Quod cum superfluum humorem habet, nihil omnino dissoluit:
 quod verò minimum, plus quam oportet, exiccat. Hinc nō omni-
 no absurdè præcipiebat Avic., alternatis vicibus ad hos indicatos
 tumores modo emollientibus, modo digerentibus per halitū, utendū

Medicamenta
scirrhis ac-
commoda.

Rhasis medi-
camentum ad
scirrhus
emolliendos
& discutien-
dos.

Galenī cata-
plasma.

Si scirrhus ad
suppuratio-
nem spectet.

esse. Verum quoniam id & radiosum & factu ut oportet per-
difficile est, satius ac tutius Galeno visum est, medicamentis
mixtam facultatem habentibus, ad horum curationem utendum
esse. Eodem enim tempore, quod induratum est emolliemus, &
sensim per halitum digeremus: illis tamen ab initio aliquid quod
modicè reprimat, viri admiscendum. Ad hanc rem Avicennas
quamplurimas remediorum formulas insinuat: verum quo-
niam ea magis dicata sunt scirrhis ex phlegmone aut erysipelate
impendiò refrigerari (ut in sequenti scholio ostendemus) pro-
creatis, illis relictis assume medicamentum à Rhasē lib. 7. ad
Almansorem descriptum: facta tamen prius ab initio aliquali
influentium humorum (moderatis quibusdam repellentibus ad-
motis) repressione. Rhasis autem medicamentum ad hunc mo-
dum habet: R. bdellij, ammoniaci, galbani ana part. æquales:
terantur in mortario cum oleo de beën, seu potius ben (quod
Græci balanon myrsificen, Latini glandem unguentariam vo-
cant) aut de lilio. Deinde sime mucaginem fœnugraci, sem-
lini & ficum, pondus omnium prædictorum: terantur omnia
simul, donec in unum coëant. Galenus 14. Therap. ad eam rem
magno opere commendat corticem radicis alibæ (quam, inquit,
vulgus anadendromalachen, quasi dicas arborecentem malham,
vocat) asferino vel gallinaceo adipe liquatam, & cum eo
consensam, atque in cataplasmati formam redactam. Quod si
tumor ad suppurationem spectet, summo opere cavendum est, ne
particula laborans caloris ficis auxiliis, aut quoniam alio modo irri-
tetur: ita enim faciliè cancer accerseretur. Si verò aperiatur tu-
mor, materia iam in pus conuersa, ab usu unguentis, quod dia-
cylon nominatur, minimè tibi discendendum fuerit. At si in la-
pidcam duritiem degeneraverit, ad ea auxilia quæ scholio se-
quenti describuntur, erit accedendum, & quæ observatione se-
quenti dicemus.

OBSERVATIO IIII.

De phlegmone scirrhusa in scirrhum illegittimum, &
non exquisitum, seu in duritiem lapideam mutata.

IVVENIS quidam cum phlegmonem scirrhu-
sam istis temporibus in femore haberet, ac chi-

ruis

zurgi imperitiâ nimium refrigerata in duritiem lapideam transisset, seu in scirrhum illegittimum & non exquisitum; nos cum ad eum acciti essemus, cum axungia anserina, gallinacea & vitulina inunximus locum, & emplastrum de muccilaginibus commodè apposuimus. postea & nostrum emplastrum de ammoniaco.

SCHOLIA.

CVRANDI verò scirrhi illegittimi & non exquisiti communis indicatio est (nam signa tum causas ac iudicia superius diximus,) ut quod præter naturam in particula est, totum vacuetur. Modus tamen vacationis eius proprius est, ut lib. 14. meth. Gal. annotauit. Nam detergere (inquit) id quod contumaciter inhaeret, oportebit. Quod si quis is quæ vehementer trahunt digeruntq; medicamentis vacuare tentet, nec iis quæ excalfaciant & humectent; molliant, ac liquent; huic paucis primis diebus egregiè processisse curatio videbitur; scirrhus enim manifestò decreuisse apparebit: ceterum quod de affectu restabit, id insanabile erit: si quidem toto, quod in eo tenuissimum partium erat, digesto dissipatione; quod reliquum est, veluti lapidosa concretio linquitur. Hac igitur de causa ad scirrhosos affectus nullum vehementer excalfaciens; siccatiusve medicamentum idoneum est. Sed ea tantum, quæ cum molliendo, hoc est, præter quod molliant, digerere etiam commodè possunt: cuiusmodi sunt, tum cernina medulla, tum vitulina, tum senum bircinum, taurinum, pardale, & leoninum. Ex adipibus volucrum commendatur imprimis anserinus; quam proximè sequitur gallinaceus, & phasianicus. Ad hac ammoniacum rhomyama, id est, suffianen, galbanum & bdellium utrumque, magisq; Scythicum, quanto videlicet est humentius. Styrax quoque qui humentior est, & pinguis. Radix etiam althææ, & sylvestris malvæ, quæ passim nascitur, folia modicè antè decocta, cum anserino adipe, aut gallinaceo: vel si horum facultas non sit, suillo confusa, ad hanc intentionem apprimè sunt idonea. Prohibet autem Aricennas axungias salitas: & prædictis addit mastichen, ladanum, & sippum humidam, strigumenta gymnasiarum, quæ sordicies balneo-

Summa curationum scirrhorum.

Medulla.
Senum.
Adipes.

Gal. 14. methodi.

Strigmenta gymnasiarum.

rum appellantur, sterus asiniuum, & feces oleorum de lilio, de albauna, quod cyprinum vocant, & de cherna, quod Latini ruminum dicunt. Ceterum curatio qua per acetum administratur, utilis est huic vitio, hoc est, scirrho iam adnato, & cum preparata iam sub mollioribus pars fuerit: ut etiam Galenus antioravit. Si quidem (inquit) acciti vis, modo ea quis modicè & debito tempore utatur, salutaris eiusmodi affectibus est, seu crassos humores dissicans & resolvens: sin autem vel immoderate sit, vel in tempore non idoneo adhibeatur, remiores partes violenter obsumens, id quod reliquum est, lapidescere sinit sed & si quis eo diutius utatur, substantiam ipsam nequiorum delibaberit. Ob id igitur nec saepe, ac inter initia, nec longo tempore, medicamentis quae ex aceto componuntur, ad ligamenta & tendones, est utendum. Eam ob rem Cercilij puerum Galenus, cui ex erysipelate nimis infrigidato & vehementer adstricto, tumor durus, ac scirrhosus in toto femore relinquitur fuerat, ita curabat. Inprimis femur persudis oleo Sabino, quod omnium est tenuissimum: cuius loco hodie videntur sambacino, quod vulgus lajminum vocant, postquam vero partem sic sonisset, ammoniacum thyracina, hoc est, suffimentum, quod pingue & non ventosum esset, praedictis medullis & adipibus remixtum adhibuit. Post hac ammoniaco pinguisimo, aceto acerrimo dissoluto, circumtulit totum femur, insuper puerum altero crure salire, quo plus in id alimenti ferretur. Itaque relaxantibus, quae molliorem tumorem redderent, & digerentibus, seu resolventibus ita vitissum, ac moderatè utendo, puerum curavit. Verum in tendonibus & ligamentis scirrho obductis, aceto ex Galeni consilio, lib. 14. Therap. & 2. ad Glaucon. ad hunc modum utendum est: Lapis igni candens aceto acerrimo extinguendus est: & si quidem haberi potest, pyrites; sin eius copia non est, molaris, quem Graeci myliten vocant. Deinde ascendente post insusum lapidi acetum vapore calido, in hoc pars affecta commoveri debet, ut vaporem ascendentem recipiat, a quo scirrhus dissolvatur: atque exinde rursus medicamen quod emolliat imponendum. Oleo tamen non aqua quoridie ab initio omnino laborans particula persundenda est. Esto autem id oleum handquaquam adstringens, sed pluriè tenuium partium, cuiusmodi Sabinum est. Interdum autem

Oleum ruminum.

De aceti usu in variis scirrhosis partibus.

Historia lib. 1. ad Glaucon.

Oleum Sabinum.

Tendonum & ligamentorum scirrho curatio. Pyrites lapis.

Lapis mylites.

incoquenda oleo est althæa radix, ac sylvestris cucumeris, & si qua est eius generis alia. Sanè plurimi hac curationis ratione paucò tempore perfectè sanati sunt, adco ut multis ferè (inquit Galenus 2. ad Glauc.) magnum opus videretur. Ex his igitur constat, curationi quæ per emollientia fit iam in tendonibus, tum in ligamentis, cum scirrhusa fuerint, aliquid incidentium debere admisseri. Ex quorum numero vel imprimis accitum est. De medicamento autem, quæ vim molliendi durities obtinent, diffusius tractatur à Tagantio lib. vi. de re chirurgica. Nunc autem capita curationis scirrhorum tumorum breuiter ex eodem adiciamus. Scirrhum, qui resoluta, atque absorpta humiditate, in topheam duritiem concreuit, sensuq; omnino caret, cuiusmodi est, quem exquisitum Galenus vocat, tamquam inmedicabilem curare ne aggredior. Scirrhus non exquisitus (qui non sine sensu quidem omnino est, sed aggrè admodum sentit) medicamentis, quæ tepido calore, ac mediocri humore prædita sunt, hoc est, quæ emolliendo moderatè digerant, adhibeto. Vehementer digerentia atque immodicè exiccantia, partibus scirrhu laborantibus ne unquam admoneto: iis enim subtilior humiditas resoluitur, quod verò reliquum est, exiccatum lapidosumq; efficitur. In duris ac densis partibus scirrhu obsessis, (cuiusmodi sunt tendones,) atque aliis etiam in locis, si affectus iam inneteratus est, medicamenta quæ dissecant, atque incidunt, cuius generis est acetum, emollientibus & moderatè digerantibus misceto. Scirrhusam quoque partem hanc duram ac densam, & quamlibet aliam diuturno scirrhu affectam, super vaporem calidum, quem molaris lapis igni candens acerrimo aceto persusus emittit, collocari, ac subinde versari inbeo. Quotidie etiam aliquo tennium paruum in quo cucumeris sylvestris, aut althæa radix, aut anethum viride recens, aut id genus aliud incoctum fuerit, affectam partem perfundito. Eiusmodi desiccantia, incidentia ac crassos humores resoluentia modicè id est, non sæpe, nec longo tempore, atque opportunè, hoc est, non inter morbi initia, & interposito remollientium vsu, prædictis scirrhis partibus admoneto. In summa, scirrhos omnes, qui nondum callum contraxerunt, medicamentis, quæ commode digerendo emolliunt, curato. Scirrhusi lienis, atque etiam iecinoris curationem, medicorum prudentia committito.

OBSERVATIO V.

De cancro non ulcerato in mamilla dextra.

MONIALIS quæ ad nos venit, obscura rudimenta canceri in mamilla dextra habebat, tumorem exorientem ciceris magnitudine cum dolore & calore quasi ferientis & candentis acus; sed subinde dolorem iterum nullum habebat: quare cum ferrum adhibere nollet, post aliquot menses fabæ, deinde iuglandis & oui magnitudinem æquavit; & post annum in maiorem molem excrevit. Præter palliationem cum nulla alia remedia admitteret, postea hæc varios consuluit chirurgos, & quosdam qui perfectam curationem pollicerentur. Unde materia tum vetustate tum errore vivendi, & fortè medicamentis, quibus utebatur, longo tempore incalescebat: quo factum est, ut dolor calorque citra inflammationem eandem magis exerce-ret; & tandem pars conspicuè liuescebat & nigricabat, venæque in ambitu crasso nigroque sanguine nonnumquam turgebant. Hæc denuò cum ad me veniret, & si non integram ac perfectam curationem, saltem palliationem quæreret, consideravi ipsius cancerum nondum ulceratum esse, sed originem suam habere ex atra bile mitiore, & tamen facillimè posse exulcerari. Et quia cancer, ut dicebat Valescus, est apostema melancholicum, ex melancholia adusta generatum, ut 2. de arte curat. ad Glauc. & apud Auic. 3. 4^{ta} ex melancholia adusta à materia cholericâ: hic tamen sciendum, quod cancer modò sumitur pro apostemate duro melancholico doloroso, modò pro ulcere sequente apostema dolorosum & durum. Sic in nostra hac agra erat apostema melancholicum non ulceratum, & fiebat talis cancer ex melancholia adusta, ut 1. aph. commento 2. in perturbationibus ventris &c. Talis erat quoque

Cancer non
ulceratus.

quoque tumor ille durus in gena, illius Petri Florentij, quem diximus obser. 9. lib. 2. noli me tangere habuisse: sed hoc tempore, anno 1570, 27. Iulij, cum hæc scriberem, cum durus ille tumor cancrusus etiam vltra 25. annos latuisset, nunc latior & maior factus ac durior, vsque ad oculum tum nasum se se dilatabat, & totam genam vsque ad os occupauit. Cæterum quomodo ibi vsi simus palliantibus, locum citatum vide. Sed quod ad hanc monialem attinet; hic cancer nondum erat ulceratus, nam, vt Auicenna & Galenus 14. Artis parua, in principio est sicut faba parua, durus, rotundus, fusci coloris; & modò est cum vehementi dolore. Cancer autem dicitur vel ob suam tenacitatem, vt dicebat Valescus, quia firmiter tenet locum in quo nascitur, vel ex forma sua rotunda dura in superficie quam habet cancer. Aut dicitur cancer propter plenitudinem venarum circumquaque; sicut pedescaneri sunt in circuitu corporis eius. Differt cancer non ulceratus à scirrho seu sclerosi, quia cancer fit de melancholia adusta cum cholera adusta. Scirrhus verò seu sclerosi fit à melancholia feculenta pura vel mixta cum phlegmate. Secundò, quia in cancro adest dolor & acuitas & pulsatio, in sclerosi nihil horum inuenitur. Tertio, in cancro sunt venæ circumquaque nigrae, non rubrae, sicut in phlegmone. Quarto, cancer fit incipiendo, sclerosi non; sed sequendo alia apostemata. Quintò, in cancro adest nimius sensus, in sclerosi non. Cæterum quia hæc monialis me rogauit vt illi consilium scriberem; inprimis prognosticon feci quòd non posset curari perfectè, nisi ferro, cum iam esset confirmatus. At ipsa potius mori volebat, quàm ferro vti. & eo tempore nec ipse ei volebam consulere vt ferro extirparetur, cum eius dilatio vsque ad axillas processisset, ac timor esset de arteriis magnis incidendis: & quia hic confirmatus erat, sola pallia-

Differentia
inter scirrhum & cancerum non
ulceratum.

tionē contenta esse debebat, licet Auicenna dicat: Accidit in quibuldam hominib; ut sanetur cancer incipiens; confirmatus verò non. Quod ad curationem attinet canceri non vlcerati, hos canones à Valesco positos, & hic animaduertendos proposuimus: qualis erat hic primus canon vniuersalis, ut cancrofi ab omnibus cibis bilem atram generantibus abstineant. Secundò, & speciatim, cibos calidos sanguinemque adurentes vitare debent. Tertiò, ex Galeno 2. ad Glauc. cap. proprio, dicta sit euchy,ma, id est, boni succi. Quartò, ex eodem, in principio canceri sanguis ex media vena demendus. Quintò, venter ex apozemate epithymi frequenter soluendus: idque non tantum ad curationem iuuat, sed vitæ prolongationem, ut 6. ad Almanz. c. de cancro patet. Sextò, ex Galeni loco citato: Cum mulier cancro vexatur, non habens menstrua, si quinquagesimum nondum attigerit annum, oportet ea prouocare. Septimò, authore Haly, non sat est semel bis aut ter euacuasse, sed toties donec corpus ab isto humore sit repurgatum, quia talis humor difficile purgatur, nec mouetur propter sui frigiditatem & siccitatem. Nonò: cum victu & regimine supradicto cauendum est quantum fieri potest, ne cancer non vlceratus, vlceratus fiat. Ideò quod ad curationem particularem, procedemus primò iuxta tenorem primi canonis, ut hæc ægra versetur in aëre bono ac temperato, tendente ad caliditatem temperatam, & humiditatem. Cauebit à cibis bilem atram gignentibus: ut sunt caules, lentes, caro bubula, anseris, vinum nigrum turbidum, & secundum Rhafem carnis leporinæ, falsæ & effumatæ, caseus falsus siccus, fabæ, & legumina omnia, anguillæ piscesque limosi. Et iuxta tenorem canonis secundi caueat ab omni aromate & calidis speciebus, pipere, allio, cepis, porris, eruca, sinapi, nasturtio, raphano, & similibus; & declinet exercitium in sole in aëre calido,

aut apud ignem : sed potius conseruet se in locis
 temperatis. Et iuxta tenorem tertii canonis secun-
 dum Haly vtatur cibus bonum sanguinem gene-
 rantibus, vt sunt gallinæ, pulli, caro agriua, bœdia, 2,
 perdices, phasiani ; & secundum Rhalem, pitres
 squamosi seu in aquis mundis vel petrosi degan-
 tes. Conceditur & borago, lactuca, cucurbita, por-
 tulaca suo tempore, & in potu vinum clarum sym-
 phatum, vel ceruisia clara bene defecata: nutriatur
 vitellis ouorum forbiliū, hordeato, aurnati : &
 diæta vergat summarim ad frigiditatem & humi-
 ditatem: si autem fuerit æstas, vt nunc est, Auenenna
 dabat lac bubulum, à quo extractum erat buty-
 rium. His ita præscriptis, iuxta 4 canonem fiat phle-
 botomia ex mediana, instante autumno, & extra-
 hatur sanguis pro consuetudine: nam, vt illa dice-
 bat, consueua erat sanguinem mittere. & secundum
 tenorem sexti canonis, digeratur materia frigida &
 sicca melancholica cum syr. de fumoterræ, ex apo-
 zemate borag. bugioss. scolopend., epithymi, tha-
 marisci. Vel hoc modo, vt Laurentius Brunick
 chirurgiæ doctor insignis procedebat in iuuenula
 nobili de Mastain commorante in Aet in Hanno-
 nia, habente cancerum absconditum in mamilla
 dextra absque vlcere, sed cum maximo aliquibus
 temporibus dolore, cuius mamilla erat dura &
 multum consumpta: R. syr. de epithymo ʒ ij. syr. de
 fumoterr. ʒ j. syr. viol. ʒ ss. aquæ bugioss. borag. sco-
 lopend. ana ʒ ij. aquæ nenuphar. cicoreæ ana ʒ j. ss.
 Deinde purgetur secund. Gal. 2. ad Glauc. & Haly
 & omnes alios authores, cum ʒ iiij. epith. dissolui
 in sero caprino. Vel dentur pilulæ Haly contra me-
 lancholiam, quæ ira fiunt: R. myrob. andærom, my-
 rob. chebul., epithymi, dauci Cretici ana ʒ i. ss. erleb.
 nig. ʒ j. agar. ʒ j. cum succo fumiterræ fiant pil. da-
 tur ʒ j. Vel sic lenius purgetur, vt in iuuenula su-
 præscripta: R. cass. fistul. recenter tractæ, cum syr.
 viol.

viol. diacathol. ana \mathfrak{z} β . pul. foll. senæ & epithymi
 ana \mathfrak{z} j. zach. q. s. fiat Bolus. Et iuxta tenorem 4. ca-
 nonis hæc digestio & purgatio frequenter est ite-
 randa: quia iste humor melancholicus vtraque qua-
 litate est inobediens digestionibus, & purgationibus resi-
 stens: ideo ista frequentanda sunt. Et, ut probatur
 6. canone, si mulier habens cancerum non purgetur
 per menstrua, prouocentur ea. Postea ad topica ve-
 niemus. quale hoc est, quod dolorem in virgine no-
 bili prædicta leniebat: R. olei nenupharis, myrtill.
 ana \mathfrak{z} j. olei cheierini \mathfrak{z} ij. camphoræ puluerisatæ \mathfrak{z}
 β aceti vini \mathfrak{z} β ducantur in mortario plumbeo, &
 pistillo plumbeo, donec colorem & virtutem plum-
 bi acquirat: & post inunctionem ipse Bruninck
 prædictus pannum intinctum succo morellæ; sca-
 biosæ, adiecto cochleari vini aceti, & \mathfrak{z} ij. campho-
 ræ apponebat. & si forte ista non iuuarent, Vn-
 guentum sequens præscribebat: R. bol. armen., ce-
 rusæ, plumbi ana \mathfrak{z} β . terræ sigillatæ \mathfrak{z} ij. mucilagi-
 nis psyllii extract. cum aqua solatri, olei de cheiri, &
 aquæ nenuphar. añ. q. s. fiat ung. satis solidum, ad-
 dendo \mathfrak{z} j. β . camphoræ. Sed ne procedat, tali quo-
 que utebatur: R. tutiæ extinctæ & lotæ in aqua ros.
 \mathfrak{z} β . litharg., cerusæ ablutæ in aqua plantag. ana \mathfrak{z} ij.
 olei de cheiri \mathfrak{z} ij. cetæ \mathfrak{z} iij. camphoræ \mathfrak{z} β . pulue-
 rizada puluerizentur subtiliter, & cribellentur vsq;
 alcohol: oleum & cera fundantur simul: postea mi-
 sceantur cum reliquis in mortario plumbeo, cum
 pistillo plumbeo calido. imperauit quoque eidem
 puellæ generosæ, ut in digitis portaret lapides pre-
 ciosos, præsertim sapphiros, & ut manè fricaret pe-
 des, eos tamen custodiendo à frigiditate: commen-
 dabat & pedum lotionem. Sed cum domina illi re-
 scripisset hæc remedia non iuuisse; ipse admiratus
 denuò rescripsit ut fieret leuis purgatio cum foliis
 senæ, & fieret phlebotomia ex vena splenis supra
 paruum digitum sinistri pedis, sanguine pauco ex-
 tracto:

tracto: ac rursus præscripto optimo regimine, hoc vnguentum iterum supra mammillam vt poneretur, imperauit: R. succi plantaginis maioris & minoris morellæ ana \mathfrak{z} j β . semperuiuæ, consolidæ minoris ana \mathfrak{z} j. albumina oui tria, olei ros. \mathfrak{z} ij. aceti \mathfrak{z} j. istis simul incorporatis iussit cum panno poni supra mamillam; & panno exiccato iterum mader fieri: & asserebat, si ista fierent in mortario plumbeo, multo fore efficaciora: & volebat (vt etiam de omnibus medicamentis) vt non deberent continuari nisi ad quatuor dies: quia ab eo, vt dicit Auicenna, quod consuetum est, non fit passio. Iussit quoque vt subinde sumeret parum de theriaca optima, saltem bis in septimana: & scripsit ipsi hunc syrupum capiendum de mane antequam surgeret, & de sero vna hora ante cenam: R. cancerorum fluuiatiliū num. x. herbæ roberti, agrimonie, sanamundæ, tormentillæ cum rad. ana m. j. polytrichi, adianthos, ceterach, capill. Ven. hypericonis, scabiosæ ana m. ij. buglossæ m. j β . contundantur & coquantur in aquæ fontis lib. x. vsque ad libras i v. colaturæ addendo sacchari q. s. & fiat syr. longus, debito modo clarificatus. Sed & hoc Vng. eidem præscripsit, cum ipsa puella nobilis Louanii habitaret: R. gummi drag. dissol. in aqua solatri \mathfrak{z} j. vitellorum ouorum num. ij. camphoræ \mathfrak{z} β . misceantur secundum artem in mortario plumbeo, & fiat Vng. Hæc ipsa etiam vt fierent nostræ moniali, proposui: vel vt vteretur vng. diapompholygos, seu de tutia. Sed & hæc Bononiæ in quadam muliere Elisabetha nomine, cancro laborante ex melancholia innaturali adusta grossa, præscripta fuere: R. succi linariæ & saxifragiæ ana \mathfrak{z} β . pul. ligustri \mathfrak{z} ij. misceantur cum vnguento hoc: R. olei viol., ros. ana \mathfrak{z} j. chamomill. \mathfrak{z} ij. vng. popul. \mathfrak{z} β . litharg. aurei, cerussæ ana \mathfrak{z} iij. ammoniaci \mathfrak{z} ij. resinæ q. s. fiat ceratum. item, R. olei ros. viol. an. \mathfrak{z} j. vng. popul. \mathfrak{z} vi. decoct.

decoct. malua, viol., althææ ʒ iij. succorum solatri
 plantaginis an. ʒ ʒ ping. anteris, & castrati ana ʒ iij.
 bulliant simul omnia ad contumptionem succo-
 rum, & decoct. deinde coietur: cui addantur litharg.
 aurei ʒ j. ꝑ. tutiæ alexand ʒ ij. pul. figuſt. ʒ ʒ. pulve-
 rentur subtiliſſimè: ammoniaci diſſoluti in aceto
 ʒ ʒ. ad ignem rurfus cum cerâ albâ & refinâ q. ſ. ſe-
 cundum artem fiat ceratum: R. follicul. ſenæ, thy-
 ri, epithymi, cuſcutæ ana ʒ j. polypodij quercini
 ʒ ʒ. bugloſſ., horag., meliſſ. capill. Ven. recentis ana
 n. ꝑ. paſſule nucleat. q. j. liquit. raſæ ʒ ʒ. rad. aſpara-
 gi, ruſci, ſemeniculi ana ʒ j. ʒ. enulz campanæ ʒ ij. ʒ.
 ſemeniculi, aniſi ana ʒ iij. agar. electi tantundem: fiat
 apozema, &c. vel potius ſyr. longus, cum ſacch. R.
 oleir. ſ., myrt. ana ʒ j. ſucci arantii acetof. aceti
 roſ. ana ʒ j ʒ vng. popul. ʒ ij. aquar. plantag. ſolatri
 ana ʒ iij. bulliant ſimul ad conſumptionem liquo-
 ris: deinde modico cerâ addito fiat vng. molle. item
 R. olei myrtillorum, roſ. ana ʒ ʒ. pingued. caſtr. ʒ ij.
 aquar. plantag. ſolatri ana ʒ j. bulliant ſimul ad con-
 ſumptionem aquar., additis litharg. tutiæ, ſarco-
 cell., maſſich. ana ʒ j. antimonij ʒ ʒ. additis in fine
 cocturæ gr. v. camphoræ. Ego tamen in hac mona-
 cha, cum cancer iam proceſſiſſet, & metueretur ne
 ulceratus fieret, propoſui vt diapompholygos vn-
 guentum apponeretur: oportet enim apoſtoma du-
 rum & doloroſum cum calore refrenare, eius ma-
 lignam refrigerand., & reſoluendo: ad quod maxi-
 mè valet ſuccus granorum alkachengi ſeu morellæ,
 vt Galenus aſſertit: Vel, ne creſcat cancer, linimen-
 tum fiat ex terra ſigillata & bolo arm. in mortario
 plumbeo diu ductis cum ſucco agreſtæ aut lactu-
 cæ, aut ſemperuivæ, & ceruſa. Iſta enim valent ante
 ulcerationem, & poſt, ſecundum Haly, vt & Va-
 leſcus annotavit: & dicit Auicenna quòd illa diſta
 cum mucilagine pſylli in mortario plumbeo præ-
 paratis conferunt, & emplaſtrum de cancriſ fluia-
 tilibus;

tilibus, cum chimia, id est, fecce auri vel argenti, vel aliquibus similibus virium alijs medicamentis.

S C H O L I A.

QUOMODO cancri fiant, & in quibus locis, diximus abunde lib. 17. obser. & curatum nostratum medicinalium, cum de mamilla affectibus scriberemus. potissimum lib. 17. obs. 24. & 25. de cancro in mamma. plurima etiam diximus de canceris ulceratis & non ulceratis, & de canceris oculis lib. 28. obs. & cur. medic. obs. 46. & 47. cum de vteri cancro loqueremur. Quare hic de canceris qui etiam in alijs locis maximè adnatis, exterius euenire possunt, pauca dicemus. & primò de cancrosum tumore, quem vulgò cancrum apostemofum vocant, vel non ulceratum. Secundò de cancro ulcerato. Cancro enim nomen medicis & chirurgis æquiuocum est: eius enim significatio ad duo morborum genera extenditur: nempe ad canerosum tumorem (quem vulgò cancrum apostemofum vocant) tam euidentem, hoc est, in summa corporis parte hærentem, quàm absconditum, ut qui in penitioribus & latentibus corporis partibus est, sede nimiam, palato aut sinu muliebri conditus: & ad cancrum ulceratum. Vterque affectus gignitur ex atra bile, hoc est, eiusmodi natura sicco, cuiusmodi est fax in vino, & amirca in oleo, ut 14. Therap. & lib. de tumoribus præter naturam Gal. testatum reliquit. Vbi autem misit fuerit succus, huiusmodi latentem seu occultum cancrum, sine ulcere progignit. si verò acrior maligniorq; contingit, tum erodit: & cancrum facit cum ulcere: de quo scholio sequenti dicemus. Hic autem solùm sermonem faciemus de cancro in extremis partibus constituto, & nondum exulcerato, qui & ipse quandoque oculum Galeno dicitur. Estigitur cancer, de quo hic agitur, tumor durus, inæqualis, rotundus, venosus, id est, venas habens in circuitu turgidas & exaltatas, lineas sine succo, & (ut Paulus ait) colore magis, quàm inflammatione nigricans, calidus, sed non adeò, ut inflammationes subito accrescens, agros maximè fatigans: & perpetuo ferè dolore affligens. Græcè καρκίνος & καρκίνωσα dicitur. Hanc appellationem habet à cancro aquatico animali: quoniam circa hunc implentur & intenduntur venæ, cancrorum pedibus, a glo-
biere illo corporis descendentes, per similes. Nonnulli verò inde

Cancro nomen ad duo morborum genera extenditur.

Cancro quoniam ore gignatur.

Cancer sine ulcere.
Cancer cum ulcere.

Cancro tumore de-
scripto.

Quare cancer nomen hoc vitium sibi adoptauit.

fic.

sic nuncupantur, quòd difficillimè ab his partibus, quas obse-
derit, enollatur, quemadmodum cancer aquaticus animans:
is enim loco, quem semel apprehenderit, persinaciter hæret.
Adde quòd & hic tumor canceri animalis colorem represen-
tat, nempe subnigrum. Caterùm prima canceri istiusmodi ru-
dimenta iam confusa interdum exiguaq; sunt, ut vulgus ipsum
latere possint: vix enim, dum adhuc incipit, ciceris aut fabæ ma-
gnitudinem aequat. Quare nihil miri est (inquit Galenus lib. 14.
Therap.) si vulgus tunc lateat, non secus profectò quàm stirpes,
quæ è terra iam exeunt: quoniam hæc quoque peritis tantum
agricolis agnoscuntur. postea verò in tantam molem attollitur;
& iam vehementia, & magna & cunctis evidèntia adfere
symptomata, ut ne puerum quidem clam sint. Itaque tunc nemo
de appellatione ambigit, sed nominant vno assensu omnes eius-
modi affectum, cancerum: quoniam (ut diximus) venæ in hoc
morbo ex utraque parte intumescunt, distendunturq;, ac figuram
omnino similem cancro representant. Ad signa itaque & indi-
cia canceri evidèntis & non ulcerati ut perveniamus, cancerosus
tumor (ut superius dictum est) duritiem habet, & inæqualita-
tem, quæ tactu facile deprehenditur. colorem præfert lividum,
sive fuscum, qui inter rubrum & nigrum medius est; Græci
αἰδώς vocant. Circa locum cancro affectum, quidam illius qua-
si punctum illati sentiuntur: interdum etiam torpet Celso. Venas
ostendit in circuitu tumentes, & exaltatas, canceri bronchio-
rum modo: nonnumquam etiam in quibusdam delinescunt; ta-
menq; is locus, alius dolorem adfert, in alio enim non habet. Re-
nixa quoque huic tumori valens est, ait Galenus 14. Therap.
Adhuc extraneam quandam caliditatem habet. Cancer seu car-
cinoma à toto genere morbus est gravis & perniciosus. Vix enim
vngquam propter succi crassitiem consanescit, vix quòd nec
repelli nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat. Sed
& tanta eius vitii malignitas est, ut minora plane contemnat
remedia, illiq; (ut dici solet) medium unguem pertrigat: vehe-
mentioribus verò, veluti crabro irritetur exaulescatq;, atque
efferetur. Id vitium in quacumque corporis parte oriri consuevit, sed
maximè in partibus superioribus circa faciem, nares, aures, labra
& manus seminatum, atque earum præcipue, quæ à natura

Canceri notæ
per initia
confuse atque
obscuræ.

Notæ canceri
evidèntis
non ulcerati.

Iudicia.

Celsus lib. 5.
Gal. lib. 2.
ad Glauco.

purge.

purgationem menstruorum non habent. Sed vitis etiam plerumque accidunt cancri, quibus aspera per menses purgationes suppressa sunt: per has enim turbidus ac crassior sanguis (unde prima vitium hoc rudimenta accipit) expurgari à natura consuevit. Porro cum humor ipse melancholicus feci viciaria proportionem respondens, in particulam aliquam defluit, ibique, impactus manet, interdum varices facit, aliquando verò cancerum, utpote cum ipse deferbuerit. Cum verò ad exitum vniuersam expellitur, sic is morbus, quem elephantem nominant. Est itaque cancer particularis quidam elephantiasis, quam vulgus malè lepram appellat. Dicit Galenus 2. ad Glauc. cap. proprio, quòd cancerum incipientem multoties sanauerit, sed magnitudine eleuatum sine chirurgia nullus sanauit, idem & in Arse parua dicit. Quanto autem sanguis ex quo ortum habet cancer, crassior fuerit ac nigrior, tanto deterior affectus eius est. qui enim sanguinem minus crassum habet, magis obedit purgationibus & pharmacis. Et, dixit Auicenna, accidit in quibusdam hominibus, ut sanetur cancer incipiens: confirmatus verò non. Hinc & Leonus. Hoc malum per sui initia, prius quàm in membro figatur, curari potest. Sed ubi in molem satis insignem attolitur, insanabile efficitur. causa dicta est superius. Hinc quoque dicebat Rhasis 7. ad Alinanz. Cancer est agriundo in qua est maxima sarigatio: & ferè incurabilis est. cui si cum incipit succuratur, ut deest, & regatur, forsitan stabit ut est, nec augmentabitur. Cancer verò confirmatus non curatur, nisi cum omnibus suis euellatur & extirpetur radicibus & venis. Sic etiam Tagantini. Cancer autem iam confirmatus (ut dicitur) atque inneteratus, curationem non admittit, nisi radicibus extirpetur, aut per sectionem scilicet, aut per vitionem: Verùm qui in penitioribus corporis partibus constituti sunt cancri, talem curationem non desiderant, ut sequenti aphorismo nos edocuit senior ille medicorum facili princeps Hippocrates, inquit Aphor. 38. lib. 6. Cancros oculos omnes melius est non curare: curati enim citius perent; non curati verò, longius tempus perdurant. Experientia namque (ut in Commentario huius aphorismi Galenus testatur) compertum est, omnes qui huiusmodi cancos sectione, aut vitione curare tentant, illos magis irritasse, & breui homines interemisse. Soli

Qui cancri
radicitus tol-
li debeant, &
qui non.

Radices can-
cri quæ.

Cancer ex-
ulceratus
pessimus
sæctus.

Quæ notæ in
cancro futu-
ram exulce-
rationem
portendant.

Triplex cu-
rando cancro
scopus pro-
ponitur.

Primus
scopus.

itaque cancri illi curationem huiusmodi admittunt, qui in sum-
ma corporis parte hærent, quique exulcerati sunt. & adeo labo-
rantes fatigant, ut & ipsi vltro chirurgi manum efflagitent; &
simul in talibus partibus cõsistant, quas refecare & exutere vna
cum radicibus possumus. Voco autem radices cancri, cum Galeno, eas
venas quæ pleuæ sunt sanguine melancholico, & undique ver-
sum ad loca circumstantia extenduntur. Ceterum ex cancro non
ulcerato non ratio sit ulceratum (ut longo postea tempore nostræ
enent moniali, quamquam tunc adhuc chirurgum quidam ineptum
veniens Dordraco, huic pollicebatur sanitatem: postea ipsa obum-
pta miserie modis tandem vitam & morte mutauit) putrescente
scilicet spacio temporis humore, in vasis delitescente, vel irritato
à medicamentis inconsulte admotis, affectum. Hunc autem exulce-
ratum cancerum pessimum esse indicant omnes, & vera curatio-
ni (quæ omnia mouetur & agit, ut laborans particula ad sanita-
tem perducatur) prorsus ineptum. Hic enim ad perfectam atque
absolutam sui curationem mordentia, aspera, ac vehementia de-
sideraret medicamenta. Atqui (ut diximus) talibus magis irrita-
tur, efferturque, tantum abest, ut sub eis vel mitescat, vel consue-
scescat. Proinde satis fuerit si cancos non ulceratos, etiamnum
summa corporis occupantes, præsertim maiores & iam inuetera-
tos, prohibeamus augeri, à perfecta quidem curatione manu sub-
trahentes. Quod & superiore aphorismo nos commonuit Hippo-
crates. Cancros enim eos, qui sine exulceratione fatigant, etiam
(Galeno auctore) occultos nominauit. In quibus sanè exulceratio-
nem minantur, vehemens caliditas & pulsatio. Ceterum, quod
ad curationem cancri non ulcerati adhuc incipienti & nondum
inueterati, summa corporis occupantis, attinet; curatio cancri non
exulcerati & adhuc recentis tres habet scopos præcipuos. Primus
est, humoris melancholici generationem prohibere. Secundus est,
succum melancholicum genitum & per totum corpus dispersum
vacuare. Tertius, humorem, qui locum affectum occupat, vel re-
gerendum vel digerendum omnino; adhuc, patienti laboranti
robur adferendum esse insinuat. Primus scopus perficitur ea vi-
uendi ratione ad vngue obseruatâ, quæ supra in capite de scirrho
legitimo nominato, iam obseruatione præcedente præscripta est.
Id autem inter cetera maxime ac præcipue obseruandum est, ut

is, qui hoc affectu laborant, ea alimentia offerantur, quæ refrigerandi atq; humectandi vim sortita sunt: quæq; protin ac tenuem succum, in corpus ingesta, generant. Cuiusmodi sunt, cremar. bordei, pisces saxatiles, omni generis aues, præterquam palustres: onorum, sed maxime sorbilius (quæ Græci ποφτὰ vocant) lutea; & quæ eius generis sunt alia. Quod si caliditas effata digna, citra febrem tamen, in patienla laborante adsueris, lac bubuli, à quo butyrum fuerit extractum, vel ierum lactis initio offerri potest. Sed & olea, quæ refrigerantia atque humectantia natura sunt, velius malua, atriplex, blizum: & quando tempus iuleris, cucurbita, item cistrulli & borago illi in cibum permittuntur. Secundu scopus, qui est, totum corpus ab humore melancholico, unde vitium hoc originem traxit, repurgare, compleitur purgantibus medicamentis vacuanda dicta bili accommodis, in capite de scirrho superius enumeratis. Sed ut seriatim & per ordinem progrediamur, purgationem ordiemur, lenitq; alio, à sanguinis detractione. & modo etas & virius permiserint, vena incutenda in gibbero media. Mox humorem præparabimus syr. de sumaterra, de acetofo, de bug. inde enacnabimus, semper à lenioribus & simplicioribus incipiendo; & ab ip'o epithymo (quod Romani inuolucrum vocant) pondere quatuor drachmarum in sero lactis mulsive, ut Galenus præcepit lib. 14. Meth. Ea autem quantitas epithymi, vel paulo maior, tertio quoq; die offerenda est, ut scilicet melancholicus humor, qui in venis collectus est, & cancro generationem dedit, sic sensim atq; ex interuallo vacuetur: quau- doquidem vniuersum simul enacnare vix datur. Sed nec semper prohibere possumus, ne deinceps eiusmodi succus in corpore generetur, & in venis colligatur. Itaq; materia eiusmodi antecedenti purgatio, sic per initia quidem simplicium aliquo, per vices molienda est. Deinde, si res ita existeret, antequam ad fortiora veniamus, compositorum aliquo utemur. ut, R. electuarij lenissimi, diacathol. ana ʒ v. confectiois hamech ʒ ij. misce: & cum decocto stanni & fructuum cordialium, & myrob. chebul. & emblicorum fiat potio breuis. Vel exhibenda postea hiera Russi, vel Apicenna, quæ nigrum veratrum recipit. Nec ab illi quidem ita repetitis purgationibus prius desistendum est, quàm totus ille succus melancholicus extractus fuerit, & pars non amplius tumesceat.

Vitius ratio
tenuis sit, bo-
nique succi.

Secundus
scopus.
Humoris me-
lancholici
vacuatio.

Vena sectio.

Epithymum.

Sensim ac
blandè, non
secul atque
assatim pur-
gandum in
cancro.

Hiera Russi.

Hiera Aui-
cennæ.

Quod si nihil obstituerit, hoc est, si aias, & vires permiserint, etiam, ut diximus, sanguinem misceamus, & postea purgabimus: & si fuerint mulieres, menstrua euocare utile erit, si quidem nondum quinquagesimum annum attigerint, ut lib. 2. ad Glauco. Galenus nos admonuit. Hæc secunda indicatio omnium prima est Galeno, quæ verò primo loco posita est, secundum ordinem sibi iure vendicat. Communis namque (inquit lib. 14. Methodi) indicatio curationis in cancro est, humorem unde vitium est natum, illico vacuare: mox verò prohibere, potissimum si fieri potest, ne de cætero eiusmodi succus melancholicus in vena colligatur: sin id fieri nequit, saltem eum omnino ex intervallis vacuare; & simul particulam firmare, ne quid humorum redundantiæ ad eam confluat. Sed, quod omiseramus, si hæmorrhoides in viris, quibus emanare consueverant, suppressæ sunt, recludantur. Tertia igitur indicatio (quæ omnibus eiusmodi affectibus ex fluxione creatis communis est) nobis insinuat humorem, qui in particulam affectam procutuit, vel regerendum esse, vel digerendum omnino: adhuc particulam firmandam esse, ne quid humorum redundantiæ (ut supra diximus) ad eam confluat. Porro repellendi quod influxit, tempus accommodum erit, in principio quidem, tam in ipso purgationis tempore, quam ante. Vbi verò iam totum corpus exquisitè purgaueris, tunc digerendi dabitur occasio. Verum si mediocris tantum purgatio præcessit, mixtam habere facultatem quod applicabitur medicamentum conveniet, reprimentem scilicet, & digerentem. Sanè, ut hæc intentiones ritè assequaris, deligenda tibi erunt medicamenta, quæ viribus quidem sunt mediocria, qualitate verò minimè mordentia. Talia enim huiusmodi affectibus solum sunt idonea. Nam quæ imbecillius vires habent (ut Galenus ait lib. 14. Therap.) nullum opera præstare efficiunt, sed vincuntur. Quæ verò valentiores sunt facultate, vehementer quidem tentiores, quæ in vena sunt, sanguinis partes, vel digerunt vel recludunt; crassas verò & melancholicas, quas faci prius assimilamus, nec euocari, nec reprimunt; quoniam potius eas ad solvendum ac discutendum continuaces reddunt. Ad sanandos igitur incipientes cancris, medicorum virinum medicamentis est opus: quæ scilicet nec propter imbecillitatem vincantur, nec propter effectus vehementiam,

Tertius
scopus.

Quid in prin-
cipio & si-
mul ipso pur-
gationis tem-
pore agen-
dum.

Quod aptum
medicamen-
tum canceris.

Valer.

valenter sanguinem incrassare valeant: adhuc item (ut dictum est) quæ omnino hand mordeant: quandoquidem vitii malignitatem ab iis quæ mordent irritatur, ac (ut dici solet) efferatur. Ceterum cum materia ex qua ortum habent canceri, magnâ ex parte crassa sit, repulsiōni, ac etiam resolutioni contraria, sine inobediens, multaq; malignitatis particeps, sat fecerimus (ubi saltem periculum ex chirurgia imminerimus, nec curari affectus aliter possit) si usu præcedentium medicamentorum, ex vtilis elotiq; metallicis (ut Galenus consulis) acceptorum, ipsos angere prohibeamus, & præsertim si maiores fuerint: aut iuxta Aulienæ sententiam, eos ab ulceratione vindicemus. Ad quas intentiones lib. 2. ad Glauc. succum solani. & medicamen ex pompholyge constans, aut quod ex chalcite sit (diapalma vulgò appellatur) magnopere Galenus commendauit. Proinde Theodoricus ad eam rem ung. instituit diapompholygos nominatum, quod eidem recipit olei ros., cera albæ ana ℥ v. succi granorum rubrorum solani ℥ iij. cerussa lota ℥ ij. plumbi viti & loti, pompholygos (quæ, initia vulgò dicitur) ana ℥ j. thuris ℥ ss. Refert quoque Galenus lib. 1. de compositione pharmacorum secundum locos, unguentum quoddam ex Apollonio ad manantia capitis ulcera, quæ Graci achoras vocant, institutum: quod ad eiusmodi taucrosos tumores adprimè vtile esse adfirmat. Recipit autem olei vel rosacei vel omphacini (id est, immaturi) heminam, quæ Graci Coryte dicitur; quod in pilam plumbeam infusum tenuissimè (sub sole) cochleario etiam plumbeo agitari debet, aut pistillo plumbeo terri, donec crassescat nigrescatq; adeo ut plumbi colorem referat. Deinde seorsim conterito lithargyri lib. 1. cerussa tantundem, & cum oleo commisceto, ac fiat unguentum. Sed & hanc descriptionem fieri vidi in Italia ipsius diapompholygos: R. olei ros. lib. j. ss. cerussa lota ℥ iij. cera albæ ℥ x. plumbi viti, initia preparata ana ℥ iij. succi granatorum, solatri viridis ℥ vii. thuris albi ℥ j. ex cera & oleo fiat ceratum: dimittatur in frigidari: postea puluere misce, in fine verò succum solatri: & in mortario bene commisce, & malaxetur manibus; & fiant magdaleones. Sed & aliud ung. diapompholygos Bononiæ in usu est ad cancos: R. pul. plumbi viti loti, pompholyg. olivani ana ℥ iij. absinthij (credo quod intelligunt succum) ℥ ij.

Succus solani.
Diapompholygos.
Diaphorcinæ seu diapalma.
Unguentum diapompholygos Theodoric.

Apollonii medicamentum.

Hemina capiti
℥ vii. & ss.

Alia descriptio diapompholygos.

Plumbi vis
mirabilis in
canceris
umoribus.

Paulus lib. 4.
ex Arcan-
gece.

Chirurgia in
capitis te-
merè non
adhibenda.

cera 3 in olei ros. 3 v. una lupine, id est solarii, nempe bacca
seu fructuum succi q. s. At descriptioni diaphorhologos Theodo-
rici adicere licet interdum lemnium sigillum, bolum arm. suc-
cum sempernini vel una acerba in plumbeo mortario, cum pi-
beo pistillo usque ad glutinis consistentiam subacta. Porro quan-
tum valeat facultas plumbi, praesertim combusti & eloti, in om-
nibus cancerosis dispositionibus, satis superque noverunt omnes, qui
de hac re periculum aliquando fecerunt, & qui attentè legent
quae scribit Galenus de plumbo (quod molybdos Graecè eadem di-
citur) lib. 9. de simpl. medic. facultatibus. Ad eandem morbosam
dispositionem Landarunt Paulus & Anicennas emplastrum ex can-
ctu flumiatilibus, praesertim si parem modum cadmia receperit.
Cancrorum igitur flumiatilium crematorium & cadmia par mo-
dus in pollinem coactum inspergunt, aut cancerosis una cum
cerato inspergunt. Paulus etiam cum symphyto apponendus, ita
quantitatem moderando, ut aggraves item rose, melilotum, pap-
sem cum passo trita, & paululum decocta, ac subinde cum luteis
ovorum subacta applicanda praeterea hoc malo correptis data sunt
medicamenta quae venenatis adversantur, ut est iheriacà &
antidotum mithridaticum. Sed & idem Anicennas iubet minu-
tos cancos, in quibus locis apprehendi possunt, radicem esse ex-
tirpandos, excidendosve: facta verò excisione huiusmodi crasso-
rem sanguinem circumquaque exprimendum esse, deinde cancrio
locum esse adurendum. Hoc enim reliquias materiae dissipat &
absorbet, membrum roborat, & haemorrhagià prohibet. Galenus
etiam ante Anicennam cancos interdum per chirurgiam extir-
pandos esse permisit, lib. 14. method. medendi, ut de cancro ulce-
rato postea dicemus. Verum enimvero, tametsi curationem hanc,
quae per chirurgiam fit, Galen. & Anic. permittunt, ad vitandum
tamen haemorrhagiæ & ulcerationis, imò verò & vitæ agrotan-
ti periculum, ea omissa, curandi rationem praescriptam, quae solis
lenibus & quasi adblandientibus medicamentis fit, tamquam ra-
tione & minus calumnia exposita, amplecti, atque ea sola con-
senti esse debemus. Quandoquidem, si eiusmodi tumor cancerosus,
qui iam in molem insignem crevit, quae sanis partibus coniungitur,
eodem circumcidatur, statim immodice profusionis sanguinis, pro-
pter vasorum magnitudinem, maximeque arteriarum, periculum

Immitte. Quas venas si laqueis (inquie Galenus) interceptas, consorij iure alia partes afficientur, & ingenti dolore cruciabuntur. Adde, quod excisa carcinomata (ut Celsus ait lib. 5.) etiam post inductam cicatricem tamen reuerterunt, & causam moris attulerunt, quod & ego ipse experientia ita fieri cognoui, ut post abscissam mammilla cancerosam, cancer postea denno redierit, mortemq; intulerit. Sin eius mali radices exurere velis, neq; hoc quidem sine graui laltura vicinarum partium fiet, praesertim si iuxta principes partes exussio fiat. Itaq; canceri maiores, & qui iam inueterauerint, neq; ferro temere adurendi sunt, neq; scalpello excidendi, sed blande potius, ac leniter (ut diximus) tractandi. Pleriq; enim nullam vim adhibendo, qua tollere id maius sentent, sed imponendo tantum lenia medicamenta, quae quasi blaspdiantur, quo minus ad ultimam senectatem perueniant, non prohibentur. Reliqua quae ad huius operis complementum seu absolutam cancro tractationem attinent, scholio sequenti de cancro ulcerato, tum locis iam superius citatis, requirenda sunt. Interim capita curationis tangi non ulcerati adhuc incipientis, & summa corporis occupantis, ex Tagazio hic apponemus. In cancro incipiente, & qui ex humore non admodum crasso constat, nec venas valde tumentes exerit, humorem melancholicum, unde hoc genus vitij nascitur, a toto corpore imprimis vacuato. Ergo si atas & vires ferant, secta in cubito vena, sanguinem primum, quantum res ipsa efflagitat, mittito. Deinde medicamentabilem acram per alium exigentia, initio blanda, & mitiora, postea vehemensiora, exhibeto. Si menstrua in mulieribus ante quinquagesimum annum, aut marisca tum in eis tum in viris, ex internallu sanguinem fundentes suppressa sint, illas modis omnibus promouato. Interim tenuem victus rationem & qua probum succum ac minorem melancholicum generes, instituito. Si prohibere non possis, quo minus succus crassus & melancholicus in venis colligatur, eum ex internallo tum simpliciter, tum compositis medicamentis vacuato. Remedia affectu parui ante purgationem, & in ipso purgationis tempore, repellentia; ubi vero corpus integre repurgatum est, digerentia, viribus mediocria, & qualitate minime mordentia adhibeto. Ergo salani succum, vel medicamentum ex pompholyge, aut quod ex chalcie sit

(diapalma vulgo appellatur) atque id genus alia dolenti loco admovento. Quod si per chirurgiam cancerum sanare andebis, melancholico humore prius medici consilio repurgato, quod vitiosum est, prorsus excidito, & sanguinem satis multum effluere finito, crassiorémque ex vicinis partibus exprimito, atque affectum tandem similiter reliquis ulceribus sanato.

OBSERVATIO VI.

De cancro ulcerato in mamilla dextra, qui postea mortem intulit.

CECILIA apud Clarissas Delphenfes cùm cancerum inueteratum & magnum in mamilla dextra longo tempore habuisset ulceratum, ita vt toto vitæ meæ tempore maiorem mamillam non viderim induratum; tandem hic cancer adeò exedens detegebatur & exulcerabatur, vt corruptæ carnis speciem exhiberet, cum fœtore, & cum sordida illuue, horrido aspectu, labris præduris & inuersis; quæ omnia signa in cancro ulcerato esse solent; adhæc sanies tenuis nigra subinde & fulua manabat; vapor expirabatur, cordi, ori, cerebroque grauis febris assidua, eaque lenta inerat, frequensque animi defectio, quæ præsertim cùm cæcer in mammis inhæret, adesse solent. iam quoque exesis venis sanguis adeò profundebatur, vt chirurgus Guilhelmus de Dalem, qui eam tractabat, sanguinem reprimere non posset: cui accedebat & Cornelius Ericius confrater meus, vt eam consilio suo interdum iuaret, aut saltem subinde inuisendo alacriorem redderet, & aliqua ex parte consolaretur. Erat autem tantus fœtor, vt ego ipse, dum à chirurgo medicamenta adhiberentur, semel ex vehementi odore in animi deliquium inciderim. Et profectò vsque adeò malignus erat cancer, & ita longè lateque se se dispergebat, vt neque chirurgus prædictus ferro eam tangere auderet, quamuis pau-

cis antè annis in alia sororcula in mamma can-
 crum (tamen non vlcerat) excisione curauisset,
 nostro & Cornelii Ericii consilio, quæ adhuc dum
 hæc recolligerem, nempe anno 1590, viuit. Sed hic
 cancer adeò inueteratus & malignus erat, vt neque
 incisione neque corrodentibus medicamentis per
 chirurgum curari posset, vlcératione etiam totam
 mammam ferè occupante, & sanguine feculento
 axillares arterias replente. Quare, cum de plena cu-
 ratione desperarem, adhibitis solummodo reme-
 diis blandis, vt aquâ plantaginis, cum cerussa, si san-
 guis profunderetur, tum aliis cancerum vlcerat
 mitigantibus, palliatio ad tempus fiebat per eun-
 dem chirurgum. Sed cum sua malignitate paulatim
 talis cancer (quali similem numquam vidisse me
 recordor) proreperet, non solum carnem, sed &
 alias partes solidiores depascens, non diu post hæc
 ipsa magnâ cum miserâ quasi cadauerosa, cum nos
 & Ericius & ipse chirurgus prædictus vix fœtorem
 toleraremus, vsque adeò vt chirurgus eam non satis
 bene tractare posset, tandem obiit, anno 1570, sub
 finem Iulij mensis.

SCHOLIA.

CANCER hic vlceratus ex calidiore & acriore fit humo- Causa canceri
vlcerati.
 re, vt & scholio præcedente diximus. Habet quidem eandem
 causam cum superiore, nisi quòd humor atrabilarius magis sit
 acrior, unde & exulcerat. Signa quoque in hoc differunt, quòd Signa.
 in cancro vlcerato, præter dolorem, duritiem tumoremque vlcera
 erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurimâ ex parte sordida, labris
 prætimidis, aspectu horrenda, & concretâ humorum collumie
 ingrata. Quæ verò (inquit Paulus) pura videntur, secientia,
 linida, atque interdum etiam subrubra & eruenta apparent: sa-
 nies inde manat continuò tenuis, aquosa, nigra, aut fulua, præ-
 nitens olens. De prognostico scholio præcedente satè dictum est.
 Sed quod ad curationem canceri vlcerati attinet: scholij huiusmodi Ratio curan-
 dicancrum
 cancrum per chirurgiam curare audeas, læpisse quidem (vt ait exulceratum.
 Gale.

Vacuatio.

Excisio.

Vide Paul.
lib. 6.

Vtlo.

Cantharides.

Corrosio.

Carcinoma
mitiora con-
tinent re-
media.Arsenicum
sublimatum.

Gal. 14. Therapent.) à vacuando per purgationem melancholico humore oportebit: ubi verò totum quòd vitiatum est, prorsus excideris, ita ut nulla supersit radix, sine effluere sanguinem: nec propter enim inhibebis: imò premendo potius vicinas partes, exprimes ex his crassiores; mox curabis eo modo quo alia ulcera curari consueverunt. Sunt qui exciso carcinomate, & crassiore sanguine ex circumstantibus partibus expresso, ferramentis igni candentibus locum adurunt. Alij cum partem aliquam corporis carcinomata eiusmodi, quod cum ulcera est, occupavit, hoc (si locus non refragetur) circumcidi opus esse tradunt, dein vimolentius aduri, tritaq; cātharides ex alumine & cyprino oleo superponi. Alij verò à sectione & vssione qua sit ignito ferramento, abstinentes, corrosione valida ex adurentibus medicamentis facta vitium hoc totum extirpant & destruunt. Porro medicamenta eiusmodi si quando adhibenda sunt, valentis admodum facultati esse debent. Nam, ut scribit Hippocrates, extremis morbu, extrema remedia adhibenda sunt. Tanta autem est huius vitij malignitas, ut mitiora planè contineat remedia. Inter cetera verò prestantissimum ac tutissimum auxilium in hoc affectu Gnidoxi à Carliaco predicatur, arsenicum sublimatū, cuius egregias dozes supra iam multisies commemoravimus, & in sequentibus adhuc celebrabimus. Hoc (inquit Theodoricus) cancerum, lupum, ischiome-num (hoc est, sphacelum seu fiderationem) noli me tāgere, fistula, & tales omnes pessimos morbes, prima die occidis & extirpat. Ceterum & ipse Valescus refert de medico quodā & chirurgo, qui cancerum, ulcera sibiarum antiqua succo solani vel plantā-ginis fovebat, in eo posito pulvere arsenici; pannumq; in eo madefactum superponebat: & sanabantur multi cum adiutorio Dei & illius medici. Ceterum magna locorū circumstantiā interim dum hac admonentur, cura semper habenda est, ne scilicet ea ipsa inflammatione atq; humorum confluxu occupentur: quod incommodum facile deueniatis ipsū arsenicum sublimatum instā quāritate & legitimo modo adhibendo (quā quantitatem coniectura tantū artificiali rationali definit medicus) partesq; vicinas & carcinomata cingentes, bolo armeno, vel ung. de bolo arm. & succo solani, & id genus aliis illinendo. Inter adurentia & multum corrosiva, abq; tamen dolore, connumerantur pulvis mercurialis,

ex inuentione Iohannis de Vigo. Vbi autem ipsum arsenicum, effectum quem desiderat, praestiterit (quod ex loci inflatione sine timore, & mora tridua deprehendes) dolor mitigandus erit, & crusta casus hoc emplastro prostranda: R. decoct. althaeae, maluarum, violanae li. ij. statim hordei q. s. uisce: inde bulliant ad spissitudinem, quibus adde olei rosae, olei violati ana. 3 j. Interea ononum hum. y. croci parum. Cancro vero sic penitus extincto, ac radicibus extirpato, vltus ipsum quod remansit, similiter aliis causis ulceribus curabis. Carcinoma autem prorsus extinctum agnoscas, si proba & sana caro appaeruerit, si & nulla virulencia prolapsa se in parte affecta ostenderit, nullaq. amplius graeolencia, eorum qui proxime astant, naves offenderit. Ceterum soli illi cancri etiam cum ulcere consistentes, curationem eiusmodi, quae vlsione vel sectione fit, admittunt, qui in summa corporis parte haerent, quique ad rem laborantes fatigant, ut ipsi vltro (inquit Galenus) chirurgi manus efflagiant, & simul in talibus pariter consistent, quae rescare & exuere una cum radicibus possit. Sed cum hac curandi ratio, non sine graui aegrotantis periculo (ut supra scholio precedentie de cancro non ulcerato monimus) administrari possit, temere adhuc in talibus adhibenda non est. Itaque si in penitioribus corporis partibus consisterint, si cancri istiusmodi, aut in talibus quidem consistent, quae nec adurere, nec excindere una cum radicibus possit, vel si loca principibus membris vicina occupent, vel laborans ob virum imbecillitatem tale curationis genus suslinere non possit, aut forsitan euentus hac subire non velit, adhuc si ex hac curandi ratione deterius aliquid malum sequeretur: breuiter si periculum ex chirurgia, id est, sectione, aut vlsione, timeamus, nec curari affectus aliter possit, sat fererimus, si hunc angere prohibeamus proba in primis vitae ratione, & commodis vacationibus, selig. lenibus & quasi adblandientibus medicamentis viuentibus: a vehementibus vero & acerbis prorsus abstinere. Ergo imperanda egru talis vitae ratio est, quae tenuis sit, bonit. q. & minime melancholicum succum generet. Quod si ob iecoris caliditatem & siccitatem excedentem, prohiberi non possit, quin crassus & melancholicus in corpore sanguis procreetur, cibis refrigerantibus, & humectantibus erit viuendum, quibus hepatis intemperies paulatim emendetur. Connexum itaque in hoc affectu piisane cremet,

Lexit. ni. effe.
Aus. arsenici
notiz.

Extincti car-
cinomatiz
notiz.

Quinam can-
cri ulcerati,
vlsionem, aut
sectionem
desiderent;

Quibus can-
cri duntaxat
adblandien-
dum, vera
curatione
omissa.

Vitae ratio
in cancro
ulcerato ob-
seruanda.

Succus me-
lanchollicus
ex intervallo
vacuandus.

Ung. loco
affecto im-
ponenda.

Succus so-
lani.
Ung. album.

Lamina
plumbæ.
Modus vrēdi
succo solani.

Ung. ad can-
cros vlcera-
tos.

cremor, lactiq; serum, vinum paucissimum & aquosum, pisces
saxatiles, atque omnis generis aues, præterquam palustres. Ex
oleribus malua, asriples, blicum, cucurbita, atque id genus alia.
Actium esus, & repletio omnis vitanda. Sed & crassior ille suc-
cus, qui in venis colligitur, ex intervallo viacnaudus erit, interdum
purgante medicamento, interdum (nisi quid prohibeat) vene-
sectione. In mulieribus quoque, si quidem liceat per ætatem, men-
ses euocandi; atque etiam in viris hæmo rrhoïdes (si eas pati con-
sueverunt) proritanda. Locò autem affecto imponenda remedia
sunt, qua dolorem leniant, & isa ipsam firmare possint, ut nihil
redundantia humorum amplius excipiat, quæ item refrigerent
& exiccant, minimè verò mordenæ aut irritent: cuiusmodi
sunt solani succus, vel aqua distillata: cum succi copia non est,
plumbum vstum & elotum, ung. album, quod habet cerussæ in
aqua ros. loræ ʒ i x. litharg. albi lori ʒ v i. olei ros. lib. j. cera al-
bissima ʒ iij. vel paulo plus: confice secundum artem. Nec mi-
nus confert ung. ex lithargyro & plumbo vsto: ex pompholyge
quoque, scholio præcedente descriptum: aut aliis id genus metallicis
vstis & elotis. Aqua etiam, ut vncant, camphorata similiter
& succi in mortario plumbeo ducti huic vitio efficacissimè ad-
mouentur. Lamina quoque plumbea maximo & panè incredi-
bili usu canceris ipsis exulceratis super inducuntur. Modus autem
vsum succi solani (quod medicamentum eiusmodi affectibus vi-
lissimum esse scribit Galenus) talis esto. Solani succo linteam
molle duplicatum imbutum, & loco affecto impositum. Extrinsecus
lanam molliusculam eodem succo madentem linteo circumdato;
atque hæc, ne siccescant, eo succo subinde irrigato. Hoc remedium
loco dolenti inductum, sine dolore ac molestia (inquit Paulus)
exulceratis canceris subvenit. Plurima medicamenta composita, à
Galeno, Paulo, Celso, Aetio ad hunc usum conscripta sunt, ex
quibus duo hæc selegimus cum Tagantio. Argenti spumam &
cerusam in plumbea pistella cum oleo rosaceo tantisper conterito
in sole, dum plumbi colorem, unguentum quod ex his sit, acqui-
uerit. Aliud, quod magnopere probò: R. plumbi vsti & eloti,
pompholyg. thuris ana ʒ v. absinthij ʒ j. olei ros. lib. ss. cera ʒ j. ss.
succu solani q. s. ad unguenti crassitudinem. Insigniter autem le-
uant solani arg. plurimum in ipsis exacerbationibus, & crucia-

in tempore, malua, aut albua (quam bismaluam appellant) in Malua, al-
mulso subacta liquefacta & rosacei paulo lenigata, in istaque chza.

cataplasmatica ista. Adhuc cataplasma ex ficibus aridis, meliloro
(quam Latini feru lam campanam vocant) ruta, thure, buma-

de herba, id est, napo, diligenter cum oleo confusa, lenis item cata-
plasma quod constat palmularum dactylis in passo decoctis, qui-
bus adiecta sint oucrum lactea: poleuinaq. Adhuc quod ex papa-
uere aut metonio factum est, aut polygono aut feride, hoc est,
cichorio: hac quid em in doloribus vsui sunt. Multi mitigant eius
fraudentiam & lupacitatem (ita loquitur Guido) cum pecia
scarlati, & appositione caruini gallinarum. Hinc vitium hoc

ideo lupum appellari vulgus putat, quoniam carnes vniui galli-
nae si apponantur, quotidie ferè absunt & denotat. Quod si for-
sitam eiusmodi gallinacea carnes, vel similes, illi pro pabulo non
offerrentur, car res sibi proximas, cen lupus quidam famelicus, ad
eandem quantitatem depascere & exedere. Quidam huic

malo veluti ad blandiuntur, admoeto puluere stercoris humani &
anethi, igne co incrementum: item apposis quibusdam herbis, ut
scabiosa, trifolium, verbasco, id est, rapio barbato, & herba Rober-
tiana nuncupata, qua quibusdam myrrhis Dioscoridis esse putat-
ur. Valescunt addit & scrophulariam, ceterach, gentianam, &

capillum Veneris ex quibus, inquit, possunt fieri positiones & empla-
stra. Sed & caprifolium, pilosella, pulicaria & pulvis reperitur in
fungo qui se se dilatat supra terram ad modum stella, si appo-
nantur. Quodam præter unguenta superius dicta, apponunt pec-
ciam scarlatam (ut vocant): alij ung. ex pul. litharg. 3 ij. cerussa,

tucia ana 3 j. olei ros. cera noua ana 3 ij. suis simul & coctis
addita 3 ss. plumbi vsti conficiunt, & in eo pannum blanum (ita
enim loquuntur, id est caruleum) madefaciunt cerati instar, &
apponunt per multos dies: interim tamen omni die mundificando
cancreum. nonnulli sophisticari iubent cum cerasolio, vel aqua
iridis, cardui benedicti cum puluere seminis eius. Quidam acci-
piunt extremitates spinarum mori sylvestris, quæ presenti anno
creuerunt, habentium quinque folia desiliuntur: & inde lanans
membra cancrofa: est enim mirabile, etiam si cancer ipse in pa-
bulo esset. Caterum, viciniquæ res se habeat, comminorata non
per remedia (quoniam ferè temperata sunt) si magnopere con-

Cancer vice-
ratus cur
quibusdam
lupus ap-
pellatur.

Herba Ro-
berti.

Valescus.

pro-

350 OBSERVAT. CHIRURGICARVM
profine, nocere saltem non possunt. Hæc de cancro: nunc ad ele-
phantiasin seu lepram Arabum accedamus, quæ totius corporis
cancer existit.

OBSERVATIO VII.

De elephantiasi & lepra Arabum.

CVM in Gallia adhuc praxin exerceremus, vi-
quidam ad me & chirurgum quendam in ciui-
tate Pithueriensi experiendi causa accessit, ut à no-
bis sciret: numquid lepra vera afficeretur nec ne. In-
primis colligentes signa rām ex principe Avicenna,
Gordonio, Gherardo Viatico, quàm Gilberto, iux-
ta ordinem satis facilem, hoc modo processimus:
Primò dando verba consolatoria: deinde auxilio
Domini Altissimi inuocato spem ægrotanti adieci-
mus, quod ista ægrotudo procul dubio futura esset
ad salutem animæ; & idcō de ea re non dubitaret,
& propterea nobis veritatem diceret de omnibus
quæ eundem interrogarem: nam est quod le-
prosus reperiretur, id sine controuersia in animæ sa-
lutem sempiternam accessurum; modo id sibi à ma-
nu Domini contigisse sine ylla querela aut murmu-
ratione fateretur: nam quantumuis exosi sint le-
prosi à mundo, à Deo tamen minime, ut certò con-
stat de Lazaro, quem plus ceteris dilexit Deus (ita
ut Christi ipsius historia habet) qui eum in sinu
Abrahæ excepit: Diutem verò, qui Lazarum spre-
uerat, ad tartara demiserit. Deinde proposuimus ei-
dē ut nobis iuraret dicere veritatem de interro-
gandis. Postea interrogare cepimus de his quæ ho-
minem ad elephantiasin seu lepram disponere pos-
sunt, numquid parentes leprosos habuisset, aut
num cum leprosis vnquam conuersatus fuisset, vel
etiam aliquando hæmorrhoides habuerit, quæ
nunc forte restrictæ sint: vtrum vsus esset cibis me-
lancholicis: nam quoque quales ægrotudines in vita
ali-

aliquando passus esset; num quartanam habuisset, aut variolas, vel morbillos passus esset. Aut si in hepate vel splene debilitatem vel caliditatem pati solitus fuerit, vel somnia graua, ponderosa, premensia, terrétia, melancholica, subtristia, qualia sunt bufones videre, serpentes, incubum pati. Vel si sentiat acuitatem, ardorem, puncturam in carne, vt ex verricis aut spinis fieri assolet. Hæc enim signa mala sunt. Cum enim elephantia seu elephantiasis Græcorum seu Arabum lepra, de qua nunc agimus, sit morbus venenatus in terrena substantia, totius corporis naturam (vt rectè annotauit Fernellius doctissimus) immutans. Quum enim terrenus ac melancholicus humor venenatam qualitatem ascruerit, eam mox tum visceribus, tum partibus omnibus impartitur, quæ dein inquinata, terrenum quendam ac melancholicum succum vel ex purissimis alimentis gignunt eiusdem veneni participem: quo partes imbutæ ac nutritæ paulatim ac longo tempore similem nanciscuntur naturam, sitque in eis elephantia totius substantiæ morbus. Neque verò hic morbus (quod plerisque visum est) cutem solam aut corporis summa, sed & intima quæque ossaque ipsa intruadit & obsidet, quod omnia impuro fruantur succo. Quamquam autem ipsa morbi qualitas, ad totum corpus pertineat, præcipua tamen vis in iecore atque liene residet, quæ sua dein vitia corpori toti impartitur. Ideo & de morbis hepatis ac lienis inquirendum. Præterea elephantiam alij ab ortu, alij contagione, alij sponte proprioque vitio contrahunt. Ab ortu, qui ex elephantico parentum semine procreati sunt: atqui si parentum alter quum genuit elephanticus erat, fœtus quoque nascetur elephanticus: tanta est diuinæ illius procreatricis facultatis energia, vt in semine intemperato ac prorsus impuro consistens, corporis partes fingat vel ex impura materia. Si nondum elephantia pa-

rens,

rens, quum genuit, tenebatur, sed in eam duntaxat erat propensus, filius eadem ætate qua parens elephanticus euadet. Quorundam etiam literis proditum est, mulierem quæ instantibus aut profluentibus mensibus conceperit, fortum edere in elephantiam procliuem. ideo rectè in Lege prohibitum erat, ne quis cum menstruosa muliere concumberet. Contagione verò siue concubitu, siue accubitu, siue assidua vitæ consuetudine, lues hæc hominem adoritur, quod ex elephantico perniciofa qualitas pariter cum humore transferatur in aliud corpus, sensimque irrepit in omnes partes. Proprio corporis vitio inducitur, cum bilis atra plurimum exuperat, quæ sensim ac tempore venenatâ labeficitur. Nam veneni species in nobis gigni potest, vt de peste aliàs demonstrauius. Exuperat autem, quum vel sanguis vel melancholia, vel bilis flaua supra modum torretur. Quocirca eos adoriri solet, quibus vel menses suppressi, vel varices, vel diuturnæ hæmorrhoides curatæ sunt: & eos qui bubula, ceruina, asininæve carne vescuntur, cæterisque cibis glutinosis atque crassis: eos denique quibus vel iecoris ardor, vel victus calidior bilem flauam cumulauit, quæ diu cohibita degenerauit in atram. Quæ mala quum non nisi florētis aut etiam prouectioris sint ætatis, elephantia nec pueros nec adolescentes sponte inuadet. Cæterum vt redeamus eò vnde digressi sumus: postea ad vrinam eius deueni; numquid ipsa liuida an alba, subtilis, pilosa an trumbosa & cinerosa esset. Dicit tamen ipse Fernellius, quod quæ ex vrinis aut ex sanguine tradi notæ solent, incertæ omnino sunt atque fallaces. Postea ad pulsum deuenimus; numquid is debilis, occultus, & paruus esset. Postea diligenter totum corpus inspeximus: atque id acu punxi iussimus per chirurgum, vt experiremur, numquid sentiret, cute leniter perforatâ. Caput quoque diligenter animaduertimus: simi-

liet

Alter & faciem : eâ tamen cautione , ne ex eiusdem
 anhelitu inficeremur. Propterea vidimus numquid
 pili capitis leniter decidere inciperent , & numquid
 subiliarentur , & æget tam in supercilis quàm palpebris
 & barba depilaretur , ac pili ex iisdem locis
 extracti carnem in radice haberent , vt in porcinis
 pilis apparere solet. Deinde spectauimus numquid
 tuberositas vel tumor , inflatio , crassitiesve in palpebris
 aut supercilis conspicerentur : numquid & in
 facie sentiretur fornicatio , tanquam formicæ irreperent
 per faciem , aut punctura acuum siue spinarum etiâ in fronte & aliis partibus corporis : numquid
 etiâ motus trubationis seu iectigationis , vt vocant , & distortio in partibus faciei & aliis membris
 fieret. Propterea & totum corpus nudauimus ,
 num aspersa aqua tanquam guttæ pluuie caderent
 super faciem aut alia corporis loca , rugositatesque
 in fronte apparetent , & contractio palpebrarum
 adesset. numquid furfores cum vinctuositate cutis
 capitis & totius corporis haberet ; & ideò vt chirurgus
 eum vnguibus fricaret , mādauimus. Nam incipiente morbo
 viuus ille coloris flos perit , cutis decoloratio apparet ,
 aliis quidem nigricans , aliis flauescens , aliis albicans :
 vnde nonnulli tres elephintæ statuerunt pro coloris
 varietate , differentias : hinc densior , durior , asperiorque
 redditur , quum scilicet iam multo est humore perfusa.
 Talis verò præcipuè conspicitur aut in facie aut in manibus
 aut in pedibus , naturâ , quoad licet , vitia propellente
 in corporis extrema. In his sensus torpescit ,
 frigusque perpetuum inest , maximeque in pedibus :
 licet enim horum initio integer seruetur motus ,
 stuporis tamen & frigoris sensus inest. Tum
 temporis verrucæ plurimæ succrescunt , non in manibus
 solum , sed & in facie & in reliquo corpore :
 peculiares verò in linguæ radice. pedes , manus &
 facie tument in hisque varia prominent tubercula.

la, maximè verò in malis quæ extuberant liuido tumore: labia inuertuntur, nares resimæ obstruuntur crassitie alarum, & rimis discriptæ crustulas nigras atque eruentas excutiant: oculi candidum flavescent, mira quæ crassitie quasi vngue obtegitur: supercilia prædura ac ferè callosa, atque etiam glabra. Ex his enim, quemadmodum & ex palpebris, & ex mento, pili venenatâ qualitate imbuti defluunt, dum tandem horrenda euadat partium omnium deformitas. Manuum pedumque digiti siccitate dehiscunt, vnguesque finduntur ac dilacerantur: totius etiam corporis cutis arefcit, atque fœda siccatque scabie exasperatur, eaque interdum cum pruritu, ipsa quinetiam musculorum caro absumitur ac sensum liquefcit. Malo autem ingtauescente, pro stupore cutis sensus perit, manente motu; vt ne infixa quidem acicula dolorem moueat, neque inspersa feruidior aqua exurat: vox in gutture raucescit, respiratio difficilior euadit, spiritus totiusque corporis exhalatio fœret, sordida virulent. quæ vlcera in manibus, pedibus & plerisque locis excauantur, grauisque putredo omnis contaminat. Est autem eo sauior elephantia, quo signa grauiora apparent: maximè verò quum non in summo duntaxat corpore, sed & in ipsis quoque visceribus, in ossibus, cæterisque interioribus partibus firmitus inhærescunt. Non omnia tamen in omnibus, sed alia in aliis comparere solent. Istis consideratis, oculos quoque eius inspicere cœpimus, cum in iis signa certiora (iuxta quoque Neotericos) reperiuntur, an eorum color esset liuidus aut fuscus, tenebrosus in albedine ipsorum: & numquid rotundiores fierent circa angulos, & huererent cum intuitu, aspectu fixo & horribili; & num circulos haberent rubeos, & ex se præberent horrorem videndi eos, vel quòd in eis appareant distortio, iectigatio, lachrymæ, & sit aquositas multa, quamquam tales non reuera plerent.

plorent. Tam & oculi quibusdam videntur exire à locis suis, & facies est multum terribilis in aspectu: quæ signa sunt cæteris potentiora. Nec satis esse putauimus quòd conspiceremus numquid pili totius corporis graciles, rari & pauci essent, cum tales fiant ob materiæ crassitiem & eompactionem (vt vocât) non potentis exhalare per poros, ex quibus pili generari debent. ideo & capillos conspeximus ad solem, utrùm graciles essent, decliues, vel recti admodum, more setarum porci: nam hoc signum est lepræ, ob materiam terrestrem ex qua orti sunt. & ideo diligenter ægrum conspeximus, numquid supercilia & etiam cilia pilis nudata haberet: nam leprosi in superciliis pilos non habent potissimum, nec apud oculi angulos. Post hæc considerauimus nares, quæ solent augmentari, incrassari (vti diximus) & extrinsecus dilatari, interius verò coarctari & oppilari, ita vt anhelus eorum, tum efflatio, fiat eis difficilis & fœtidus: & loquatur per nares (quemadmodum & quidam nunc lue gallica infecti) & cartilago nasi corroditur, vlceratur, & tandem nasus cadit, & est naufragium manifestum: nam vt ablato frontispicio domus, ipsa domus deformatur; ita & ablato naso, tota facies deturpatur. Ab istis signis descendimus ad partes oris; & cum oris speculo chirurgus imperauimus vt animaduerteteret deprelsâ linguâ numquid grana ad modum porcorum leproforum in lingua seu radice eius conspiceret: adhæc extractâ linguâ cum panno, diligenter conspeximus numquid in eius radice corpuscula quædam ad modum granorum milij albi inueniremus: hæc enim perfecta signa lepræ existere solent. Interim obseruabamus, numquid lingua extrâ propenderet, tum labia emitterentur, vel sanguinem funderent, ac vlcerarentur, vel fœtida fœrent, simul labra incrassarentur, denigrarentur, conuellerentur, aut distorterentur. A lingua ac labijs seu labris ad au-

res accessimus, numquid rotundiores fierent, incurvarentur, & pulpæ earundem contraherentur, graciliores fierent atque acutiores. Mox ad musculos qui intra pollicem & indicem digitum erant, devenimus, conspicientes num aliqua ægritudine consumpti forent. Similiter faciem quam diligentissimè iterum conspeximus secundò, num eius color rubicundus foret, lividusve, aut ad plumbeum colorem tendens, vel maximam nigredinem, vtrum guttæ rosacæ in ea conspicerentur, vel tuberositas, pustulæ ac ionthi adessent, simulq. inflata foret, & aspectus eiusdem turpis esset, leoni similis & horribilis, tum diuersæ formæ ac fixus. Interim quoque iussimus vt cantaret, vt ex illo perciperemus numquid vox eius rauca, ferox & aspera foret: quod etiam signum lepræ est. Postremò eum vestibus detractis nudum conspeximus, vt diligenter consideremus an macilentus esset, niger, ac num asperitas in ipso corpore aut cute cum lenitate vinctuosa, quod etiam est signum lepræ: quare & chirurgus paratam habuit aquam in pelui, & sal in vase, & baculum: aquam autem spargebat, & quasi irrorabat super ipsius spatulas, vt periculum faceret num aqua cuti adhæreret: nam si manerent guttæ, & vesicæ minutæ quasi in loco vnito, hoc est pessimum, eo quòd significat vinctuositatem in carne ægri, quò minus guttæ aquosæ dissolvantur, sed inhæreant. propterea & cutem quoque iussu nostro aquâ confricabat, numquid eidem adhæreret, vel faciliè ab eadem dissoluta caderet, aut non appareret. idèò & cutim digitis comprimendo diligenter attingimus, vt cognosceremus numquid caro eius vinctuosa esset. saltem deinde proiecit in cutem eiusdem: nam si adhæreat, signum est quoque vinctuositatis. deinde cum baculo per perticam vt saltaret imperavimus, ad probandam virtutem motiuam, maximè musculorum, numquid post saltum inciperet cadere vel

tre-

tremere. Post hoc considerauius totius corporis cutem, numquid color eius mutatus foret, aut morpheâ infecta, vel scabiosa, pruriginosa, impetiginosa, aut pediculosa vel verminosa: itémque num ad aërem aut aliunde crispetur aut rugas habeat, vt anser deplumatus: num in cute oriantur nodi, excrescentiæ, pustulæ seu eminentiæ: num adsit asperitas, tuberositas, circa iuncturas & extrema. Imperauius quoque vt facies eidem cooperiretur, ne videre posset, & vt chirurgus diceret, Caue, quia ego pungam te in pede; & ipsum tamen non pungeret: sed postea pungens illum in pede, peteret num punxisset: nam si diceret non punxisse, signum est lepræ. oportet verò vt pungantur stilo aut acu in spatulis, tibiis, & in talo, vel in minimo digito, & vicinis locis, vsque ad genus: vel à minimo digito manus, vsque ad cubitum: & si sentit punctiōem, bonum signum est. Sed quare magis in istis locis pungeri sint, & cur minus in iisdem sentiant, ratio est, quia debiliores sunt, & ideo citius à naturâ spiritibus destituuntur. Postea quoque spectanda sunt crura (vti fecimus) numquid pulpæ eorum decurrerentur, & numquid adsit sensibilitas in puncturis factis in eis: & num sint crura scabiosa, squalida. Dehinc quoque circumspeximus num pulpæ manuum ac pedum macilentiores essent ac decurtatæ, & numquid in eis foret insensibilitas, mansura, frigus, dormitatio, stupor, præcipuè in extremis digitis, & præcipuè minimi digiti & illi propinqui: quæ omnia in manu extenduntur aliquando vsque ad humerum, & in pedibus à digitis ipsis pedum vsque ad genua vel anchas: & expertissimum signum est lepræ. Interim & periculum fecimus num manus essent nodosæ, & pedes contracti, pustulis fœdis, duris, maculis pannosis infecti; & num essent impotentes ad ambulandum, vel ad opera solita peragenda: facta quoque, vt supra diximus, examinatione

numquid saltare: ultra perticam aut lapidem posset: periculum quoque facientes, numquid separatio in manibus tum pedibus adesset: num ungues scabri forent, inspissati, huidi; & num in illis aut vicinis partibus fissuræ, seu scissuræ tam in pedibus quam manibus apparerent: nam solet in istis & fieri mutatio coloris cum sanguinis mutatione, si premanetur: & incipit in iisdem fieri forma fœda. Deinceps considerauimus sudorem eius, num corruptus esset, & ad foetorem decliuus; idem quoque experimentum facientes de superfluitatibus eius, quæ non solum foetere solent, sed & totum corpus hirci instar foeret. Non minus, si fieri potest, perquirendi sunt impres eorundem à notis, & amicis aut astantibus; quia sunt ut plurimum malorum morum, dolosi, suspiciosi, habentes quasi quemlibet suspectum: sunt astuti, facile irascuntur, & magis solito in furem & iram concitantur: ardent in concubitu, & sentiunt se debiliores ex concubitu. Quamquam autem diximus quod signa in sanguine (teste Bernelio) sint incerta; iuxta tamen alios Neotericos ea volumus indagare: quare extraximus sanguinem per chirurgum à vena communi mediana dicta, in tres scutellas eum partientes: in prima scutella, cum sanguis propè esset congelatus, grana salis grossi ad quantitatem pilorum imposuimus, ut videremus num, sal liquefieret & dissolueretur: id enim dispositionem lepræ præsignat, & magnam sanguinis adustionem, ut ferunt. in secundam scutellam iniecit acetum vini acerrimum, ut videremus num mutaret colorem sanguinis, vel ibidem faceret ebullitionem quandam, quemadmodum si proiiciatur super terram; nam hoc est malum, significat enim terrestritatem. tertiam partem sanguinis, quæ erat in tertia scutella, posuimus in panno lineo clauso, & duximus in aquam (potest & contineri in ripa fluminis aut torrentis currentis) donec substantia sanguinis abluc-

ablueretur; & tunc periculum fecimus numquid in panno arenositas stridens inter digitos confricata maneret, aut sanguis vntuosus reperiretur id enim malum præfagit. vbi etiam remaneat caro in panno, strideatque & foetorem habeat, aut nigrescat, significat ariditatem, adustionem, vel lepram: ac cum apparet caro alba in sanguine, est bonum signum. Addunt alii, si sanguis positus in aqua clarissima supernatauerit, tunc eum esse aut corruptioni proximum, aut saltem, vt loquuntur, in viâ corruptionis: si verò petat fundum, non esse ita. si autem sanguine conseruato in panno lineo, & in aqua, vt dictum est, expresso videantur aliqua corpora carnea, huiusmodi, ad modum milij vel panis, signum est lepræ. si super sanguinem quoque abiectio liquore ponatur vrina ægri, & ea si non misceatur sed submergatur, signum est lepræ: sin secus, pro optimo signo habetur. Sed cur magis de vrina quàm humore dicant, ratio est, quia eius corpus magis subtile, magisque penetrans est quàm alius humor; & propter maiorem conuenientiam quam habet cum sanguine, cum sit eius colamentum. & quamquam de vrina quoque signum falli possit, vt diximus ex Fernelto; quatuor tamen modis alii hoc indagari posse admittunt. primò quòd vrina leproforum debet esse alba, cum quadam limpideitate, & clara ac tenuis: secundo debet esse, quantum ad eius contenta, umbrosa, & debent intus apparere corpuscula ad modum farinæ vel furfuris bene tritæ. item si matula moueatur, debet facere sonum; & ratio est, sicut in hecticis debet carere sono propter oleaginitatem resolutam à corpore, sic in istis debet facere sonum, propter terrestitatem (vt loquuntur) & siccitatem corporis. Istis signis omnibus consideratis, vt examen debitè fieret, accepimus tabulam in qua scripsimus partim bona signa, partim mala, vt non deficere mus in iudicio: & tan-

360 OBSERVAT. CHIRURGICARVM
 deinde concussione facientes, quod mala à bonis su-
 perarentur, lepram nondum confirmatam esse prò-
 nunciavimus, sed facile in lepram eundem casu-
 rum, si non bona victus ratione tum medicamen-
 tis uteretur. At hic discedens cum se denuò re-
 versurum diceret, sed antè cum amicis suis se com-
 municaturum, verùm medicamentis per nos præ-
 scriptis uti necessarium existimarent, postea non
 rediit: & sic nulla medicamenta præscripta sunt. Ac
 alios in quibus suspicio eiusdem morbi æquè eui-
 dens erat; ob plurima & manifestissima indicia,
 quæ in illis apparebant, dei opt. max. auxilio, debi-
 tis accommodisque remediis præscriptis (qualia in
 sequentibus Scholiis memorabuntur) à foedissimo
 hoc malo liberauimus, aut saltem imminens ma-
 lum avertimus & præcauimus, summi Dei nutu,
 cuius nomen in omnibus morbis iuuocandum.

SCHOLIA.

DE elephantia Arabum, quæ in crinibus fit, diximus abundè
 lib. 2. §. 1. Obj. & Curationum nostrarum medicinalium,
 Scholio Obser. 2. §. At hic loquimur de Elephantiasi Græcorum,
 quæ lepra recentiorum est, hoc est, ipsorum Arabum; & vulgo
 dicitur morbus Dini Lazari. Longè hic differi à Græcorum le-
 pra, ut sequenti scholio dicemus. Est igitur elephantiasis cancer
 universi corporis, ab elephante animali nomen accipiens, ob affe-
 ctionis magnitudinem, longitudinem, & entis asperitatem. Dici-
 tur etiam Satyriasis, quòd facio, qui sic laborant, Satyris similes
 sint: quoniam & alacritas quadam vehemens ad coitum ipsis
 inest, quemadmodum de Satyris fertur; quòd scilicet semine
 abundant; largior siquidem ipsis generatio in seminarii vasis, ob
 materiam crassam, accidit. Vocatur etiam Leontiasis, quòd frons
 agrorum cum quodam tumore laxior reddatur, ad similitudinem
 pelvis flexilis superciliorum leonis. Barbari autem quatuor species
 seu differentias lepræ ponunt: & primam volunt fieri ex sangui-
 ne melancholico adusto, aut melancholia adusta; & appellant
 hanc speciem elephantiam. Quæ verò fit ex sanguine bilioso
 adusto

Lepra Ara-
 bum.
 Morbus Dini
 Lazari.
 Elephantiasis
 Græcorum.

Satyriasis.

Leontiasis.

Barbari qua-
 tuor diffe-
 rentias lepræ
 ponunt.

adusto aut cholera adurente, & inficiente sanguinem, vocatur
 Leprina: at qua de sanguine adusto phlegmatico, aut phlegmate
 adusto inficiente sanguinem fit, appellant Tyriam, ut primam ab
 elephante, ita & hanc à tyro serpente, quæ verò sit ex sanguine in
 se adusto & corrupto, aut re aliqua corruptente ipsum extra-
 nea, simpliciter alopeciam nuncupant, à similitudine alopecia
 seu capillorum defluji. Rarò tamen volunt has species puras
 simplices ve inueniri, frequenter vero compositas, binas vel ter-
 nas, vel etiam quatuor, simul omnes commixtas. At illi qui
 Græcos ob id sequuntur, omnes sub elephantiasis differentiis com-
 prehendunt: quam eandem & iterum in duas differentiis se-
 cant, Cùm enim elephantiasis (ut dicunt) quemadmodum can-
 cer, ab atra bile fiat, hæc atra bilis cùm duplici modo generetur,
 nimirum vel ex melancholico sanguine, fuculentioraq; & ve-
 luti eui limo; vel ex bile flaua, virisque nimium visis: prima
 eius differentia subtrubicundam elephantiasin, mitiorem quodam
 modo, ut autem verius dixeris, minus malignam procreat: Aite-
 ra verò flaua bilis nimium exusta febales elephantiasin malig-
 norem & seniozem producit; in qua totum corpus sædatur ul-
 ceribus, & extrema decidunt. Qua propter morbo iam visus na-
 nus admonenda non est. Differt à cancro, quoniam hic unam
 partem solummodo occupat; elephantiasis verò largè per uni-
 uersum diffunditur, ita ut spatio temporis ossa quoque vitiet.
 Talis morbus frequens est in Alexandria, ob victum rationem &
 loci caliditatem. Crassus enim cibus, ut pulle, lentici, cochleis,
 scissamentis, nonnumquam & asinua carne, Alexandrini veni-
 unt. Ambientis verò aeris caliditas hunc humorem ad cutem
 euocat: unde malo huic est origo. In Germania & Mysiaratò;
 apud Scythas, qui lacte vescuntur, vix unquam apparuit: quo-
 niam neque crassus cibus aluntur, neque ambiens aër in ipsorum
 regionibus calidus est. Sed nunc temporis videmus hic in nostra
 Germania inferiori, seu Gallia Belgica, & posissimum in nostra
 Batavia seu Hollandia, plurimos passim fieri leprosos, populatim
 per urbes vagantes: cùm tamen ipse Galenus vix dixerit in
 Germania fieri: multoq; minus dicere debere eum morbum
 in Batavia nostra gigni posse, quæ aërem crassum, frigidum, sa-
 piusque humidum, ambientem habeat, locis multis aquosis cir-

1. Elephantia.
 2. Leprina.
 3. Tyria.

4. Alopecia.

Secunda spe-
 cies elephan-
 tiasis.

Quibus ele-
 phantiasis
 differat à
 cancro.

Gal. ad 7
 Glau. 2.
 cap. 10.

cumdata. Igitur ob aliam quandam causam in Batavia nostrae illam lues provenire dicendum est; & fortassis ob crebram in hysce regionibus salinarum carnium & plurimorum falsamentorum corruptorum ac piscium non bene saluorem esum plurimi simili elephantia malo corripuntur simili, inquam: nam eos legitimâ elephantia corripere non crediderim. Et, ut verum fateamur, non omnes illi qui leproforum nomine per has & vicinas regiones circumvagantur, verè leprosi sunt, sed solummodo ob cutis exterioris fœditatem aut turpem scabiem, à mundis & nimium anxie formidolosis hominibus refugiuntur, & pro verè leprosis habentur. Imò vix decimus quisque illorum verè leprosus aut legitima elephantiasis correptus esse deprehenditur. Nam, ut hoc exemplo & ratione confirmem, cum inter Henricum Vergerium, medicum insignem (pia memoria) Hagha consistorantem, & inter me, verba de Lepra Arabum fierent, tandem rem ipsam diligentius ruminantes & sedulò inspicientes, cum maximo nostro dolore & indignatione animadvertimus, quòd ob incuriam vel potius imperitiam medici illius Harlemensis, cui negotium examinandi leprosos totius nostrae patriae incumbbat, pro elephantiasis & leprosis indicabantur quamplurimi, qui dumtaxat fœda scabie infecti, vel aliquo inguinamento cutem exterioram dumtaxat deturpante, vel vitiligine, leucis, a'pho vel morphea, aut impetigine, lichene, psora, quae Graecorum lepra est, laborabant: nam hoc ipsum passim in mendicantibus leprosis saepe vidimus, qui equidem si bene tractarentur, etiam facile curari possent; & iam plurimi etiam tales à nobis persanati sunt. Quocirca, si omnino sequa iustâ trutinâ & diligenti examine excuterentur, non tam subito tam multi nunc homines leprosi ab omnium hominum consortio abiudicarentur. Sed quàm sui venenatus morbus elephantiasis, nunc ex parte Ool' precedente ostendimus; & eiusdem generationem explicavimus. Est enim morbus hic (ut & Arabes volunt, qui ita suam lepram de qua nunc agimus definiunt) corrupte complexioni & formam & figuram membrorum: proveniens ex multa aspersione cholera nigra corrupta ad totum corpus. quam definitionem Aniconna ponit 2.4. tract. 3. cap. 1. Quod ad causas attinet, quamvis iam ex supra dictis haberi possint, tamen ad

res precipue reducuntur. Alii enim hanc primitiua, procatar-
 etica, seu externa, ut est corruptio aeris, quemadmodum euenit
 in aëre pestilentiali, in apparatu, aut in participatione aut con-
 fubulatione cum leprosis, quia aer inspiratus & expiratus ab eis
 corruptus & infectus corrumpit aërem circumstantem, & de-
 mum qui eundem quoque attrahit, cum morbus sit contagiosus,
 & innadens alios, ut idem dicit Auicenna: ita & concubitus
 cum leprosa, vel cum muliere, cum qua paulo ante concubuit le-
 prosus, semine eiusdem adhuc in viro manente. Propterea, recte
 dicebat Gordonius, quilibet caveat sibi ne cum muliere leprosa
 concubitat. Dicam, inquit, quod mihi accidit. quadam Coniussa
 lepra affecta, Montem pessulanum accessit: quam tandem etiam
 in curatione mea susceperam: & quidam Baccalaureus in medi-
 cina ministrabat ei, & longa conuersatione tandem rem habuit
 cum ea, ita ut eandem impregnaret; at miser postea perfectissime
 leprosus factus est. Igitur felix quem faciunt aliorum pericula
 cautiorem. Tam quoque res ab externo venientes ad has referun-
 tur, ut nimii accidentia, ira, tristitia, timor, pusillanimitas, si
 longo tempore perdurent, melancholicum humorem gignunt, ut
 6. aphor. 23. constat. longa similiter continuatio ciborum me-
 lancholicorum; ut sunt, legumina, casei antiqui, carnes capra-
 rum, ursorum, vulpium, & asinorum, porci, precipue leprosi,
 habentis carnes glandulosas; ususque carnum salinarum, & pi-
 sci sum salinarum: & comedere lac & pisces in eadem mensa, te-
 ste Auicenna, Valeo, & aliorum auctoritate, si diu continen-
 tur. Causa antecedentes lepra sunt, nimia caliditas hepatis,
 adurens vel incrassans sanguinem, ipsamque conueriens in uari-
 etam melancholicam; scd & multiplicatio melancholici humoris in
 hepate, uenis vel liene, idque per viam generationis vel adustionis
 à complexione calida. Causa coniuncta: ut enim sit aegritudo ha-
 reditaria, quia filius leprosa vel leprosi nutritus est lacte leprosa.
 alia autem & coniuncta & simul immediata est ipsa melan-
 cholia corrupta ad superficiem corporis transmissa; aut error assi-
 milature virtutis in carne, sequens errorem digestiue in hepate
 & uenis: & causa efficiens magis antiqua, iuxta Auicennam,
 est malitia complexionis hepatis, inclinans ad caliditatem &
 siccitatem, quoniam adurit sanguinem; quantum lepra sit morbus
 frigidus.

Causæ pro-
catarcticae.Historia
Gordonii.Causæ antec-
cedentes.Causæ con-
iunctæ.

Signa.

frigidu, ut dicebat Avicenna; & causa materialis immediata est ipsa melancholia. Quod ad signa attinet, licet ea ipsa ex parte observatione precedente enarravimus; ut ea tamen brevibus complectamur: Consequitur eos, qui obnoxij futuri sunt huic malo, segnitie, spiratio tarda, spirandi difficultas, motus difficilis, assidua constrictio alui; urinarum, veluti sunt inmentorum lotia, excretio; respiratio gravis, & fetida, ructus continui, qui etiam ipsis agris aliquid molestia addunt: appetitus non obtusus quidem, neque inflammatus, impetus in Venetrem intensus. Iam vero ubi ad cutem progressum fuerit malum, mala primum crassiores fiunt, & menium, deinde rubescunt, non florido, sed linido rubore, & sub lingua venule varicosa fiunt, ac nigrescunt: quod signum est, etiam viscera ipsa in simili constitutione esse eiusmodi, & precipue iecur. Capilli magna ex parte rari fiunt, pilique superciliarum decidunt. Nasus fit siccus, & prius corrumpitur; unde Guido etiam lepram à lepore nasi dictam esse vult; quemadmodum & Valescus annotavit: aures erose; labra crassa: vox rauca: sub lingua & sub auribus crebra minnaque; veluti glandula, his similes, quæ in porcis grandinæ nomen habent, immittuntur. In summa, facies aspectu horrida est. Si paululum corpus incaluit, cutis acutus pungi videtur; aut si refrigeratur, insilaz, depilumis auferis exasperatur. Quod si magis adhuc morbus auctus sit, tumores crebriores, ac maiores in tota cute oriuntur, ita ut digiti in manibus, pedibusque sæpe sub his condantur. Turbulenta sunt insomnia, mens subdola: vitam ut amittere metuntur, sic generoso animo (quoniam sunt pusillanimes, affectum ferre non possunt: verum veluti se ipsos condemnantes, se occulant, & notos homines vitant. Quidam porro ex eis, ad modum eorum, qui suffocantur, aut strangulantur, maxime circa somnos, afficiuntur. Eadem ferè signa apud Holerium de morbu internis cap. 61. de elephantiosi verè recensentur. Fiunt autem tales pterygodes, quasi alati, & Satyros representant. Somnia molestissima, incubi, mæror, & angustia. Copiosam huius descriptionem habes apud Aretæum. Si libet rem omnem excutere, vide 7. lib. Gilbertij, cap. de lepra, de signis eius generalibus & cuiusque speciei propriis, tum elephantia, leonina, tyria, & alopecia. de his quoque, si libet, Gordonijum & Valescum consulis. Sed quia hic morbus

CON-

contagiosus est admodum & abominandus, atque aliquando cognitus difficilis (ut etiam annotauit idem Holerius) optimè cognitus est à veteribus, ut extra urbem pomeria ablegentur elephantici: & medici doctissimi, velut critici ac censores, constituantur, qui hos explorent, ut apud Belgas & Arelate. Qua de re doctissime scripsit F. Valeriola in suis Enarrationibus. Initium est de annua elephantiorum apud Arelatem probatione, veteri senatus consulto instituta. Vnde & rectè dicebat Holerius: Sæpiusq; medicus, ut de morbo indicet, quàm ut eundem curet, appollatur, ut hic sit. Signis itaque de morbo pronuntiandum est. Temperamentum hominis imprimis spectandum est: & sic qui sunt sanguine crassiore, huic vitio magis opportuni sunt; & aliquando hereditarium malum est. Locis calidioribus adius sanguis, aut à frigore congelatus hoc malum inuehit à febrilis continuus malè curatus, ab usu alimentorum & medicamentorum que melancholiam gignant aut pituitas crassam (ut Arabes quoque voluit) que atturitur, que vimini incident & attenuant, aut aliter caifaciunt, nonnunquam huius mali initium est. Signa quedam vinuoca faciunt, alia equiuoca. Vinuoca, ut ab elephantico prognatis esse, ab anis, aut aianis repetita origine: cum elephantice consuetudo, excretionum consuetudinum retentio: citorum crassum, salsozum, acutum, nidorosozum, asiduum vsum: vini multi & crassi potus: vita autumnosa in metis & merore: exuberationes in plerisque corporis partibus, sed in facie magis, & secundum frontem: antes acuminata, nasus simus, labra crassa, horrendus aspectus, color faciei ex rubeo luens, vocis raucitas, oculorum rotunditas. Signa equiuoca sunt, excretionationes extremorum & crurum: color morpheæ similis, & tenebræ: capillorum desinitium, & tenuium regeneratio: musculorum (præcipuè pollicis) consumptio, stupor aut sensus amissio in extremis partibus induratis & exiccatis, scabies, imperigines, gutta rosacea, exuberationes rotundæ & duræ sub lingua, palpebris, auribus; ulcerosa lasitudo, cutis crispitudo instar implumis anseris, vultuosa cutis, & tamquam reflecta aqua, sanguis rubrosus, niger, luens, obscurus. Ex his omnibus notis, vel multis simul concurrentibus, vel paucis, sed essentialibus & pathognomonis, explorentur elephantici.

Operiet

Extra urbem
pomeria cur
elephantici
ablegandi
sunt.

Signa vinu-
uoca.

Signa equi-
uoca.

Signa ele-
phantiz, ex
notatis.

Oportet igitur unctum medicum, ut de re magis momenti pronunciet, hæc signa omnia percurrere. Quæ ut acta sunt, ita & aucti vitij indicium est. Hanc autem rem signorum ad unguem pertractavit Gilbertus loco citato, ubi & specierum signa quoque distinguit. Sed de generalibus signis cum satis dictum sit, specierum signa hic brevitè ex eodem annotemus, & primo de elephantia, quæ fit ex melancholia adusta, ab elephante nomen trahens: quemadmodum elephas cæteris bestis magnitudine, fortitudine, & cutis turpitudine præcellit, ita & hæc species alius maior est & fortior, quantum ad causam & curationem: & quia hoc animal maculosum est, ita & elephantia, quamvis hoc commune sit in omni lepra: quia in principio macula superueniunt, & citò recedunt: hæc & malicia & turpitudine alias antecellit. & universalius pronuntiatur eandem incurabilem esse, quamvis curam eius intensiorem recipere, vel remissionem & mitigationem. Fit autem ex cibis melancholicis. ut iam diximus, ut carne caprina, conilia venusta, cernina, lentibus, vino forti aut corrupto, aliis, cibis potibusq; corruptis ingestis, coitum cum leprosis, confabulatione, aspectu eorum, cohabitatione, ambulatione, hereditario tunc, menstruis repressis, comeitione carnum infectarum suillarum leprosarum. His color est lividus totius corporis ac faciei, ad nigredinem vergens: ex leni frigore talis color apparet, vel lenissima alia causa: aspectus est horridus, cutis dura, squalida, subsusca, subnigra: & in hac maior est & crebrior partium insensibilitas, cum sinore, quam in reliquis. copia strumarum, glandularum durarum & tardantium, continua discoloratio: ferè semper subitiles sunt, samelici, sæpe constipati. temporis progressu supercilia arctantur, sit oculorum roquedizæ, palpebra corrugatio, narium constructio, oculi distortis labia, nares, & frons rugis exarantur: granula sub lingua, vocis rancido, manus nodosa, contractæ, ac pedes: pustula dura, turpes macule, panni, verrucæ nigre, musculorum consumptio: fissura: pedibus ac manibus impotentes sunt. Hæc efficit melancholia sicca. Urina modò glauca & tenuis: paucus vel nullus sudor, fortior oris sanguis in phlebotomia niger, lividus vel cærinus, cum terreo colore, qui citò condensatur a vena egressus, & quanto magis laxatur in aqua, tanto magis condensatur; & in lesione apparent

qua-

quadam venula alba, quasi neruorum rami: & cum tractantur, frident. Hac aggrando tarde venit ad augmentum & quandoque facit fissuras in superciliis, manibus & pedibus, & aliis partibus diuersis ipsius corporis. Leonina vero sit ex cholera infecte sanguinem, vel sanguine cholericco adusto, ex rebus adurentibus, cibis calidis, acutis, aliatis, piperatis, vino forti, rithmoq; omnibus amentis. Signa communia quadam cum alopecia habet: nam depilantur supercilia, facies citrinum colorem acquirit, aut subrubrum. ita & totum corpus rubet, vel citrinescit (sit enim loquantur,) punctura in palpebris, oculi rotundi, tremuli, instabiles, constricti, narium compressio, vox gracilis, emigra mira effertitas, quasi catulorum, fissura labiorum, cutis crepans, separatio vniuersalis inactrayum, in manibus & pedibus, sed precedit varia macularum distinctio per totam cutem, ad modum leoninae pellis, gingivarum corrosio: valde stridendi sunt, & clamosi, veneret, iracundiores ceteris: parum constrictio in pectoris & thoracis, extremitatum gracilitatem, ventris stridulam. Urina tenuis, pauca, colorata, sanguinea sub nide vel aliquid sanguinis continens: adeest impetigo, serpigo, morphea infra, crocea, cum inueieratur: corrodamur extrema. Sanguis exiens à vena, subtilis est, & igneus, & quasi scintilla distinctus, qui & tarde condensatur & in lotura cito dissoluitur. hac species cito venit ad augmentum, & postea vix aut numquam curatur; omnia hac operatur cholera interea siccitas. praeterea adeest iisdem constrictio narium oppilatio, & stricture, & ex qualibet leui frictione sanguis egreditur. Tyria sit ex phlegmate adusto, vel sanguine adusto phlegmatico, & habet nomen à tyro serpente: nam quemadmodum serpens iste se cito deponit solum, ita laborans hac passione foeda, cutem cito deponit: cito enim putrescit cutis, & caro adiacens, ob corruptionem phlegmatis sit possimam ex cibis pituitosis, corruptibilibus, & specialiter lacte, & piscibus in una mensa sumptis, cum his causis praedictis. hic adeest pallor faciei praeter naturam, albus, morphea alba: facies cum semper est lucida, & quasi subvirens, pinguos habens pilos, vel nullos circa mentem & supercilia: nullo sudore dissimunt: valde pigrescunt: oculi patentes, & humiditas circa totum corpus, furfuris, squama faciem foecant alba: plerique venter laxus est: hinc

Signa Leonina leproe, ex neotericis.

Signa leproe Tyriae, auctor 2 neotericis.

hinc debiles & dissoluti: habitudo est squalida, rugosa, facies suctumida est, nasusq; crassus, & supercilia grossa sunt; & morbo accrescente cum malitia facile depilantur, & subito inflantur, cum reliqua omnia depilantur: inuertuntur palpebrae, lacrimantur oculi, oppilantur nares: gingivae & labia putrescunt, & adiacens caro ob corruptionem phlegmatis. comprimuntur spiritalia: vox fit rauca, facies subitumescit, & spolia enim tunc in modum serpentis depamperantur; & tunc ex phlegmatis infusione extrema quasi hydropes turgescunt, extremitates digitorum manuum pedumq; incrassantur & putrescunt & crepant, findunturq; putrescunt, cadunt ungues, & pustulae abundant plussquam in ceteris: excreationes & emuntiones plurimae. Virtus eorum semper est remissa, quasi scissa in fundo, & saepe quasi itacorum aut colicorum. Sanguis exiens à vena cito conuertitur in aquam, & mirè est aquosus & indigestus, & quasi varius; & est spissus vel subalbidus, & cinerinus, & quanto magis lamatur, tanto magis induratur. & quoties in aliqua parte se se scabunt vel scalpunt, videntur quasi farinam & sursum excussisse. glandulae moles in cute oriuntur: cutis mollescit & decahit; & aqua super eam conersa non cohaeret. Haec autem species (ut animalis verminum sapius) in nostris his regionibus magis est frequens. Alopecia à vulpecula depilata nomen habet: fit autem, ut diximus, à sanguine in se adusto aut corrupto, & re externa, negligètia phlebotomia, & dieta. Hanc speciem praecessit incompositus rubor faciei, cum rubra linore vel citrinare; & eius facilis mutatio in pallorem & remissio in ruborem. Finit autem macula rubea flava phlegmatica exterius, & sponte recedunt; & saepe morphea rufa rubores ulcerosi plurimi, desudationes plures, cum grani odore, maxime circa pedes & axillas. Vena oculorum fere semper rubore perfunduntur, visum obliquantur, oculi semper flidi & lacrymantes, supercilia & cilia depilantur; palpebrae inuertuntur, incrassantur; nares oppilantur & comprimuntur; & gingivae putrescunt; nasu ingrossantur, difficultas fit odoratus, & sordet anhelitus, & à phlegmate educitur sanies, & ex tenui frictione, scalptum ab ipsis & naribus sanguis emanat: supercilia comprimuntur, facies cum corpore foedantur pustulis & maculis rubra: diffunduntur cutis & caro

Signa leprae
Alopeciae a
neotericis
dictae.

nimis molli, & quasi semper subincida aliqua vntuositate per-
 linata: corporis autem adest habitudo sanguinea. Urina vero est
 tmbra & pinguis, & facilius quàm in ceteris turbatur, & fa-
 torem concipit ubicunque fundatur. Sanguis in phlebotomia
 turbatus apparet, statim & varius; & quasi continetur in ve-
 nis sanies, & est spissus & viscosus, & lotionem denigratur &
 inuiscatur. Cum vero iam manifesta sit corruptio, plus omnibus
 pustula totum corpus inuadunt, anhelum pra reliquis sciet, ex
 facili sanguinis alteratione; & nimis velociter morbus augmen-
 tatur, & citius extra castra mittuntur: & ideo canis ab eis
 canendum. Signa iam prognostica non solum generaliora, sed
 & uniuersusque speciei iam dictae, ex precedentibus ferè pa-
 rent. Est autem grauis morbus, & propè ex eorum numero, qui
 incurabiles existunt: & grauis quidem est ipsi agro, intolerabi-
 lis autem conspicientibus, utpote qui ipsum omnino auerantur,
 adeò ut & plerique ex necessariis & domesticis agri ipsius con-
 uersationem deuitent. Etenim suspicionem de se prabet malum,
 tamquam sit contagiosum: & sanè malum est cum ex conuer-
 sari: inquinatur etiam aër quem inspirando asrahimus, ex ulce-
 ram foetore, & ex vitiosa spiritus exhalatione. Ceterum affe-
 ctio ipsa non ob id solum grauis est, quòd indissolubilem ferè ha-
 beat structuram & apparatus, sed quòd principia generationis
 eius ferè sunt ignota: cum enim circa superficiem iam vestigia
 eius appàrent, tunc illa non gignitur, sed perficiunt, intus à vi-
 sceribus initio facti, & progressu usque ad cutem dilatato: qua-
 re non absimile est, imminentes eminentias etiam in internis obori-
 ri. Vnde & Rondeletius in method. sua curandi, cap. 87. de ele-
 phantiasis inquit: Morbus hic si extra dispositionem sit, non cura-
 tur. Nam ut cancer particulari non curatur, sic nec elephas,
 qui vniuersalis cancer dictus est ab antiquis. Cur non curetur,
 in causa sunt permulta. Primum qui hoc morbo laborant, vel
 non conuenientibus, vel non opportunis & suo tempore reme-
 diis videntur: solent enim medicos consulere, cum iam morbus à
 dispositione ad habitum transsit, quo tempore partium substantia
 lasa est, & absorpta. Tunc certè morbus incurabilis est, tum
 quia materia in partes remotas recepta est, & ita inueterata,
 & incognita, ut sibi reddiderit carnem similem, qua materia

Signa pro-
gnostica

Rondeletius.

Cur elephan-
tiasis incurabi-
lis.

medicamentis laxantibus enacuari amplius non potest, tum quia digerentius & aliis propriis remediis propter crassitatem & distantiam non potest discuti. Adde quod intemperies illa sicca emendari non potest, ut in aliis à siccitate morbis. Hoc autem ob humorum remedium imbecillens agendi vim, tum ob magnam partium siccatarum resistentiam; quod calor imbecillus est, qui actionem digerit, & partes sicciore redditæ, densiores factæ sunt: quare ob causam vis medicamentorum penetrare non potest, sine qua morbus educi non potest. Quæ propter morbo iam victis manus admoventia non est. Apprehenduntur autem hæc affectione viri magis quàm femine; atque inter illos magis qui crassum & viscosum ac atra bile redundantem sanguinem habent, & qui pituitam multam salisam gignunt: amplius, qui vitæ crasso & egre concoctili utuntur, & qui in otio degunt: non minus verò & qui multis & inordinatè exercitiis utuntur, & per hoc sanguinem inspissant: item hi qui cibos assidue in ventris corrumpunt: quod verò ad ætatem attinet, pueri & iuvenes, quo tempore maximè pubescere incipiunt. Addunt hæc iudicia Neoterici. Primò, Anicenna inquit, Lepra quæ est debilis, difficilis est curationis: sed ea quæ incipit, iuxta eundem tum alios, (ut & Valescus annotavit) curari potest. Secundò, de curatione fortis lepra non est spes. Tertiò, lepra confirmata si fuerit, magis est inobediens curationi. imò ea quæ est confirmata, cum manifesta corruptione formæ & figuræ, & rancedine, possumus predicere (ut dicebat Gordonius, & citatur à Valescio) quod in æternum non curabitur: sed bene possumus vitam prolongare, & diminueræ materiam melancholicam, ne invadat cor & membra principalia, cum medicinis & optimo vivendi modo. Quartò, lepra facta à melancholia quæ fit à cholera, est magis sæda, & maioris nocimenti, & difficiliorum accidentium, & vehementius adrens & exulcerans: sed est susceptibilioris curationis. Quintò, facta à sece sanguinis est magis quæta & salva, minusq; exulceratur: sed hic intelligendum, modò sex illa sanguinis, non aduratur. Sextò: illa quæ fit à melancholia adusta, est sicut illa quæ fit à cholera, & hæc tardius recipit curationem. omnia quoque hæc ponuntur ab Anicenna; 2. 4^{ta} tract. 3. Septimò, hæc agitando non cessat corrumpere com-

Viri magis
apprehen-
di sunt lepra,
quàm femi-
næ.

complexionem membrorum per qualitatem copiatam complexionem conuenienti vita, scilicet caliditati & humiditati, donec perueniat ad membra principalia, & illic interficit. ex quibus cognoscas quantum res calida & humida proficiant elephantiasis. Ostendit Gordonius inquit, Alopecia est minus periculosa & facilioris curationis à principio: leonina verò facilius venit ad augmentum: elephantia verò tardius; & idio tardius curatur. tyria medio modo se habet. Nondè, dicit Serapio, omnes species lepræ absolutè & in inceptione generationis suæ, suscipiunt curationem: At quando confirmatur & figitur, non speratur eius curatio. Similia refert idem Serapio in 3. lib sui Ereniarij: & talia quoque à Valesco annuntiantur. Sic & Halerius: Confirmata elephantiasis non curatur: recens curari potest & prohiberi. Recentem autem volunt, quæ annum non superat. Decimò: quanquam hoc malum ferè incurabile sit, tamen (ut inquit Aëtius) humanum est & plenum beneuolentia signum, in extremis etiam malis usque ad experimentum procedere, ad difficultatem affectionis compescendam. Curatur autem cum est in dispositione, victus ratione, & medicamentis. Viduus ratio debet esse enchyma & humida semper, aliquando frigida; ut cum à bilis aduersione fiat; minus autem, si ab aëre bile vel pituita assata. Comedant quæ sanguinem temperent, quæ crassitatem dissipent, & dilutiorem reddant. Laudantur pisces aliqui saxatiles, & qui carne sunt media: qui crassa carne & nitrosa, mali, ut polypus, sepia, loligines. Ex crustaceis locusta, astaci, conchyliæ, & ostrea laudantur. permittuntur peccines & penunculæ, quia dulces, & succum faciunt nimis nitrosi, aut salini. Olera etiam quæ sunt humida, ut lactuca, borago, spinachia, in quibus domesticæ, commendantur. Vituperantur caules sabbatica, & beta, & aliæ herbe odoratæ. Fructus humidi, ut pepones, cucumeres, cucurbitæ, non sunt reiciendi. Legumina omnia, & salita & acuta, omnino fugienda: saluberrima etiam quæ linguam pungunt. Intestina bonâ victus ratione humectante, imperantur otium, quies & somnus, & quæcumque humectare & saginare corpus solent. Nimia corporis motio, & frequēs vix fructuum, balnearumque, morbum citius producere faciunt, quare omnia hæc moderatè facere oportet. Atq; intèr imprimis in hac lra

Quoniam se
se extendit
elephantiasis
recens.

Actius.

Curatio.

Viduus ratio.

ut præscribatur victus ex cibo nequaquam crassum succum venientibus. Panis itaque erit hordeaceus, aut triticum retens: inter olera præter iam dicta etiam malva, lapathum, sisarum, porrum, & cappariz: rectè etiam ipsis dantur præsana, ona sorbilia, alica, lac cum melle. Vivuntur carnibus amiculatum montanatum, hædorum, gallinarum, caponum, & iis similibus: piscibus molli carne præditis. Ex fructibus conveniunt ficus & una arefacta, pyrum coctum in aqua mulsæ: à reliquis fructibus omnino abstineant. Bis cibum capere quotidie, melius est, quam semel se replere. Prandium simplicissimum parent: cena magis varia sit. Vinum tenue album & aquosum bibant: aut aquam, in qua parum cinamomi decoctum sit: vino forti & meraco perinde atque Venere per totum morbi curriculum abstineant: Somnus quidem diurnus nocivus est, nocturnus verò aptissimus. Post longum à cæna interstitium deambulatio lenta, ac sensim facta, commoda est, ut cibi eo melius descendant. A somno membra eorum plurimum & leviter manibus contrectari debent: deinde curandum ut alius excrementa deponat: post hæc deambulent, aut gestationibus committantur, & clamore exerceantur: aut frictionibus aliisve generibus exercitationum utantur. Sudore subinde, quem illic contraxerunt, absterso, adipe ursino aut vulpino illinantur, vel caprino, aut taurino, aut aliquo ex volucrum genere, aut lupo recenti. panxillo temporis interposito, cum fenugraci aut præsana succo, qui aliquid ammoniaci cum aceto liquefacti amixtum habeat: atque ita lauacro utantur, nocivum enim est malo, si quis non lauet. Commoda etiam sunt arida somenta, & post sufficientem ex dictorum usum exudationem, natationes in mari, aut sulphurentis & aluminosis aquis: somenta verò parabuntur ex fumaria, origano, scabiosa, oxylapatho, & chamæmelo, meliloto, menthastræ & similibus: à balneo detergi, ad acrimonie & mordacitatis curationem, ex oleo myrteo, rosaceo, aut massichino cum aceto & vino conquassatis illinantur: aut decocto aliquo eorum, quæ adstringunt, plantaginis scilicet, aut betæ aut belxines persundantur: optimum est & butyrum recens illitum. Post lotionem & extersionem per tenera linicola, ad hora dimidium quiescant: deinde tepidâ aquâ hantâ sponæ vomant, digitis aut pinnis in os dimittant,

missis. Postea modico intervallo temporis interposito, vinum ab-
 finitibus aut ex origano confectum bibant, non minus huius
 mensura, hoc est, uncias nouem: post cibum eis apponatur. Quod
 ad medicamentorum rationem attinet, iecur (si eius occasione Medicamen-
torum ratio.
 vitium hoc sit ortum) ad naturam temperiem reducendum est:
 & humor qui totum corpus obsidet, vacuandus. & quoniam
 humor iecoris curationem impedit, ab huius vacatione asspici-
 bimur: At cum succus hic non solum venosum genus, sed uni-
 uersum corporis habitum occupet, non uno vacuandi genere
 utemur, sed scitis in cubito venis, vesicariis hemorrhoidibus, pro-
 uocatis mensibus, purgationibus, vomitionibus, errhinis, cucurbi-
 tulis, lavationibus, frictionibus, exercitationibus, & (sicut supra
 dictum est) illis medicamentis. Protinus igitur inter initia, si Vena sectio.
 morbus deploratus non est, & vires respondeant, sanguis missi
 debet: primum ex cubiti dextri, deinde sinistri vena, non aspi-
 ciens, ne malum sanguinem exhauriendo, bonum quoque detra-
 has: proinde adhibendus in vacuando modus est. paulatim igitur
 iterata vena sectione sanguis ducendus est, precipueq; in Vere,
 quo tempore u magis abundat, morbiq; & fit & augeatur.
 Hinc & Rondeletius capite proprio inquit: Purgetur, primo le-
 uiter medicamentis eccoproticis, ut castia, diacatholico, diasebe-
 sten, diapruno, syr. ros. laxat. Postero die, si aetas permittat, trahatur
 sanguis, primum ex duabus tibis, deinde ex brachio. Quod si
 sanguis crassus & ater sit, trahatur ad vires, diuersis horis: quod
 si tenuis, sistendus. Item si membra incipiant ladi, non inutile erit
 eum extrahere e venis, quae sunt intra annularem & paruum
 digitum: item e venis frontis: sed hoc est faciendum post corporis
 purgationem, ut sanguis ater euacuatur, qui immediate morbum
 facit & fouet. Sanguis enim in habitum corporis per harum ve-
 narum extremitatem euacuatur: ut in quariana venam aperi-
 re, quae est inter annularem & paruum digitum, oportet saepe in
 processu febris, quia quasi materia coniunctam euacuat: sic
 certe in his. Quare & idem cucurbitulas & sangnifugas laudat Cucurbitulae.
 post internarum partium rectificationem, & humorum euacua-
 tionem. Sic etiam Holerius cap. proprio lib. 1: de morbo internis Sanguifugae.
 cap. 61. de elephantiassi vera: Consilium, inquit, est Galeni, ubi
 eius mali suspicio est, ut Vere sanguis detrahasur; deinde reser-
 uatum

viribus exhibeatur medicamentum, quod atram bilem purget. Ratio una instituitur, quæ sanguinem crassiorem extenuet ac depuret. Vitæ tamen immodico usus attenuantium, rationem una ex Aëtio & aliis colliges, at nos iam hac diximus. Consensus est Græcorum & Arabum, initio detrahendum esse sanguinem. Sed quia magna ex parte corruptus is est, particulatim ex utroque brachio detrahes; eligesq; maiores venas, si quidem vires patimur; multo magis cum spiratio difficilior est. alioqui venam extremæ manus vel malleoli aperies. Nonnunquam etiam contentum eris sanguisugis, aut cucurbitulis cum scarificatione apposis; partim vltis partem scapulis. Auicennas venas etiam capitis incidit, & ingulares, si suffocatio imminet. Sed & teste Aëtio, etiam mariscæ, si manare consueverint, enocanda sunt: si minus, hirudines his admouenda. ex eiusmodi enim venis crassus seculentusq; humor magis effluit; & si mulier est, quæ patitur, ciendi menses sunt, nisi aîas prohibeat. Natura enim post humorem commodè enactum, morbo superior enadit; calorq; qui ab eius copia suffocabatur, velut renuiscit, morbiq; reliquias potentius abigit. Post sanguinis vacationem, interpositis aliquot diebus, nempe vel nonem vel decem, ut in huiusmodi recreetur, viresq; resumât, medicamentis quæ atram bilem ducant, utendum est: primum quidem lenioribus (ut in cancro dictum est) deinde valentioribus. Dato igitur minoratino, mittatur sanguis è venis maioribus, deinde coquatur humor syr. de pomis, de corticibus citri, de succo boraginis; vel cum iisdem præparetur, vel cum syr. de succo buglossi, de fumo terre, lupulorum, viol. cum aquis melissophylli, lupulorum, aut buglossi: ut R. syr. viol. de pomis, de corticibus citri ana 3 ss. aquar. melissæ, buglossi. lupul. ana 3 j. misce. Vel R. syr. de fumo terre, de epithymo, de end. ana 3 j. aquar: vel decocti ex polyposio, vel folior. senæ ana q. s. pro ij dosibus vel tribus. Vel coquatur humor syr. sequentis; & postea enacentur excrementa: R. rad. buglossi. borag. ana 3 q rad. glycyrr. 3 j. rad. graminis, asparagi, corticium rad. cappar. & tamarisci, populi, si obstructio, vel tumor in splene appareat, vel à melancholia crassa fiat. Si à sanguine vel bilis assatione fiat, prætermittantur: sed addè barbarum capill. buglossi. borag. lentiscula aqua, cichor. end.

Lactuca

Consensus
Græcorum
& Arabum
de venæ
sectione.

Mariscæ eno-
candæ, vel hi-
rudinibus
exonerandæ.

Menses
ciendi.

Humoris
preparatio
sive conco-
ctio.

lactuca ana m. j. passul. mund. 3 ij. quat. sem. frig. maior. ana 3 ij. anisi 3 j. fiat decoctio in aqua hordei, ad lib. ij. in quibus dissolue syr. viol., de sumoterr. simplic. vel de cucurbita lib. j. fiat syr. arom. cum 3 ij. triasant. capiat in sex dosibus. interea tertio quoque die institiatur clyster sequens: R. mercur. bo- Clyster.
rag. cicla ana m. j. anisi 3 ss. sem. melon. cucurb. ana 3 ij. flor. chamomill. viol. borag. ana p. j. fiat decoctio ad lib. 7. ss. dissol. mellis viol. loboch de castia ana 3 ij. succi mercurial. 3 i ss. olei viol. 3 ij misce. fiat clyster: quo curandum est, ut die pre- cedente medicamentum facilius & citius ad intestina descen- dat, & à corpore egrediatur. Facta autem humoris coctione ac preparatione, purgetur corpus hoc medicamento vel simili, Purgatio.
dummodo eandem habeat proprietatem: R. florum viol. bo- rag. fumiterre, lupul. ana 3 ij hordei mundi 3 ij. senæ, epithy- mi ana 3 ij. ss. myrobal. indorum 3 j. ss. vinar. passul. 3 ss. prun. num. iq. coquantur omnia. & colentur: cuius decocti accipe 3 iiij. in quo dissolue manna Calabrensis 3 ij. vel iij. aut capix fistula 3 j. aut diacathol. 3 vi. aut confectiois hamech aut diasena 3 iij. misce, & fiat posio. Post dies aliquot sero lactis utendum: ex eoque non minus tribus heminis, neque amplius quinque, accipiendum: cui admisce aliquid scammonie, epithymi vel senæ: ita ut hæc ipsa cum modico sero ieiunius præbeamus, atque deinde ipsum serum paulatim exhibeamus. Hæc purgatio frequens esse debet: omnino namque conandum est, ut omnes corporis habitura hoc malo occupati liquefaciamus, alimurque quendam ex integro regeneremus. Id ipsum verò fiet, si per inter- nulla opportunè purgationes adhibeamur, & cibi apponantur fa- ciliis concoctionis & distributionis. Alij verò à sanguinis mis- sione preparata materia purgationem ex hiera diacolocynthidos, deinde etiam diagridio adiecto institunt: postremò etiam elle- boro; sed internallis & hæc fieri inbent. Quo tempore cessamus à phar- macis, sero lactis, lacte etiam, & his quæ humores præpa- rant & depurant, utantur. Materia ex cap. de melancholia ex- cipienda. Sed & hic sciendum, quòd medicamentum purgans in forma humida minus siccet, deinde in forma boli. Quod si non li- cet facere aliter, utatur in forma pul. vel pill. quæ siccant. in forma liquida pareatur ut superius, vel sic: R. rad. bugloss. Medicamen-
tum in forma
liquida.

glycyrr. rase ana ℥ j. polypod. querc. receuiū ℥ ij. passul. xxx. prun. sebesten num. xx. sena orientaliū ℥ iij. smmitatum iby-
mi, epithymi, cuscutha ana ℥ ij. anisi ℥ β. flor. cord. ana p. j. fiat
decoctio; & in quart. j. colat dissolue confect. hamech ℥ iij. syr.
ros. laxat. ℥ ij. misce fiat potio: capiat manē. Postero die rursus
capiat de eadem decoct. in syr. redacta, perfectē coctum cum de-
coct. borag. & mercurialm: R. decoctionis precedentis lib. j.
z. acch. q. s. fiat syr. addendo syr. ros. laxat. de fumo terra ana ℥
vj. capiat postero die à sumpto medicamento, ℥ iij. ut diximus,
cum decoct. mercurial. & borag. Et hoc debet esse commune præ-
ceptum in omnibus morbis, qui sunt à melancholia, vel quorum
materia est in habitū, ut duobus vel tribus diebus continuis eva-
cuetur. Primum medicamentum excrementa ventriculi & in-
testinorum deterget: secundum materiam irahit & euacuat:
tertium retentum euacuat, & morbum eradica. Habenda quo-
que erit ratio materia, ut si à sanguine affato vel à pituita, vel
à bile, addenda erunt medicamenta, quæ materiam euacuanc
autē dictam, siue dentur pilula, siue pulueres. siue syrup. Si bolum
eger desideres, paratur ex confectioe hamech, vel diaphæn. vel
indo maiore, addendo pul. diasena solut. ut R. diaphæn. ℥ ij. con-
fect. hamech ℥ iij. cum ℥ j. pul. diasena, & sacch. fiat bolus. Post
purgationes per intervalia, cibosq; facili collatione & distribu-
tionis exhibitos, deinceps vomitus prouidetur à cibo, aut ieiunio,
cum radícula; postea etiam cum veratro albo. Sic & Holeria
cap. proprio. Postea verò frequens vomitus, primum quidem le-
nioribus, deinde raphano; postremo elleborismo. Post hac autem
virum refocillatrice victus ratione utendum est, ac medita-
mentis quæ summam cutem desiccant, adstringuntq;. Lenēs
igitur cucurbitula seu inanes, ori ventriculi & hypochondriis
utrimque agglutinabuntur: eadem membra etiam dropace, hoc
est, unguento picato deliniuntur. Medico temporis processu rur-
sus ad superiora reuertendum est; prætermissa sanguinis detra-
ctione, ut quæ plus noxa quam presidiij esset allatura. atque hoc
circum ad ternas vices, quaternasve per annum vii expedit;
vere potissimum & autumno. Iam quoque non solum cucurbi-
tula inanes stomacho & visceribus admoventur; sed & caput-
purgia, gargarismata, unctiões, primum è vitæyro: deinde ubi
præ-

Commune
præceptum
maximè ob-
seruandum
in omnibus
morbis me-
lancholicis,
vel qui in ha-
bitu sunt.

Solut.

Vomitus.

De dropace
menit Gal.
6. cap. 8 de
sanitate
tuenda.

Caputpurgia.
Gargaris-
mata.

pruritus est, ex iis, quæ detergent: postremo cum ulcerata partes sunt, conueniunt quæ leniter adstringunt. Balnea primum sint dulcia: (persuasum autem vulgo est, balnea parata è sanguine humano, morbum hunc persanare:) deinde, si pruritus est, naturalia conueniunt. In multis remediis brassica & absinthij decoctum, storachados, & ligni sancti commendantur. Optimum quoque fuerit cum his passulas, si us, violarum flores, bugloss. & borag. incoquere, multo magis, si feruidior sanguis est. Castratio, ut singulare remedium, ab antiquis probata est. Scobs eboris, cornu cerui, succus cyrenaicæ, aselli aquarq. scilla semen, & hæc duo maxime contra dysphoriam. Smaragdus trita & ex aqua data, vel cum aqua & gummi illita. Erinacei caput laudatur à Galeno, nepeta, quæ eo modo utendum erit quo ligno sancto, id est, cum passulis & cæteriis. Laudatur theriaca, quæ in calidiore conditione temperari potest adiecta parte conseruæ viol. aut boraginis. Laudatur vinum in quo vipera viva extincta sit. Viperarum carnes abscisso capite & cauda ad purilaginem coctæ cum iure albo veterum, vel iis quæ huic morbo conueniunt, ut & carnes edantur, & insculum sorbeat. Alioqui non tam suspectum remedium, si pabulis caponum & gallinarum insculum illud & carnes misceantur. Senties penetrasse virum, cum pluma decidat auitibus, tumq; anes ad cibum elixabis. Sed theriaca & remedium usus magis tempestinus est à thermis comparatus è sumaria, boragine, endinia, nepeta, rosmarino, origano, & meliloto, & aliis eiusmodi. Cæterum theriaca ex viperis Andromachi mirificè prodest, & quasi compendium totius curationis est, si post purgationes per modica intervalla præbeatur, & eâ pariter cutis oblinatur. Mirabile quoque elephantiæ remedium viperarum usus existit: sed eas hoc modo apparatus edere oportet: primum quidem capite amputato & cauda usque ad digitos quatuor, detracta pelle, & omnibus interaneis exemptis, corpus ipsarum aqua bis aut ter lotum, in olla instar anguillarum decoquitur, aqua quidem sufficiente affusa, & oleo modico, cum porro & anetho. Liqueat autem quod carnes sint decoquenda donec molles reddantur. Post conuenientem cocturam insculum moderato sale conditur, atque ita agro in sole desidenti exhibetur, capite tamen probè velato. Neque verò semel tantum,

Vnditiones.

Balnea.

Lignum
Guaiacum.

Castratio.

Quæ vi qua-
dam occulta
conferunt.

Theriaca.

Carnes vi-
peræ.Gal. 2. ad
Glauc. cap.
penult.

aut bis viperas edere satis est, sed saepe id fiat, & praesertim cum extra periculum sit, & commoditatem afferat. Sine autem viperæ recens capta, & ex locis humidioribus, nam quæ in iuxta mare aliâq; falsa loca degunt, siticlosa existunt. Vtlio quoque (quemadmodum & Holerius annotavit) frequens circa caput satis fiat aliquando, alioqui in iibis ac genis aut musculosa parte brachiorum imprimuntur. Exinsectis (in balneo potissimum) medicamenta quæ extergunt & repurgant sunt adhibenda, ut est vitrum, sulphur vivum, pumex, resina sepia, nigella, oxylapathum, quæ interdum arida affricari possunt, aut irita cum aceto, aut rosaceo oleo, aut mastichino corpori sunt illinenda. Hoc autem mirabiles habet effectus: R. rad. runcicis m. j nitri 3 v. thuris, sulphuris ana 3 iij. contunde, & ex aceto illine. Similiter (si Paulo credendum est) hoc infra scriptum multa efficacia commendatur: R. auripigmenti 3 x sulphuris ignem non experti 3 vii i i, calcis viva, cera ana 3 iij. costi, baccarum lauri aridarum ana 3 j ss. hæc macerantur populi alba foliorum succo, aut crasso decocto: ubi mellis spissitudo est facta, illinuntur. Plura alia pete ab ipso Paulo. Ad spirandi difficultatem eorum qui elephantia laborant: aselli sub aquariis degentes quinquæ aut sex, ex aqua mulsæ cyathis tribus, hoc est, libra dimidia, potantur. Iam verò quadam ex his quæ ad agrè spirantes inscribuntur, ipsis quoque communiter competunt. Aquarum naturalium usus adhiberi debet, cum maxime necessarius, praesertim aluminosarum, ferrumq; resipientium, & si fieri potest, frigidarum: Conserui ipsis, si etiam bibantur: lunat & marinæ arenæ usus. Eandem habent efficaciam, omnia quæ desudationes movent. Quoniam verò affectus hic, non miris ac pestilentia contagiosus est, quàm longissimè ab urbibus remoti agri in locis mediterraneis, frigidis, & ubi sit hominum infrequentia, habitabunt; inde verò ad consinia migrabunt, tum ipsorum causa, tum illorum potius, qui, ut vero simile est, ipsis incident, quippe & aëre fruentur commodiore, & alios hac lue non inficiunt.

Vtlio.

Medicamenta
exterius qua-
lia adhibenda.

Paulus.

Aquarum
naturalium
usus.

OBSERVATIO VIII.

*De præſervatione à lepra Arabum, de qua
ſuſpicio erat.*

IVVENIS quidam, qui ad lepram Arabum valdè erat inclinatus, nam multis annis ſcabie ſicca furfuracea per totum corpus laborauerat, cum cutis deſcèdatione, ad me conſilii aut auxilii petendi gratia cùm Delphos veniſſet, huic vt in Vere & autumno phlebotomia fieret, imperauimus: nam in leprâ confirmatâ, quod percipitur ex corruptione formæ & figuræ, non multum competit phlebotomia à magnis venis, nec fortis medicina laxatiua, quia materia iam eſt extra venas, & eſt in membris inbibita, & non poteſt reuocari: quanquam poſſent iſta competere ratione materiæ antecedentis, ſi lepra eſt ex ſanguine, quantum ad phlebotomiam; vel ab aliis humoribus, quârum ad pharmaciam, vt vocant. Arque hunc quoque Primum canonem poſuit ipſe Valeſcus in generali curatione. quemadmodum & Secundum canonem ſumpſit ex Auicenna & Serapione & aliis, quod principium curationis lepræ debet eſſe in frequenti euacuatione materiæ, cum digeſtione competenti tali humori. Tertius canon eſt, poſito quòd ibi ſit ſanguis plurimus corruptus, per vices ex magnis venis trahendus: ſi verò non, tunc ex iſdem venis plus noceret quàm iuaret: & iſte canon ex Auicenna deſumptus eſt. quemadmodum & Quartus, ex duabus Guidenegi, pro gutturis rauedine, ſi timeatur ſuffocatio. Quintus canon eſt, quòd medicinæ fortes, vt ex elleboro, in principio non adminiſtrandæ, ob materiæ inobedientiam, ſed potiùs leniores ſint frequentandæ. Sextus: qui lepram vult curare, oportet vt roboret tres coſtiones, & præcipuè tertiam & aſſimilatricem quæ in membris celebratur. Septimus:

mus: oportet ut leprosus omnino à coitu alienetur, ut & Auicenna admonuit. Octauus: Vnguenta, balnea, vel topica ante vniuersalem purgationem celebranda non sunt, ne poros oppilent. Nonus est canon Auicennæ, quòd eius carniū viperaliū, & rerum in quibus virtus earum existit, sublimior, id est, certissima, existit leprosis medicina. & quamquam hi canones generales ponuntur in curatione vniuersali, etiam competunt in præcautione: nam videtur & curatio particularis nihil aliud quàm præcautio & præuisio esse, cū tantū lepra vera Arabum curetur cū est in dispositione, & non cū est in habitu. Ideò, ut præcaueamus, vel dispositionem curemus, præcautionem siue maius dicere curationem decem scopis perficiemus. Primò victus ratione & vitæ institutione. Secundū igitur Rhāsim oportet ut hic iuuenis sese transferat in regionem valdè humidi aëris, & non superflui frigoris. utatur optimo pane, vino albo, vel claretō maturo, cum bona quantitate aquæ; vel ceruisia consueta, non fœculenta aut crassa. Carnibus mutonis, capreti, gallinarum, perdicum, phasianorum, auium campestrium vescatur: piscibus squamosis, ex aquis mundis: ouis sorbilibus, hordeato, auenato, herbis optimum sanguinem generantibus, borag. malu. bugloss. fœnic. fumoterræ, petros. apio, hyssopo, calamentho, quæ ventriculum & primam coctionem robovent. utaturque cibis leuibus, dulcibus, velocis penetrationis & nutritionis, & qui impinguant corpus: & ideò lac ex animalibus sanis ab eodem Rhāsi commendatur, & iuuenibus. Cauebit à cibis incrassantibus, adurentibus sanguinem. Coitum vitabit omnino, quia materiam malignam & vaporem putridum exterius propellit, ut ait Arnoldus de Villanoua in libro de retardanda senectute. Declinet iram, solitudinem, tristitiam, laborem corporum quoque & animi; superfluum calorem, frigus

gus excedens. Fructus recentes maximè vitentur;
(ebulliunt enim & citò corrumpuntur;) & quicquid
excitat & resoluit humiditatem, auctore Auicenna.
Secundò, materiam digeremus, & parabimus
cum syr. de fumo terræ, vel eo qui describitur apud
Valescum cap. proprio; vel decocta (vt vocant)
Maialia, quæ sanguineæ purificent, præscribemus:
quæ medicus præsens pro suo arbitrio componere
potest. Tertiò: digestâ materiâ, eam purgabimus
cum decocto senæ, polypod. fumiter. borag. bugloss.
epithymo, & prunis. Etiam tunc sanguinem postea
mittemus ex utroque brachio per interualla, vt
medico præsentî videbitur commodum. Interim
ad syr. digerentes, tum ad apozemata præparantia
reuertemur: mox Quartò ad purgationes validio-
res reuertemur, cum diasene, confect. hamech, hie-
ra Ruffi. Tandem Quintò cum elleboro nigro, mo-
dò robustus videatur, procedemus. ego soleo in de-
coct. senæ & aliis purificantibus imponere ʒj. vel ij.
pro viribus, rad. ellebori nigri & solummodò in
Vere, cum suo correctorio, nempe semine dauci. De
his vide Mef. Auic. Valesc. & alios auctores cap.
proprio. Quod autem ad materiam coniunctam
attinet euacuandam, possunt & competere phlebo-
tomia ex naso, cum setis porcinis; & de pulpis au-
rium, & de summitate narium; & scarificationes
extremorum pro materia coniuncta. Sextò ad ca-
put purgia veniemus, vt succum maioranæ inicien-
tes in nares: vel errhinis utemur, de quibus consu-
lendum est caput de cephalæa: vbi & tractatur de
maſicatoriis, vt est zinziber cum mastice: hæc
quoque materiam coniunctam consumunt, aut
euacuant. Septimò ad balnea & lauacra progredie-
mur, & stuphas ex fumo terræ, lapathio acuto, sca-
biosâ, rosinarino, flor. stæchad. camomill. melilot.
Cum autem egreditur, theriacamumat ad ʒj. &
in lecto sudet ac dormiat: postea ſumat cibum
som-

competentem. hæc in diluculo fiant. iubet & Valescus stando in balneo cum dictis decoctionibus fieri frictionem cum panno aspero, vngendo caput & totum corpus cum sanguine leporis calido. Postea cum sanguis ille fuerit exsiccat, intret stupham dictarum herbarum, & lauet se; id ipsum continuando multis diebus ac septimanis & mensibus. post frictionem inungat se cum balsamo vel oleo terebinthinæ; vel hoc vnguento Guidonis; \mathfrak{z} . vng. citrini lib. j. vng. albi lib. β . pingued. serpentis quart. j. olei ros. vng. popul. ana quart. β . & fiat vng. Mandè verò intret stupham, & se abluat. Potest admisceri & oleum tartari, & oleum frumenti. Octauò administrabitur caro serpentis eo modo quo dictum est Scholiis præcedentibus. Sed quia hîc tantum fit præcautio, sat erit vsus theriacæ moderatus. quomodo autem viperæ præparentur, vide etiam ad longum apud authores & Valescum cap. proprio. Nonò extirpabimus tuberositates, & malum faciei colorem corrigemus. hæc autem remouentur eo modo qui scribitur capite de saphati; id est; pustulis rubeis, albis vel liuidis circa nasum; cum rubore totius faciei. Vide Valescum tract. suæ Chirurgiæ cap. 16. Sed quia hic iuuenis nondum tales pustulas habet, idè si superueniant, poterit medicus ex loco iam citato remedia querere, vel cap. 21. de lepra apud eundem, sub finem. Decimò, si fiat oppilatio in naribus, fiat tenta ex bombace, quæ contingat vsque ad colatorium; & circumlinatur vng. citrino; & aspergatur puluere lithargyi & aristoloch. rotundæ. At vt pili superciliarum crescant, primò sanguisugæ ponantur in superciliis, prius bene fricatis & rubificatis: deinde capill. Ven. recens & ladan. ana p. æq. bulliant in oleo laurino; & inde supercilia vngantur.

SCHO-

SCHOLIA.

GILBERTVS in curatione lepræ in generali, ex mente Hippocratis, censet, si vacuum vel phlebotomandum sit, id in Vere fieri debere, aut in autumno; interim cum tutioribus medicamentis. Sed quia in precedentibus satis de curatione generali diximus, nunc pauca ex neotericis adiciamus, quæ unicuique speciei magis conueniant: ideò elephanticum, inquit Gilbertus, diatetur (sic enim barbarè loquuntur) copiosè, sed cibo digestibili; aliter enim cadunt in defectum & periculum. Et sciendum quòd uni elephantico vix sufficiat quod tribus sanis sufficeret, propter consumptiua melancholiæ malitiæ. Vnde præ cæteris maxime cauendi sunt à fame, & frigore. Præparetur eorum materia cum diantho, diasene, oxymell. squill. syr. de fumoterre, cum aqua decoct. thymi, epithymi, sene, cuscute, florum borag. & folior. eius manè & serò. Purgetur verò cum hiera logod. partibus duabus, & una hiera Ruffi, vel cum oxymelle Iuliani. Tertia die fiat stupha ex fumoterre, lapathio aceto, scabiosa, boragine, epithymo, & aliis herbis calidis detergentibus. Existenti in stupha offeratur theriaca maior, cum succo sumitæ tepido; & sic fiat tribus diebus continuis. Sequenti die post ultimam stupham, quia materia est putrefacta intus & exiit, aperiatur vena hepatica. Quarta die apponantur ventosa supra renes, ad extrahendum subcutaneam materiam. Singulis quindecim diebus fiat prædicta stupha; ita tamen ut sequenti die post stupham offeratur theriaca opiata: de sex in sex septimanis alternatim aperiatur cephalica in una parte; & in alia, hepatica. In singulis autem binis mensibus purgentur; sed omni mense moderatè phlebotomentur, duabus uncis extractis, vel parum plus, in declinatione lune. Non placet tamen mihi toties repetita vena sectio. Inbet idem quoque fieri scarificationes in anterioribus & posterioribus tibiarum. Aliquando ponatur ventosa in fonticella colli, vel sub mento, aliquando fiat phlebotomia in summitate nasi. Fiant etiam cantheria in tibis & brachiis. Quod ad localia attinet, stuphetur facies cum aqua decoctionis thymi, epithymi, sene, cuscute, folior. borag. florum croci, palear. hordei, & auenæ. & tunc fiat inunctio cum equali mixtura ung. susci

Curatio elephantiæ.

& ung. ad falsum phlegma, & acuatnr pulvere litharz. adie-
 ctis sem. frigidis. Mand. abluatur facies cum colatura fursurii,
 vel lanatura sabarum fractarum; vel ex succo bryoniae, & sem.
 frig. pul. finis pulvis, & temperata una in aqua tepida post stu-
 pham, ea facies illiniatur, & abluatur, ut prius. Vel extractio
 sanguine nasi, tota facies illiniatur & sinapizetur pul. & in
 sequenti die lauetur, ut dictum est. Iterum redendum ad syr.
 de succo fumiterre; & in colatura decoquenda epith. thymum,
 sena, aristoloch. rotund. gentiana, myrrha, bacca lauri, cinamo-
 mum, zinz. & caro serpentis sic preparata. Accipe serpentem,
 qui reperitur in nemoribus, qui habet ventrem album, & in me-
 dio ventris lineam rubeam, in dorso nigram. remoneatur caput
 & cauda, & exentretur medium, & decoquatnr cum pradiſtis
 usque ad integram resolutionem carnis coleatur, & colatura ad-
 misceatur zacch. & fiat syr. De hoc syr. accipiat de tertio in ter-
 tium diem quantum testa oui capiti, cum aqua tepida. Preceden-
 te usu istius electuarij decoquatnr serpens preparatus in vino
 albo, remoris osibus ac spina, teratur caro, & admisceatur cum
 duabus partibus diasena, & fiat electnarium contra frigidam
 causam. Sed contra calidam causam duae partes rosata novella
 & tertia carnis serpentis addantur. Item utatur syr. de fumo-
 terra, cum apozemate thymi, epithymi & sena omni hebdoma-
 da. Comedat omni die unam, apium ante cibum cruda; & po-
 tione anacardi semel in hebdomada utatur cum sero caprino. &
 pul. quodam anacardi, cum aliis speciebus apud eundem Gilber-
 tum descriptis. quae tamen mihi videntur satis calida. In Leo-
 nina, quae fit à cholera, abstinere inbet ab acutis sanguinem adu-
 ventibus, aceto, animi accidentibus, praecipue ira, & ab his quae
 calfaciunt. Vti debent diata temperata: sudent saepe in aëreo bal-
 neo, non multum calido. Preparetur materia cum duabus parti-
 bus oxyzach. & tertii syr. de fumo terra. Digesta purgetur cum
 duabus partibus electuarij de succo ros. & tertia parte cathartici
 imperialis, vel hiera Ruffi. Fiat stupha ex herbu frigidis, por-
 tul. lact. plantag. quinqueneruia, foliis vivearum, salicis, lapathij
 acuti, scabiose, fumiterre. Exentii è stupha offerantur duae part.
 rubia trochis. cum tertia parte iheriaca. Sequenti die iteretur
 stupha, & detur opata. Similiter fiat die tertio. Post tertiam
 stupham

Curatio leo-
 nina & lepra.

stupham aperiatur vena cephalica, vel altera hepaticarum, sin-
 gulis mensibus, in secunda aetate linae; vel cephalica in uno bra-
 chio, & hepatica in alio, fiant predictae scarificationes in sibis
 & brachiis, quater in anno purgetur ut dictum est, & singulis
 mensibus fiat predicta stupha: & singulis quindecim diebus offe-
 ratur predicta epinata. Localia sic fiant. fiat suffumigatio cum
 scolopend. paka hordei, avenae, & succo fumiterre. & fiat
 inunctio cum ung. citrino misto cum pul. gummi arab. drag.
 albi, litharg. corad. lauetur in postera die cum colatura sur-
 furis vel fabarum, vel sero caprino tepido: vel frequenter lauetur
 facies cum lacte tepido sem. frig. & accipiatur diap. cu syr. de su-
 moterra, & syr. ex succo borag. cum aqua cucurb. de:ur & cas-
 sia, thamarindi, vel myrobal. citr. cum syr. iam dicto. Et in hac
 specie confert abscessio testiculorum: in frigidis verò causis nocet.
 Nares saepe illiniuntur oleo ros. vel aqua in qua decoquantur
 viol. ros. & gummi Arab. & amyli modicum: quae omnia bene
 colata per nares trahantur violententer in profundum. Pro fissura
 oris liquefiat axungia gallinae, cui succus consolida maiorem com-
 misceatur, addito litharg. & amylo, & anthera ana fiat ung.
 Succus etiam cymbalariae seuo agnino aequaliter admixtus idem
 efficit. Cum lacte etiam caprino recenti & calido saepe bucca
 illiniatur. Tyriaci verò sugiant omnia incoctilia, melancholica,
 viscosa, salsa, acuta, inflammantia, vinum forte, iram, ieiunia,
 vigiliam, coitum: super omnia exercitia fortia, repletionem, cra-
 pulam, ignem; & naribus quandoque pilula de castoreo insun-
 dantur. Ad digestionem materia detur diacyminum, dianthos,
 oxymel squill. syr. de fumoterra. Materia digesta purgetur cum
 duabus partibus hiera picrae, & tertia hiera Russi. Tertia die fiat
 stupha ex foliis sambuci, ebuli, scabiosae, fumiterre, lapathij acu-
 ti, calamenth. menthastr. apij, absinthij, calend. laeud. sisymb.
 & in aqua ponatur parum aceti & olei, & sol. borag. aliarumq;
 cal. herb. & ita fiat tribus continuis & singulis diebus. & ex-
 eunti à stupha detur Mithridat. vel theriaca cum succo fumi-
 terre tepido. Sequenti die, post ultimam stupham, aperiatur ce-
 phalica in uno brachio, & hepatica in altero. & quater in anno
 purgetur, & fiat stupha, & offeratur theriaca, & fiant phlebo-
 tomiae & ventosa, scarificationes & cantheria rupatoria, pra-
 dicta

Curatio le-
 prae Tyria-
 dicar.

dictis temporibus. Facies stupetur cum aqua decoctionis folior.
 sambuc. ebuli, calamiisbi, origani, scabiosa, fumiterre, lapathij
 acuti; & fiat unctio cum equali mixtura ung. citrini & albi,
 & acuaturs cum pul. libarg. plumbi vsti, ros. brasili. postero die
 lauetur cum colatura surfuris vel fabarum, vel cum sero caprino.
 item apponatur sanguisuga in summitate nasi, & cum sanguine
 illiniatur tota facies, & superaspargantur pulvis predictus; & se-
 quenti die lauetur facies ut dictum est. Praterea accipe serpen-
 tem, & decoque eum cum tritico; pascantur gallinae, & tunc de-
 plumabuntur, & remonebuntur pluma. assentur gallina ista, &
 offerantur omnibus leprosis, ad renovationem carnis, & depositi-
 onem vetusta. Et si de pinguedine inde fiene inungatur facies,
 idem operatur. Mox reuertatur ad predicta electuaria, & post
 usum eorum ad syr. de fumo:erre, & alia localia predicta de
 de elephanta. & exhibeantur sanguinem mundificantia, cum syr.
 de fumo:erre, cum sero caprino. Pusula inungantur ung. fusco,
 & ung. contra phlegma salsum, & albo simul mixtis. & inun-
 ge anbera dropace, ung. de tartaro. Referunt hepar erichij afferunt
 in prodesse. In Alopecia, digerantur materia cum oxyz. & tertia
 parte syr. de fumo:erre. Valet & zach. viol., ros. tripli. sarac.
 cassia, cum quibus purgeitur, vel cum sero caprino. deinde dentur
 diarrhod. abb. sine musco, triasant. syr. viol. cum apozem. cus-
 cuta, cetera minoris, vel cum sero caprino in quo azara bac-
 cara cocta sit. Tertia die post etiam purga, adiecta tertia parte
 hiera Russi: fiat stupha ex herbis frigidis, ut fumo:erre, lapath.
 acut. borag. scabios. & exennii offerantur due partes rubia tro-
 chis. & tertia theriaca maioris, cum succo fumo:erre tepido; idq;
 tribus diebus continuis. deinde fiant ph'ebotoni, cancria, ruptoria,
 & alia, ut in aliis speciebus dictum est, & redeant ad elect. syr. &
 stupetur facies cum decoct. herb. frig. palea hordei, avena, &
 iungatur cum axung. gallinae predicta, vel cum ung. de thure,
 massice. Vel liquefiat iragacant. alb. gummi arab. in aqua ros.
 & admasce equali pondere ung. citrin. & fiat unctio. Tota
 nocte obuoluetur facies p'plo. Mane laet se, ut dictum est, &
 postea mundificetur cum lacte sem. frig. vel lacte caprino, vel in
 vino decoct. serpentis, predicto modo preparato: quod vinum
 etiam valet in omni specie lepra, ad consumptionem venenosa

Curatio le-
 pro Alopecie
 dicta.

materia, & ad mundificationem faciei. Vel thus althum tritum,
 mixtum cum oleo viol. precedente stapha ex eo fiat unguento. Alij
 & extracto sanguine de facie patientis, faciem illinunt sub nocte:
 & mane abluunt, ut praedictum est. Vide trochisc. apud Gilber-
 tum, qui dissoluti cum oleo amygd. amar. vel viol. illinendi. Si
 pustulae sunt ulcerosa, ung. albo fusco, & ad phlegm. salinum; ad-
 iecta cernisa, litharg. utantur. Fiant dropaces, scarificationes, ven-
 tolationes, in occipito, sub mento, in summitate nasi; pheboto-
 mentum & tibia, vel ante & retro scarificentur. Si a coitu fiat le-
 pra, de utroque brachio fiat phlebotomia. Digerantur materia cum
 duabus partibus oxyzacch. & tribus de sumoterra: & purgetur
 cum confect. hamech alijs addunt hieram Russi, deinde conficiunt
 staphas ex frigidis, ut in adoperia. alijs offerunt partes duos rubia
 trochisci. & vitam theriaca, cum syr. sumoterra, triens continuis
 diebus, a stapha sanguinem detrahunt, uno die ab hepatica, altero
 a cephalica, & redeunt ad staphas, ad opiatas, & ad scarificatio-
 nes in tibiis, ruptoria, ventosas sub mento, omni mane exhibens
 zach viol. syr. de sumoterra simplicem. Faciem inungunt cum
 ung. cirino, admixta exigua aqua ros. abluunt cum aqua sarsu-
 ra, vel sabarum. Si infectio a frigida melancholica vel phlegma-
 tica, digere cum oxymello partibus duabus, & tertia syr. de su-
 moterra: & purgetur cum duabus part. hiera picra & tertia hiera
 Russi in phlegmate; in melancholia cum duabus partibus hieralog.
 & tertia hiera Russi. Stapha ex herbu calidis, foliis sambuci,
 ebuli, scabios laparth acuti, sumiterra: excunt a balneo theriaca
 maior denu, cum succo sumiterra. deinde fiant phlebotomia, pan-
 co extracto sanguine, ut dictum est, per vices. deinde redeundum
 ad staphas & opiatas, scarificationes, ventosas, & ruptoria sub
 mento & contra malum colorem capiat vinum insus. Rhab. la-
 uerur facies cum vino repido, in quo puruerit Rhab. pul. Acuo-
 unt ung. cir. cum pul. br. silij. nocte inungatur facies, mane ab-
 luatur. In omnibus speciebus per internallum confert theriaca
 exhibita, & caro vipera. Gilbertus dicit vix centum cauteria
 posse sufficere. De accidentibus quae in habitudine exteriori lepro-
 forum contingunt, ut sunt pustula, oppilatio narium, gingivarum
 corrosio, mortificatio, insensibilitas, depilatio superciliorum, ser-
 pigo, impetigo, & morphea, haec pauca ex eodem adiciamus.

Si lepra sit
 ex infectione
 post coitum
 cum leprosis.

Accidentia
 quae in habi-
 tudine exte-
 riori lepro-
 forum con-
 tingunt.

& primò de pustulis quæ sunt ex sanguine vel alio humore. ex sanguine sunt rubæ, molles, & facili suppurantur. ex cholera, citrina molles, aliquantulum dura, & exigentiam sanient emittunt. à phlegmate, albæ tenues, citò sanient facientes. à melancholia, dura sunt, livida, terrea. In viraque causa suffragietur facies cum aqua decoct. malvæ, bismalvæ, viol. ita fiat ritus diebus, mane & serò : & post singulas fumigationes inungantur pustule cum rasura lardi, quia facit ad emolliationem & consumptionem : & tunc phlebotomo aperiuntur in duobus tribusve locis ; & cum sanguine inde fluente distemperetur pulvis lithargyri vel plumbi vili, & masticis, & fiat emplastrum ; amittunt pustulis superponatur. Contra causas ex frigidityte fiat suffragium cum aqua decoct. fumiterre, lapidib. acutis, scabiosis, tribus diebus continuis mane & serò : & post fumigationem fiat inunctio cum succo porri, & rasura lardi, & deinde phlebotomo aperiuntur, & cum sanguine inde fluente distemperetur pulvis hermodact., eliebor. albi & aluminis : & fiat emplastrum, & superponatur. Sed & aliq. hoc fortiori, nempe calce vitæ distemperata cum aceto & oleo inungunt pustulas : aut ruproium commune ex mixtura equali cantharid. & fermenti distemperant cum aceto, & imponunt. Duris vero scissis in modum crucis phlebotomo, & sanguine inde fluente pustulas fricant : postea inperso pulvere ex lithargyr. cernis. auripigmento & alumine folium caulis apponunt. Item facto ruporio & remota cruce in omni specie lepra frigida apponatur pul. equalis mixtura viridis eris & tartari, ad pustularum corruptionem. At in causa calida lithargyr. & tartar. sumatur ad pustularum corruptionem. Sed in viraque causa fiat inunctio cum ung. citrino acenato seu mixto cum pulvere litharg. ad carnis regenerationem & cicatrizationem. Item accipe limaces rub. dividantur per medium, & superponatur pulvis salis gemmæ, & illud liquidum quod exillat, admiscetur cum pinguedine terre quæ ubique reperitur terrarum. inde illuminantur pustule & facies mundificat sanient, & consumit pustulas. Pinguedo emanans ex sumario vel sterquilinio putrefacto idem prestare creditur. Item cinolia, quæ reperiunt sub mola fabrorum, excideant & distemperentur cum aceto, & fiat inunctio idem facit crota vel acatia cum aceto,

Pustulæ le-
proforum
quomodo
curentur.

Et hoc à plurimis pro præstantissimo habetur, vel litharg. cum oleo & aceto. Vel ex creta, litharg., cadmia, bol. arm. & aceto confice emplastr. Ad desiccationem verò humiditatum pul. baccarum lauri, nitri, salis gemma cum terebinth. conficiantur; & ungatur corpus ad solem aut ignem: confert. Ad palliationem verò, & earundem remotionem venosam cum scarificatione post collum & spaulas ponantur. Post certum diem sanguisuga subter ubera ponantur: dande ungantur ung. vel feruenti unguen. idq; ad ignem: R. sponu Gallici 3 iij. picula lib. j. cera 3 iij. axungia veteris 3 vi. fatina lupinarum, olei filiginis ana 3 ij. capirelli q. s. & poteris addere nitri, succi cyclaminis ana 3 iij. ad 3 r: aut præcipuum est. Ad Elephantiam verò proprium est quod R. piperis, sulphuris ana 3 iij. pyrethri 3 j. olei phialam j. succi porri, saponis Gallici ana lib. j. in balneo se ungat, prius abrasus. Contra oppilationem navium leproforum iniungatur tenta de gantiana, cura ung. curruo acuto, cum lithargyrio vel plumbo vsto, & navibus imponatur. & si inde foris fiat vltio, iniungatur cum rasura lardi, & succo porri, si causa fuerit calida: si autem causa fuerit frigida, cum pinure lithargyri & tartari; vel immutatur aurea alexand. cum oleo muscellino. Contra depilationem superciliorum pulverizetur talpa combusta, ungula caballina, cerebdlum, & siccum sericū. & apponatur sanguisuga supercilio, & cum repleta fuerit comitatur, & istorum pulneres commiscantur, & facta inuastione cum oleo lapdanino vel spuma apri in superciliis prædictis pulvis undique superaspergatur. Vel fiat scarificatio: & postmodum confectio fiat ex pulvere facto ex asperu & spinosis folliculis castanearum adustis. Vel imponatur pul. factus ex muscu, apibus, vespis combustis. Gargarismi corrosio, mortificatio, insensibilitas, serpigo, impetigo & morphea carentur ut in propriis capitulis. Sed & hoc unguentum unice valet serpigini, impetigini & elephantia: R. aloës, litharg. arsenici, antipigmenti, argenti vini, tartari, mastice, olivani, cumini, sulphuris, picule, axungia veteris q. s. unge ad solem vel ad ignem. Aliud Memphicum dictum, valens ad morpheam & lepra palliationem: R. succi lapathij acuti, succi enula, succi consolida maioris, succi mentha & cyclaminis ana 3 ij. nitri, tartari, boracu,

Vng. ad
tyrian.

Ad elephanti-
am.

Contra oppi-
lationem na-
rium lepro-
forum.

Contra depi-
lationem
supercilio-
rum in le-
prosis.

Vng. ad ser-
piginem, im-
petiginem, &
elephantiam.

Ung. Mem-
phicu ad-
terius mor-
phicu, & ad
lepre pallia-
tionem.

cryſtalli, coralli albi, ſulphuris ana ꝑ. argenti vivi, albes ana
ꝑ. ꝑ. nigella alba, ſanguinis leporis, olei frumenti ana ꝑ. ꝑ. fa-
tina lapinorum, tragacanthi, ceruſe, gerſa ſerpentaria, pingued.
medull. oſium gallina, ſinapi albi ana ꝑ. ꝑ. coſſice cum Ung.
citr. vel pinguedine, vel oleo cum quo ſuccum ſimiliterra & la-
parbi & enula miſceantur. coquantur ad ſuccorum conſumptione-
uem. Aegyptius per uſare hoc malum: & ſi in reges incidiſſet,
poſſe Plinio lib. 26. cap. 1. balneo humani ſanguinis uleb-
ant ad medicinam. At Conſtantiinus (ut quidam referunt) Im-
perator, cum hoc morbo laboraret, & medicorum indicio cruo-
rem humanum ſingulare remedium eſſe illi diceretur, optimus
princeps, & Chriſtiani dogmatibus nuper imbuſus, cum au-
diſſet, abhorruit; & malle ſe dixit ſemper egrotare, quam tam
immani remedio conualeſcere. Hinc recte Bapiſta Manuauus
Carmeliſa lib. 1. de patientia, cap. 20. quomodo querenda
ſit ſanitas, ita ſcribit: Sed in ſanis reſtituendo, inquit, non ſufficit,
niſi modum querendi ſi licitus. Licita ſani quæ lege concedun-
tur. Conceduntur autem quæ non prohibentur. Omne quod
peccatum eſt, prohibitum eſt; & omne quod prohibitum, pecca-
tum. Propterea ut puniri aures, fornicari non licet. Nec au-
diendi ſunt illi medici, qui ad corporis ſanationem peccatum in-
ducunt. Quæ enim dementia eſt, ut corpus mundes, animam
inquinare: id ſimile eſt ac ſi ut argenti ſerues, aurum amit-
tas; ne vaſtem amittas, corpus occidi patiaris. Quæ autem pro-
hibita ſunt in arte medica, iam diximus, cum contra impioſiores
medicos ageremus: ut ſunt incantationes, ſortilegia, artes ma-
gica, & omnes ſuperſtitiones. Et ita Aegyptii non minus pec-
cabant hominis ſanguinem fundentes, dum hominem uocato, re-
ges ſuos leproſos curabant, eiſdem ſanguine inſtructi balneis.
Sed ea quæ naturalia ſunt, magis amplecti oportet. Atque hæc
de lepra Arabum ſatis dicta eſſe arbitror: nunc ad lepram Gra-
ecorum ueniamus, quæ ab hac plurimum diſtat.

Hiſtoria Con-
ſtantiini Im-
peratoris
leproſi.

Non ſunt
audiendi me-
dici, qui ad
corporis ſa-
nationem
peccatum
inducunt.

OBSERVATIO IX.

De lepra Græcorum, (quæ quibusdam probatis authoribus deterrima species impetiginis est) per modum consultationis, pro puella octo annorum nobilissima.

FILIOLE tuæ, generosissime Domine, quæ in Campo Regio moratur, figuram genethliacam (vt vxor tua nobilissima à me postulsuerat) idiomate Germanico à me iuxta astrologorum decreta conscriptam, ad te nuper misi, & nunc meam de eius passione intercuranea sententiam, tum curationem (vxore etiam tua à me idipsum petente) libenter transmitto. Vitium enim illud, quo crura tum brachia filiolæ tuæ charissimæ afficiuntur, pertinere puto ad quartam speciem impetiginis, iuxta Fernelium doctissimum, quæ lepra Græcorum existit. Non est elephas seu lepra Arabum: nam elephas habet propriū (vt expertissimus ille Io. Bapt. Montanus medicus consultatione sua c x l v i de defœdatione cutis ostendit) vt occupet carnem & ossa: sed ista defœdatio cutim solummodò inuasit. & quanquam lepra Græcorum maximam similitudinem habeat cum psora; differunt tamen: Nam lepra habet pathognomonicum accidens, vt decidant squamæ, vnde habuit nomen, quia squamæ quotidie decidunt. Galenus distinguit psoram à leprâ, quia lepra non habet asperitatem & inæqualitatem, vt psora. Hic autem affectus non habet quidem inæqualitatem, cutem tamen rodit, & altè depascit ac findit. ideo hoc vitium sub capite lepræ ponimus, quæ omnium aliarum, inquit Fernelius, impetiginum deterrima est: ea enim cutim vehementer rodit, altè depascit, & findit: ex qua non solum furfures sed & squamulæ decidunt, modò pallidæ, modò

subnigræ, cum nascatur ex bile atra, cui etiam crassæ lentæque pituitæ salsæ quiddam sit admistum. Filiolæ autem tuæ squamæ decidunt potius pallidæ quàm subnigræ; unde plus pituitæ salsæ habet, nec ad extremum malum, de quo Fernellius meminit, peruenit: unde ea ipsa curari fortassis poterit, ut postea dicemus, sicut lichenēs, seu imperigines. Cæterum quod filiola tua hoc vitio afficiatur, iuxta decreta siderum minùs miramur, ut in genitura eiusdem annotauimus, quam cum linguâ vulgari (ut uxori tuæ satisfaceremus,) scripserimus, hîc eandem Latine paululum explicabimus. Cum enim hæc Cancrum, signum morbosum vitiosumque, in frontispicio Horizontis habeat, tum Scorpius in sexta locum occupet, augent hæc vitia simul & Mars truculentus, dominus sextæ, antiscium suum ei aculans in Saturnum maleficum: tum Saturnus quoque in Martem: & ita malefici hî duo planetæ mutuò sese afficiunt. Luna in octauo loco, hærens in Aquario, cæcra inficit. Sol similiter in Piscibus, signo morbofo, in Martis opposito cutim squamis cominaculat, & exulcerat. Solent enim tria illa signa vitiosa, Cancer, Scorpius, ac Pisces, potissimum horoscopus intuentes, vel culminantes, aut male firi, pustulas cancrasas, cutis defædationes, vitiliginēs (quas leucas, alphos seu morpheas vocant), elephantiasin, seu lepram Arabum, ac etiam psoram & lepram Græcorum, lichenēs, impetigines, serpigines, maculas rubeas, pruriginēs, aliæque eius generis vitia in cute tum carne curatu contumacia progignere. Videtur præterea hoc malum (quo filiola tua laborat) non solum ex genitura seu cælesti configuratione, ut ad longum idiomate Germanico scripsimus, verum etiam successu quasi hæreditario ortum sumpsisse: unde & difficilius hanc defædationem cutis curatum iri suspicor. Mater enim eius, nobilis matrona, uxor tua charissima, cum adhuc puella

puella esset, & nondū menses erumpent (vt mihi ipsi retulit) eādem cutis defœdatione laborauit ad annos aliquot, vt etiam medici quam plurimi, vānè de hoc genere vitij & desceptarent & sentirent: sed profluentibus mēstris hęc præter opinionem multorum, à fœdo isto cutis colore liberata est. Faxit Deus, vt & filiola tua charissima eodem modo quoque liberetur, quemadmodum & nos speramus futurum. Quod si neque illo tempore quo menses erumpent, vitium tollatur, iuxta Hippocratem diutius eidem adherere posset, qui aphorismo 28. lib. 3. ita nobis scriptum reliquit: Plurimæ autem passiones puerulis iudicantur, nonnullæ quidem in 40 diebus, nonnullæ in septem mensibus, nonnullæ verò in annis septem, quædam verò ista 2d pubem accedentibus: quæ verò permanferint, nec in pubertate finierint, puerulis autem feminei sexus, cum mēstrua erumpunt, consensescere consueuerunt. Interim tamen curationem in hoc tempus minimè distrahendā cenleo, ne seipendo in grauius malum procedat; ita vt non corpus tantum, sed & faciem occupare posset, nam & in capite etiam sese nunc exerit. Quamobrem suaderem etiam, vt hoc tempore, cum nunc in Vere simus, exquisita optimaq. remedia adhibeantur. Consultius quoque putarem, vt id in Hæga-Comitis domi vestræ fieret, quàm hîc in Campo regio apud domitellas religiosas, cum hęc passio intra recta contineri debeat, nec omnibus tutum sit euulgari: nam etsi illa duntaxat sit lepra Græcorum, & nondum Arabum, temporis tamen processu in eam transmutari posset, quod Deus auertat, nec ego eò progressurum malum puto. Sed quia hoc malum etiā ad lichenem pertinet, cum totam faciem occupare possit, oculosque contingere, & sic fermè extremæ fœditatis causa futura; idèd diligentiori curâ vtendum erit: & cum in Vere simus, corpore toto euacuato.

cnato, vti hie in Campo Regio cam incepimus pur-
gare per decocta longa ex fumo terræ, sena, myro-
balindis, citrinis, ita illam purgationem tandem in
Haga. Conitis perficere possumus: & denum ad
topica progrediemur, vti est oleum de frumento:
prius tamen videntes balneo ex hedera arborea, mal-
ua, fumo terræ, foliis lappæ, salicum, vngula cabal-
linæ, béræ, & similibus. deinde salua ieiuna propria,
locâ intingat. Sed & hoc vnguento liniatur, quo &
altera puerla à nobis fuit curata. quæ pro elephan-
tica habebatur. & luhargyri aurî & argenti macera-
ti per noctem in aceto acerrimo ana ʒj. iussuris
vini ʒß ellebori nigri ʒj salis nitri ʒij. succi limo-
nom ʒj. butyri recentis, axungia porcina ana ʒß.
olei ros. q. s. cum modico ceræ fiat vnguentum. Si
verò hæc non iuerint, reliquam curationem cum
ad Dominum veniemus, perficemus, si Deo pla-
cuerit.

SCHOLIA.

Gal. in Gni-
tionibus.

Paulus lib. 4.
cap. 2.

Curatio Le-
pre Græco-
rum & psora.

DE lepra Arabum in precedentibus satis dictum est. At Gra-
corum lepra (de qua nunc agimus) est cuius mutatio in ha-
bitum, qui præter naturam sit, cuius asperitate & pruritibus, do-
loribus, nonnumquam & squamis decidentibus; interim plures
hæc etiam corporis partes depascitur. Lepra & scabies, inquit
Paulus, sunt affines affectus: uterque enim cutis asperitudo est,
pruritus, in qua corpus alijsumitur, colliquaturq;. Insuper ab eodem
sunt humore, hoc est, melancholico; seu ayabiliari. Differunt
figurâ: quoniam lepra, aliam eueni orbiculatim depascitur, &
piscium modo squamulas ex se remittit: scabies vero summa in-
festat porus, variè figurata, surfuracea, edit. At de lepra, psora
scn scabie satis diximus. Scholio objer. 10. lib. 2. de moribus
præter naturam, de impetigine, ex mente ipsius Fernelij, tum
aliorum. Verum de scabie libro sequenti quoque dicemus, cuius
eius multa existant differentiæ. Cæterum quod ad præsens nego-
tium attinet, horum affectuum curam, inquit Leonus ex mente
eiusdem Pauli, lib. suo de moribus præter naturam, à venæ
sectione (diuturno vires & atas consentiant) aggrediemur.

Itaque

Quæque si fuerit lepra aut scabies à sanguine, vel à bile per ad-
missionem, quod ex colore rubeo vel citrino apprehendes: prius le-
nita alno) in adultis sanguinem usque ad 3 vii, quandoque
plus, quandoque minus (prout opus fuerit) ex basilica dexteri la-
teris detrahes. Quid si melancholicum, necus adusta, peccauerit
(ex colore enim illud atrore cognoscitur) sanguinis vacuatio
per hemorrhoidas molienda, si ager hu pati assueverit; si mi-
nus, aperiemus venam in sinistra manu, quæ salubrella dicitur.

At quoniam prurita falsa quandoque scabiei causa est, & pra-
cipue in senibus, tunc nulla, vel satis parua phlebotomia fiat;

Gal. de
tempr. causis
2. cap. 6.

purgatio verò satis, quæ atram bilem ducit, tam in lepra

Cræcorum, quam psora, est exhibenda. Prius igitur sequenti-

Digestio.

bis syrupi materia digeratur: R. syr de fumo terræ, de lupulis,

de endivia, de pomis ana 3 ss. (vel de epithymo) decocti scabinia,

sumiterra, cicorea ana 3 j. misce. & per septem vel plures vices

hanc quantitatem exhibe. Deinde exhibe minoratum ex as-

sa, pauca adiecta quantitate co. sectionis hameth, in loio, vel

sero lactis. Interea verò non abesse sicut; si patiens singulo mane

per quatuor horas ante cibum, huiusmodi balneo in thalamo

calidiori, ad provocandam scabiem adveniem, utatur: R. folior.

Balncum.

malua cum rad., viol. cum rad., hordii ana m. j. bulliant in

lq. aqua, usque ad consumptionem tertie partis: deinde coleu-

tur; & colesora diluat se patiens in omnibus membris affectis.

Apparentibus iteinde signis concoctionis (vel exhibitio prius leni-

tio, postea assrupis) materia purgabitur hic vel similibus: R. aloës

Pilule.

epaticæ 3 ij. cortic. myrobalan. flava. 3 ij. ss. follicul. sene, agri-

ci optimi, epithymi ana 3 i. sumaria 3 ij. iragacanthi, ros. pur-

pur. ana 3 ss. cum aqua sumiterra fiant pilula: de quibus detur 3

j. plures autis ut pro astatu ac viri ratione. Vel sic: R. pil. de su-

mo terra 3 ij. aurcar. Nicolai, ferid ana 3 ss. & fiant pilula v.

In pituita falsa R. diacathol 3 v. confect. hameth 3 ij. diatur-

lith maior 3 ij. misce. & cum zaccaro fiat bolus: vel potius in

Bolus.
Potus.

decoct. commun. flor. & fruct. q. s. cum qua bulliant folior. sene,

polypod. querc. summitat. sumiterra ana 3 ij. propina duabus ho-

ris ante lucem. Corpore vacuato, utatur balneo aereo aut aqua

Balncum.

dulci, in qua rad. oxylapathi, sumaria, scabiosi, betæ, oxalis,

malua, fœnugrac. & similia decocta sint. Repone in sacculos

farina

farina lentium, fabarum, hordei, & furfures, & cum iis absterge totum corpus. A balneo ager in lecto stragulis operatus fudet. Extrinsecus autem pro linimento utere communiter utroque Vetro; calcemq; habe elotam & siccam; in ipso usu aqua diluens, ad sordium spissitudinem: Valent frondes olea, cocta cum aqua & aceto; item aqua sulphurea vel marina, cum frondibus olearum. Vel R. salvia, olea lachrymæ ana ℥ iij. corticis rad. capp. guini ana ℥ vii. contunde, & inunge ex aceto. Aliud: R. bastula regia radicis saci ℥ iij. sulphuris ignem non experti, muna thuris ana ℥ v. muri ℥ iij. aceto subacta illinantur. Ad scabiem quoque peculiariter facit ex simplicibus staphys agria, lupini amari, cardamomum cum aceto; liliiradix cum melle, resina terabintina, sulphur, cicer, caprillæ stercus. Inter composita, mysi & chalcitis pari modo ex vino, humidiores scabies delinuntur. Vel R. diachilonis, cera ana ℥ i. picis liquida ℥ iij. rosacei ℥ β. argenti spuma, ceruse ana ℥ i. β. stercoris argenti, Sirici, id est, sandiaci ana ℥ j. aceti quantum siccis lenigandis sufficit. Ad scabiem phavorum, in quibus nulla adhuc præcessit evacuationio, præter aliam non consentientem, plurimum valet sequens unguentum: R. olei ros. ℥ iij. salis communis, butyri recentis loi ℥ j. misce: & in mortario contunde donec fiat unguentum molle. Aliud: R. terabintina lota aqua ros. ℥ iij. succi limonis ℥ j. β. butyri recentis ℥ j. vitelli oui unum. j. salis communis ℥ j. misce: & omnia diu in mortario agitentur, donec fiat unguentum. Sciendum rarsen est, quod in huiusmodi affectibus scabiosis & leprosis (corpore prius purgato) ipsa aqua thermales Pisarum in Hericja miri sunt effectus, (ut & annotavit Leonus) si in iis patiens balnearur. Sed & ego etiam omnes sulphureas thermas conferre puto; & apud me commendatur illud unguentum ipsius Montani descriptum consultatione CXXI, valens ad lepram Græcorum & scabiem ortam ex visio virtutis assimilationis: quod sic fit: R. rad. leparthii ℥ iij. rad. ellebori nigri & albi ana ℥ ij. hordei fracti p. ij. bulliant omnia in s. q. aqua ros. ad consumptionem duarum partium: deinde facta diligenti expressione, & colatura, R. salis niri ℥ iij. olei rosacei, butyri recentis ana ℥ ij. bulliant simul ad consumptionem aqua. Deinde R. succi limonum ℥ iij. terabintina ℥ ij. misce omnia simul: & cum

Paulus 4.
cap. 2.

Cautio.

Unguentum
Montani, ad
lepram Græcorum, &
psoram.

refrigerari incipit, addito vitellos onorum num. iij. & vsui re-
 seruari iungatur scabies prius scalpta. Amatus Centuria 2. cu-
 rat. 35. de psora & lepra Græcorum, ita inquit: Iohannes ab
 Antiquis, nobilis Antonitanus, & Venetorum consul dignissi-
 mus, quum quinquagesimum ætatis suæ annum attingeret, torne
 psora & lepra scatebat: pro quibus deponendis affectibus, quum
 varia, sed frustra, experiretur remedia, nostro consilio decoctum
 radicis cynara ebibat; à quo liber ab ea corporis sedatione enasis,
 nec amplius in eandem recidis. Idem inquit Centur. 2. curat.
 98. ad scabiem & lepram tamquam expertus confirmo, & plu-
 rimū approbo illud medicamentum quod habet radices enula
 campana viridis lib. ss. pingued. porc. 3 ss. in mortaria marmoreo
 pistentur, & ad lentum ignem parum ebulliant, & fiat ung.,
 quo eger pustulas inungat. Est enim miranda virtutis hoc un-
 guentum, ut incantamento vini opus simile videatur: cuius vires
 (inquit) si expertus fueris, nobis consenties. Aliud, & est ipsius
 Rondeletii, valens ad psoram, lichenos & huiusmodi vitia, quod
 & ad lepram Græcorum, quam Fernelius inter species imperi-
 ginis seu lichenis ponit, valere puto: R. olei de iunipero 3 ij. olei
 nucis 3 j. tartari vini albi 3 j. virioli, salis communis, sulphu-
 ris ana 3 iij. terebinthina loca in succo limonum 3 ij. lithargyri
 3 j. ss. cere parum: fiat ung. Si morbus fuerit contumax, adde
 argenti vini 3 ij. sublimati 3 ij. & erit efficacius. Applicetur
 post purgationem & balnei usum, & mollescant crusta, & ci-
 tius penetrat. Vel R. olei de iunipero 3 iij. olei lucernarum &
 nucum ana 3 ij. tartari vini albi nouiss. pul. 3 j. ss. virioli, salis
 communis ana 3 iij. litharg. auri 3 iij. incorpora simul; quibus
 adde succi plantaginis & limonum ana 3 iij. aceri squillitici
 3 j. incorpora simul, & fiat unguentum. Cæterum de scabie lib. o-
 sequenti, cum de tumoribus ex humoribus permixtis, vel maculis
 curis agemus, latius dicturi sumus. Nunc in ordine ad tumores
 melancholicos etiam sequebantur & varix & polypos. Sed cum
 de varicibus dixerimus lib. 29. Obs. & Curat. medicinalium
 nostrarum, observatione 22. de polypos autem (cuius causa ma-
 iorales sunt humores crassi & viscosi à capite derivati, per
 aduersionem, ad melancholiam tendentes, estque ipse humor me-
 lancholicus adustus) lib. 13. Obser. & Curat. medicinalium
 nostra-

Historia
 Amati de le-
 pra Græco-
 rum & psora.

Vng. exper-
 tum eludens,
 ad lepram &
 scabiem.

Vnguentum
 Rondeletii ad
 psoram, li-
 chenes, & le-
 pram Græco-
 rum.

partitus corporis, ex materia phlegmatica, inter verrucas adnumerat, part. 1. de apost. fig. cap. de verrucis, porris, acrochordonibus & lupiis. Nos autem lupias antea ad glandulas reuoluimus. Valescus verò tract. de chirurg. cap. 22. de verrucis. Verruca, inquit, sunt dura excrescentia in manibus & pedibus, & aliquando in aliis corporis partibus. harum causas vult esse humores phlegmaticos grossos vel melancholicos, quibus phlegma admisceatur. Phlegma namque quamuis sit naturaliter humidum, tamen per admixtionem melancholicæ conuertitur ad namram siccitatis. Et similiter potest fieri ex sanguine concusato & ingrossato, præterquam quod putrescit in aliquo loco, nec in venis patris, & a natura externis isti humores mittuntur, & in verrucas conuertuntur. Qui verò Græcos sequuntur, ut paulo antea dictum est, à crassis atrabilaribus humoribus fieri volunt. Sed ex his, inquit idem Valescus loco citato, quædā vocantur Porri, quia habet quasdam radices. ad extra, ad similitudinem porrorem; & in istis arguitur maior siccitas materiæ. Aliquando sunt ad similitudinem cornu: quia induratur & crescit in altum; & aliquando vocantur Clani, quia habent caput ad modum clauorum affixorum, quorum capita externis manent. At Græci verrucas, ut diximus, in acrochordonem, myrmeciam, thymion & clauum distinxere. de Acrochordone iam dictum est. At Myrmecia sunt verruca humiliores, durioresq; quæ radices altius exigunt, maiorem dolorem mouent, infra lata, supra autem tennes, nigrae coloris, ad contactum dolorem exhibentes eiusmodi, qualis à morsu formicæ animalis contingit, unde etiam nomen habent. Ita & Fernelius Verruca enim sessilis; quæ Græcis est myrmecia, humilior est thymio, lupino vix umquam maior, dura, stabilis, latiore basi, radices altè exigens; dolorem cit. Thymion verò est verruca super corpus eminens ad extem, ut acrochordon, tenuis, supra latior, subdura, & in summo peraspera; idq; summum colorem floris thymi repræsentat, à quo denominatur. habet ferè magnitudinem fabæ Aegyptiæ; raro maior est; interdum perexiguum: modo enim, modo autem plura nascuntur, vel in calis, vel palmarum, vel in pedum plantis: pessima sunt in obscenis partibus, maxime ubi sanguinem fundunt. De his autem, nempe thymis formicis, moris, scubus & verrucis ac clauis veteri & carne addi-

Causæ ex
neotericis &
barbaris.

Porri.

Clau.

Myrmecia.

Mupianicæ.
Sessilis ver-
ruca.
Thymion.

ta, latius egimus lib. 28. Obs. nostrarum medicinalium, obs. 53.
 & potissimum in Scholiis eiusdem obs. De pendendorum thymis
 & verrucis ac sedis egimus 23. lib. schol. obs. 9. Sed & de his
 nonnihil dicemus obs. sequenti. Sed & Fernelius: Altera thymion
 dicta, & colore thymi florem repræsentant, ad curam etiam te-
 nuis est, in summo lata & dura, & aspera, pensili muner. At de
 clauo postea seorsim caput proprium adidemus. Cæterum, quod Præligat.
 ad præfagia attinet; scire oportet quod verrucarum genera licet
 exigua sint mole, tamen sœda sint, ac plerumque molesta; ideoq;
 in morbis haberi debent. Est enim verruca morbi officialis, in
 unguero addito, secundum Gal. 1. de morb. cap. 9. & verruca
 raro solitaria (quod & Fernelius de thymio intelligit) sæpius
 complures proveniunt, maximè in palmis pedibusque puerorum.
 Plerumque ex inopinato comparent, atque etiam nonnunquam
 subito dispärent. Ex his acrochordon & thymion sæpe etiam per
 se (ut retulit Celsus, & hoc ipsum confirmatur à Tagautio cap. Celsus.
 proprio de verrucarum iudicio & curatione) finiuntur: & quo
 minora sunt, eo magis. Myrmecia & Clauis sine curatione vix
 umquam desinunt. Acrochordon si excisa est, nullam radiculam
 relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Thymio clauoque excisis
 subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad car-
 nem, eaque relicta idem rursus exit. Myrmecia latissimis radici-
 bus iubarant: ideoque ne excidi quidem sine ulceratione magnâ
 possunt; & sine curatione vix umquam desinunt; & difficiliter
 curantur quam acrochordones. De curatione nunc agamus, hoc
 prius interposito exemplo.

OBSERVATIO XI.

Per modum consultationis, de verrucis in virga &
 alijs locis, ad Petrum Chirurgum Brielensem.

PETRI STI à me, Petre, amice candidissime, qui-
 bus modis verrucas in virga aut veretro tollere
 posses, cum apud te in Brielis agerem. Rogabam eo
 tempore, num. ille de quo postulabas auxilium seu
 consilium, morbo Gallico laboraret: respondebas
 eâ lue hominem minimè affectum esse, quamuis ra-

subnigræ, cum nascatur ex bile atra, cui etiam crassæ lentæque pituitæ falsæ quiddam sit admistum. Filiolæ autem tuæ squamæ decidunt potius pallidæ quàm subnigræ; vnde plus pituitæ falsæ habet, nec ad extremum malum, de quo Fernellius meminit, pervenit: vnde ea ipsa curari fortassis poterit, ut postea dicemus, sicut lichenēs, seu impetigines. Ceterum quod filiola tua hoc vitio afficiatur, iuxta decreta siderum minùs miramur, ut in genitura eiusdem annotauimus, quam cum linguâ vulgari (ut uxori tuæ satisfaceremus,) scripserimus, hîc eandem Latine paululum explicabimus. Cum enim hæc Cancrum, signum morbosum vitiosumque, in frontispicio Horizontis habeat, tum Scorpius in sexta locum occupet, augent hæc vitia simul & Mars truculentus, dominus sextæ, antiscium suum ei aculans in Saturnum maleficum: tum Saturnus quoque in Martem: & ita malefici hi duo planetæ mutuo sese afficiunt. Luna in octauo loco, hærens in Aquario, cæcra inficit. Sol similiter in Piscibus, signo morbofo, in Martis opposito cutim squamis cominaculat, & exulcerat. Solent enim tria illa signa vitiosa, Cancer, Scorpius, ac Pisces, potissimum horoscopus intuentes, vel culminantes, aut male siti, pustulas cancras, cutis defædationes, vitiliginēs (quas leucas, alphos seu morpheas vocant) elephantiasin, seu lepram Arabum, ac etiam pforam & lepram Græcorum, lichenēs, impetigines, serpiginēs, maculas rubeas, pruriginēs, aliaque eius generis vitia in cute tum carne curatu contumacia progignere. Videtur præterea hoc malum (quo filiola tua laborat) non solum ex genitura seu cælesti configuratione, ut ad longum idiomate Germanico scripsimus, verum etiam successu quasi hæreditario ortum sumplisse: vnde & difficilius hanc defædationem cutis curatum iri suspicor. Mater enim eius, nobilis matrona, vxor tua charissima, cum adhuc puella

puella esset, & nondū menies erumperent (vci mihi ipsi retulit) eādem cutis descœdatione laborauit ad annos aliquot, vt etiam medici quam plurimi, variè de hoc genere vitij & desceptarent & sentirent: sed profluentibus mensibus hæc præter opinionem multorum, à scœdo isto cutis colore liberata est. Faxit Deus, vt & filiola tua charissima eodem modo quoque liberetur, quemadmodum & nos speramus futurum. Quod si neque illo tempore quo menies erumpent, vitium tollatur, iuxta Hippocratem diutius eidem adherere posset, qui aphorismo 28. lib. 3. ita nobis scriptum reliquit: Plurimæ autem passiones puerulis iudicantur, nonnullæ quidem in 40 diebus, nonnullæ in septem mensibus, nonnullæ verò in annis septem, quædam verò iam ad pubem accedentibus: quæ verò permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis autem feminei sexus, cum menstrua erumpunt, consensescere consueuerunt. Interim tamen curationem in hoc tempus minimè distrahendam censeo, ne serpendo in grauius malum procedat; ita vt non corpus tantum, sed & faciem occupare posset, nam & in capite etiam sese nunc exerit. Quamobrem suaderem etiam, vt hoc tempore, cum nunc in Vere simus, exquisita optimaq. remedia adhibeantur. Consultius quoque putarem, vt id in Hæga-Comitis domi vestræ fieret, quàm hîc in Campo regio apud domicellas religiosas, cum hæc passio intra tecta contineri debeat, nec omnibus tutum sit euulgari: nam etsi illa duntaxat sit lepra Græcorum, & nondum Arabum, temporis tamen processu in eam transmutari posset, quod Deus auertat, nec ego cò progressurum malum puto. Sed quia hoc malum etiam ad lichenem pertinet, cum totam faciem occupare possit, oculosque contingere, & sic fermè extremæ scœditatis causa futura; ideo diligentiori cura vtendum erit: & cum in Vere simus, corpore toto euacuato.

enato, vti hie in Campo Regio eam incepimus purgare per decocta longa ex fumoterre, sena, myrobaliudis, citrinis, ita illam purgationem tandem in Haga Comitis perficere possumus: & denum ad topica progrediemur, vt est oleum de frumento priustamen vtenies balneo ex hederâ arborea, malua, fumoterre, foliis lappæ, salicum, vngulæ caballinæ, betæ, & similibus. deinde salua ieiuna propria, loca intingat. Sed & hoc vnguento liniatur, quo & altera puella à nobis fuit curata, quæ pro elephantica habebatur. & li hargyri aurî & argenti macerati per noctem in aceto acerrimo ana ʒj. sulphuris vivi ʒss. ellebori nigri ʒj. salis nitri ʒij. succi limonium ʒj. butyri recentis, axungie porcine ana ʒss. olei ros. q. s. cum modico ceræ fiat vnguentum. Sin verò hæc non iuuerint, reliquam curationem cum ad Dominum veniemus, perficemus, si Deo placuerit.

SCHOLIA.

Gal. in huius
tionibus.

Paulus lib. 4.
cap. 2.

Curatio le-
pre cetero-
rum & psora.

De lepra Arabem in precedentibus satis dictum est. At Graecorum lepra (de qua nunc egimus) est cuius mutatio in habilitum, qui præter naturam sit, cum asperitate & pruritus, do-
loribus, nonnumquam & squamis decidentibus; interim plures
hæc etiam corporis partes depascunt. Lepra & scabies, inquit
Agius, sunt affines affectus: uterque enim eadem asperitudo est,
pruritus, in qua corpus afficitur, colligaturq; Insuper ab eodem
sunt humore, hoc est, melancholico; seu ayabiliari. Differunt
figuræ, quoniam lepra, aliam eadem orbiculatam depascunt, &
piscium modo squamitas ex se remittit: scabies vero summa in-
festat poris, varie figurata, surfuracea, edis. At de lepra, psora
sen scabie satis diximus. Scholio obser. 10. lib. 2. de humoribus
præter naturam, de impetigine, ex mente ipsius Fernelij, tum
aliorum. Verum de scabie libro sequenti quoque dicemus, cuius
eius multa existant differentie. Ceterum quod ad præsens nego-
tium attinet; horum affectionum curam, inquit Leonus ex mente
eiusdem Pauli, lib. suo de humoribus præter naturam, à venæ
sectione (diuturno vires & alas consentiant) agrediemur.

Itaque

Yeaque si fuerit lepra aut scabies a sanguine, vel à bile per ad-
 misionem, quod ex colore rubeo vel citrino deprehendes (prius le-
 nita alno) in adultis sanguinem usque ad 3 v i i, quandoque
 plus, quandoque minus (prout opus fuerit) ex basilia dexteri la-
 teris detrahes. Quid si melancholicum iucius aduila peccauerit
 (ex colore enim illud arriore cognoscitur) sanguinis uacnatio
 per hamorrhoidas molienda, si azer huius pati assuerit: sic mi-
 nus, aperiemus venam in sinistra manu, que salustella dicitur.

At quoniam pigritia falsa quandoque scabiei causa est, & præ-
 cipue in senibus, tunc nulla, vel satis parua phlebotomia fiat; pur-
 gatio uero si uis, qua atram bilem ducunt, tam is lepra

Gal. de
 sympt. causis
 2. cap. 6.

Græcorum, quam psora, est exhibenda. Prius igitur sequenti-
 bus syrupis materia digeratur: R. syr. de fumoterra, de lupulis,

Digestio.

de endiuia, de pomis ana 3 ss. (vel de epithymo) decocti subrosa,
 fumiterra, cicorea ana 3 j. misce. & per septem vel plures vices

hanc quantitatem exhibe. Deinde exhibe minoratum ex cas-
 sia, pauca adiecta quantitate p sectionis hamech, in bolo, vel

sero lactis. Interea uero non abire fieri, si patiens singulis mane
 per quatuor horas ante cibum, huiusmodi balneo in thalamo

Balneum.

calidiori, ad prouocandam scabiem adterenti, utatur: R. folior.
 malua cum rad., viol. cum rad., hordii ana m. j. bulliant in

3 q. aqua; usque ad consumptionem tertia partis; deinde colen-
 tur; & colatura diluat se patiens in omnibus membris affectis.

Pilule.

Apparentibus deinde signis concoctionis (vel exhibitio prius leni-
 tina, postea assrups) materia purgabitur huius uel similibus: R. aloës

epaticæ 3 ij. cortic. myrobalan. flaua. 3 ij. ss. follicul. sene, agari-
 ci optimi, epithymi ana ʒ i. fumaria ʒ ij. iragacanthi, ros. pur-
 pur. ana 3 ss. cum aqua fumiterra fiant pilule: de quibus datur 3

j. plus minus uel pro aetate ac uirum ratione. Vel sic: R. pil. de fu-
 moterra ʒ ij. aurear. Nicolai, ferid ana ʒ ss. & fiant pilule v.

Bolus.
 Potus.

In pituita falsa R. diacathol 3 v. confect. hamech 3 ij. diatur-
 lith maior ʒ ij. misce. & cum saccharo fiat bolus: vel potus in

Balneum.

decoct commun. flor. & fruct. q. s. cum qua bulliant folior. sene,
 polyod. querc. summitat. fumiterra ana 3 ij. propina duabus ho-
 ris ante incem: Corpore uariato, utatur balneo aereo aut aqua
 dulci, in qua rad. oxylapathi, fumaria, scabios. beta, oxalis,
 melus, fenugrac. & similia decocta sint. Repene in sacculos
 farina

farina lenium, fabarum, hordei, & surfures, & cum iis absterge totum corpus. A balneo ager in lecto stragulis operitus iudet. Extrinsecus autem pro linimento utere communiter utroque veratro; calcemq; habe oleam & siccam; in ipsa usu aqua diluens, ad sordium spissitudinem: Valent frondes olea, cocta cum aqua & aceto; item aqua sulphurea vel marina, cum frondibus olearum. Vel R. salvia, olea lachryma ana ℥ iij. corticis rad. capp. guaiaci ana ℥ vii. contunde, & in unge ex aceto. Aliud: R. bastula regia radice succi ℥ iij. sulphuris ignem non experti, natuna tinnis ana ℥ v. niri ℥ iij. aceto subacta illinantur. Ad scabiem quoque peculiariter facit ex simplicibus staphys agria, lupini amari, cardu aquum cum aceto; lilii radix cum melle, refina terobinibina, sulphur, cicer, caprilli stercur. Inter composita, mysi & chalcitici pari modo ex vino, humidiores scabies delinantur. Vel R. diachilonis, cera ana ℥ j. picis liquida ℥ iij. rosacei ℥ ℥. argenti spuma, ceruse ana ℥ j. ℥. stercoris argenti, Sirici, id est, sandiaci ana ℥ j. aceti quantum siccis lenigandis sufficit. Ad scabiem puerorum, in quibus nulla adhuc praecessit evacuatio, praeter aetatem non consentientem, plurimum valet sequens unguentum: R. olei ros. ℥ iij. salis communis, butyri recentis loti ℥ j. misce: & in mortario contunde donec fiat unguentum molle. Aliud: R. terobinibina lota aqua ros. ℥ iij. succi limonis ℥ j. ℥. butyri recentis ℥ j. vitelli oui unum. j. salis communis ℥ ij. misce: & omnia diu in mortario agitentur, donec fiat unguentum. Sciendum tamen est, quod in huiusmodi affectibus scabiosis & leprosis (corpore prius purgato) ipsa aqua thermales Ejsarum in Hebrida mirisunt effectus, (ut & annotavit Leonus) si in eis patiens balneetur. Sed & ego etiam omnes sulphureas thermas conferre puo; & apud me commendatur illud unguentum ipsius Montani descriptum consultatione CXXI; valens ad lepram Graecorum & scabiem ortam ex visio virtutis asinulatina: quod sic fit R. rad. lepathii ℥ ij. rad. ellebori nigri & albi ana ℥ ij. hordei fradi p. ij. bulliant omnia in s. q. aqua ros. ad consumptionem duarum partium: deinde facta diligenti expressione, & colatura, R. salis niri ℥ iij. olei rosacei, butyri recentis ana ℥ ij. bulliant simul ad consumptionem aqua. Deinde R. succi limonis ℥ ij. terobinibina ℥ ij. misce omnia simul: & cum

Paulus 4.
cap. 2.

Cautio.

Unguentum
Montani, ad
lepram Graecorum, &
psoram.

refrigerari incipit, addito vitellos onorum num. ij. & vsui re-
 seruatiungatur scabies prius scalpia. Amarus Centuria 2. cu-
 rat. 35. de psora & lepra Græcorum, ita inquit: Iohannes ab
 Antiquis, nobilis Antonitanus, & Venetorum consul dignissi-
 mus, quum quinquagesimum ætatis suæ annum attingeret, torne
 psora & lepra scatebat: pro quibus deponendis affectibus, quum
 varia, sed frustra, experiretur remedia, nostro consilio deorsum
 radicis cyrara exhibit; à quo liber ab ea corporis sedatione exiit,
 nec amplius in eandem recidit. Idem inquit Centur. 2. curat.
 98. ad scabiem & lepram tamquam expertus confirmo, & plu-
 rimis approbo illud medicamentum quod habet radicis enula
 campana viridis lib.ß. pingued. porc. 3ß in mortaria marmoreo
 pistentur, & ad lentum ignem parum ebulliant, & fiat ung.,
 quo ager pustulas inungat. Est enim miranda virtutis hoc un-
 guentum, ut incantamento æmulo: simile videatur: cuius vires
 (inquit) si expertus fueris, nobis consenties. Aliud, & est ipsius
 Rondeletii, valens ad psoram, lichenus & huiusmodi vitia, quod
 & ad lepram Græcorum, quam Fernelius inter species imperi-
 ginis seu lichenis ponit, valere puto: R. olei de innipero 3 ij. olei
 rariari vini albi 3 j. vitrioli, salis communis, sulphu-
 ris ana 3 iij. terebinthina loca in succo limonum 3 ij. litharg. yri,
 3 j.ß. cera parum; fiat ung. Si morbus fuerit contumax, adde
 argenti vini 3 ij. sublimati 3 ij, & erit efficacius. Applicetur
 post purgationem & balnei usum, & mollescant crustæ, & ci-
 tius penetret. Vel R. olei de innipero 3 iij. olei lucernarum &
 nucum ana 3 ij. rariari vini albi nouiss. pul. 3 j.ß vitrioli, salis
 communis ana 3 iij. litharg. auri 3 iij. incorpora simul; quibus
 adde succi plantaginis & limonum ana 3 iij. aceri squillæ
 3 j. incorpora simul, & fiat nigrum. Cateris de scabie libro
 sequenti, cum de tumoribus ex humoribus permistis, vel maculis
 cutis agemus, latius dicturi sumus. Nunc in ordine ad tumores
 melancholicos etiam sequebantur & varix & polypos. Sed cum
 de varicibus dixerimus lib. 29. Obs. & Curat. medicinalium
 nostrarum, obseruatione 22. de polypos autem (cuius causa ma-
 teriales sunt humores crassi & viscosi à capite derivati, per
 aditionem, ad melancholiam tendentes, estque ipse humor me-
 lancholicus adustus) lib. 13. Obser. & Curat. medicinalium
 nostra-

Historia
 Amati de le-
 pra Græco-
 rum & psora.

Vng. exper-
 tum eiusdem
 ad lepram &
 scabiem.

Vnguentum
 Rondeletij ad
 psoram, li-
 chenes, & le-
 pram Græco-
 rum.

nostrum, Obser. 7. & 8. in quorum scholis quoque hæc ita explicantur, ut non opus sit hic retractare: ideo benevolus lector loca iam citata percurrere potest. Restat igitur ut de verrucis agamus, quæ etiam pertinent ad tumores præter naturam melancholicos.

OBSERVATIO X.

De Verrucis.

MULTA referuntur experimenta ad verrucas. Sic meus pater charissimus Iordanus Forestus, dum iuuenis Louanij litteris incumbebat, & manus verrucis repletas haberet, eidem consultum fuit à Iohanne Spiringio medico illius temporis præclarissimo, ut omni die sale & aceto verrucas confricaret; quò remedio sanatus fuit, ut mihi puero aliquando rettulit. At multa referuntur à mulierculis & aniculis experta, sed valdè superstitiosa, & veræ fidei Christianæ aduersissima, dum præculas nescio quas tacite submurmurantes, manus suas lauant quotidie r. r. maiali, vel singulis dominicis diebus aqua Asperginali exorcistica; cui sal inspergi solet, quod forte verrucas consumit. Vel ipsas verrucas confricant pannis lineis inadescentis, & die Dominico soli ad exiccationem expolitis præculas Germanicas nescio quas superimurmurant, tanquam penitentia ductæ, quod die Dominico pannos lineos exiccandos soli expoluerint. Non desunt quæ caluaris alicuius demortui cum magna superstitione verrucas infricant. Sed omnia hæc veræ religioni, ut dixi, contraria, pijs potius detestanda, quam admittenda sunt: ideo naturalia remedia magis amplexabimur: quale illud est Amati Cent. 6. curat. 34. ignitis sarmentis dextræ adhibitis, quibus ille absque ullo dolore intra octo dies puerum sanauit. Quemadmodum & alij sanari referuntur liquore stercorei bouillo supernatante, aut sudore equino verrucas infricantes, vel ipsi inun-

Ais sapius liquore limacum sale resolutarum; aut sanguine columbino; quo fertur quædam pulchra puella nuper curata. quibus addes & alia remedia in Scholio subsequenti annotata, quibus & veteres uti solebant. Sed, quod omittendum non est, nostrâ ætate quidam succo calendulæ solo mundò, sanati sunt.

SCHOLI A.

VERRUCA proprie significat editiorem acuminatam Verruca magisq; saligiatam montis partem: à cuius similitudine ^{quidam} appellarunt antiqui Verrucas emoues quosdam, siue emunctas, in summa hominum cute apparentes, aut embo apud Italos Porcioni diuunt, eo quod quædam, siue quædam, siue capillamenta porcorum, ad cutem non abscissa corpore: nostratibus lingua vulgari dicuntur W'ra. Sunt, ut inquit Galenus, germina vitiosa multitudinis ad exteriora, & incens repentis. Verrucarum species sunt acrochordon, myrmecia, ihy ^{Verrucarum} mum, clauis: quorum vultures à crasso atque illa humori ^{specie} bus sunt; & parum inter se origine varians de quibus tamen ^{causa} separatim scribere superuacuum non fuerit. Est igitur Acrochordon verruca pensilis, orbicularis, angustam basim obtinens: sic dicta, quod chorde nexu suspensa pendere videatur, sed magnitudinem raro excedit: vix una tantum eodem tempore nascitur, sed ferè plures, maximeq; in pueris. Verruca pensilis (inquit & Fernellius) que acrochordon Græcis appellatur, parte quidem summa latior, ima vero, que ad cutem est, tenuior, quæ quasi pediculo innititur, exquisitè dura est & aspera, cinereo-color. Barbari vero (ut Gordanius) excrescentiam esse volentes ad modum capitis uberum, mollem, pendentem, ortant ex materia phlegmatica. Sed & hic idem verrucam distinguit hoc modo: portio. Verruca, inquit, est duro dura & spissa, per totam corporis nata, maxime in pedibus & manibus, origo à materia phlegmatica & melancholica. Idem sunt porri, nisi quod porri sunt verruca minime fixa ad modum portorum, habentium multas barbas; & hoc est propter maius dominium melancholicæ frigoris & terre. Idem & lupus, quæ gerantur in palpebris & oculis

Verrucarum
specie.

Causa.

Acrochor-
don.

Celsus.

Quomodo
verruca à
porri, alie-
rant.

partibus corporis, ex materia phlegmatica, inter verrucas adnumerat, part. 1. de apost. fig. cap. de verrucis, porris, acrochordonibus & lupis. Nos autem lupias antea ad glandulas reseruamus: Valescus verò tract. de chirurg. cap. 22. de verrucis, Verruca, inquit, sunt dura excrecentia in manibus & pedibus, & aliquando in aliis corporis partibus. harum causas vult esse humores phlegmaticos grossos vel melancholicos, quibus phlegma admisceant. Phlegma namque quantum sit naturaliter humidum, tamen per admixtionem melancholiae convertitur ad naturam siccitatis. Et similiter potest fieri ex sanguine conculcato & ingrossato, praeterquam quod praesit in aliquo loco, nec in venis parvis, & a natura exterius isti humores mittuntur, & in verrucas convertuntur. Qui verò Gracos sequuntur, ut paulo antea dictum est, à crassis atrabilibus humoribus fieri volunt. Sed ex his, inquit idem Valescus loco citato, quaedam vocantur Porri, quia habent quasdam radices ad extra, ad similitudinem porrorum; & in istis arguitur maior siccitas materiae. Aliquando fiunt ad similitudinem cornu; quia indurantur & crescit in altum; & aliquando vocantur Clavi, quia habent caput ad modum clavorum effixorum, quorum capita exterius manent. At Graci verrucas, ut diximus, in acrochordonem, myrmeciam, thymion & clavam distinguere. de Acrochordone iam dictum est. At Myrmecia sunt verruca humiliores, durioresq; quae radices altius exigunt, maiorem dolorem mouent, infra laeta, supra autem tenues, nigrae coloris, ad contactum dolorem exhibentes eiusmodi, qualis à morsu formicae animalis contingit, unde etiam nomen habent. Ita & Fornelius: Verruca enim sessilis; quae Graecis est myrmecia, humilior est thymio, lupino dixi vniquam maior, dura, stabilis, latiore basi, radices altius exigens; dolorem cit. Thymion verò est verruca super corpus eminens ad extem, ut acrochordon; tenior, supra latio, subdura, & in summo peraspera; idq; summum colorem floris thymi representat, à quo denominatur. habet ferè magnitudinem fabae Aegyptiae; raro maior est; interdum perexiguam: modo unum, modo autem plura nascuntur, vel in talis, vel palmis, vel in pedum plantis: pessima sunt in obscenis partibus, maxime ubi sanguinem sudant. De his autem, nempe thymis, formicis, moris, scibus & verrucis ac clavis veteri & carne addi-

Causa ex
neotericis &
barbaris.

Porri.

Clavi.

Myrmecia.

Myrmecia.
Sessilis ver-
ruca.
Thymion.

ra, latius egimus lib. 28. Obs. notarum medicinalium, obs. 54. & potissimum in Scholiis eiusdem obs. De pudentorum thymis & verrucis ac scidis egimus 22. lib. schol. obs. 9. Sed & de his nonnihil dicemus obs. sequenti. Sed & Fernelius: Altera thymion dicta, & colore thymi florem representans, ad cuius etiam tenuis est, in summo lata & dura, & aspera, pensili minor. At de clauo postea seorsim caput proprium adidemus. Caterum, quod Præligia. ad prasagia attinet; scire oportet quod verrucarum genera licet exigua sint mole, tamen sœda sint, ac plerumque molesta; ideoq; in morbis haberi debent. Est enim verruca morbus officialis, in numero addito, secundum Gal. 1. de morb. cap. 9. & verruca raro solitaria (quod & Fernelius de thymio intelligit) sæpius complures proueniunt, maxime in palmis pedibusque puerorum. Plerumque ex inopinato comparent, atque etiam nonnunquam subito disparent. Ex his acrochordon & thymion sæpe etiam per se (ut testis Celsus, & hoc ipsum confirmatur à Tagautio cap. Celsus. proprio de verrucarum iudicio & curatione) finiuntur: & quo minora sunt, eo magis. Myrmecia & Clauis sine curatione vix umquam desinunt. Acrochordon si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem. Thymio clauoque excisis subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem, eaque relicta idem rursus exit. Myrmecia latissimis radicibus inhaerent: ideoque ne excidi quidem sine ulceratione magna possunt; & sine curatione vix umquam desinunt; & difficilius curantur quam acrochordones. De curationis nunc agamus, hoc prius interposito exemplo:

OBSERVATIO XI.

Per modum consultationis, de verrucis in virga & alijs. scq; ad Petrum Chirurgum Brielensem.

PETRISTE à me, Petre, amice candidissime, quibus modis verrucas in virga aut vetetro tollere posses, cum apud te in Brielis agerem. Rogabam eo tempore, num. ille de quo postulabas auxilium seu consilium, morbo Gallico laboraret: respondebas eâ lue hominem minime affectum esse, quamuis ra-

rò (hoc præsertim tempore) absque lue gallica in iis locis verrucæ oboriri soleant. Quicquid sit , ad myrmecias & acrochordonas verrucas tollendas, sæpe feliciter vsus sum succo rithymali , vel limacis sale ablumptis. Valet etiam cinis, & ranunculi folia apposita , præter multa vulgaria experimenta; sicuti & cinis, palmitum cum aceto cataplasmatibus modo illitus : nam & hoc thymos compescit , nec augescere sinit , vt Paulus lib. 6. cap. 58. & Aëtius lib. 14. cap. 4. docuerunt. Sed in ano ac locis secretis potissimum vrimur medicamentis valdè consumentibus & exiccantibus, vt pastillò Aretæ Andromachi, & similibus, quæ & ad rimas & condylomata valere inscribuntur: qualis est hic, qui in maximis doloribus citò liberat : ℞. stibij, id est, antimonij, acaciæ, plumbi vsti & loti ana ʒj. ꝑ. spodij, pompholygis lotæ, fructus ericæ, aluminis scissilis, thuris, atramenti sutorij, myrrhæ ana ʒvi. opij ʒiij. cum vino omnia terito, & in pastillos redige, quos vsus tempore passo diluito. Ad acrochordonas & myrmecias inueteratas hoc mirabiliter prodest: ℞. sulphuris viui, sandarachæ, atramenti sutorij, elaterij ana par. æqual. Terantur cum aceto, & formentur pastilli: quos cum opus fuerit, cum aceto molles factos applicabis. Verùm myrmecias priùs circumscalpere oportet, & iis pharmacum illinire. Ad communes verò verrucas raphanum excauato, sale impleto, operculo occluso in catino per nocte seruatum, salem in liquorem versum reperies, eo verrucas confricato, quæ in manibus sunt; & panno in liquore eodem tincto superligato, postea decident. est hoc secretum Alexij Pedemontani. Sed & hoc Rondeletij probatur: ℞. salis ammoniaci, vitrioli Romani, viridis æris ana ʒij. alum. rub. ʒj. calcis viuæ ʒʒ. distilletur in alembico vitreo. reiciatur primus liquor, secundus efficacior erit; & reseruetur vsui. confert ad verrucas & alia tubercula. Hoc quo-

quoque ad verrucas in facie commendatur: R. rad. afari, tempera in aqua rosacea biduum, pista & illine. Ad Verrucas etiam valet radix chelidonæ cum axungia trita & admotæ; eas enim *absumit* & tollit. sic & sanguis lacertæ destillatus eas exiccat. Agrimonia quoque cum forti aceto emplastrata verrucas tollere dicitur. Cæterum de verrucis in virga, de quibus auxilium petiisti, vereor quod sapiant lue Gallicam, & quod ob hoc difficilius curari poterunt, si trochisci ad rem non faciant supradicti. Ego hoc modo curo omnes verrucas in virga, vel in aliis locis secretis, ex lue quoque Gallica, post vniuersales purgationes: dissoluo parum sublimati in aqua plantaginis, cum exiguo aluminis; & plumâ verrucas illino: quibus exiccantur, & cum crusta decidunt. Chirurghi in Nosocomio Delphensi in Gallica lue verrucas in omni corpore tollunt, inungentes vng. morbi Gallici: quo si non desinant, etiam vtuntur sublimato, alumine cum aqua plantag. (quo remedio & nos vti consueuimus antequam illi eo vterentur,) donec decidant & perfecte curentur. Isbrandus chirurgus Nosocomij Delphensis hac aqua egregia subsequenti vtitur, ad condylomata, verrucas, & thymos ani, virgæ & membrorum muliebrium consumenda & auferenda in lue Gallica: quæ aqua simul mundificat pustulas faciei & totius corporis: R. aquæ plantaginis lib. ß sublimati ℥ iiii. aluminis ℥ ß. puluerizentur. in qua penna aut pluma intincta vel pecia lini, pustulæ faciei infectæ vel verrucæ tangentur. Quod si thymi inueterati in ano vel muliebribus racematim ex morbo Gallico pendeant, tunc sublimatum in substantia in aqua calcis viuæ, vt antea in aqua plantaginis, misceatur, & ea vtere. Proiicitur autem calx viua in aqua, sæpiusque lauatur, & factâ residentiâ aqua vsui reseruetur, in qua addendum sublimatum; estque miræ efficacis. At alij vtuntur oleo

arsenici; quemadmodum nuper Theodorus chirurgus nolo comij Delphensis, oleo arsenici vsus est in thymo portentosa magnitudinis, racematim propendente, ita vt in duorum pugnorum molem excresceret, ex lue Gallica, in cuiusdam mulieris pudente, vt viam vrinariam praeluderet, ita vt agra nequiquam reddere lotium posset. sed id quidem sustulit thymion, verum mulierem quasi membra deinde habens insensibilia reliquit. Quare oleum istud arsenici nimis violentum remedium est, praua post se relinquens symptomata; & non nisi in valde extremis & deploratis eo vtendum censeo. Quidam vtuntur oleo vitrioli, vel aqua vitriolata, quemadmodum Nicolaus Massa in libello suo de morbo Neapolitano eius compositiones describit lib. 6. cap. 4. de modo resoluendi, & maturandi apostemata dura siue grumos, hoc modo: \mathfrak{R} . vitrioli Romani siue Cyprini \mathfrak{z} xxx. salis nitri, aluminis rochæ ana \mathfrak{z} iiii. misce. & puluerizentur omnia, & calcinentur ad ignem, secundum artem. postea pone hoc calcinatum in boccia curua lutata; ad ignem fornacis alchymistarum, & per ignem istum habebis in recipiente oleum, quod est cauterium mirabile, & sine pari in quacunque operatione, & maxime in scrophulis & verrucis magnis elevandis: sed recipiens sit magnum, si vis facere dictum oleum. Idem Nic. Massa cap. 5. de cura omnium vlcerum morbi Neapolitani describit modum faciendi aquam separationis auri ab argento, qua vtitur in verrucis, hoc modo: \mathfrak{R} . vitrioli Romani lib. ij. aluminis rochæ \mathfrak{z} vi. salis nitri lib. j. pone in cucurbitam curuam lutatam: vel, si vis, pone in rectam cum capello suo & recipiente, ad ignem fornacis, vt faciunt Alchymistæ, & habebis aquam, cum qua separatur aurum ab argento, & cum qua fit puluis angelicus: quæ aqua est mirabilis ad remouendas verrucas in quacunque parte, & maxime in ano & vulua. Cauterizans

terizat etiam ista aqua vlcera maligna, ambulatiua, vbi-
cumque etiam fuerint, vt in gutture; & prohibet
progressum aut deambulationem vlcera, vbi-
cumque sunt, vt puta virgæ, & vuluæ. Sed cum est nimis
acuta, oportet lymphare ipsam cum aqua rosacea.
Et ego (inquit idem Massa) sæpe sanauit vlcera ma-
la gutturis, tangendo bis in die cum aqua dicta, cum
medietate aquæ ros. admixta: & est de secretis no-
stris. Et quamuis Iohannes de Vigo vir doctissi-
mus, eundem puluerem doceat componere sub no-
mine pulueris rubei, nihil ei debeo in hoc, quo-
niam antequam ipsum scriberet, ego illum com-
ponebam, & habui à quodam viro Alchymista se-
ne, qui erat mirabilis experimentator; & multa alia
ipse docuit me; cuius anima requiescat in pace, quo-
niam mortuus est. Talibus utebatur Nicolaus
Massa: sed talem compositionem facere si pro hoc
tempore tibi molestum foret, poteris igitur vti sub-
limato cum aqua plantaginis soluto, & modico alu-
mine admixto, vti paulo antè posuimus, quo nos
felicissimè semper vti sumus, & nostri chirurgi si-
militer in Noloscomi Delphensi, in quo à lue
Gallica curantur ægri. Quæ quidem omnia iam su-
pradiſta amicis minimè celare volui. Quare hisce
valeto; nostroque labore fuere. Raptim Delphis 2.
Nouembris, anno 1565.

Petrus Forestus, medicus apud Delphenses.

SCHOLIA.

DE pudendorum thynis ac verrucis satis superq; diximus
lib. 23. Curationum medicinalium noſtrarum, Scholio
obſ. 9. Sed quod ad præſens negotium attinet, pauca hic dicamus
etiam de verrucarum curatione, in quacunque corporis parte
conſingant, etiam extra luen Gallicam. Curatione itaque verru-
carum, poſiſſimum iuxta neotericos & barbaros, vt Valeſcenn
& Gordianum, conſtat viciuſ ratione, vt caueant à regimine

*Curatio verru-
carum.*

melancholiam generante, aut phlegma crassum vel sanguinem crassum procreante: deinde purgetur melancholia vel phlegma cum agarico & turbith & fumo terræ, & epithymo, myrobalanizis, lapide lazuli; & si videatur quod adsit repletio, adhibeatur phlebotomia. & ista iterentur & continuentur: nam malum regimen (inquit Valescens cap. proprio) & omisso purgationis, produciunt scrophulas & verrucas. Localia autem remedia, eodem anthore, primò experientiâ constant; quòd dum essem atatis (inquit idem Valescens) quindecim annorum, & plurimas haberem verrucas in manibus, ab eissem cum frequenti appositione lactis tithymali perfectè sanatus fui. Secundò, ligari poterunt versùs radicem pilo equino, vel bovino, aut serico; & continuè diebus stringantur, donec totà cadant; & incipiantur à maioribus, quia fortè per se alia destruentur, ut ait Auicenna, quia ista magna ratione similitudinis attrahunt ad se multum illius materia, ex qua multe filie generantur: & sic de directo accidit in scrophulis. Tertiò: nouacula superficialiter scindantur, & radantur usque ad sanguinis exitum: & tunc apponatur lac ficus, vel lac tithymali. Quariò: auripigmentum puluerizatum incorporetur cum lacte tithymali, vel fici, & super verrucam ponatur abrasam, sicut iam dictum fuit. & hoc fit in capsula aut cupula glandis, vel lupini, vel cerasi, vel pruni; & sic emplastrum non nocebit resisto corpori. Vel hoc Gordonij remediũ apponatur: R. viridis avis, auripigmenti, pulpæ colocynthid. salis ammoniaci ana ʒj. & pistentur cum lacte tithymali & cera; & in capsulis supra porros & verrucas abrasas ponantur. Vel radantur fortiter, & mitiatur inde multus sanguis; deinde aspergatur lac ficus, aut lac tithymali, aut pulvis lithargyri, aut auripigmentum temperatum cum forti aceto. Henricus rutam, herbam Roberti, milisfolium trita alligat, & intra tres quatuorve dies curantur, prius mollificate & abrafa usque ad vivam carnem. Vel R. limacum rubiarum quantitatem quam velis; & ponantur in v. se plumbeo, asperso sale, & sic maneat per iij. dies: abiectis limacis ter quatuorve in die cum liquore earum in vasculo permanente liniantur verruce; idq; continuando per septem vel octo dies; & absque dolore cum radice cadent; & illud remediũ est Gilberti Anglicani,

Auicenna.

cani, cap. proprio. Alij faciunt raptorium ex calce vina, & sapone molli, & in capsula aut cupulis superponunt. Quidam post rasionem suffumigant, & emolliunt radices, donec sanguis incipiat exire: & tunc apponunt puluerem asphodelorum, vel puluerem arsenici, cum capsula, ne membrum vicinum corrumpatur. Ceterum, iuxta eos qui Gracos sequuntur; Acrochordon si fortiter filo stringatur, per se cadit, si diutius in ea stritura maneat: facile quoque per velsellam eradicatur: & ne regerminet, locum calido ferro inurere potes, vel caustico medicamento. Vidi (inquit Dominicus Leonus cap. proprio) Bononia visliorem quandam acrochordona super gulam habentem, constrictato loco affecto, quoad multum incalesceret, & tubesceret, deinde cum succo solani ipsum locum reueratis vicibus illinendo, facillime verrucam eradicasse. Paulus Aegineta lib. 4. cap. 13. plurima enumerat quae verrucas eiusmodi, praesertim pensiles & sessiles, tollunt exteruntque. Cuius generis sunt elaterium (quod succus est fructus cucumeris agrestis) cum sale infricatum, thuris cortex cum aceto, grossi, id est, primitina ficus; quae velut praecoces non maturescunt, cum aceto, farina & nitro. Idem quoque illi praestat succus seu liquor fici arboris illius, rithymali, sinaridis piscis caput salsum concretum, arugo cum sulphure vino, hoc est, ignem non experto combusta, ocymi folia cum asramento sutorio, quod Graci chalcanthum vocant, sarmentorum adhuc viridum visorum, quod destillat, finis ouillus cum aceto, hircinum fel illitum; heliotropij magni fructus, per se illitum, vel cum vino applicatum; ruta cum nitro & pipere; nitrum cum urina pueri impubis, & nondum Venerem experii: sterces bovis gregarij, seu armentarij, adhibitum in aceto. Ceterum hac quae ad myrmecias & acrochordonas exterendas commemorata sunt, ferè omnia & ad clauos & thymia etiam magnopere conducunt. Tradunt etiam lacerta caput myrmecias, acrochordonas & clauos tollere. Sunt qui decoquant capita salsorum piscium in aqua illa, quae destillat ex sarmentis viridibus, dum comburnuntur; idque praestantissimum ad praedicta vigia remedium esse praedicant. Alij ad eadem exterenda linimentum conficiunt ex arugine (quae recentioribus viride aris & flos aris dicitur) sulphure, & aqua, seu

Cura acrochordonas.

Verrucarum per medicamenta curatio, ex Paulo.

Ad myrmecias & acrochordonas.

Aqua ex sarmentis destillans.

Stercus bubulum.

Ad clauos & thymia.

Lacertae caput.

Arugine quid.

instilla-

infiltratione illa samentorum. Atque hic unus est curandi modus, quo vti solent ad verrucas è medio tollendas, per medicamentum scilicet erodentia, adurentiaque. Id autem vnum summa cura observandum est in eiusmodi medicamentis administrandis, quod Celsus monet lib. 5. nempe quòd ea qua circa sunt, folis conlegi debent, ne ipsa quoque exulcerentur. Alij ob eandem causam circumiacentes paries illinunt unguento ex bolo armano, terra sigillata, aqua rosacea & aceto. Porro acrochordonas, myrmecia & thymia non solum præscriptis hisce adurentibus medicamentis abolemus, sed & ignis flamma, vel candente ferro, illis rite admoto. Ea quoque nonnumquam excidimus. Interdum verò ligatura scilicet illis coaptata (ut sit in vero sic) vel primoribus dentibus, ut quidam Romæ Galeni tempore facere solebat, euellimus ac radicibus extirpamus. cuius hæc est historia lib. 14. method. med. cap. 17. Plurima, inquit, iuueniuntur hodièque, quæ apud maiores nostros non fuisse inuenta : velas nunc Romæ quidam excogitant quemadmodum acrochordonas & myrmecias ore sanet. Verùm de prioribus, virore à cute exstantibus, minus est mirum; de myrmeciis verò, potissimum quæ cum summa cute prorsus sunt æquales, mirum videbatur. Veruntamen has quoque certa primis laborum applicatione, censu ad se traxit, atque à radice euulsit : deinde primoribus apprehensas dentibus, totas simul exemit. Ceterum si ignem aut candentem aliquod ferrum verrucæ admoueris, lamina quadam ferrea periusa, vel simile quidpiam, ita verruca adurenda coaptari debet, ut foramen eam exactè comprehendat, adeò ut nihil circumposita cutis appareat. Facta verò adhesionē, crusta bulyro vel aliquo alio vinctuoso illito resolunda est. Deinde vlcus similiter reliquis vlcibus curandum erit. Quo pacto autem myrmecia quæ à cute non extant, curentur, illa curatione excogitata per Romanum, ex Galeno, lib. 14. Methodi medendi, diximus. Acrochordonas verò à cute exstantes facili statim modum prehendebat, & ita protinus educebat. Sed & Myrmeciarum geminam aliam curandi rationem mox subiungit Galenus, inquiens : Sed & scalpello ad myrsacæ folij speciem formato, & ferramento eo, quod scolopomachation Græci vocant, quilibet manibus exercitatus, facile eas excidat, cum propriis limamentis

à cir-

Cautio.

Hoc Hal-
abb. & Guido
probant.Aliæ curandi
rationes.Historia
Galeni.Myrmecia
curatio mira,
ex Galeno.Quomodo
verruca tuto
viti possint.Alia curatio
myrmecia-
rum.
Scolopoma-
chation.

A circumposita cute circumscripta discernantur. Aequè verò & valente aliqua penna, circulo myrmecia imposita, ipsam educimus. Debet autem penna fistula esse myrmecia crassitudini per, ut eam undique prorsus constringat. Quae postea circumacta, ac simul deorsum impulsâ, celeritè ita myrmeciam etiam cum ipsa radice totam educet. Constat verò & quod fixi ipsæ penna, quæ eam circulo secabit, non tenuis modo, sed etiam acutus & firmus esse debeat. Itaque tum galli veteris pinna, tum vel magis aquila, ad hunc usum est a. commoda. Abscindere verò ab his tantum radicem versum oportet, quatenus reliqua partis fistula complecti myrmeciam possit. Sanè ex ipsa statim abscissione, si modo rectè fiat, etiam acumen ipsi comparabis. Hæc Galenus hætenus: quæ etiam a Tagantio citantur. Vltus verò quod relinquuntur sic anulæ verruca, similiter reliquis v. ceribus impleri debet, & ad cicatricem perducit. Alij verò (ut & Leonis annotauit) areæ, aut ferreæ fistula ulem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam uolsellâque apprehensam, scalpro, clauorum modo, excindere. Lac caprifici myrmecias eicit superimpositum: pariter grossi crudi: & succus thymali liniis non modò myrmecias, verum & acrochordonas tollit. Idem faciunt caulic & folia batrachij sine rauunculi, ut testatur Gal. 8. & 6. de simpl. med. facul. At thymos compeſcit nec finit rursus augescere, cuius palmitum (ut diximus) cum aceto cataplasmati modo illitus: item corticis salicis combustæ cinis. Distinguerè autem oportet thymos mansuetos, à malignis: nam mansuetos curamus per medicamenta, quæ consumere ac contrahere possunt: malignis autem, eadem quæ cancroſis ulceribus resistunt, præsertim in mamma ac uero, adhibemus. Thymos qui sunt in musculo ani adstrictorio, uolsella attractos, radicem excindere oportet, & siccum medicamentum sanguinem sistens iussurgere, quale est Rhodia appellatum. Recipit enim, Gallæ crudæ ℥iij. gallæ combustæ restinctæq; vino, aride ℥vi. squaræ aris nigri vel rubri ℥iij. atramenti sutorij, id est, chaicanthi ℥j. ꝑ. alum. scissi ℥xi. ꝑ. tenetur omnia multi diebus: ualeat, ut Paulus scribit, non modò ad suppressum sanguinem, sed ad ulcera depascentia & excreſcentia. hoc vel alio exiccante vii poteris donec persicte curetur: nam uinctuosa curatio affectionem refricat.

Alia curatio, per pennam.

Pinna scilicet radicem uolens abscindenda.

Paulus 6. cap. 87.

Curatio thymi. Paul. lib. 6. cap. 58. Actius lib. 14. cap. 4.

Si verò in partibus magis conspicuis thymi fuerint, postquam feceris, vitionem ad sanguinem sistendum, & ad regenerationem in posterum prohibendam, adhibere expedit. Adhibita igitur vitione, curatio decernatur communis ad perusta; primum ea qua crustas amovere potest, deinde repurgans, & tandem resiccans. Crustas autem removere possunt in talibus lac & mel per linamenta adhibita. Quod si scalpello solum excisi fuerint thymi, post excisionem rhodia, vel aliud sanguinem sistens superimponatur: & reliqua curationis ductum resiccans, ut dictum est, adhibeatur. De thymis naturalium agit Paulus lib. 6. cap. 58. sic scribens: Thymi carnosae sunt tubercula, nunc in glande, nunc in praputio concreverunt: ex his alij consumacii, alij facili curationis sunt. Miniores itaque scalpelli acie detradere convenit, & chalcididem ipsis inspergere: in malignis, eo quod visiatum est, exciso, adustione utendum. At si contra se mutuo in praputio stans thymi, hi intra ipsum, illi extra, oportet omnibus ipsis confectum manuum admonere, ne praputium structura tenne, imprudenter pertundamus. Sed primum interiores auferre consilium est; inque cicatrice obductis, tunc quoque exteriores aggredi. Nonnulli verò recentiorum forfice ipsos auellentes, equino pilo deligatos curare solent, quemadmodum alij refrigerato paulum ferro candenti eosdem deunt. His adiunge ea qua diximus lib. 2. 3. Obs. & Curat. medicinalium nostrarum, Schol. Obs. 4. & lib. 28. Scholio Obs. 54. Vniuersaliter ad omnes verrucas faciunt medicamenta, qua consumunt ac resiccant: quale est hoc: R. aluminis scissi, atramenti susorij vñli, glutinis ana ʒj. squamae aris ʒij. trita glutine cum aceto praeussoluto misce, & illine. Ad easdem valent pastilli Areta, Andromachi, Obs. praecedente positi. Nunc igitur tempus est, ut ad Clannum deveniamus, qui etiam ad species verrucarum (uti antea diximus) referri solet.

De thymis
naturalium,
ex paulo.

Qualia me-
dicamenta
vniuersaliter
omnibus ver-
rucis conue-
niant.

OBSERVATIO XII.

*De clauo in digito pedis, per modum consilij, pro fratre
meo Iacobo Foresto, cùm Louanij medicine
operam daret.*

CLAUUS (vt nosti, mi frater) teres figurâ callus
est, colore candidus, clauorum capiti similis,
toto corpore (nam & in auribus ipsis sæpe cõspexi
ex longo decubitu, vt in vxore mea & etiam in fa-
mula mea experimento didici) sed pedum solo di-
gitisque præcipuè nascens, quem dolor sequitur, &
incessus impedimentum. Quomodo autem ille cu-
retur cùm à me postulaueris; post lotionem pedis,
vt longa mora in aqua calida mollior euadat, scal-
pello continuò clauus excedentem partem abradito,
aut pumice lapide affricato: hoc modo (vt ego ex-
pertus sæpe sum) clauum tolles. Callum quoque sub
planta pedis post lotionem sola lapidis pumicis af-
fricatione curabis. Quòd si hoc modo clauus non
tollatur, post eius incisionem succum tithymali
dendroidis lacteum plumâ instillato, vel affundito:
ita enim plurimos curauì. Vel ammoniaco & gal-
bano, in aceto dissolutis, instar cerati appositis vttere.
Mercurius sublimatus in aqua vitæ solutus etiam
clauum sanat. Clauo prius emollito guttula vna
aquæ fortis stylo ferreo instillata, idem præstat.
Ammoniacum cinabrio mixtum, & pice nigra tum
pipere, clauum emollit, tum humorem melancholi-
cum euocat. Et hoc quoque subinde expertum est:
cântharidum & atramenti sutorij, hoc est, chalcanti
(vulgo vitrioli) ac castorei par modus singulorum,
contusa excipiuntur terebinthina, vt emplastri fiat
spissitudo, clauoque prius circumciso superimpo-
nitur, &c. Hisce, mi frater Iacobe Foresti charissime
valcas.

SCHOL.

SCHOLIA.

Clavus.
Hæc.

CLAVVS est callosa quædam eminentia (καλός Græci vocant,) existentia rotundus, colore albæ, sit in plantis digitisq; pedum, capiti clavi assimilis, qui ita pungit, ut quasi clavus ferreus videatur: unde nomen sortitus est: caro enim dum rescit in callem semper pungentem: miris aliquin affectus, nisi profundior sit; nam tunc malignitatem habet continuatam. Clavus (inquit Fernelius) ut sessilis verruca, in cute eminet, albus, rotundus, callosus, parte junctura clavorum capiti similis, sed prædura solidaq; radice intrò se inficiens, quasi ex ossium membranis emergat & expulset. In digitis plantisq; pedum, ex calcei pressu aut intertrigine nasci solet: acuto interdum dolore sponte feriens, semper verò ingredienti molestus. Clavum subinde deradere, commodissimum est, & aqua tepida perfundere, ut & Tazantius ex Celso annotavit: nam sine ulla vi sic emollescit. ac si sanguinis quoque aliquid emissum est, sæpe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurget, deinde imponat resina, cui miscetur pulvis paulus, quem ex lapide molari contrito feceris. Clavus circumscissus, volfellisq; seu specillo apprehensus, scalpello acuto aciei, aut quo vena scinduntur, radicitus eximatur. Nonnulli, ne rursus succrescat, caudenti ferro utuntur. Tollitur clavus longiori tempore etiam, si quis excedentem clavi partem continuè abradat scalpello, aut pumice affricet. Proficet & lupinorum concrematorum cinis, cum melle, aut melanrhino, seu nigella, cum urina pueri Venerem non experti: vel ovulaceum sabarum lomento cum aceto incoctum. Sunt qui tradunt caput lacertæ aliquantisper contusum, imò etiam sanguinem eiusdem, clavos, acrochordonas & myrmecias tollere: Pariter caput salgarum piscium decocta in aqua, quæ destillat ex fermentis viridibus, dum comburnuntur, præstantissimum remedium ad huiusmodi vitia esse dicunt. Gregorius pharmacopæus Haganus mihi dixit eo tempore quo apud D. Illustrem de Abbenbroeck in curatione eram, cum sermo incidisset de clavo pedis curando, quo vitio D. de Jelssteyn laborabat, quòd M. Antonius Hartverus, medicus Haganus uteretur solo olivæo posito supra clavum, quo remedium se plurimos curasse noverat. credo quòd ipse forte

Curatio
clavi.

Paul. lib. 6.
cap. 87. de
clavis, myr-
meis &
verrucis.

forte intellexerit galbannum, quo ego vsum sum cum magna prosperitate in me ipso, adiecto subinde ammoniaco, &risque dissolutis in aceto. egregie hæc emolliunt. Quidam (ut ego in arcanis M. Acmilij medici Amstelrodamensis, qui ante me praxim Alcmariæ exercebat, inueni) in albanis (sic enim Barbari vel Auicennistæ clauum vocant; quod etiam clauum sonat. linguâ verò nostrâ Germanicâ Exterocge, quasi Pica oculis, dicitur) oleo raparum mixto cum succo maritima vintur; quod etiam usurpant ad verrucas. Alij viridem ceram aut rubram superponunt, ut minus doleat, & mollescat. Sed & succum hedera terrestris superpositus clauum curare dicitur. Quidam cum hoc modo sanabat: primò clauum scindebat duobus vel tribus diebus ante novilunium, quousq; sanguis exiret; deinde superimponebat emplastrum sequens: æ. galbani, ammoniaci, scrapini ana p. æ. misce cum aceto, & imposito. ego verò prius exciso imposui succum rithymalli commodipiniè. Idem præstat & succus chelidonia, & habetur pro præsentaneo remedio. Etiam gutta aquæ fortis imposita cum pinna, post incisionem. At superiora minus corrodunt. A clano non magnopere differt callus, qui colore atque substantia clano similis est: obdurata enim est summa cutis, ex labore, in palmis aut in inferioribus pedum plantis increscere eius. Nullam tamen radicem alitè demittit, ac proinde prorsus est doloris expertus. Hinc Leonus cap. proprio de Clano: A clauis, inquit, non magnopere differunt calli, quos Græci Τόλμας vocant, nisi quod per se indolori sunt, eodem quo cutis colore; neque sponte, sed ex labore obdurata cute gignuntur: Eadem curandi ratio, quæ clauis, callis quoq; conuenit, de qua re vide Paulum lib. 3. cap. 80. de iis quæ ad callos & clanos faciunt. Et ita absolutis tumoribus præter naturam melancholicis, hunc quartum librum finiamus, & ad quintum librum accedamus, qui erit de tumoribus permissis, maculis enim fœdantibus, & pustulis in facie & alius corporis partibus apparentibus; itemq; de pruritu, scabie, & vnguinum vitis.

Callus.
Τόλμας.

Curatio calli.

FINIS libri Quarti Observationum & Curationum Chirurgicarum, de tumoribus præter naturam.

OB.

OBSERVATIONVM
ET CVRATIONVM
CHIRVRGICARVM

Liber quintus,

DE

TVMORIBVS

PRÆTER NATVRAM;

D. PETRO FORESTO Alcmariano,
auctore.

OBSERVATIO I.

De maculis quibusdam plumbeis, ad cineritium colorem tendentibus, exterius in cute apparentibus.



NOBILIS matrona Heutera, cùm obstructioni lienis sæpe obnoxia esset, quod dolor exiguus in hypochondrio sinistro indicabat, qui dolor hæmorrhoidibus subinde sponte apertis ac fluentibus cessabat; huic tamen ipsi, tempore ver-
no potissimum, ac in principio autumnii, si obstructio augetetur, & hæmorrhoides consueto modo non fluere, per cutem maculæ magnæ instar daleri nummi efflorescebant; quibus accedebat dolor circa ventriculum, si intus reperent; & calor levis, ac subinde pruritus accedebat, quamuis rariùs: & incallescenti in lecto euanescebant, sed mox reuertebantur.

tur. Hoc autem decocto soluta aluo, anno 1569, maculæ disparuerunt: sed cum deinde hoc tempore, anno 1570, 24. Augusti, iterum suppullarent, eodem decocto rursus exhibigo, prorsus curata fuit: & borag. bugloss. fumiterræ, scolopend. ana m. j. capili. Ven. ceterach, absinth. Romani (nam stomachum valde debilem habebam) acetosæ ana m. ss. sem. anisi ʒ j. β. folior. colluteæ ʒ vi. rhabarb. selecti ʒ j. prun. damasc. num. ix. vuar. pass. enucl. ʒ j. liquiritiæ rasæ ʒ β. squinanthi ʒ j. infunde per noctem in aqua communi, facta ebullitione prius manè fortiss. express. adde syr. ex infus. ros. ʒ ij. misce, pro duabus dosibus maturinis. Quibus sumptis bene soluta aluo, postea semper delitescabant maculæ, ac hæmorrhoides sæpe sponte profluxerunt.

SCHOLIA.

SUNT & ceteris vitia quædam quæ nihil prominent, sed Maculæ.

aqualia manent, nulla asperitate: huiusmodi sunt maculæ, quacumque alieno colore hanc faciunt, quales huic matronæ maximè ex humore melancholico apparere. Ad maculas quoque Maculæ quæ cutim vitiant. pertinent vitiliginis species, lenticula, ecchymomata, sugillata, stigmata, vibices; de quibus sigillatim tractabimus. nam & vitilignes ad tumores præter naturam referuntur, qui ex mistis humoribus fieri dicuntur, de quibus hoc in libro potissimum agemus. Ad classem igitur horum tumorum, clarioris doctrinæ gratiâ, reducemus etiam has maculas, & cum Leono, vitiliginem, impetiginem, mentagram, varos siue ionchos, parotidas, artribridem, podagram: adiciemus & nos scabiem, ac pustulas ex diversis humoribus ortas, perniones, unguinum vitia. Possemus & addere Luem Gallicam; quam idem Dominicus Leonus inter tumores permixtos numerat. Sed de ista Lue, quæ plurimas nationes hoc nostro sæculo in Europa (ex Americâ eo delata) miserimè infestat, peculiari libro abunde satum egimus. Ad enim igitur librum lectores meos relegans, in insitito hoc meo persistens, de Vitiligine agere incipiam, quæ pro Arabum morphea & Albaræ haberi solet.

Qui ad tumores varios & permixtos refertur.

OBSERVATIO II.

De morphea, cutisq; defædatione maculosa.

VIR quidam Alematianus, cum morphea labo-
raret, ac tota eius cutis valdè maculosa & de-
fædata esset, ita vt leprâ laborare idem videretur,
anno 1549, mense Maio ad me descedebat: cui de-
coctum sequens præscripsi: R. sumiterræ viridis m.
iij. scabiosæ, lapathii acuti, acetosæ, dentis leonis, bu-
glossæ, boraginis, summitatum absinthij commu-
nis, summitatum lupulorum ana m. j. cuscutæ, me-
lissæ, agrimoniz ana m. ss. rad. enulæ campanæ, rad.
lapathij acuti, rad. malvæ ana ʒ ss. rad. fœniculi ʒ j.
sem. 4. frig. maior. & minorum ana ʒ j. sem. anisi ʒ
ij. folliculorum sennæ ʒ j. ss. epithymi, polypodij
querc. ana ʒ ss. rad. ellebori nigri ʒ ij. ss. cort. rad. ta-
marisci, capp. ana ʒ ij. prun. damasc. quart. j. vuar.
pass. ab arill. mund. hordei communis ana m. j. fiat
omnium decoctio in sero lactis, pro lib. iij. per no-
ctem infusa fortiter omnia exprimantur, & zacch.
apozema dulcoretur: R. myrobal. omnium ana ʒ j.
agarici optimi, rhabarb. ana ʒ ss. spicæ, squinanthi,
zinz. ana ʒ ss. fiat puppa: pendeat in dicta decoctio-
ne, dum potio sumetur: ex qua sumebat semel aut
bis in die, prout alius responderet. Qua potione
optumè deinde se habuit. Interim huic laboranti
morphea consulimus vt bis in anno purgaretur, in
Vere & in autumno. Quantum enim valeat annua
purgatio in atra bile seu melancholia, mania, ele-
phantiasa, cancro, comitiali morbo, apoplexia, an-
helatione, articulari morbo, aliisque, vt morphea
seu vitilagine, docet Gal. Commento 47. aphor. lib.
6. præterea in libello Quos oporteat purgare.

SCHOLIIS.

2 quot
species mor-
pheæ ponat.

QVI sequuntur Arabum decreta, morpheæ modò duas, mo-
dò tres, modò quatuor species ponunt. Ita Valescius tract.

suo chirurgiæ cap. 20. de morphea & albarat, Morphea, inquit,
 est particularis cutis defœdatio, sine alia eius læsione, ex defectu
 virtutis assimilatiuæ in ea. Sed licet (inquit idem) authores, Valescius:
 antiqui ponant solum tantum duas eius species, scilicet albam
 & nigram; tres tamen ponenda sunt: duas scilicet supra dictas,
 pituitosa nimirum & melancholica morphea species, ac tertia
 sanguinea: cholericæ enim nulla species ab authoribus ponitur,
 quia cum eius acuitate & penetratione sub cute stare non va-
 lens, exterius penetrat, & facit impetiginem & serpiginem, ali-
 quando prurium & scaliæ, secundum subilitatem & crassi-
 tiem quæ habet. Gordonius vero quatuor species esse asserit, Gordonius:
 part. 1. cap. 23. de morphea; sic scribens: Morphea, est cutis de-
 fœdatio maculosa. Intelligendum est quod omnia illa quæ sunt
 causa lepræ, sunt causa morphea: unde quod est lepra in carne,
 est morphea in cute. Aduertentium igitur quod morphea habet
 conuenientiam cum lepra, quoniam sicut in lepra errat virtus
 assimilatiua, ita in morphea; sed hoc differunt, quod lepra est in
 carne; & morphea in cute. Morphea etiam habet conuenien-
 tiam cum icteritia, quoniam utrobique est cutis maculata. Sed
 differunt; quia morphea est infectio in cute maculosa; in qui-
 busdam partibus apparens, in quibusdam verè minime; sed in
 icteritia est color ille luteus, per vniuersam aut ferè vniuer-
 sam cutem sparsus; diciq; idè potest vniuersalis; aut saltem
 panè vniuersalis defœdatio cutis. Secunda differentia est, quia
 in icteritia non errat virtus assimilatiua; in morphea autem er-
 rat. Concluditur igitur quod morphea est error virtutis assimi-
 latiue in cute. Considerandum quoque circa hanc materiam,
 quod authores communiter loquendo solummodo duas species
 morphea recensent, scilicet albam & nigram; de quâ re summe
 miror, quia postquam morphea & lepra non differunt, nisi quod
 hæc in carne, illa verò in cute sit, & species lepræ sint quatuor,
 idcirco & morphea quatuor species ab ipsis statui debuissent. Et
 forè idè non posuerunt has quatuor differentias autores, quia
 omnes quatuor non aequè sunt famosæ, & rarè accidunt: quo-
 niam si oriatur à sanguine, & fiat in facie, appellabitur gutta
 rosacea: si sit in corporis residuo, appellabitur rubor: & si
 fiat infectio de cholera, appellabitur impetigo & serpigo: &

Quomodo
 morphea ha-
 beat conue-
 nientiam cum
 lepra; & in
 quibus differ-
 rat.

Quibus mor-
 phea differat
 ab icteritia.

Gal. de loc.
aff. lib. 3.

Vitiligo.

Leuce.
Albaras.
Vitiligo alba.

Alphos.
Morphea.

Celsus.

Alphos
albus.
Alphos
niger.

Vitiliginis
apud Ferne-
lium tres
species.

Malum mor-
tuum.

ita ista duæ species quodammodo aborsptæ sunt: sed sciētia medi-
cine, verum est sciētia, & non vocum, sicut scribitur 2. de mor-
bo: & ideo nec de numero nec de nominibus curo, dum tamen
res intelligamus. Supponamus igitur quod quatuor sint species
morpheæ: quædam à sanguine adusto, quædam à cholera adusta,
quædam à phlegmate saiso, & quædam à melancholia adusta.
Alij verò, qui Græci sequuntur & Latiniore, morpheam sub
vitilagine comprehendunt. Est enim vitiligo, si genere quodam
comprehendatur, sicut curis color, ex malo particula habitu pro-
ueniens, nutrimentum bene assimilare non potens. In duas divi-
ditur species: quarum prima à Græcis Leuce, ab Arabibus Allaras, à
Latinis Vitiligo alba dici potest. Altera Alphos Græcè, ab Anic.
Morphea vocatur. Est verò Leuce coloris in cute ad albidum mu-
tatio; quæ non modò in superficie infigitur, sed altius descendit,
adò ut carnem usque contingat, ac piles coloret: Alphos autem
sen Morphea summam cutem tantummodò infestat & inficit:
& hac in duas subdividitur species in albam, & nigram. Celsus
vum vocis sequitur, albam, leucam alphos; nigram melan nomi-
navit. Hic affectus ex eo alphos nuncupatur, quòd colorem cutis
immutet: immutare enim veteres Græci ἀλφαις dicebant.
Omnia hæc serpunt, sed in aliis celerius, in aliis tardius. Alphos
albus, & alphos niger in quibusdam variis temporibus & crisi-
unt & desinunt. Leuce quæ occupavit, non facillè dimittit. At
Fernelio Vitiliginis tres species sunt; Alphus, melas, leuce. In his
cutis scinditur, dispersis maculis, neque continuatis, neque coha-
rentibus, sed quæ sedem mutant, ac serpunt. Sub his sensus aut
omnino perit, aut multo stupidiior evadit, ut ne quidem si cutis
scalpatur, & interdum ne si acui quidem leniter infigatur, per-
cipiat. Alphus alio, melas nigro colore velut umbra infestit: atque
hi summam duntaxat cutem occupant. Leuce alio etiam, ut al-
phus colore describitur, sed altius descendit, cutemq; totam pre-
hendit in hac pili excidunt, aliq; albi ac tennes succrescunt, lan-
ugini similes. Confirmata leuce perfusione usquã rufescit;
neq; adusta aut sanguis, sed aquosa duntaxat sanies exit. Vide-
tur præterea & interdum vitiligo quædam, rufro, fusco, aut
linido colore, cuius sensus aut perit aut stupidiior est: hocq; genus
universum innigres malum mortuum appellant: quidam etiam
ad

ad scabiem referunt, ut postea de scabie dicemus: & ab ipso Ron-
dellio pro quarta specie scabies habetur. sed de hoc magis postea.
Ceterum hæc vitia peculiaria iis sunt, quorum malum est habi-
tus: omnium quippe efficiens causa est humoris impositus: albus
quidem & leues crassa glutinosaq; pituita, melancos bilis atra,
ceterorum humor sædo coloris conuentaneus. De his vide Pan-
lum lib. 4. cap. 5. de Leuca; & cap. 6. de alba albo & nigro.
Qui barbaram sequuntur medicinam, tres causas morpheæ con-
stituant: primum, ut est vitium ciborum pinito orni, vel me-
lancholicorum, vel ternum adurgentium sanguinem. causam uero
antecedentem dicunt esse (ut Valsens) errorem virtutis digesti-
uæ in stomacho, & in intestinis (patitur ego in hepate esse quædam,
vel in venis mesaraicis) quem sequitur error virtutis digesti-
uæ in hepate. Nam error in prima & secunda digestiua factus in ter-
tia corrigi non potest. Causam autem coniuictam idem esse uide
& immediatam, errorem virtutis assimilatiuæ in cute. Ceterum
secundum eosdem auctores causa materialis morpheæ alba est
phlegma salsum. & causa morpheæ nigra est meliâ bolis adusta:
& causa morpheæ rubra est sanguis crassus, acutus, calidus, super-
fluens. Prima (inquit Valsens) & secunda species sunt famosa,
& tertiam de sanguine frequenter uidi: sed quartam, quâ aliqui
ponunt, de cholera, nunquam uidi. Et est albaras species subalterna
morpheæ, & dicitur sic apud Arabes: & est morpheæ alba ut lac,
vel est Albaras vitia cutis albificatio, sicut in synonymis dici-
tur. Et de ista dicit Auicenna 1. Fen. 4. 4. tract. 2. Albaras qui-
dem est in cute & carne usque ad os: & sic uidetur quod sit le-
pra particularis. Postea ibidem inquit, Differentia inter morpheam
albam & nigram, est, quia una est ex phlegmate, alia ex me-
lancholia. & sic comparatio albaras nigra ad albam non est talis
sicut est morpheæ nigra ad morpheam albam: idcirco primum
differunt; quia albaras nigra est illud quod nominatur imperigo
excoriata, & est scabies, accidens cuti, aspera & uehemens;
& facit squamam, sicut sunt piscium squama, cum pruritu; &
ista sit propter humorem melancholicum imbibentem cutem,
cum imbibitione fortiori quàm se solum imprimere in colore: &
est squama prima lepra: estq; cum malitia; & si est antiqua,
non recipit curationem. Et dicit Serapio quod albaras sub-

mergunt in profundo, & propter hoc pili nascuntur albi: Morphea vero non mutat nisi colorem tantum: & morphea nigra est ex genere impetiginis excoxiata, & ista dicitur albas nigra. Hæc Valescens: Causa autem ipsius albas seu leuca, iuxta Græcos, contrahitur ex viscosa glutinosâque pituita. At albi albi ex pituita ducunt originem; nigri ex atra bile. Causa itaque horum affectuum est ipsius nutritiva virtutis vitium: quod quomodo fiat, docet Gal: Frustratur nutritio, ait, cum prorsus non sit, vel intra iustum modum vitiosève sit: Idq; vel culpa nutritiva virtutis, quæ alteratrix est species, vel materia defectu vitiosè: defectu quidem in atrophis; vitio vero, ut in elephantiasi, & leucis, cæterisque id genus. Accidit enim dum agglutinantur carnes nutritivum, ubi pituitosior sanguis est, carnem quoque effici magis pituitosam. Neque enim idem est carni esse, & pituitosa carni esse: sicut nec carni esse, & melancholica carni esse, nec biliosa; atque temperata esse. Certiorem fidem sermoni nostro adhibebis, si animalium carnes, tum sanguine prædiorum, tum exanguium æstimabis; ad hæc etiam reptilium, quæcumque Veris tempore gigni cernuntur: maximeq; ex iis quæcumque viridum herbarum colorem præferunt: nam horum caro simillima ipsis herbis est. Aliorum alba & exanguis, vulvis locustæ & polypodis; atque a iorum alia quedam. Ergo cum (sicuti diximus) caro longo tempore pituitosa simul ac glutinosa sanguine nutritur, caro quidem adhuc manet, mutatur tamen eius forma, & in aliam speciem vertitur, sitq; media quedam inter sanguineam exanguemq; carnem. Vbi autem talis est reddita, accidit ei, ut de cætero allatum sibi nutrimentum non magis vel tenet in rubram carnis speciem mutare, quam polypodes, & locustæ: ita fit, ut tum alba, tum pituitosa tota quam ciusmodi enâdet; cum nec ipsa præsit nutrimentum ad ruborem vertere, & simul pituitosum illud affinat. Ergo qualem ab initio locustæ carnem habet, fereq; omnes ostrea, talem ex transmutatione habent, qui leucis faciuntur, ita enim carnis vitium nominant, a colore scilicet albi nomen imponentes: sicut nigra & callosa carni ab elephante nomen ferunt. Fit itaq; eodem quo leuca modo, melancholico nutrimento ad carnem longo tempore confluenta. Aliarum vitiliginum generatio cum præ-

Paulus lib. 4.
cap. 5. &
cap. 6.

Causæ ex
Galeno 3. de
sympt. causis.
cap. 2.

Etia viridis similis est generis; non tamen sub iis, ut in leucis, tota
 caro vitiatur; sed in summo corpore viciis squamæ quæpiam
 insiguntur, alba quidem ex pituitoso, nigra ex melancholico suc-
 co exorta. Quam magnam vero vim habeat nutrimentum ad
 carnis mutationem, etiam ab Aristotele traditum est, ubi me-
 minit regionum, in quibus peccata tam colore, quam ceteris diffe-
 rentiis sensibilibus mutantur atque alterantur. Signa tam fore
 patent ex horum affectuum descriptione, tum ex iis quæ diximus. Signa.
 Et apud illos qui plures species morpheæ constituunt, ut Gordo-
 nim, si color fuerit rubens, si, cuius maculosus, tunc est a sanguine;
 Et si fuerit citrinus Et fuscus maculosus, tunc est a cholerâ;
 si fuerit albus maculosus, tunc est a pituitate, Et ista species est
 famosa; Et si niger maculosus, tunc est a melancholia, Et ista
 quoque species famosa est. De nominibus igitur nulla sit corre-
 ctio, dummodo res intelligamus. Sic Et Valescius, in morpheæ alba,
 inquit, apparent magne macule albe in aliquibus partibus cor-
 poris; Et in morpheæ nigra nigris maculis deturpatur corpus;
 quando laborant, vel sudare Et calferi ex labore incipiunt, sen-
 tiunt calorem subcutaneum, cum quadam arsurâ Et puncturâ,
 Et aliquando cum pruritu. Albas vero, ut diximus, profun-
 dâs serpit, Et pili albi innascuntur. Idem Et illi qui Græcos se-
 quuntur, ita scribunt: Leucæ tam aliè in corpus penetrando ra-
 dices agit, ut Et pili in eâ carni Et lanugini similes innascan-
 tur. In alba, ut ostensum est, squamula quædam affixa cui in-
 herent. Idem Et lentæ sen albas prius malum est quàm albos
 sen morpheæ. Hinc Et Valescius: Albas alba, mala; quia pili na-
 scuntur albi. Secundum signum est, quia cutis est magis depressa
 quàm in partibus circumstantibus sanis, ac si aliqualis fossa ibi
 esset. Tertium signum est, quia si leniter pungetur cum acu, exit
 humiditas alba, Et non sanguis. Quartum signum est, quia si
 locus fricetur cum panno aspero, Et non rubescit, signum malum
 est. atque hæc signa significant morpheam incurabilem, quæ
 omnia quatuor signa pro primo iudicio habenda. Secundum iu-
 dicium in morpheæ est, quia in eâ manifesta asperitas apparet,
 Et in albas furfures cadunt post frictionem; ex quo significa-
 tur quod cum peccato virtutis assimilatione adest malitia adusta,
 ex qua fit prurigo in loco, cum asperitate, etiam si cum aliqua
 d 3 descer-

Præfatio.

degeneratur lesione, vel viciamento, in secunda vel tertia die re-
 fueritur cum squamis & furfuribus. Signa morpheæ nigra sunt
 macula nigra solum, ut dictum est; sed Albas nigra, ut dice-
 bat Anticenna, adeo exortatio, squamositas & fessilitas (ita eximi
 barbari loquuntur) quæ non sunt in morpheæ nigra simplici. Et
 dicit Anticenna quod albas quadam est aspera, & quadam lenis:
 & lenis in vitæ specie alba est deterior, & melior est illa quæ
 parum elongatur a colore corporis. Sed quæ magnam locum oc-
 cupat, est incurabilis, ac marcescit eodem statim, & occupat loca
 multa. & antiqua non curatur, & est morpheæ erythematosa chro-
 nica & difficilis cura. ideo videas quid promittas in cura eius.
 hæc Valerius, quæ scilicet desumpta sunt ab ipso Galieno, qui hæc
 prognostica ponit. Si, inquit, morpheæ fuerit recens & nova,
 curabilis est: antiqua incurabilis, vel est cum magna difficul-
 tate. Si occupaverit modicum spatium, curabilis; si magnum,
 curari difficile. Si locum morpheæ affici purgatur cum aceto
 in superficie cutis, ita ut non profundetur ultra cutem, & san-
 guis exierit, curabilis est: si autem acquisita, incurabilis est,
 aut valde difficiliter sanescit. Sic Panus lib. 4. cap. 3. Quotiam
 verò non quilibet leuce eruptionem recipit, nolas ipsam tales
 habere. Ac per summa leuce puncta, sed cito non peritiosa, si
 sanguis emanaverit, sanabilis est; si lactea humiditas, despera-
 ra est. Vel panniculo lanceo asperiore infricata cutis, si quidem
 rubicundior evaserit, medicina locus est; si idem color remaneat,
 non sanescit. Et quæ plura corporis loca occupaverit leuce,
 difficilius tollitur, quàm quæ parva demulserit: item venustior,
 quàm recens minus in medicina spei habere censenda est. De al-
 phis hæc scripta reliquit Alphi cetero leucis modo generantur:
 sed hæc alius cutim mutant, ut piles quoque sibi similes procreant.
 Alphi summam cutim infestant: quàmquam & ipsi in veteru-
 statem sentiant, penitus recedunt, in eug, albi pilis innascuntur,
 idq; humoris qui subest, ratione. Etenim ex pilis albi du-
 cunt originem; nigri ex atra bile. Ex his facile colligitur hoc
 præseium, quod Viriligo leuce dicta, vix unquam sanescit; at
 si quid ei vitio desit, tamen non ex toto sanus color reddi-
 tur. Viriligo alphas tam albus quàm niger, curationem non diffi-
 cillimam recipit. Virum aliquod horum sanabile sit, an non sit,
 experi-

Lib. 4. cap. 6.

experimento facile colligitur. Incidi enim cutis debet, aut ac-
pungi: si sanguis exiit, quod ferè fit in alphi, & pectus ls. n. est; si
humor albidus, sanari non potest. itaque ab hoc quidem absti-
nendum est. Hæc de nominibus, causis, signis hominis affectuum;
nunc ad curationem, hoc interpositis exemplo, veniamus.

OBSERVATIO III.

De Vitiligine.

MVLIER Delphensis, anno 1560, quæ in M. io
mense vitiligine affecta erat, insuper fa-
ciem habens valde rubram & pustulosam, ex qua
furfores & squamæ decidebant, post multa experi-
menta muliercularum & tonforum, quibus frustra
vsa erat, tandem me quoque ad se aduocavit. Ad
quam accedentes, cum quasi leprâ videretur esse
correpta, decocta quamplurima præscripsimus san-
guinem depurantia: & præterea decoctum illud
quo vti solemus, in his, quibus & suspicio morbi
Gallici est, cuius descriptionem posuimus lib. 23.
Obser. & Curationum nostrarum medicinalium,
Obser. 7. Faciem vero lauabat variis aquis destil-
latis: & ad deponendum furfores vsus sum decoct.
maluæ, sem. cydoniorum & fursus is macri, ad de-
terfionem. Variisque deinde vsa est vnguentis: sed
nihil profuere. Postea oblinebat faciem oleo rapa-
rum, mixto cum aqua. quo remedio crustæ decide-
bant furfuræ, tum squamæ; & facies paulatim
pristinam, præter opinionem, nitorem recepit. Ha-
betur autem hoc pro arcano, &, quod mirabile erat,
illud oleum raparum concussum cum aqua fluui-
atili seu corrente, cutem nitidam in facie effecit. In-
terim nos non desistebamus interius medicamenta
repurgantia & corrigentia sanguinem exhibere.
At alteri viro, qui morpheam nigram ex humore
melancholico habebat, consului vt materia pec-
cans purgaretur cum sequenti medicina: & diasene
lenitui

lenitui 3 j. calthæ recens tractæ 3 ß. misce, & fiat potus cum aqua decoctionis polypodij quercini, epithymi, thymi, & aliorum fruct. & flor. omnium communium. Demum digessi materiam, nulla facta phlebotomia in tali curatione; quoniam augeret causam, ut præceptor meus Benedictus Faentinus piæ memoriæ dicere solebat; ut etiam scriptum reliquit in sua Empirica, cap. 5. de morphea: (Cæterum utrum phlebotomia conveniat aliquando in morphea, scholio sequenti disputabimus.) Itaque omissa venæ sectione digessi, inquam, materiam sequenti medicamento: R. syr. de fumo terræ, de epithymo, de thymo, de endivia ana 3 ß. aquæ boraginis, melissæ, fumo terræ ana 3 j. misce. Continuato isto syrupo per septem dies continuos, ut materia purgaretur sequenti purgatorio, imperavimus: R. dialenæ lenitui 3 vi. confect. hamech 3 ij. elect. de succo ros. 3 j. misce: & fiat potus cum prædicta decoctione. Postea omnes partes morphea affectas inungi mandavimus sequenti oleo calido, omni vespere cum iret dormitum: R. olei de tartaro, vini albi potentis 3 iiii. Deinde etiam hoc sequenti vng. R. olei de tartaro 3 ij. ol. amygd. amar. 3 j. succi lapathij acuti 3 j. ß. ceræ q. l. fiat vng. interim dum vespere fieret hæc inunctio, manè continuè diluebatur locus affectus morpheæ, sequenti aqua: R. aquæ distillationis lapathij acuti lib. iij. interiorum melonum, cum sem., lib. ij. ovorum hirundinum numero x. salis nitri 3 ß. tartari vini albi optimi 3 ij. omnia simul misceantur; pulverizatis pulverizandis, & ponantur in alembico, & distilletur aqua, quæ vlti referuetur.

SCHOLIA.

Curatio
morpheæ &
albaras, iuxta
Arates &
práticos.

CURATIO morpheæ & albaras, insequendo vestigia Art-
bium & practicum neotericorum, ita instituta est. Pri-
mò in morpheæ alba, rectificentur dextra, cavendo ab illis quæ ge-
nerant

nerant phlegma, ut sunt fructus recentes, pisces, crapula, & quacumque impediunt coctionem primam, & secundam & tertiam. Ita morpheâ nigrâ cauenda omnia cibaria melancholica. Et ita primam intentionem habent in reborando primam digestionem & secundam. Comedere igitur iubent quæ sunt bonæ substantiæ, & facili concotionis, in tali quantitate ut digerere possint, cauendo à carnibus porcinis, bubulis, piscibus, lacte, & omnibus lacticiis, carnibus leporinis, cerninis, pane azymo, miliaceo, & ab omnibus herbis frigidis ac oleribus. Potest tamen vii petroselinulo, salvia, borag & hyssopo. Cauere quoque iubent à nimia repletione, comestatione, crapula, ebrietate, & ciborum potuumque intemperantia. his enim prima coctio debilitatur, & secunda indigestum recipit, ac tertia; unde sequitur error per omnes virtutes, usque ad assimilationem. Pane igitur bono ac optimo frumenti utantur; vinis odorifero, albo & clareto: & cibi condiantur optimis aromatibus. Utantur & ouis sordilibus, gaudeant, letentur, exerceantq; se ante cibum: à prandio minime moti violento moneantur. Inter cenam & prandium à potu abstineant, nisi magna sit cogent. Secundam intentionem curant ut vertunt ad humorem peccantem; quem digerunt, si pituitosa est, cum oxymell. squillitico, diuretico, in quo præbullierint hyssopus, calamentum, anisum, & similia. Deinde euacuantur aliquando cum vomitu, quia à longinquis attrahit partibus; vel purgetur cum pul. diatribiti vel agar. Vel fiat hic syr. ad digerendum phlegma: R. orig. calamenti, menthastris, hyssopi, dauci, balsamita, samfuchi, salvia, betonica ana m. j. rad. apij, petroselinuli, brusi, asparagi ana m. ss. mentha, absinth. ana p. j. sumiterra, lapathi acuti, folior. borag. ana m. j. squilla, raphani gallicani ana ʒ i. fiat decoct. & cum aceti albi lib. ss. melis lib. ij. fiat syr. detur cum aqua cicorum & hyssopi. Deinde purgetur cum pul. diatribiti facto in bolo, vel purgetur cum hieralogod. Archigenis, Ruffi, vel pill. de hiera picra, acnatis (ut loquuntur) cum pulicologynth. vel propinetur infus. chebul., indorum, cum substantia epithymi, atque hæc sæpius reiterentur, ob materiam rebellem: & vomitus sæpe pronocandus. Postea ad localia deueniendum. Friceatur locus albus morpheâ infectus (à quo prius exiit sanguis per punctiorem acm) cum cepa & ace-

to, vel cum sinapi vſuali, vel cum ſolis ficis, aut corticibus
eiusdem; hæc enim ſanguinem ſubtiliunt, & ad exteriora tra-
hant. Horum materia qua ung. & epithemata compoſuntur, hæc
ſunt, quæ valent ad omnem infectionem cutis, poſt vniuerſalia:
nempe ſalia, cortices, ficus, calx abluta, ſulphur viuum, vitrio-
lum, auripigmentum, ergo eryſi, lapathium, ſumiterra, tartarum,
ammoniacum, liſharg. as uſum, alumen, cadmia auri &
argenti, gentiana, radix lilij, ariſtoloſch cucum. ſylueſt. dragun-
tes, Zeluſum, elleborus uterque, ſang. leporis, cantharides, alœ,
myrrha, fuligo furni; ſinapi, eryca, ſuccus pap. rub. euphor-
bium, piper, uipera, mel. ex hiis fieri poſſunt ung. olea, lotiones,
epithemata. Vel fiat hoc ung. rz. tartari, fuliginis oris
furni ana ꝑ. j. ſulphuris vii i, ſalis nitri ana ꝑ. ſ. auripigmen-
ti, aluminis ſciſſi, ellebori albi ana ꝑ. ij. fiat pul. & incorporetur
cum ſucco ſumiterra, addendo ung. citrini q. ſ. & conſidera illa
quæ dicuntur cap. de ſaphari, id eſt, de puſtilis rubris & lini-
dis, vel albis, circa naſum, cum rubore totius faciei. Bre-
uiter, cura morphea a. b. a, fiat in vomitu & abſtinentia ab
humectantibus, & phlegma generantibus, & ſudare in balneo
vel ſtaphæ: & viſi poſſunt phlegmagogis, adiectis maſtice, thu-
re, & aliis roborantibus ſtomachum & hepar, cum purga-
tione frequenti cum turbiſ. & pulpa xolocynthid. & cum
ung. & epithematibus ſortitur ſupradictis. In morphea ru-
bea ſi homo ſentit pruritum & arſuram & anguſtiam poſt
aliquem laborem, & locus morphea affectus eſt ſuſcus vel ru-
bins, vel ad citrinatam declinã, tunc eſt à ſanguine acuto,
groſſo, vel à ſanguine ſubtili cholericò. tunc primo (inquit
Valeſcens cap. proprio.) fiat phlebotomia de parte oppoſita, de-
inde de eãdem parte. Alij authores in nulla morphea phlebo-
tomiam admittunt. Hinc recte dicebat Gordonius cap. pro-
prio: Inſtelligendam quòd in morphea, ſicut dicunt ſapien-
tes, non competit phlebotomia: & verum eſt, quoniam ipſi po-
rebant ſolui modo duas ſpecies, & utraq; orit à cauſa ſi-
gida. Poſſunt etiam dicere, quòd in aliqua ſpecie, ſicut in
lepra, non competit phlebotomia, & poſſimum poſtquam
aggruendo eſt confirmata, quia materia trahetur ab exterioribus
ad interiora. Alumen ſi nos ponamus morpheam à ſanguine,

Breuiſe reca-
pitulatio cu-
rationis
morpheæ
alba.

Curatio mor-
pheæ rubæ.

Utrum phle-
botomia
competat in
morpheæ.

ne, seu rubores, tunc in principio competit phlebotomia. Si etiam ponamus morpheam à cholera, & corpus sit plethoricum, à principio competit phlebotomia. Nec videtur procelere ratio quam posuit Avicenna & quidam sequaces eius: quoniam ubi est sanguis melius malus, & paucus bonus, phlebotomia totum rapit, & maius relinquit in vena. At inquirunt, ponamus sanguinem putrescere intra vasa, sicut in syncho; nonne est tunc maior copia sanguinis mali, quam boni, & tamen in syncho fit phlebotomia. Sed non valet ratio, quia natura retinet bonum, quia indiget, & dimittit malum, sicut videmus in phatmacia cum superfluo; quia ultra ò emitte sanguinem. Potest igitur competere phlebotomia in morphea à principio sanguine dominante, aut corpore plethorico existente: & propterea cum materia in morphea adhuc existit in vena, bene potest fieri phlebotomia, sed postquam notabiliter est extra venas, minus competit. Hac Gordonius. postea mundificetur sanguis, ut dicebat Valesius, cum castia, & thamarind. & famoterr. & cum myrobal. citrinis, & indis, & bull. ricis. & purgati materia, & observata bona diæta, cauendo calida & secca & sanguinem adurentia seu ingrossantia, fiat tale unguentum: R. auripigmenti quantum vis: incorporetur cum succo famis terra & succo rad. lapathij acui: fiant trochisci, quibus dissolutis cum succo vel syr. de fumo terra liniatur locus: vel partes affectæ inungantur sub noctem; manebit abluantur aqua calida. Vel unguantur cum ung. citrino: & postero die lauentur cum aqua sursuris. In isto casu, & in omni morphea, valet hoc virginale dictum: similiter & passio ventosorum in locis morphea effectus cum scarificatione. & postea vagatur cum sanguine l-poris tepido. Deinde cum isto pulvere aspergatur: R. thuris, massœ, amydi, lithary sarcocolla ana ʒss. & stet sit per tres dies sine lotionē; & in quarto lauentur cum aqua calida sursuris. & in isto casu non lauentur cum aqua frigida, quia mortificat, & incrassat materiam. Valet & hoc linimentum ad idem: R. succi absinthij, mellis ana. bulliant simul; & inde liniatur locus, & supra aspergatur de pulvere supradicto. Sed & sanguis leporis, si eo morphea frequenter inungatur, soluit omnem morpheam, & pul. supradictum dissolvit sanguinem grossum.

Curatio al-
baras & mor-
pheæ nigre.

Gordonius.

Serapio.

Guilhelmus
de Saliceto.

grossum, & praparat ipsum resolutioni, & consortat locum
laseri facit succum spatula feride. Et ista debent fieri post uni-
versalia, & non antea. Caterum curatio albaras & morpheæ
nigra est multo difficilior, eo quod materia eorum sit radicata, &
aliquando adusta & plurimum infecta & alterata, unde com-
petunt medicina fortiores. Attamen sciendum est, ut dicebat
Gordonius, quod à principio morpheæ potest dari medicina fortis-
similis, ita ut sit fortis in se, sed quæ detur in parva quantitate;
quoniam licet morbus sit chronicus, quantum est ex hoc, debilis
medicina debet dari utroque modo: tamen si ægritudo esset con-
firmata, periculum esset; & ideo pro acuta reputatur, quo ad for-
titudinem medicine, sed non quo ad quantitatem, iuxta aphor.
6. 1. part. Ad ultimas ægritudines ultima curationes sunt po-
tentes. Primum ergo post usum oxymel. squillitici provocetur
vomitus post comestionem raphani, & piscium salitorum: &
post purgetur cum biera Archigenis, & biera sogadij: quia ista
biere rectificant hanc ægritudinem, secundum Serap. & admi-
nistrentur cum aqua end. & epithymi, & pass. & polypod. quia
ista attrahunt humores corruptos & adustos. Vel purgetur cum
pil. fortidis, vel ut dictum est de impetigine. Guilhelmus de Sa-
liceto in morpheæ nigra fricat locum cum cæpa & oxymelle
squillitico, & iubet fieri hoc emplastrum: R. cantbarid. ʒ j. pi-
stetur cum fermenti ʒ j. & cum aceto fortissimo, & apponatur
loco morpheæ affecto, & dimittatur per integram horam, ita ut
locus vesicetur. Post lauetur cum ung. albo & ung. de litharg.
Valeat & in albaras: & postea utatur hoc medicamine: R. cipa-
monii, spica, carpobalsami, azari, croci, folij, calami, pulpa colo-
cynth. ana ʒ j. alvës ʒ i 8. fiat opiata cum melle & aceto, &
detur ʒ j. cum aqua calida. Valeat & oleum tartari, & lac vir-
ginale, & ung. quod ponitur in Lilio apud Gord. cap. de tineæ.
& ita in nigra morpheæ confert frequens evacuatio humoris
melancholici, maxime cum epithymo & lapide lazuli, vel cum
pulvere dicendo in cap. de saphati seu pustulis faciei & nasi: &
dissemperatur sem. cruce, piperis nigri, baurach ana ʒ j. cum
succo sumiterra & melle, fiat linimentum vel epiphema. Vel
epithimetur cum arsenico citrino pulverisato, & cum sem. lau-
reola dissemperatis cum melle, addendo staphisagriam. Hæc
Rhases.

Rhases. sed & caro arietis adusta & linita, & confricata valet morpheæ Anic. in 2. can. Cancer fluminalis adustus ponitur in medicamento morpheæ: & conferunt folia cypressi, & secundum Anicennam, aristoloch rot. facit bonum colorem, & conducit morpheæ. Aqua quoque sulfurea est bona ei & albaras. Cinis alij cum melle linitus super morpheam; & althæa, aut semou eius cum aceto tritum; & postea sedere in Sole. Hæc Valescus ex mente Anicenna. Et hoc vng. confert in morpheæ albaras, im-

perigine, materia sufficienter purgata, & præcedente optima dietâ inaque sumatur semel in septimana vel bis lib. s. aquæ castei, cum ʒiij. epithymi. Deinde ℞. tartari, fuliginis oris fatui ana ʒ j. jali niri, sulphuris, ana ʒ ss. auripigmenti, alum. scissi, ellebori albi ana ʒ ij. omnia ista pulverizata incorporantur cum succo fumiterre & lapathij acuti. fiat vng. mediocriter liquidum. Gordonius ita curat morpheam; præsupponit bonam dietam, ac regimen, ut vocant, sicut in lepra, deinde materia peccantis digestionem, & euacuationem aptam: deinde venit ad localia remedia. Inprimis, inquit, fortiter fricetur locus cum panis aspero: deinde inungitur cum auripigmento rubeo pulverizato, & incorporato cum succo fumiterre, & postero die abluat cum aqua fursurum calida: & hæc si sit de causa calida. Si de frigida, corpore mundificato fricat locum cum solis ficis, & inungit cum oleo tartari: quod ita fit: Tabula tartari calcinantur in furno calcinationis, & postea ponantur super marmor: & quod destillabitur per silexum, erit oleum clarissimum, quod reseruetur in vase vitreo; & locus inungatur, & sanabit procul dubio. Sed iste modus non est notus aliis, quam solis Alchymistis, quia modus Alchymicus in multis est utilis in medicina, sed in aliis est ita damnosus, ut in eius via infiniti perierint. Si infectio fuerit de causa calida, inungatur locus cum unguento citrino, cuius vis augeatur cum lithargyrio. Et si fuerit de causa frigida, addatur vng. fuscum, vng. ad scabiem: & actuat cum sulphore vivo. Vel fiat vng. ex istis materialibus, ut sunt calx abiusta, sulphur canalicatum, atramentum, auripigmentum rub. & citr. sal ammoniac., viride æris, alumen, es vitrum, & illa quæ paulo antè à nobis memorata sunt. Quod si istis non curetur morpheæ, curetur curatione lepræ. Refert M. Iohannes Tiengius, medicus Amstel-

Vnguentum valens aduersus morpheæ, albaras & impetiginem.

Olei tartari compositio.

Contra Alchymistas quoddam.

rodamensis,

rodameris, ut in eiu libello ipsius propria manu scripto inueni,
 se habuisse Minorem quendam p'lethoricum tempore quadragesi-
 ma, habentem morpheam cum magna maculatione cutis liuida,
 versus rubedinem aliquam, cum impotentia erudi, vel morendi
 eryta, & brachij impotentia: cui d. c. hanc porionem: R. na-
 stury aquatici m. j. end., viol., borag. sumiterra ana m. ss. folior.
 fenæ ꝑ j. fiat decoctio in duabus pintis aqua lactis, ad cōsumptio-
 nem quartæ partis. & coletur. Bibet at omni mane cyathū unū;
 ut quotidie bis tēve alium deponeret. & facta mundificatione
 notabili accepit col'ocymidū ꝑ j. & decoxit in acet. & aqua fa-
 bur. ana lib. ss. eaq; calefacta, p'p'io seu spongia illi immersa bal-
 ne: bat loca hac labē sedata; & breui tempore maru'a singu-
 la fuerunt deleta: Sed & alteri p'lethorico in pede eiusmodi de-
 sedationes habenti, declinante ad rubedinem, cum pedis infla-
 tione, post exhibitum prius sequentem, (R. diacath. ꝑ j. confect.
 himech ꝑ j. ss. cum aqua viol. fiat potus) balneationem eandem
 adhibuit, & curatus est. Caterū insequendo vestigia Gracori,
 in vitiligine LEPTERYMBILI; statim post institutam optimam vi-
 tæ rationem, meditantia exhibenda, qua glutinosos humores
 extenuare possunt, ut est hyssopus, calamintha, anisum, oxymeli,
 & id genus alia: deinceps qua eosdem purgare valent pharmaca
 sunt propinanda. Corpore euacuato, ad localia veniendum. In
 leuce igitur, quando curationem recipit, vii poteris lentiscula mi-
 sta cum sulphure & thure, sic ut excontrita sit, ex aceto: vel
 folia viridia sic macerata in aceto: sit autem aceti tantum, ut ea
 superet, & panitus contegat: deinde contrita, & trita cum suf-
 ficientia calce vina misceto, & locis prius exersis in sole illinito,
 usque dum lentigini ipsa leuce similitudinē præferat: atque
 deinde sic surcum recentem supra istam illuionem inducito, ip-
 samq; leucen solam aliquamdiu confricabis; & de vicinis par-
 tes exulceres, obseruabis. Egregie autem auxiliatur, quod in hūc
 modum patitur: Nucum inglandum adhuc acerbarum exterior-
 um corticem viridem detrahito, & si nigra syluestris ramulos
 amputato: ad hæc lithargyrum conicies, ac cum aceto cocta con-
 teres: & postquam ad unguenti fortunam reduxeris, in sole illi-
 nito. In decoquendo etiam hordei grana septem addito: hinc enim
 sufficienti decoctioquis signum eris, ubi videlicet hordei grana
 cocta

Cura leucæ,
 secundum
 Gracos.

Actus.

ocula apparent. Fortiora iam dicta sunt sulphur vinum, veratru,
 sandarach, cha'canthum, alumen rotundum, & scissile, ventres
 cantharidum, sal ammoniacum, nitrum, & similia: è quibus
 vnguentum confici potest, ut R. sulphurū vini, nitri ana ʒ ij.
 alium. scissi, rotundi, ellebori albi ana ʒ j. salis ammoniaci ʒ ʒ fa-
 rina lupinorum ʒ ij. ʒ. redacta in puluerem cum vng. flauo (ci-
 arinum vocat) quod satis est, excipiantur. Porro cui prius quàm
 medicamenta adhibeantur, nitro ficanda erit. Sunt etiam qui
 prius acu transfixam pungant, quoad cruor emanet. At nonnulli
 (Paulo Aegineta dicente, lib. 4. cap. 5. de Lenca) adustionem illam
 quæ ferramento candente administratur, in lenca probant, sed
 ita ut hac vel sola valetudini sufficeret. Alij verò inde dolores
 cicatricemq; secuturam veriti, ut quæ non minùs ac lence inde-
 cora sit, medicamentis crustam inducentibus, qualia & cicatricem
 aiunt concolorem efficere, vsi sunt. Alij & horum inefficaciam
 repudiantes, incturis vi maluerunt, impostura potius, quàm auxi-
 lij rationem habentes; quæ sanè omnium maximè vitari debet,
 quod affectus celeriter renascitur. Itaque subiectis vi medicinis,
 consilium est, nempe: adaries, cactryos, sulphuris vini, singulorū
 paria pondera, in sa & incerniculo priuatim creta, deinde simul
 cum aceto in pollinem sat multū dictus deorita, in sole illuminatur,
 non vniversa, ne cutis exulceretur. Procedere autem tempore ve-
 ratru, & galle similiter momentum adiicitur. Aliud: Fici nigra
 furculos, aceto imbutos, contritosq; misceto, aphronitri, sulphuris
 ignem non experti, myrica fructus, pari singulorū modo, ubi nitro
 cutem defricaueris, in sole perungito, animum attendens ne ex-
 ulceretur. Archigenes autem fici foliis, calcis vine quod satis est, Archigenia
 mixto, similiter vsus est, vel infricatus, inquit, lenças, allo vera-
 tro, donec sudore diffuentes reliquo corpori concolores fiant, illi-
 nito sinopide, vel mediade; vel acu transfixa punctas, quoad
 cruor emanet, illinito sinopide, cum aceto; vel prius abstersis, ut
 est comprehensum, perungito, fici liquore reueri, & folie eiusdem
 affatim infricato. In vitiligine, a'pho, videtur qui neque pituitam, vitiliginis
 neq; atram bilem in corpore atretet, insitnendus. In albo igitur, albi cura-
 principio quæ pituitam deducunt medicamenta; in nigro, quæ
 melancholicum humorem euacuant, exhibenda sunt. Vtriusque
 igitur (inquit idem Paulus lib. 4. cap. 6.) commune prodeit
 auxi-

auxilium, elora calx aqua soluta, aut dracunculi radix, cum acet. so illita : simili modo virumque veratrum eisdem efficax est; itemq; lupinorum amatorum decoctio superfusa, coramq; farina ex aceto, vel oxymelite inducta. Iam capparis radicis cortex cum aceto, liliq; radix cum melle, copa ex aceto in sole peruncta, crocodili terrestris fumus idem praestant : par efficacia est & in sturni excremento, cum sturnus oryzam duntaxat ederit; eademq; vis est in sepia testa concremata Compositum vero praestans est Alcyonij, nitri, singulorum pondo sextans; veratri albi, sulphuris vini an. ʒj. Nonnulli vero & floeces vini combusta adiciunt. Vel r. sulphuris ignem non experti, nitri, spume ana ʒiij sem. rarismarini gr. vii. terantur cum aceto. solum vero album perungito, sed ita ut integram partem non attingas. siccatum medicamen aqua frigida eluitur. Aliud : Erui farina lib. ij. eruca seminis; amygd. amar. cucum. slinejl. rad. ana lib j. mulsio simul laevigata deliniuntur; & hora interposita per spongiam abluuntur. Facit etiam ad ephelidas; varos & clausos. Ad alphas albos experta, ex eodem; Sulphuris ignem non experti sextarij duo, calcis vine candida ʒiij. albumina onorum quinque, olei nardini & aceti momentum. sulphur primum in pollinem cogitur, mox oleum nardinum ei superiusfunditur; tursusq; laevigatur; deinde acetum instillatur, & iterum teritur : calcem vero priuatim lotam semel bis terpe, sulphuri adiciamus, una cum onorum aquato; & denuo conterimus : collectus humor effunditur. paucillam vero relinquentes, ut unguentum qucat illini, in hunc modum utimur. Aliud Archigeni: Sulphure vino, fici folijs aridis, aphronitro, alcyonio, terra timolia, myrio, & aceto vinor. Vel fici folia, qua in umbra exaruerint, sulph. aluminis ana cum aceto inungitur. Priuatim nigros exterit efficaciter sandaracha, cum sulphuris dimidio; sed cure intro prius defricata, in sole perungitur. Albos vero tollit atramenti sitorij, aruginis aequalis modus, nitri duplicatus sine pingui infricatus, perungiturque: vel cachryos, sulphuris vini, adarca aqua portiones, ex aceto infricantur, illinunturque: citius inaruerint, abluito, locum perficans. Idem facit & Lencis. Sed & hoc secretum est pro alphi seu morphea : Accipiantur tres vel quatuor lacerta virides & crassa, & abscisis capitibus & cauda, & ele-

tis

Ad alphas
albos ex-
perta.

Priuatim ad
nigros
albos.

Ad albos.

Arcanum.

Etis interioribus decoquantur in oleo communi usque ad dissolutionem ipsam. & illud oleum in frigidari permittitur; & pinguedine supernatante reservata, morphea inungatur, precedente forti frictione cum panno crassiore, & pulvere tartzari, quousque sanguis emanet. deinde inungatur locus affectus prædicta pinguedine. idem potest fieri de serpentibus. Nunc ad alias maculas progrediamur minus molestas & malignas.

OBSERVATIO IIII.

De lentigine & panno faciei.

NOBILIS puella cum lentigines in facie haberet, ac nos consulere quibus modis ab ea liberari posset; consului ut aqua è cochleis destillata vteretur: illa enim mirum in modum lentigines delet: quemadmodum & panis è furno calidè extractus, & calathò vimineo contextus, olla etiam supposita, si inde rore destuente lentigines liniantur: mirabile enim est. Vel sal ammoniacum siccatum in Sole ad ζ j. β iniice in ζ iij. olei tartari, & per 20 dies Soli exponito. hora somni lentigines eo tangantur. manè digitis melle fricato: postea linteo madefacto aqua clara faciem abluito. Vel ut solo oleo tartari liniret, imperavi. Vel albumina ouorum q. v. ouis ad duritiem coctis abiectis vitellis in alembico destillato, & vutor; maculas faciei delent. Sed & hoc ad pannum faciei efficacius est: R. lixiuij barbitonf. ζ iij. olei tartari ζ ij. saponis albi rasi ζ j. bulliant omnia simul, quousque materia densetur ad formam mellis. sub noctem inungito: manè linteo detergito; idque diebus interpositis peragito; interim cauendo ab aëre, radio solari, & igne: domique maneat, cum hoc remedio vteretur.

SCHOLIA.

LENTIGO in facie potissimum & in manibus, nonnumquam in pectore emergit lentis magnitudine, colore fusco, et ebrie

crebris quasi guttis dispersa. Huus familiaris est qui ruffo sunt pilulo. Interdum, hiemeq; præsertim, sponte delentur aut dissipantur: æstate verò reuirescunt, ac crebrescunt. Accidunt & partibus cæteris macule, palma interdum magnitudine, colore etiam fusco (ut de domicella Hentera antea diximus) & quæ quibusdam temporibus & oriuntur & desinunt, quæ quoniam naturæ eiusdem sunt, in id quoque genus pertinent. Has autem constat ex melancholico succo nasci, qui & visceribus in cutem sit effusus. Interdum etiam peculiari cutis vitio & affectu contrahuntur, quo illius alimentum, etiam si purum sit, corrumpitur, alienumq; colorem subit. Cutis enim extrinsecus infecta, suum pariter iuveni minuit, quemadmodum & macule ab oris primæ uel conformatiue, ut signa quadam nobis inusta, nulla possunt ratione deleri: & quamuis nonnunquam obscurantur, tempore tamen virescunt, aliæ quidem cum maturis fragis aut cerasis, aliæ vindemiaturis, aliæ alio tempore, aliòve cæli statu. Quinetiam ut exanthemata, ita etiam aliæ quadam macule, venenata qualitatis contagione sine pustulis efflorescunt, tum colore tum figura variæ; atq; etiam interdum inaudita; idq; vel aëris inquinamento, vel hausti veneni perniciæ, vel virulenta bestia morsus, quæ non nisi extincta venenata qualitate deleri possunt, ut in libro De venenis diximus. Verùm de maculis & quæ exanthematum modo in cute efflorescunt, maximè in febrili, de iis suo loco diximus. Sed hîc rursus breuiter de lentigine dicamus. Sûnt autem lentigines, ut Gordonius partic. 3. 4. cap. de lentiginibus faciei scripsit, infectiones cutis faciei ut plurimum, & aliquando cutis totius corporis. atque istæ infectiones modò à causis externis originem habent, ut ex nimia caliditate solis, aut propter aërem corruptum, vel simile quid. Vel à causis internis, ut propter crisin, aut propter retentionem menstruorum, aut hamorrhoidum, & aliarum superfluitatum assuetarum euacuari, vel propter bonitatem naturæ mundificantis corpus à superfluitatibus, aut propter malitiam humoris exterius resudantis. à menstruis repressis plerumque oriri videmus in gravidis, cum menstrua desineantur: nam tunc panni in facie maximè apparent. Signa causarum exseruatum, vel si menstrua retineantur, ex sermonibus ægra faciliè discernuntur. Si propter crisin fiat,

cogno-

Cause.

Gordonius.

Cause externa.

Internæ.

Signa.

cognoscetur ex alienatione morbi, quia & febris cessat. Et si fuerit ex bonitate naturæ, est sine mordicatione & dolore. Nam multas puellas noui, quæ haberent eiusmodi nephelides, eò quòd calidioris naturæ essent, vel maximè proclines ad Venærem, fortè quia non satis mensurantur. Si autem fuerit ex malitia materiæ, semper concomitantur aliqua mala accidentia, sicut est pruritus, dolor, debilitas appetitus, & similia. Et si sit ex melancholia, ad linorem & nigredinem. & si sit infectio cutis ex sanguine, ad rubediuenem verges; ex bile, ad citrinitatem; ex phlegmate, ad albedinem. Si est ex sanguine corrupto, est color cutis sicut sanguis mortificatus. Si lentigines & cutis infectiones in feb. veniant ante signa digestionis, & in die non critica, sequum est pessimum, & lethale: quare in talibus cutis frequenter est inspicienda. Sed in rursis puellis, absque febre nihil mali aut molestia portendit. Vnde & Cornelius Celsus lib. 6. cap. 4. de varis & lenticulis & ephelide ita scribit: Pueri incepta sunt, curare varos & lenticulas, & ephelides. Sed eripi tamen faminis cura cultus sui non potest. Vari, idem inquit, & lenticula vulgo nota sunt, quamuis rarior ea species est, quam *ξίρος* Græci vocant, cum ea sit lenticula rubicundior & inequalior. Ephelis verò plerisque ignoratur: quæ nihil est, nisi asperitas quadam & durities mali coloris. Lenticulam tollunt galbanum, nitrum, cum pares portiones habent, contritæque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis manè eluendum est, oleoque leniter ungendum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Paulus aut ephelidem & lenticulas, terra cimolia torrefacta, congio leuiss, aphronitri tosti ʒ V I I I. erui filiqua ʒ iij. sellis taurini, eburnea scobina ʒ V I I I. lenigatis facies defricatur. Vide & eundem lib. 3. cap. 25. de faciei vitis, ubi ad faciei nigritias vsitur pastillo proponato. Sed, ut ad neotericos redeamus, Gordonius hanc curationem de lentigine inscripsit, quamuis hæc ipsa etiam ad maculas alias pertineat & cutis infectiones diuersas: nam si infectio, inquit, sit in facie, & corpus sit plethoricum, & sanguis dominetur vniuersaliter, fiat phlebotomia in basilica: sin

Prognostica,

Celsus.

Ξίρος.

Ephelis.

Curatio
lenticulæ.Ad ephell.
dc.Curatio neo-
tericorum.

fit repletio & infectio in toto, ex mediana; in facie verò, ex cephalica; in facie quoque possunt fieri ex saphena scarificationes de tribu aut inter spatula, aut sub mento: & purgentur humor peccans. Sed sciendum est, quòd si fiat infectio cutis ex aliis humoribus quàm melancholico humore, tunc non sunt propriè lentigines, & alio colore imbuuntur nam lentigines semper vergunt ad quandam fuscedinem; & apparet descedatio maculosa ad modum lentium: & ita sunt lata, rotunda & coloris vergentis ad fuscedinem. tamen quadam melancholia est multum crassa, & ex ista causantur in partibus inferioribus pustula, scabies, & malum mortuum. Si autem fuerit materia minus crassa, tunc ascendit ad faciem & non potest evaporari; & idè causat lentigines. Cholera autem de facili evaporat, nisi fuerit incrassata ratione admixtionis vel aduisionis. Ceterum ad lentigines faciei post plenariam corporis mundificationem fiant unguenta, illutiones & aqua, & similia ad mundificandam cutem: & sunt ista materialia: nempe, farina hordei, fab. scænuigraci, lupinorum, amygd. amar. surfur, calx, virriolum, nitrum, myrrha, sal ammoniacum, conchylium marina alba, corall. crystallus, been alb & rub amyllum cand penid., liquiritia, lac ficus, arsenicum, sublimatum, fella animum viventium ex rapina: aqua tartari, raphani, porri, dragonæ, lilij: flores sambuci, fabarum, sumierræ, succi maioranæ (& propriè in sanguine mortificato recenti, quia in antiquato scarificatio est necessaria) ruta agrestis: cortex citri, acetum alb., vinum album: colatura surfur. farina oryza, lac foliorum ficus aut extremitatum aut ficum: aut aqua decoct. istorum. imò decoctum ficum ex se naturam innat, expellendo exterius. ex his fiant apta remedia. sed quia hæc ad fucum & ornatum spectant, de illis aliàs latius agemus. Hinc spectat ecchymoma, cutis descedatio: est enim nihil aliud quàm sanguinis per cutem effusio atque concretio. Effunditur autem è tenuibus exilibusq; venis in cutem sparsis, quæ ob sanguinis copiam aut tenuitatem aut acrimoniam vel anastomosi, vel diapedesi referantur: crebrius verò vel labore immodico vel confusione ex ictu casive rumpuntur. Ex his ergo sanguis per cutem effusus coit, modò cum levi tumore ac dolore, modò citra hæc: eimq; colore inficitur cutis: primumq; lineis, ac imm affe-

Simplicia
medicamina
ad faciei
lentigines.

Ecchymoma.

Stio pelioma Græcis nuncupatur : deinde & nonnunquam nigrexit, estq; cum melasma: utraque nobis jugillata dicuntur. Ad hæc radicule corticem cum melle detritū impone : hoc & veteribus efficax est. Porro ad veniſſa faciei jugillata & linorea, tordyli paries duas, terra ſancta partem unā cum melle admixto, cura adhibita ne exulceretur. Ad linorem faciei conſuſum facii faba impoſita. vide lib. 5. *Celſi*. & eodem malagmatis deſcriptionem ad linorem faciei conſuſe. vide & *Paulum* lib. 4. cap. 30. quomodo ecchymoma curretur. Hiæ autem ſugillatæ minora ſunt ſtigmata, minoresq; vibices, quales reliquuntur ex flagellis. Stigmata curabis (inquit *Paulus* lib. 4. cap. 7. ad ſtigmata, ex commentariis *Archigenis*) ſi quod macula adhæreſcit, aceto quāvis acerrimo illinas, vel calis vine partem unam, nitri coſti ſulmi dimidiam, cum aqua in ſole illinas. At ubi exulcerationem fuerint experta, cicatricem tamquam ulceri induito. *Oribasius* tradit rannunculum illitum, vel capparvis ſolia, ſtigmata abolere. Reliqua quæ huc ſpectare videntur, ut ad lentigines & maculas à ſole pronocatas, vide *Ætium* lib. 8. cap. 10. & 11. ad *ephelidas*, cap. verò 12. de ſtigmati ſine notu à verberatione illa, quæ in alia quapiam corporis parte vel in facie inſignuntur, quales quoque notas videmus in manibus eorum qui militiam exercent. Ad eos qui ſtigis caſi ſunt, & vibices, *Paulus* : *Cervuſe*, argenti ſpumæ æqualis portio, cera quadrupla, cum ſuſino aut roſaceo emplaſtri modo induuntur. primo die primatigi ſuſino ſolo utitur : vel croci drachma, tragacanthi tantundem, onum integrum inſponuntur item pellis ovæ recens excoriata calens adhuc circumdata, quolibet efficaciùs die uno & nocte perſanat. Sed hæc ſatis de maculis, nunc denudò ad puſtulas revertamur.

Polioſus.
Maculæ.
T'orçia.

Stigmata.
Vibices.
Maculæ.

Ad vibices
lib. 4. cap. 12.

OBSERVATIO X.

De lichene.

FILIA *Guilhelmi* de *Berendrecht* ſecretarij *Haghani*, iuuenſcula 18 annorum, cum lichenem in palinis manuum & circa interſtitia digitorum admodum fœdam haberet, quam *Vulgares Teſer ſeer* appeillant, nec ullis remediis curari poſſet, tandem

438 OBSERVAT. CHIRURGICARVM
vniuersalibus tactis euacuationibus hoc nostro vn-
guento eam curavi : R. litharg. auri & argenti per
noctem in aceto acerrimo infusi & macerati ana ʒ
ʒ. sulphuris viui ʒj. pul. ellebori nigri ʒj. succi li-
monum ʒj. axungia porcina & butyri loti in aqua
ros. ana ʒʒ. ceræ modicum. fiat vnguentum molle,
secundum artem.

SCHOLIA.

DE lichene seu impetigine egimus lib. 2. obser. chirurgica-
rum, obs. 10. 11. 12. & 13. & in Scholiis earundem obser-
vationum & Scholio 14. Serpigo à Gordonio, vti dictum est
quoque in locis citatis, ad impetiginem refertur. quare ad ea loca
recurrendum. Hoc vinum arcanum his addam, valens ad serpi-
ginem puerorum, maximè faciem occupantem, quam vulgares
appellant Springent vier. Creta quinerizetur, & miscetur
cum succo sempernini, ad crassitiem linamenti : quo locus inun-
gatur. statim exsiccatur serpiginem, phlyctenas, ignem volantium
vulgo dictam. eo remedio diu ante nos Christophorus chirur-
gus Delphis commodè in pueris utebatur. Leonus impetiginem
etiam ad tumores permixtos refert : quare & hic de ea mentio-
nem fecimus : quamquam ad tumores biliosos alij referant : &
ideò lib. 2. precedente l. de eadem scripsimus. Sed ipse Leo-
nus parotidas quoque ad eosdem tumores permixtos refert ; quas
modò à sanguine, modò à bile, modò ab humore pituitoso, qua-
doque à melancholia, post aures vel in aliis emunctoriis fieri scri-
bit. Sed quia de istis diximus lib. 12. Observationum nostrarum
medicinalium, obs. 16. & 17. & 18. & in Scholiis earundem,
de iis nunc dicere supersedeo : hac penca solummodò adiciens,
quòd post aures maximè fiant : & si sit parotis à sanguine, ha-
bet dolorem, rubedinem, granitatem & loci affecti circumtenso-
nem, atque ad tactum resistentiam. Quæ autem sit à materia
subtili & biliosa, magnos quosdam cruciatum inducit ; locus non
ita tumidus, neque rubens, sed citrinus apparet ; dolor sine grane-
dine, sed admodum ardens percipitur. Paroti à pituita, grauius
quidem, sed cum nullo ferè dolore ; locus ad albedinem porrens,
quàm ad rubedinem tendere videtur ; & ad tactum, sicuti cede-
ma,

Parotides.

ma, resistit. Quæ verò magis ab humore melancholico & crasso ducit originem, neque rubellinam habet, neque dolorem infert; at tumorem quendam scirrhum representat. Parotis illa magis salubris, quæ sit per viam crisis; quæ autem sit cum crisi, cum qua non est signum maturationis, vel quæ præcedit horam crisis, mala. Reliqua ex locis citatis pete. Aduenimus tamen his aliqua exempla curationis.

Aulic. lib. 7.
scn. 4. tract. 1.

OBSERVATIO VI.

De parotide.

IN parotide illâ quæ in iuvene post aures à sanguinis missione fiebat, venæ sectionem ex cephalica eiusdem lateris fieri mandauimus: deinde cataplasma leniens ex farina hordei, foenugr. & sem. althææ & chamomillæ cum aqua mulsa adhibuimus. egregiè valet & cataplasma quod ex rumice & axungia insulsa constat. emplastrum quoque ex diachylo seu ex succis contulit. At alteri, qui parotidem ex renui feruentique sanguine & in biliosam naturam conuerso instar erysipelatis haberet, onum cum chamæmelo & sapa admoui: commendatur & hyoscyamus, lapathum cum axungia leuigata & obducta, bis die aut ter immutata. Ex pituita verò terram cimoliam cum aceto & lapatho rectè imposuimus, prius butyro inuncto. Sed & calx lota inuncta probè tumores œdematodes discutit. Scirrhusæ verò picem liquidam, seuumque taurinum, hircinum, vitulinum aut ceruinum, bdellium & styracem (ex Tralliano) commodè applicuimus.

SCHOLIA.

SI à sanguine parotis oriatur, victus conueniet qualis in tumore phlegmonosis superius à nobis descriptus est. Post sanguinis detractionem mitigatoria adhibent, ut emplastrum Menasei leniens: ut R. axungia porcina lib. ss. colophonie ʒ ij. argenti spuma lib. j. vini opt. lib. ij. misce. & secundam artem

Curosto parotidis à sanguine.

A bile.

conficiantur. reliqua adice ex lib. nostro 14. ubi aurium vitia explicimus, & parotides schol. obs. 10. 11. Si ex biliosa materia (ex Tralliano) valet compositio ambrosia dicta, ut R. croci ℥ iij. spuma argenti ℥ j. olei ros. cera ana ℥ ss. adipis porcine ℥ ij. mellis ℥ j. cremoris sem. lini q. s. misce, & secundum artem confice. Hoc quoque medicamentum calidis affectibus opitulatur, quod habet cera ℥ v. olei chamomill. ros. ana ℥ ij. quorum inica num. vii. farina sabacea ℥ iij. misce: & parato vitior Ad parotides oedematosas, præter ea quæ diximus, etiam cum melle applicati, aut misca, valde siccantem discutientemq; vim obtinent. Ut verò scirrhusas discutiamus & emolliamus, præter sena illa clarum est calidiora olea, ut chamamelinum & rosaceum, parotidibus ex frigido abortis, ubi febris non adest, melius adhiberi: quemadmodum & infra scripta emplastra: R. spuma argenti lib. j. ss. ceruse ℥ vii. ss. aquæ maris ℥ xii. ss. olei veteris ℥ ix. buccinorum combustorum ℥ iij. ss. cera rufa ℥ iij. ss. terebinth. ℥ ij. thuris ℥ ij. misce, & confice emplastrum secundum artem. Quod sequitur, diastribin vocatum, non modò parotidibus confert, verum & strumis scirrhusis, durisq; condylomatibus, nervorum vulneribus, incipientibusque panis, visceribus scirrho induratis, & stomachi abscessibus; iophos dissolvit: denique medicamentum est multis accommodatum: R. herba lanaria, quæ struthion dicitur, ammoniaci suffiminis, aristolochia rotunda, galbani, squama aris, manne thuris, spuma argenti ana ℥ iij. resina picea, cera ana lib. j. aceti squillitici lib. ij. ss. olei veteris lib. vi. oleum, argenti spumam & acetum coquito, quæ manus non inquinant: deinde lebere humi posito, adice herbam lanariam, ammoniacum, squamam & galbanum: inde rudicula agitando, adiungito mannam thuris & aristolochiam; coquitoq; donec in crassitiem coierint. Si tumor nihil, quod notari possit, imminui ex medicamentis & cataplasmatibus discutendi facultate præditis appareat, sed etiam dolor persisteret, necesse tandem est, ut ad ea, quæ suppurationem excitare, & materiam possunt coquere, digrediamur. porro materiam in pus tum mutari inde tibi innotescet, cum rigor præter rationem & febris oboritur, quæ prius non erat, dolorque maior urget. Sunt multa simplicia quæ suppurationi conferunt; quæ tamen brevitatis causa

Curatio parotidis oedematosæ.

Curatio parotidis scirrhusæ.

Emplastrum Arto-barzanium.

Emplastrum Diastribin.

causa prater eo. inter composita hoc unice laudatur: R. axungie, farina pollinis an. lib. j. supra § iij. ona auferina num. iij. Hac probe lenigata & in panniculum illius applicato, continuo immutans. Insuper medicamentum quod sequitur, multum iuvat, ut celerius fiat suppuratio, & humores crudi, coctionisq; expertes concoquantur: idem etiam humores in pus conuersos extrahere consuevit; quin & humorem insidentem per iennes, & a visu remotos meatus latenter elicere, ut cicatrices postea iennes, & quodammodo obscura appareant; cuius medicamenti talis est descriptio: R. serinenti, resina picæ lib. j. cera § v. i. apothymatis salis communis, galbani, seu tauini ana § iij. salis floris, picæ ana § j saponis Gallici § ij. hoc medicamentum ita preparatum, non modò parotidibus, verum etiam aliis abscessibus accommodatur, ubi affectum virisque indigere putauerim: nempe ut humores in pus iam mutati excernantur; qui antea mutati non sunt, concoquantur. Vide plura apud Tralianum lib. 3. cap. 10. de parotidibus, & reliqua ex locis iam citatis pete. A parotidibus ad alios tumores permixtos ipse Leonus descendit, nempe ad variolas & morbillos. Sed quia de istis abundè differrimus, tum de curatione eorundem tumorum, lib. 6. Obser. & Curationum nostrarum medicinalium, cum de febribus scriberemus, hic nihil dicemus; nam istos tumores toto illo libro integrè pertraximus. Deinde quamuis arthritidem, podagram, chirogram, inò & ischiadem ad tumores permixtos idem Leonus in method sua curandi tumores referat; nos hic tamen de iis nihil dicemus; utpote cum lib. 27. Curationum nostrarum medicinalium ea ad ungues descripserimus, ita ut non opus sit hac eadem deus hic reficere. Quare benemolus lector loca iam citata perlegere poteris, & huc transferre. Reliquum igitur est, ut de variis seu icnibus, seu pustulis in facie apparentibus, cosic unigo lialis dictis, agamus: & ita ad scabiem & alias pustulas perueniamus; cum hæc iam dicta etiam ad tumores permixtos referri possint; prætermissa tractatione de morbis articularibus, de quibus prius loco iam citato dictum est; atque etiam curatione lnis Gallice, quæ à quibusdam unà cum scabiei curatione describitur: nam & de hac peculiari libro abundè egimus.

OBSERVATIO VII.

De varis seu ionthis aut coxis, vel pustulis apparentibus in facie: per modum consultationis.

SCRIPSISTI mihi, Iacobe Torneburghi, advocate doctissime, & cognate candidissime, ut pro pustulis in facie apparentibus tibi consilium seu remedium transferberem. Istis itaque pustulis seu tumoribus parvis & duris in faciei cute orientibus, qui vari Latinis, Ionthis Græcis, & vulgo apud Italos Cossi seu Coxī dicuntur, nisi succurremus, eiusmodi leues affectus elephantiasim quandoque præfigere solent, aut in callum concreti difficilius curabuntur. Fiunt autem plerumque ex crasso humore, cum tenui quadam sanie, ut Galenus de remed. paratu facil. cap. 2. refert. De varis autem & Celsus lib. vi. cap. 5. egit. Sed & præceptor meus charissimus Benedictus Fauentinus, quondam primarius lector Bononiensis, in sua Empirica de coxis & pustulis apparentibus in facie, cap. vi. tractavit: quem & nos in hac consultatione maximè imitaturi sumus. Hoc tamen inter causas addendum, quòd in his nostris regionibus plerique crapula cerevisiaria vrentes, aut vino continuò sese implentes, eiusmodi pustulis sæpe afficiuntur, ut omnis generis lapides supra nasum & faciem, ut topazios, sapphīros, turcesios cernere te putes, uti Gualtero Cornelio Alemariano contigit, ut faciem magis pustulosam vix vnquam viderim. Sed quod ad curationem atinet, insequendo, mi cognate, vestigia Benedicti Fauentini præceptoris nostri, instituenda victus ratio quæ minimè multiplicet sanguinem cholericum aut phlegma falsum, cum secundum plurimum harum pustularum materia immediata sit sanguinis acuti vel choleræ multitudo, vel ipsius falsi phlegmatis. Cauebis igitur ab omnibus cibariis calidis,

calidis, quemadmodum sunt carnes quibuscunque condimentis commixtæ & conditæ: multus item vsus ouorum quantumcumque recentium, omnesque res falsæ, & ex falsis omnia parata condimenta, tales affectiones progignunt: na omnia piperata, id est, condimenta facta ex pipere, quibus associatur zinziber, cinamomum, giryophylli, macer, & alia huius generis. Cauendum quoque à coitu, tamquam a re admodum obnoxia, cum ex coitu immoderato humores exacuuntur, & fiant tunc materiæ præparatæ ad generationem talis affectionis. Primo itaque ad minorationem materiæ accipies infra scriptum bolum, per duas horas ante prandium: ℞. floris cassiæ nouiter tractæ ℥ j. carniū thamarind. ℥ β. misce, & fiat bolus cum zach. Sequenti verò die vtile esse existimo, vt sanguinis missio fiat ex hepatica cubiti dextri cum extractione sanguinis sex unciarum, vel prout videbitur crassior aut nigrior, & virtus ferat. Die autem sequenti, pro alteratione temperaturæ calidæ hepatis, capies in diluculo sequentem syrupū: ℞. tyt. de succo acetosæ, de succo endiuizæ ana ℥ vi. de fumoteræ ℥ β. aquar. sem. com. frigid. lupul. fumiterræ ana ℥ j. misce. & ter reiteretur. Demum iterum laudo vt fiat phlebotomia ex saluatella sinistræ manus, cum extractione sanguinis pondere ℥ iij. Deinde continuabis syrupum vsque ad septem vices. Octauo verò die materia iam satis parata & concocta, hoc modo purgetur: ℞. sem. acetosæ, plantag. end. ana ℥ ii. quat. florum cordialium ana m. β. thamarind. ℥ β. iuiubar. sebesten ana num. 10. carniū prun. damas. pass. enucleat. ana ℥ β. bulliant in f. q. aquæ vsque ad consumptionem medietatis: deinde cum colatura dissolue floris cassiæ recenter tracti ℥ vi. elect. de succo ros. ℥ j. β. confect. hamech, diaprun. solutiui ana ℥ iij. & fiat potus. deinde quiesces post purgationem per duos trisve dies. Demum
post

post meridiem facias apertionem venarum hæ-
morrhoidarum, cum extract. sang. pondere \mathfrak{z} iij.
precedente tamen clysteri leniente. Peractis vero
his euactionibus, tam cum pharmacis quam cum
phlebotomiis, vesperi cum cubito eas inunges
pustulas vnguento sequenti: & manè ablues totam
faciem cum infra scripta aqua: R. nucleorum persi-
corum torrefactorum & subtiliter puluerizatorum
 \mathfrak{z} j. succi plantag. semperuivæ ana \mathfrak{z} β cerusæ ablu-
tæ \mathfrak{z} j. β . cum cera q. s. fiat vng. molle. Vel R. succi
citri \mathfrak{z} ij. cerusæ \mathfrak{z} β . sarcocollæ \mathfrak{z} ij. salis communis
 \mathfrak{z} j. olei ros. \mathfrak{z} β . litharg. arg. \mathfrak{z} vi. omnia simul in
mortario bene ducantur: demum superaddendo
modicum aquæ rosatæ, pone in pomo citri: bul-
liant duabus ebullitionibus, continuè cum baculo
bene ducendo. manè, vt dictum est, ablue hac
aqua: R. aq. ros. lib β . aq. distillationis lapathij acuti
lib. ij. corall. rub. margar. ana \mathfrak{z} ij. camphoræ \mathfrak{z} j. pul-
uerizentur puluerizanda, & omnia simul bulliant
vnicâ ebullitione: deinde colentur: & colatura vsui
reseruetur. Vel hac aqua experta vtere præceptoris
mei, descripta in tract. de affectionibus quæ cutim
afficiunt cap. 6. de coissis, ter vel quater in die ab-
luendo faciem: R. camphoræ \mathfrak{z} ij. cerusæ ablutæ \mathfrak{z} j.
cicerum rub. lib β . interiorum melonum lib. j. ouo-
rum hirundinum num. x. margaritarum \mathfrak{z} ij. sem.
bombacis \mathfrak{z} ij. salis cōmuns \mathfrak{z} ij. succi limonis \mathfrak{z} iij.
tartari vini albi \mathfrak{z} β . puluerizentur puluerizanda, &
contundantur contundenda, & infundantur omnia
simul in lib. x. aquæ distillationis lapathij acuti per
duos dies naturales. Demum omnia simul ponan-
tur in alembico, & distilletur aqua: qua si vtaris
modo dicto, procul dubio sanaberis ab huiusmodi
affectione, vt spero. Vel si tibi nimis molesta sit hæc
compositio, aliud vnguentum ad te mitto, quo
multi, qui per quinque & plures annos faciem pu-
stulosam habebant, nec vllis remediis curari pote-
rant,

tant, curati sunt: ℞. argenti vivi salina extincti, vel aceto vini fortissimi, ℥ij. vitrioli albi ℥ij. olei laurini ℥β. agitentur diu simul, vt in vnguētum coeant. Vesp̄ri inungito, manē aquā furfuris abluito. Hoc vnguento nuper nobilem mulierem curauī, quæ per duos annos faciem pustulosam habebat, quæ nullis aliis remediis quàm hoc curari potuit. His frui, vir doctissime; & Vale.

SCHOLIA.

VALESCVS, varos, ionthos, seu coffos videtur ponere tract̄ suo chirurgia sub cap 16. de saphati, id est, de pustulis rubeis & luidis vel albis circa nasum, cum rubore totius faciei. Fernelius ad pustulas faciales etiam varos annumerat. Causæ materiales sunt (eodem Valesco autore) phlegma salsum, aut humores adusti, vt cholera adusta, aut melancholia adusta, quibus sanguis commiscetur. idē & in declaratione de pustulis & rubedine extranea faciei sciendum est primò quòd hæc agriūdo sit ex sanguine crasso, cui admiscetur aliquando phlegma salsum, aliquando cholera adusta: quoniam isti humores mixti nutritioni mittuntur ad cutem, & corrumpunt ipsam, & in eam inducunt malam intemperiem; quia isti humores ratione adustionis igniunt (sic enim loquuntur) & idē causant ardorem & prurium, & apparent in hieme, propter mortificationem caloris, & spirituum, & propter coarctationem factam à frigore. Apud quosdam & hæc agriūdo (eodem Valesco teste) vocatur gutta rosacea, aliis verò dicitur morphea rubra. Ceterum signa huius affectionis sunt manifesta. At signa causarum, si sit à phlegmate salso, hæc sunt: adest latitudo pustularum, & sentitur pruritus in facie & circa eas, & pustulae sunt humida, & aliquando ab eis exiit humiditas, quæ modò est alba modò cineritia. Si est à cholera, pustulae sunt acutæ, tendentes in alium; & non adest humiditas cuius ratio sit habenda; & adest citrinitas coloris in loco, & sentitur ardor & acuitas, & calor, maxime quando sumit species, vel res calidas, vel acutas, vel vinum forte sine aqua. Si fiat à melancholia adusta, adest luiditas, vel infuscedo coloris, terrestris, & parvus pruritus & delitium: & si

Causæ varī seu pustularum faciei acutæ.

Gutta rosacea.
Morphea rubra.

aliqua

Prognostica.

aliqua pustularum rumpatur, & violenter comprimatur, virulentia quæ exit est spissa, & coloris cere. Si est à sanguine, adest rubedo cum fuscitudine circa pustulas & circa totam faciem: & id quod exit à pustulis, est sanguinei coloris. Hæc ægritudo est de signis præcedentibus lepram; & ipsam significantibus; maxime quando venit cum inflatione faciei & rauedine vocis: nam & rubor iste intensus in facie, cum pustulis, est quoque valde curatu difficilis, & fortè impossibilis, eò quòd facies reuertatur ad calorem pristinum, & pusio quòd illa pustula violenter cum medicinis remoneatur, tunc rubedo magis intenditur, quia cutis eiusmodi medicamentis subtiliatur; & sic magis apparet sanguis sub cute subtiliatus. Verùm quòd ad curationem attinet tuberositatum & rubedinis faciei & pustularum circa nasum existentium, in primis secundum Anic. oportet dimittere omne quod dulcedinem, salcedinem, & acuitatem habeat. Sed contentus sit insipido generante humorem sanum, in quo non est mordicatio: sed humectetur corpus humectatione æquali cum balneo frequenti: non tamen in eo diu moretur: & fiat euaporatio super vaporem aquæ calidæ: sæpe & olea & adipēs adhibeantur, cum regimine humectante, & unguimento humido. Si ergo fiat à sanguine, primò phlebotometur cephalica, deinde vena frontis, & quæ est post aures, vel quæ sunt sub mento: & ponantur ventose inter spatulas, cum scarificatione. Caveat penitus à capis, allis, sinapi, eruca, nasturtio, vino, nisi sit acerbum, cum multa aqua. Capiat lactucæ, portulacæ cum aceto, & comedat cucurbit. & in decoct. istorum ponatur acetum, & agrestia absq; aromate, præter cuminum & crocum. Viatur hordeato, auenato: vescatur & carnibus veruecum, & comedat pullos gallinarum, anes campestres, & similia. Gubernentur (inquit Valescens) ac si haberent ophthalmiam ex causa calida. Posita, ex mente Anic. euacuetur humor biliosus melancholicus, & phlegma salsum cum myrobal. epithymo, aloë, & scammonia. deinde offerantur quæ mundifices residuum materiæ cum humectatione, ut est aqua cæci & sumiterra. Valei enim sumus terra nō solum in syrupis & decoctis, sed & in balneis & suffumigationibus; omnem scabiem, pustulas, & pruriginem curat, & mutat humores superfluos intercurrentes; & ad lepram dispositos sæpe innat. Et dicit Anicenna, quòd

Vide Anicennam 7. fen. 4. tract. 3.

cura & regimen istius est similis cura impetiginis: hinc & quidam, ut Guilielmus, sub uno capite de duobus his affectibus egerunt. Digeratur autem materia cum syr. de sumoterra: vel secundum Guilhel. de Saliceto sic purgetur: R. polypod. scolopend. sumiterra, epib. prunor. an. ℥ ij. fiat decoct. in qua dissolue ℥ j. māna granata, vel cassia. Vel R. epithymi ℥ ij. sena, sumiterra, scammonia ana ℥ j. rhab., maſlicia ana ℥ j. fiant pilula cum succo polypodij. dosis ℥ j. ego tamen minnerem dosin scammonia. Sed entius dabitur epithymi pul. ad ℥ ij. cum sero lactis. Deinde hoc utere ung. R. argenti vini, extincti cum salina hominis ieiuni inuenis ℥ j. olei ros. ℥ iij. cerusa ℥ ss cere noua ℥ ij. album. oni vnius, li barg. optimè puluerizati ℥ ss. omnibus incorporatis fiat ung. Facies prius inuncta sapone saracenico, vel in defectu eius cum axungia gallina, & modico melle, ungatur dicto unguento, & teneatur per vnam horam: deinde laetetur cum aqua decoct. absinthij, & sumiterra, & polypod. deinde reponatur dictum ung. continuetur. Vel fiat tale, alterans & albiſicans, secundum Guilielmum: R. acetosiratis citri vel limonis, vel citranguli ℥ iij. cerusa puluer. q. s. ad inspissandum, argenti vini extincti ℥ ss. incorporètur omnia simul. abſtergit pustulas, & consolidat, dummodo prius fuerint liuitæ cum sapone, ut dictum est. Si autem fuerint à cholera adusta, non indigent phlebotomia, sed mundificetur sanguis cum epib. & sero caprino & polypodio, & fiat ventosatio inter spatulas, & sub mento. Post vniuersalia, quemadmodum & in aliis omnibus infectionibus cutis, ut est morphea, lepra, serpigo, scabies antiqua, saphati, albaras, malum mortuum, & in vlceribus ex humoribus malis acutis, valent hæc naturalia seu mineralia, & fuligines coru, ut cadmia argenti, auri, zntia, auripigmentu, sulphur viuum & citrinum, cerusa, plumbu vstum, antimoniū, vitriolu, baurach, fuligo camini & oris furni. Ad eadem confert etiam acetum, succus limonum, arancioru, citri, oleum ros. amygd. nucum; storax liquida, oleum de tartaro, lac virginale, oleum vitellinum, succus asphodelorum & sumiterra. Ex his vel aliquibus eorum, potest fieri unguentum, epibema, aliquando cū sapone, aliquando sine eo. Herba cū quibus fiunt lotiones. sunt balsamita, rad. innula, ireos, lapathium acinum cum roio, borago, fumus terra, absinth. scabiosa, polypod. Ad cōponenda

Si fuerint
à cholera
adusta.

unguen-

unguenta deseruiunt oleum de serpentibus, iunipero, de tartaro, succum chelidonie, sicla: & si cum istis commisceatur vng. album camphorae, vel de litharg. nutrito, erit melius, & minus foetibit; ut si in qua constant ex sulphure & antipigmento. Valer & lac virginale, succus sicla cum melle, & tragacanth. etiam illud Anicenna, quod habet litharg. scoriae argenti an. \mathfrak{z} j. amygd. amar. adustiarum, rubea tinctorum ana \mathfrak{z} iij. incorpora cum aceto & oleo ros. Sed & castus recens infusus in aceto per noctem, ex eo factu episthemate, confert; & arg. vinum extinctum & incorporatum cum oleo amygd dul & amarat. & cera. Vide Nic. 7. 4. & Haly par. 2. lib. 4. cap. 3. emollit autem primo cum cera, oleo sem. lini & mucilag. deinde distemperat croci, niri, sulphur. condisti ana p. a. cum aceto, & oblini faciem. A melancholia adusta purgetur cum episthymo, senâ, myrobal. inde, popyod. querc. cum aqua casei. Purgato corpore, appone sanguisugis locis affectis, & exagent sanguinem melancholicum: aperiantur haemorrhoides; & fiat ut dictum est observatione precedente. Insequendo autem vestigia aliorum, qui Graecorum & Latinorum dogmata tenent, vari commodissime tolluntur imposita resina & alumine scissili pari pondere, cum modico melle. Facit & ad varos acerrimum acerrimum, cum melle pari mensura mistum, digitoque infricatum. Vel ex amygdalis amar. aceto dissolutis, ac curiosis irritu, pastillos formato, atque in umbra desiccato: ubi autem usus postulabit, dilutum ex his aliquem aceto varis inducito; & simul atque aruerit, sapone abstergeito: Vel R. pomata \mathfrak{z} ij. sulphuris vini \mathfrak{z} j lithargyrj, cerusa ana \mathfrak{z} ss. camphora \mathfrak{z} ss. succi limonum \mathfrak{z} j. ss. misce, & fiat vng. quo locum varis obsessum illinire poteris. Aliud, ex Paulo, quod ad Varos, pilos & aspredinem faciei confert: R. cera \mathfrak{z} v. terebinth. \mathfrak{z} ss. visci \mathfrak{z} j. liquato una oleum superinfunde: atque hoc medicamento faciem abstergeito. Hisce adice ea quae ad gustum roseam, ruborem faciei, & nasi valere scripsimus lib. 2. Obs. Chirurg. obs. 4. de noli me tangere, Scholio eiusdem. Quidam laborans Roma rubedine faciei, adeo ut pro leproso haberetur, hoc sequenti vng. curatus est: R. sulphuris vini \mathfrak{z} iij zinz. \mathfrak{z} ij. fiat decoctio cum vino albo ad spissitudinem; & cum axungia recenti fiat vng. aliquando addebat \mathfrak{z} j. piperis, & hora se-

TOSINA

A melancholia adusta.

Ad Varos, ex Celso.

Paulus lib. 3. cap. 25.

Fortina inungebat faciem : mane abluibat aqua calida, ant colatura surfurum tepida. Hac quoque aqua experta est : R. aluminis ꝑvi. succi plantag. brunelle, acetosa ana ꝑxi. alba onor. num. x. omnia probe concutiantur, ac in alembico destillentur : lauetur facies aqua ista, & pannis lineis intingatur. Nunc ad alias pustulas procedamus.

OBSERVATIO VIII.

*De pustula quadam elata ad magnitudinem fabæ
Egyptiacæ in genâ sub oculo.*

AVGUSTINVS Teylingius, filius Iob de Teylingent Dordraceni, sororij mei, adolescens septemdecim annorum, cum pustulam quandam haberet in gena sub oculo elatam, rubicundam, ad fabæ magnitudinem, satis rotundam, à quâ curari Dordraci non poterat, tandem à patre ad me transmissus est. Erat autem purpurei coloris ea pustula, & subdurius, instar furunculi. Optimè comedebat, nulla febre afficiebatur. Venerat autem ad me tertio die Octobris, anno 1558, & cum pustula sub oculo esset, metuebamur, si ad maturationem veniret, ne in fistulam abiret, ac visui obesset. idè & Iohannem chirurgum seniore apud templum Diui Hippolyti habitantem ad consilium & curam adhibuimus. Conclufimus itaque ac statuimus vt corpus primò vniuersaliter ab omnibus humoribus superfluis expurgaretur: nam interdum resoluēbatur illa pustula, ac aliquantisper disparebat, sed denuò sæpe redibat, cum adhuc Dordraci esset hic adolescens. Quare pro præparatorio medicamento, sequente potione utebatur: R. betonicæ, tumiterræ, scabiosæ, centaurij minoris, viol. borag. cicoræ ana m. j. sem. anisi ꝑj. sem. coriand. præparati, sem. end. sem. 4. frig. maior. ana ꝑß. prunor. damasc. num. xii. hordei mundati ꝑj.ß. vuar. pass. ab arill. mūd. ꝑj. coquantur in sero lactis, pro lib. j. addendo syr.

450 OBSERVAT. CHIRVRGICARVM
 de fumoterræ ʒj β. syr. viol. è stœchade, de cichor.
 nicoli, cum rhab. ana ʒ β. misce pro apozemate. De-
 inde ʒ. fumiterræ m. ij. betonica, centaurij minoris,
 scabios. viol. borag. ana m. j. sem. anisi ʒ ij. β. prun.
 damasc. num. ix. vuar. pass. ab arill. mund. ʒ j. hor-
 dei mund. ʒ j. β. folior. senæ alex. ʒ v ij. epithymi
 ʒ ij. polypod. querc. ʒ β myrobal. indorum, citrino-
 rum ana ʒ j. β. fiat decoctio in sero lactis, pro ʒ ix.
 vel x ij. manibus postquam repuerit fricetur deco-
 ctum: & fiat colatura, cui adde syr. de fumoterræ
 ʒ j. β. syr. de cichor. nicoli, de epithymo ana ʒ β. mi-
 sce pro apozemate, & sumebat omni manè cy-
 athum vnum; & quotidie quater vel quinquies
 aluum bene deponebat. Pustulæ applicuit chirur-
 gus diachylum cum gummis & mucilaginitibus: &
 cum videretur tendere ad molliriem & resolutio-
 nem, de tertio in tertium diem renouabatur. Qui-
 bus mediis pustula deinde omnino resoluta, nec
 ampliùs redeunte, breui iuuenem sanum ad patrem
 remisimus.

SCHOLIA.

Pustula seu
 In quæ
 quid.

CUTIS admodum frequens vitium est pustula, non so-
 lum in facie, sed maximè in aliis quoque corporis partibus,
 cuius appellatione comprehenditur, quicquid rotundo schemate
 leniter in cute extuberat. Eius duo genera sunt apud Fernelium:
 una est humida, è qua rupta vel humor vel sanies vel pus ema-
 nat; altera sicca, humoris nihil profundens. Humidis continen-
 tur, hydroa, ephelides, phlyctæna, seu phlyctides, & epinyctides:
 de quibus egimus lib. 2. Curationum Chirurgicarum, de hydrois
 & ephelide scholio obs. 15. & de phlyctænis obs. 8. & scho-
 lio eiusdem obs. de epinyctide lib. 1. Obser. & Cutat. chirur. obs.
 16. Ad pustulas humidas pertinent & quæ ex his ruptis sunt
 scabiei genera. In siccis numerantur exanthemata quadam,
 pruritus, deinde & vari, & verrucarum genera. Exanthemata
 explicauimus in libro nostro de febris. De verrucis verò lib.
 precedente egimus: at de Variis obser. precedente. Restat igitur
 ut nunc de pruritu & scabie agamus. Sed antequam ad pruri-

zum accedamus, addam hic experimentum experimus, quò aliquando ad pustulas latas & eminentes rubras in Margareta monacha Clarissima usus sum, quas habebat circa pedes, crura, brachia & totum corpus, cum pruritu intensissimo, ita ut eandem dixisses elephantiasi aut lepra affectam esse: quæ ipsa, cum bene per medicamenta apta purgata foret, & cucurbitulis in nartibus & scapulis usa esset, unguentum parauimus ex puluere radices enule campanæ in maxima dosi, & ex puluere virtioli, pulueribus prius per cribrum exceptis, assundendo acetum vini donec in unguentum seu linimentum coiret. quod egregie omnes pustulas siccando persanauit. Gordonius particulatim part. 1. cap. 15. caput de pustulis fecit; inquit, Pustula sunt quedam vesiculæ parue ad modum granorum sicuum, sicut sordities sudoris, & solent vocari vulgari idiomate apud Provinciales Brothia dura. sunt tamen aliquando maiores & eminentiores, ut de istis rubris pustulis diximus. Habent autem causam externam à castu, percussione, labore, exercitio, vel ob negligentiam abluendi corporis & vestes, propter unguenta & alia vehementiora, quæ corpori applicantur, ut est iapsia, res viride, & multa alia similia. Vel internam, ob humorum abundantiam, & malam qualitatem eorum: quare veniunt frequenter post somnum & sudorem cum pruritu, ut modò sint à sanguine, bile, phlegmate salso aut melancholia. Causa externa ab agris dignoscuntur: interna, si à sanguine sint, color erit rubens cum pruritu, calore & dolore. à bile sunt citrina; adest punctura & acuitas. à phlegmate, adfuit albedo, squama & pruritus. à melancholia, nigredo, linea, & modica punctura. Omnes ista pustula, si negligantur, & non mundificentur, in scabiem conuertuntur: & si ex causa calida, ulterius transiunt in imperiginem, serpiginem & peiora accidentia: ex phlegmate si fiant, degenerant post scabiem in fistulam. Si ex melancholia, sunt duriores, & difficilius curantur, & possunt transire in malum morbum. Si fuerint ex sanguine, fiat phlebotomia, & mundificetur corpus cum casta fistula, iohanninidis, & similibus. Si ex cholera, & corpus sit plethoricum, etiam fiat phlebotomia, sed parcior: digeratur materia cum oxyzacch. syr. viol. purgetur cum elect. de succo ros. Virgæ confert balneum, & isdem valde conducit inunctio cum popul. ung. citrino,

Vng. ad pustulas latas, rubras, eminentes in crure & brachio.

Causæ pustularum.

Signa.

Prognostica.

Curatio.

acnato (ut loquuntur) cum litharg. Si fuerit à pblegmate, digeratur cum oxymel. diuretico, syr. de fumo terra, oxyszacih. compos. purgetur cum hiera picra, Ruffi. Si autem à melancholia ortum habeat malum, digeratur cum oxymell. squillitico, syr. de epith. pomis, borag., fumo terr. & purgetur cum diasene, diabolorag. & hiera Ruffi. & istis ambabus competunt stupha & ung. ad scabiem; vel hoc: R. Ung. fusci, ung. ad scabiem ana lib. ß. litharg. ʒ iij. tartari ʒ ij. elæbori virinisque ana ʒ ij. argenti vini extincti ana ʒ j. misceantur cum aceto & sece olei; vel cum isto: R. succi chelidonia, fumo terra, boraginis, scabiosa, lapathy acuti ana ʒr. ij. litharg. cernisa lora, eris vlti ana ʒ ß. misceantur cum sece aceti, & axungia antiqua; & fiat quasi unguentum: & istud non valet tantum in pustulis, sed in omni scabie, & in omni genere infectionis & ideo cum aliquis ignorat quid particulariter sit agendum, utatur isto ung. & non decipietur: & appellatur Vade mecum. Sed hic animadvertendum, si ista pustule veniant à causis externis, ut plurimum corpus tunc non est plethoricum; & tunc competit aqua frigida de super aspersa, vel balneum aquæ frigide; in qua natare potest: & deinde aspergatur farina fabarum, lentium, hordei; vel innungatur cum litharg. & aceto & santal. & ros. & oleo ros. Si materia abundet, prius mundificetur corpus. Si autem causa sit frigida, balneetur in aqua dulci, & postea aspergatur pulvis orobi, oryza, hordei & lentium, & lupinorum. In omni igitur causa valet balneum aquæ dulcis, corpore mundificato, si indignerit: & tunc nihil trahit; & ita nocuum inducere non poterit; & tunc enaporabit, & resoluet, & innamentum inducet. Præterea notandum; Si pustula venerint à causis internis, ut à viriute mundificatiua corporis, tunc magis veniunt in Vere, & non oportet impedire earum motum ad exteriora; & non sunt curanda nisi prius bene mundificato corpore. Si sint ex causis externis, ut ex labore, calore & similibus, tunc possimum in aestate apparent.

Vnguentum
efficax ad
scabiem &
pustulas, à
Gordonio
dictum Vade
mecum.

OBSERVATIO IX.

De pruritu totius corporis.

QVI pruritum totius corporis habebat, huic post repurgatum corpus ab humore falso & acri, ut hoc Vng. vteretur mandavi: & rad. lapathij acuti, enuiæ campanæ ana ʒj. decoquantur in aceto, & contusa per cribrum tenue transmutantur: quibus adde olæi irini ʒiiij. salis communis ʒj. myrrhæ ʒij litharg. ʒj. β. ceræ parum; fiat vng. Talia enim vnguenta ad pruritum parantur, quæ humorem falsum, vel serosum & acrem per insensilem euacuationem purgent, discutiant & detergant. Si iis non cedat pruritus, addatur parum argenti vivi, quod pruritum sedat, maximè qui à paruis pediculis (vulgo cirones vocatis) excitatur. De quibus quoque curandis non nihil diximus lib. 2. Observat. & Curationum chirurg. scholio obs. 15. Vel addatur sublimati parum. Post exiccationem & discissionem materiæ, remanet sensus ille pruritus, quem auferre oportet ipsi vnguento oleum hyoscyami immiscendo, quod refrigerando pruritum aufert mirum in modum: vel fiat sic: & vng. pompholyg. ʒij. olei hyoscyami ʒj. β. fiat vng. vngatur locus pruriens. Post horum vsum utile est corpus balneo vel lauacro detergente frequenter abluere: quia quæ in cute remanent pruritum excitant. Prima lotio sit lixiuio, altera ex decocto fabarum, rosarum & hørdei tantum: & hæc ab ipso Rondenelio non puduit nos mutuasce.

SCHOLIA.

PRURITVS (inquit Valescius tract. suo chirurgiæ cap. pro- Pruritus
prio) est desiderium scalpendi & fricandi corpus, vel ali- quid.
quam eius partem, propter mordicationem quam inducit super-
fluitas vel humor ad partes cutis & subcutaneas. Tres sunt
f 3 causa

Causæ pri-
mitivæ.

causæ pruritui primitiue, ut calor exterior, faciens dissolutionem illorum humorum acutorum & salforum : & ad istum sudorem sequitur pruritus, ob causam dictam : & quia humores grossi dissoluti per calorem quem inducit labor, non possunt exterius exire, imò intus remanentes pruritum efficiunt. Vel externa causa esse potest pediculus, pulex, lendes, vel forficula, vel cimices, vel tarda vestium mutatio. Antecedentes sunt nimia caliditas hepatis,

Antece-
dentes.

quæ generat humores acutos, salfos, adustos : vel debilitas virtutis expulsiuæ, non potens ipsos sensibilibus vel insensibiliter exieritis propellere, quemadmodum accidit decrepitis prurientibus: Coniunctæ verò causæ sunt, qualitas mala mordicatione acuta, vel falsa, vel viscosa. Grossi humores dum sunt in venis, dicuntur causæ antecedentes : at quando iam sunt sub cute reuerti, dicuntur coniunctæ. Signa satis sunt manifesta: quia non permittunt hominem dormire, nec studere, nec alia speculari. Quicunque

Coniunctæ.

Signa.

Prognostica.

diu habent pruritum, vix coarctant scabiei: quia pruritus prima causa ac primum signum est ad scabiem. Hinc Gordonius part. 1. de affectionibus cutis, rubrica 2. unum caput fecit de scabie ulcerosa, sicca, cum squamis, ita ut videatur membrum contrahi, & de pruritu. & ista (inquit) frequenter veniunt in manibus: & hac scabiei species (ut ibidem habetur in margine) senibus admodum familiaris est: & illud dicebas Valesium cap. proprio de pruritu, indicatur quidam pruritus curatio, quæ accidit senibus decrepitis, propter granditatem ætatis, reuera est desperata, tamquam impossibilis, quoniam non possumus eos permutare ad aliam complexionem nec ætatem: (quod & confirmat Serapio lib. 5. sui Breniarij) sed bene pro tempore cum regimine potest mitigari & minorari. Hæc videntur desumpta ex Paulo, cum

Lib. 4. cap. 4.
de pruritu.

sic scribat: Pruritus qui senibus accidit, ex toto nunquam conualescit; verum leniunt infra positum. eadem. in reliquis ætatibus, si ex prauo humore contrahitur, qui nimirum biliosus aut pituitosus, putris salsusve est, per ipsam vacationem tollitur. Porro agnoscitur ab ætate, temperamento, victus ratione, anni tempore, regione, & reliquis his similibus. Si igitur in venis simul cum sanguine redundare videatur, à sanguinis dimissione auspicandum est. Sin autem qualitate magis vitiosus extiterit, similibus eo medicamentis vacuato, ad externam curationem ducit-

Curatio.

duci-

dineriemur. Sic etiam neoterici (ut Valeſius cap. proprio) in- Valeſius.
 quunt: Si cauſa eſt magna, & humores ſunt multi, primò fiat
 phlebotomia, deinde purgetur humor ſaliſus acutus, vel aduſtus,
 vel nitroſus, ut dicunt cap. ſequenti de ſcabiè. & inter reli-
 qua Serapio landanit myrobal. ſumumeterra, epiſthymum, elic- Serapio.
 borum nigrum, colocynthidem. ſed vltimis cum cautione veni-
 dum. Si verò cauſa ſit parua, vel humores iam fuerint purgati,
 ponatur ager in balneo aquæ dulcis, & poſt balneum ſudet;
 curabitur hoc modo, Domino concedente, optima adhibita diata.
 quòd ſi non curetur, ſignum eſt multitudinis humorum &
 craſſitiei; & ideo materia digeratur & purgetur, & deinde
 ducatur ad balneum vel ſtuſam, & liniatur cum linimento ſe-
 dante pruritus, ex medicinis expertis & approbatis, ſicut eſt (ſe-
 ſte Serapione lib. 5. breuiar. cap. proprio) aqua ſicla, malnarum
 campeſtrium, & domeſticarum; ſuccum acetoſæ, ſurſut & amy-
 lum, cum aceto. & ex medicamentis facientibus ceſſare pruritus
 eſt papauer cum aceto: addit & cerotum in quo ponitur apium.
 cum hiſ debet fricari corpus. adici poteſt farina fabarum, vel in-
 teriora melonum. Si prolongatur agendum, fricetur corpus cum
 aqua apij, & aceto, oleo roſ. aqua decoct. colocynthidos & roſ.
 albarum. Vel rz. roſ. alb. ʒ ij. piſtentur fortiter cum aceto, &
 addatur ſurſut ʒ j. fricetur corpus, & ponatur in balneo, fri-
 cando cum apio vno, vel cum nucibus iritis, vel corricibus nu-
 cum recentibus: ſed & farina ſæuigraci, ſuccum cucum. aſini.
 valent in pruritu. Omnes pruriginofi debent abſtinere à rebus
 ſaliſis, acutis, calidis, & ſanguinem adurentibus. Qui enim con-
 ſueverunt viſu cibariis malos humores generantibus, incidunt in
 pruritus, ſ. de morbo cap. 10. malitia pruritus ſine ſcabiè ſubilis
 eſt & ſaſa. Gordonius in ſcabiè ulcerosa ſicca, cum ſquamis & Gordonius.
 pruritu, quæ frequenter contingunt in manibus, corpore bene ex-
 purgato & mundificato, optima præſuppoſita diata, iubet mæde-
 fieri manus quotidie in aqua decoct. malua biſmalua, palea hor-
 dei & auena: deinde inungit cum axungia recenti porcina vel
 gallinacea; vel hoc vnguentum adhibet: Rz. ſucci apij, folior.
 lilij, ſucci pap. albi, aqua roſ. ana ʒ j. aloës ʒ iij. olei ſiſamini
 & cera q. ſ. fiat vng. & inungatur locus pruriginosus. Vel hoc
 vng. (plurimè enim valet ad ſcabiem ſiccam:) Rz. diatrag gūmi
 arab.

Ad ſcabiem
 ſiccam, &
 pruritus.

arab. infus. in aqua ros. sem. malva, bismalva ana $\mathfrak{z}\beta$ aloës, sarcocolla ana $\mathfrak{z}\text{ j}$. conficiantur cum axungia porcina recenti, vel gallinacea, vel oleo sesamino, vel amygd. dulc. & cera q. s. & fiat ung. Valefcus ex mente Serap. hoc linimento vititur ad prurium membri virilis: R. cerusa de plumbo $\mathfrak{z}\text{ vi}$. sulph. albi $\mathfrak{z}\text{ j}$. opij $\mathfrak{z}\beta$. misceantur cum aceto, & liniatur membrum. aliud ad impetiginem, & prurium in testiculis, & in virga: R. cerusa de plumbo $\mathfrak{z}\text{ vi}$ i i. sulph. vini $\mathfrak{z}\text{ ij}$. staphisagria $\mathfrak{z}\text{ j}$. terantur, & conficiantur cum aceto, & vngantur in loco supradicto. Iohannes Rolandus, qui diuturnum testium prurium habuerat, neque curari poterat, post uniuersalia remedia adhibita anno 1581. mense Martio per me curatus fuit hoc sequenti unguento: R. ung. albi camphorati $\mathfrak{z}\text{ j}$. ung. diapompholygos $\mathfrak{z}\beta$. lithargyrj auri & argenti ana $\mathfrak{z}\beta$. terra sigillata $\mathfrak{z}\beta$. creta alba $\mathfrak{z}\text{ ij}\beta$. sublimati $\mathfrak{z}\beta$. ducantur simul in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo, admodum diu incorporando. Aliàs aliquando, ut magis exsiccaret, quum vnà cum pruritu madorem effunderent, addebam aliquid è fuligine sumarij, vel illà qua cacabùs adherere solet. Si autem pruritus fuerit in ano aut matrice, R. aluminis iameni, id est. alum. de rocha, assi $\mathfrak{z}\text{ ij}$. tartari $\mathfrak{z}\text{ j}$. conficiatur cum aceto: pannis appositis loco apponantur. Aliud, ad pruritus testiculorum: R. acatie, mentha ana $\mathfrak{z}\text{ ij}$. aloës Soccorina, sumach, silis ammoniaci ana $\mathfrak{z}\text{ ij}$. fiat pulvis: & misceatur cum oleo sambucino, & fiat linimentum. Eadem scribuntur à Serapione, capite de pruritu. Ad pruritus totius corporis, ex

Ad pruritus
mèmbri virilis.

Ad impetigi-
nem, pruri-
tum testicu-
lorum &
virgæ.

Ad pruritus
ani aut ma-
tritis.

Curatio pru-
ritus ex Pau-
lo.

Paulo Vachaso corpore, lauandum prorsus ieiuno est, nonnumquam & modico cibo sumpto, iterum lauandum: quippe vitium vix inhumescit: detergitur autem sæuigrati decocto, aut betarum, aut fursurum, aut malua agrellis & satiuæ, aut piisana. Præter hæc farina etiam fabacea, vel lupini, vel glandis unguentaria, vel smegmatis ex pepone præparati, quod prætor appellat, si inueneris, lanatio similiter quidem conuenit: fortius autem ex saluia decocto, myrica herba, mercurialis, origani, pulegij, baccarum lauri, cucumis syluestris, rad. capparis, cineris lixiij stiliaticij, murie, aceto. Deinde respergantur arido nitro, vel cum fecula, aceto; vel quod recipit niri spuma sexta-rium, thuris lachryma, sulphuris vini, singulorum libram, cimo-

hæ libræ semissem. Vel hoc: Aphronitri, sulphuris vini, alcyonij combusti, pari modo: siccis vitæ, vel cuius quodam ex supradictis decocto. Si autem placet, etiam veratrum siccum inspergito, sine pingui addito. Illinitur autem cum oxelæo herba pedicularia contrita, vel sulphur, vel sandaracha, vel omnia; vel sinapi cum myrobalani expresso, & oxelæo, vel vitæ cochleis combustis lenigatisq; melle, vel lapathi radialis, vel smegmaris inde confectis, ut in cap. de elephantia, aut quibusdam ad scabiem efficacibus. Si autem exulceratio partes exercuerit, diapompholy. utere. Ad prurium hoc commendatur: Nucum magnarum cuius ꝑ j. sulphuris tantundem, apij succo lenigatis vitæ in balneo, membra assatim defricans. hoc solum multis cum scabiosis, cum alio pruritu detentis, abunde sufficit. Quidam cum pruritus pustulosum haberet, & scabiem, cum hoc balneo uteretur, egregie profuit: R. sumiterra. florum chamomill. malvæ, althææ cum toto, scabiosa, betæ, viol. præsii ana m. j. hyoscyami albi m. ꝑ. rad. chelid. lapathi acuti, emulæ campanæ, cucumer. asini ana p. j. ras. gnaia quart. j. bulliant in aqua maris, pro balneo: R. ung. viridis, & adde succum ebani. Sed aliter cui in manibus & pedibus pruritus erat, cum corrosione, cernissa cum albumine oui cocta per modum lotionis adhibita profuit, & lixiuum vitis, & arboris alni, Elseti vulgo dictæ. Ad prurium sicum valet succus apij, sal item ammoniacum, cum oleo nymphææ, vel pap. fortem prurium sedat etiam genitalium. Domini Iohannes Harperius cum habere scabiem in tibiis, cum aliquali calore, & pustulis rubens, cum etiam anus squamâ & crustâ cum pruritu afficeretur, hoc inunctum ung. bene habuit, & dormire potuit: R. litharg. arg. vini extincti cum salina ana ꝑ j. vitelli oui ꝑ ij exangie porcine q. s. fiat ung. Facta quoque est phlebotomia in viroque pede intra digitum minimum & medicum, & cessavit calor tibiæ; pustula tamen pruriginosa remanserunt; sed succo cardui benedicti cum albumine bullito cum lauantur, sanata sunt, potest addi aloë hepatica; & erit melius. Hisce adiunge quæ antea de cironibus & pruritu scriptimus Scholio Obs. 1 ꝑ. lib. 2. Curat. Chirurg. Nunc ad scabiem accedamus.

OBSERVATIO X.

*De scabie: in qua ponuntur multa exempla
scabiei curata.*

MARGARETA Teylingia, vxoris meæ amita, admodum vetula, annorum sexaginta sex, cum ex Kenoy Alcmariam venisset, quam in ædibus suis Theodorus Teylingius sororius meus exceperat, vt secum habitaret Alcmariæ, ex aëris tum cibi potusque mutatione scabie infecta est, ac deinde contagione totam infecit familiam, ipsum quoque, tum eius vxorem ac proles. Hanc autem ita curauimus: Post bou lenitium cassiæ, exhibuimus bis in die cyathum vnum decoctionis infra scriptæ: R. fumiterræ viridis m. ij. summitatum lupul., buglossæ, borag. absinthij, scabiosæ, acetosæ, viol. cichor. dentis leonis, agrimoniz an. m. j. sem. 4. frig. maior. ana ʒ β. sc. anisi ʒ j. prunor. damasc. quart. j. follicul. senæ ʒ j. β. polypod. querc. epithymi ana ʒ j. fiat omnium decoct. in lib. iij. feri lactis ad dimidium. Post infusionem per noctem, facta colatura zach. dulcoretur, & ea utebatur. erat autem hæc scabies valdè sicca, diuturna, cum pruritu. sed sequenti vnguento cum membra scabiosa inungerentur, ipsa breuiconualuit: R. succi fumiterræ, acetosæ, plantaginis an. ʒ j. succi comarum absinthij ʒ β. terebinthinæ lotæ in aqua ros. ʒ j. rad. lapathij acuti ʒ β. butyri recentis ʒ j. cerusæ, litharg. argenti an. ʒ j. coquantur (radicibus lapathij bene contusis) ad consumptionem medietatis succorum, addendo olei ros. & ceræ q. s. bene incorporando fiat vng. molle. Pro puerulis verò & natu minimis in iisdem ædibus, qui erant sex aut septem annorum, prius minoratium ex cassia vnicuique dedi, secundum vniuscuiusque virtutem. Deinde acceperunt bis aut semel

mel in die cyathum vnum ex decocto sequenti,
 prout alius solueretur : R. fumiterræ, scabiosæ ana
 m. ij. acetosæ, dentis leonis, borag. buglossæ, summi-
 ratum lupulorum, absinthii, agrimonix, end. cichor.
 scolopend. ana m. j. ß. capill. Ven. m. ß. flor. cord. p. j.
 sem. .4. frig. maior. & minor. ana 3 ß. sem. anisi, carui,
 fœnic. acetosæ, berberis ana 3 j. follicul. senæ 3 i.
 hordei mund. m. i. prun. damasc. quart. i. polypodii
 querc. 3 ii. epithymi 3 i. coquantur in aqua commu-
 ni aut sero lactis pro lib. ii. colaturæ adde syr. de fu-
 miterræ 3 iiii. syr. acetos. simplicis, syr. ex infus. ros.
 ana 3 ß. & adde parum sacch. Vnguentum tale
 erat: R. terebinth. lotæ in aqua ros. 3 i. butyri recen-
 tis 3 vi. succi acetosæ 3 ß. salis communis modicum,
 olei ros. q. s. fiat linimentum. Pro eius filia paulo se-
 niore, R. terebinthinæ lotæ in aqua ros. 3 ii. ß. butyri
 recentis 3 i. ß. succi acetosæ, fumiterræ ana 3 ß. salis
 communis 3 i. olei ros. q. s. fiat vng. seu linimentum
 molle. Pro filio eiusdem Augustino Teylingio, R.
 succi fumiterræ, acetosæ, plantaginis, absinthii ana
 3 i. ß. terebinthinæ lotæ in aqua plantag. 3 i. litharg.
 argenti, cerusæ ana 3 i. olei ros. q. s. ceræ modicum;
 fiat vng. molle, secundum artem. At Theodorum
 Teylingium patrem eorum, qui valde etiam infe-
 ctus erat eadem scabie, hoc modo curavi. Post leni-
 tionem ex cassia, altero die sanguinem extrahere
 feci ex vena communi brachii dextri ad 3 vii.
 Deinde die subsequenti & diebus subsequentibus
 ex hoc decocto modò semel modò bis sumebat
 haustum vnum, prout alium expurgaret : R. fumi-
 terræ viridis m. iiii. scabiosæ, viol. summitatum lu-
 pulorum, absinthii, end. cichoræ cum toto, borag.
 bugloss. acetosæ, lactucæ nouellæ, agrimonix, dentis
 leonis, scolopend. capill. Ven. ana m. i. bellidis m. ß.
 corticum rad. fœnic. apii, liquirit. ana 3 ß. sem. quar.
 frig. maior. & minor. ana 3 ß. sem. anisi 3 i. follicul.
 senæ 3 i. epithymi, polypod. querc. ana 3 iiii. ellebori
 nigri

nigri ʒ β. vuar. passul. ab arill. mundat. h. & dei mundati ana p. j. prunor. damasc. num. xv. cicer. rub. ʒ j. fiat omnium decoctio in sero lactis, pro lib. ij. colatura zaccharo dulcoretur sed & hæc puppa pende-
bat in decoctione, exprimenda dum potio sumere-
tur: R. rhab. elect. myrobal. omnium ana ʒ j. spica,
schoenanthi ana gr. v. fiat puppa. Membra sca-
biosa omnia linimento infrascripto inungebat: R.
succumumiterræ, lapathii acuti, succi plantag. aceto-
sæ ana ʒ β. terebinthinæ lotæ in aqua equiseti ʒ j. li-
tharg. argenti ʒ j. cerusæ ʒ j. β. pingued. porcina, bu-
tyri recentis ana ʒ β. olei ros. q. s. fiat linimentum se-
cundum artem. Deinde hoc quod sequitur: R. succi
fumiterræ, plantaginis, lapathii acuti, acetosæ ana ʒ
j. succi comarum absinthii ʒ β. terebinthinæ lotæ in
aqua plantag. solatri, scabiotæ ʒ j. litharg. argenti ʒ
j. cerusæ ʒ iiij. butyri recentis ʒ β. olei ros. q. s. fiat li-
nimentum ut suprâ. quibus & hic perfectè curatus
fuit. Interim tamen, ne recidiuam pateretur, probè
expurgatus fuit, ac denuò secundò phlebotomiam
fieri iussimus ex vena communi brachii sinistra.
Atque ita sanus ab illa contagione & fœda scabie
permanens. Cæterùm Machtilda Susia eius vxor,
cùm simul quoque eadem scabie inficeretur, cum
intolerabili pruritu, illam supradictis remediis
curare non poteramus, imò simul atque inungeretur
leuissimo quoque vnguento ex suprascriptis, statim
membra corripiebantur inflammatione, cum tanto
pruritu, ut integras noctes dormire non posset, ne-
que illa inflammatio & calor alio modo sedari po-
terant quàm peplis intinctis in lacte ebutyrato actu
frigido: nam cutis statim pustulis paruis seatebat,
epheleidis, ac epinyctidis vel serpiginis instar. &
quamquam calor ille tamquam in ambustis bullis,
lacte ebutyrato sedaretur, & dolor scabiei mitiga-
retur, pruritus tamen eo minimè cessabat. Cùm igitur
cutis pingua sufferre non posset, ideo ut sca-
biem

biem tolleremus, tentauimus id cum lotionibus aquarum destillatarum, vt acetosæ, solatri, scabiosæ, enuæ campanæ, vt & ita pruritus compesceremus, simul & decoctionibus rad. lapathii acuti, & aliarum herbarum conuenientium, post purgationem scilicet vniuersalem adhibitam. Sed nihil hæc iuuerunt. Postea etiam vi guento quopiam ad scabiem, ex consilio Magistri Iohannis Heyltginy di-
cti tonsoris, quod valde commendabatur, vsa est: sed post inunctionem illam adeo cutis bullis excitata ardere videbatur, vt illico me vocarit: sed adhibito lacte frigido eburtrato inflammationem compescere, & ardorem restinguere non potuimus, vt prius. Igitur lauimus brachia aqua hordei tepetacta; qua tamen pix nauas ex vnguento tonsoris cuti adhærens vix abstergi potuit. Deinde totum brachium ex vnguento inflammatum inuoluimus medulla panis contrita in lacte dulci pulvis instar: quæ calorem extraximus, & dolorem sedauimus: remanente tamen scabie pruriginosa, non tantum in brachio illo, sed toto corpore: & durauit vltra annum; nec vllis vnguentis, linimentis aut lotionibus curari potuit. M. Iohannes Gallus, medicus Harlemensis consuluerat vt tempore conuenienti balneum Aquense accederet: ego addidi sulphureum propriè. Vtebatur autem syr magistrali, quem confeceramus ex succis herbarum viridium, fumiterræ, scabiosæ, buglossæ, cum sacch. succis prius depuratis. Tandem pro consilio hoc vng. contra scabiem transmissum est per Franciscum de Croyx, mercatorem ditissimum, quo innumeri curati dicebantur: cuius hæc erat descriptio: R. rad. lapathii acuti in mortario pisti m. j pul zinzib. ʒ j. baccarum lauri, aristoloch rotundæ ana ʒ ss. cum pinta dimidia floris lactis seu cremæ coquantur per horam dimidiam in olla noua, & redigantur in vng. vesperti inungebat se apud ignem. prius tamen præcesserant &

& purgationes, & phlebotomiæ, & ventosæ cum scarificatione: & antequam inungeretur, etiam hunc bolum sumpserat: & cassiæ recenter ex cannis tractæ ʒ vi. diacathol. ʒ ij. pul. rhab. electi ʒ j. cum sacch. fiat bolus. quo quinquies aluunt deposuit. Quibus præmissis, cum isto vnguento omnia loca scabiosa inunxisset, integrè ab omni scabie liberata est, cum antea curari nullis vnguentis potuisset. & hoc solo vnguento sanata est. quo & infinitos alios subinde curavi. Quare & hoc ipsum inter arcana remedia mea posui.

SCHOLIA.

Simplic.

SCABIES asperdo cutis est, seu levis exulceratio prurienti, aut interdum rodens. Fit autem ex humidioris quamvis pustula, siue pallida siue liuida, siue nigra sit; quæ rupta vlcusculum in cute profert humidum, aut etiam interdum expurgata sanie aridum; idq; modò cum prurigine sola, modò cum leui rubore in ambitu, cumq; calore ac dolore. Ex resiccata sanie crustula obdurescit, quæ semel vlcusculum obducitur. Vt autem pustularum, ita & scabiei species multa, humorésque multi ac varij earum causa existunt, quos & dolor & color & manantis saniei species distinguit. Et toto quidem corpore scabies erumpere solent, sed ex capite pessima, quæ idcirco peculiari nomine sunt insignita. appellantur enim psyracia, fanus, & manantia capitis vlcera. Sed de iis, cum de capitis vitiis scriberemus, abundè diximus, nêpe lib. 8. Obser. nostrarum medicinal. obser. 26 de psyracis & pustulis rub. & obs. 27. & de sanis obs. 24. & 25. Nunc autem sermo noster duntaxat est de vulgari scabie, quæ in toto corpore erumpit. Scabiei itaque multa ac variantes sunt differentiæ, ut vulgus vocat. Est pruriginosa scabies, in qua pustula parvæ sunt, sed materia falsa & acris est. Alia est in qua pustula maiores & albæ, & ad suppurationem veniunt: sed illa fetida est, & punitosa, ob id minùs pruriunt. Est & alia differentia, quæ latic pustulas habet, & in circuitu rubescit, & sunt veluti parvæ inflammationes curicula, ad differentiam furunculorum, qui in carne fiunt, & ex sanguine crasso. Est quarta species, quæ malum mortuum dicitur. Est scabies à sanguine melancholico, à crusta multa quæ

Multæ species scabiei.

Multæ scabiei differentiæ.

quæ sit in tibiis; & difficilius curantur, aut curata recrudescit. Scabies itaque, ut Valescus tract. suo de chirurgia cap. 17. de scabie, inquit, est infectio cutis, cum squamis vel pustulis, cum pruritu, aliquando cum virulentia, & aliquando sine ea. ita & Gordonius de cutis infectionibus part. 1. cap. 24. de scabie non ulcerosa nec squamosa. Scabies est infectio cutis, aliquando squamosa, pruriginosa, aliquando sicca, aliquando humida, aliquando saniosa, ut plurimum in extremitatibus, aliquando magnam corporis partem occupans. Huius infectionis causa sunt humores corrupti, in hepate generati, qui conuersi in fumositatem & vaporem, in corporis superficiem expelluntur: unde si vapor fuerit nimis subtilis, enapora insensibiliter: si autem non fuerit in tanta subtilitate, & pori fuerint densi, conuertuntur in sudorem. Si fuerint grossi, generatur scabies; si fuerint mediocres, generatur pruritus secundum maiorem vel minorem corruptionem, aut generantur infectiones diuersæ. Sudor igitur gravis, gravisq; odoris antecedit; & si corruptio augmentetur, causatur pruritus; & si plus fortificetur, generatur scabies, & si magis, scabies sœda; & si adhuc magis, impetigo & serpigo; & ubi est maior adustio, non est ibi sanies; & si plus, morphea; deinde lepra. Lentigines igitur & panni, & aliæ infectiones multæ generantur ex superfluitatibus ad cutem delegatis: sed quando materia est multa, & virtus expulsiua cutis est debilis, tunc remanent iuxta cutem, & faciunt diuersa genera infectionum, secundum diuersitatem humoris peccantis. Hæc Gordonius: & scabiei, inquit, sunt quatuor species, ex sanguine, ex cholera, ex melancholia, & ex phlegmate falso. Adritur autem sanguis, quando in cibis & potibus species aromatica in nimia quantitate apponuntur: & ista est ex aliis humoribus, sicut est piper & allia, vinum purum, & stare in sole, & labor fatigatorius; & ita de aliis quæ adritur sanguinem & humores. Et ita causa scabiei quadam sunt primitiuæ, ut usus ciborum calidorum & salforum, acidorum, & aromaticorum, & amarorum: usus vini fortis, & puri, olei, & mellis; & tarda mutatio vestium, pannorum; deinde dormire & conuersari cum scabiosis. unde & illa domus Teylingica sororij mei ab amica infecta fuit. Causæ antecedentes sunt mala intemperies calida, vel sicca, malos & corruptos humores producens. Causæ coniuuctæ sunt ipsi humores

Causæ.

Multis modis sanguis aduritur.

Causæ primitiuæ.

Antecedentes.

Coniunctæ.

cor-

corrupti, calidi, nitrosi ad cutis superficiem vi natura transmissi. Vnde iste humore à quo generatur scabies, aut est sanguis, cui commiscetur cholera, quæ fortè conuersa est in melancholicus propter adustionem; aut cui commiscetur phlegma falsum, nitrosum: & sic prima quidem scabies est sicca, ex materia sicca inclinante ad profundum. idèd dicebat Serapio, quòd ex sanguine crasso, qui putrescit, fiat eius generatio. Altera est scabies humida, & humiditas eius declinat ad subtilitatem; idèd pullulat exterius, & proicit à se humiditatem virulentam: quæ verò grossa est, non ita penetrat exterius; & quia sicca est, non ita emittit virulentiam nec humiditatem saniosam. Constantinus 7. sua theorica dicit scabium quandoque enenire ex defectu cutis, quia debilis est in expellendo superfluitates quas natura còd transmittit, ut mundificet membra interna, ex quibus cognoscitur quantum iument balnea, frictions, & vnguenta, quæ poros rarios efficiunt, & humores submittendo sub cute existentes in vaporem conuertunt, & per poros excludunt. Sed præcipuè scabies procedit ex defectu virtutis digestiua in hepate & venis, facientis malum sanguinem acutum vel falsum & malam qualitatem habentem, in quo maximè inuat mala intemperies hepatis calida & sicca, simplex aut composita. Hinc tales homines habentes hepar calidum & siccum sunt pruriginosi & habent scabiem siccam. Ad hoc etiam inuat longus vsus rerum calidarum & siccarum, ut est sinapi, eruca, aromata, vinum forte, sine aqua, mel & lac. Signa generis, ex se sunt manifestà; ac causarum ita habentur: illa enim quæ aspera est in se, & habet borbores seu pustulas in cute, quæ eleuantur, & sunt acutioris capitis, talis est acutioris humoris: at quæ habent pustulas latic & magis profundas in carne, harum humor est minoris acuitatis. Si scabies sit à sanguine, cognoscitur per ruborem membri & plenitudinem totius, per mollitiem, per pruritum delectabilem, & per copiosam saniem & citam generationem; & citò exit sanguis, ex vnguium scalpillatione; & sapor in ore sentitur dulcis. Sic etiam Gordonius: Locus, inquit, vergit ad ruborem, cum humiditate & pruritu magno, & delectatione magna in pruritu, licet in fine sit dolor. Si autem sit à phlegmate falso, tunc locus flavescit, & quasi squama exennt ab eo, & est me-

diocrit

Qui maximè
sunt prurigi-
nos & ad
scabiem
inclinati.

Digna.

diocriti generatio saniei, & pruritus, & magna delectatio, & in fine est magnus dolor. sic Gordonius: Adhuc squama, & sanies, & pruritus vehemens, & delectatio in scilpendo; sed in fine est vehemens dolor. Si est à cholera, tunc adeest siccitas, & ariditas membri, & punctio, & arsura, & pruritus acutus, & valde pauca generatio saniei. locus quoque vergit ad citrinitatem, cum magno pruritu, siccitate & scissura. Si est à melancholia, locus vergit ad nigredinem, & scabies est sicca cum squamis, & sine sanie: & ita Gordonius, Locus tactus, inquit, in circuitu vergit ad nigredinem, & pustulae sunt sicciores, cum modica sanie & virulentia. Et si humores sint commixti, signa quoque mixta erunt. Quod ad prognostica attinet, primò dicit Avicenna, quòd scabies excoriatà & impetigines multiplicantur in autumno: in Vere quoque magis suppurulant. Secundò, sanies plurimum accidit inter digitos, eò quòd sint partes teneriores, & debiliores. Tertio, scabies in decrepitis est difficilis curationis, aut impossibilis, ut addit Gordonius: sufficit enim blandiri, & bonum regimen inducere. Amica tamen uxor mea, licet vetula esset, curata fuit. Caserum quòd decrepiti difficulter sanentur, ratio est, quia naturaliter sunt sicci, & nutrimentum eorum est indigestum, & non bene nutritile, & phlegmatica & serosa superfluitates in senum corporibus quamplures aggregantur, ut patet ex Galeni 5. de regimine sanitatis cap. 9. Quarto, scabies est agrotudo contagiosa, quia per contactum inficit. Hinc sciendum quòd scabies est morbus ex triplici genere compositus: nempe ex mala intemperie calida & sicca, alterante cutem & loca qua sunt sub ea: & est morbus consimilis, nam qualitas alterata ipsius sanguinis, cum veniat ad cutem, primò causat pruritus, deinde scabiem: & est morbus communis, quia solutio continuitatis hic est, cum pars à parte in superficie separetur & excorietur. Sed hic dubitatur, cui virui scabies magis noceat. dicunt quòd precipue noceat virui animali sensitiua, quia sentit malam ipsius qualitatem, ratione enim sit pruritus. Interim etiam est scabies nocuumentum viruiis assimilatiua, non potens assimilare nutriendum cum nutrito. Quintò, dicit Avicenna, scabies quadam fœda attrahit vulnera, & permiscetur interdum ad impetigines & saphra: & dicitur ibidem quòd cause generantes scabiem sunt

eadem cum causis generantibus pruritus: sunt tamen fortiores, & appropinquant causis generantibus pediculos & saphati & furfures & impetigines. propterea sciendum quod scabies humida sit à phlegmate (also, per admixtionem cholera rubea. scabies autem sicca sit ab humoribus siccis, ut est cholera adusta, per se, vel mixta cum melancholia, vel aliqua specie alicuius humoris. Sexid, (ut dicit Gordonius) scabies secca, ulceratio fetida multas partes corporis occupans & corrumpens, habet malas radices, & approximatur ad malas agnitundines, & est difficilis curationis valde: si fuerit parua, modicam partem corporis occupans, non angustiosa, neque somnum auferens, facile curabitur; & è contrario, contraria. Nunc ad curationem tendamus, hoc samen interposito exemplo.

OBSERVATIO XI.

De scabie diuturna, quæ per nouem annos durauerat.

EVA filia Theodori Teylingij, quæ in Haga-Comitis apud matrem Cornelij Susij Domini Præsidis Hollandiæ, auiam suam, habitabat, cum nouem annis scabie infecta fuisset, iuuenicula aliqui satis formosa, robusta, & procera, 16. annorum, nec ullis remediis in Haga-Comitis curari posset, anno 1552, mense Maio Alcmariam venit, ut parentes inuideret: qui me rogârunt ut eandem in curationem susceperem. Huic itaque sæpius decocta maialia, ut vocant, sanguinem purificantia præscripsimus, quæ conficiebantur ex borag. bugloss. acetosa & similibus in sero lactis decoctis. Deinde accepit ℥j. cassiæ mundatæ, cum zaccharo in bolo. Deinde ad sanguinem purificantia denuò reuertebamur, adiecta ℥j. ꝑ. follic. fenæ. Corpore autem bene expurgato, eandem nudam per horam in balneo sequenti posuimus; idque quinque diebus continuando: ꝑ. lapathii acuti cum radicibus, fumiteræ, maluæ, scabiosæ, violar. hederæ arboreæ, furfuris optimi, salis communis aqua m.ij. coquantur in aqua com-

communi, pro tina seu lauacro. deinde facta abster-
sione totius corporis, lectum calidum intrabat, &
sudabat per totum corpus. Et ita materiâ sufficien-
ter ad cutem propulsâ, tunc tandem eam inunxi-
mus vnguento ad scabiem Observatione præceden-
te descripto, quo Machtilda Susia mater eiusdem
curata fuerat. Eo cùm aliquantulo tempore inun-
cta fuisset, secunda scabie curata est; & eam domum
sanam remisimus; quæ deinde nunquam rursus
scabie infecta est.

SCHOLIA.

AUTHORES anteurationem particularem scabiei hic
ponunt quosdam canones uniuersales. Primum est Serapio-
nis, lib. 5. Euentus huius aggritudinis est à sanguine grosso, qui
putrascit: propterea inceptio urationis eius fiat à phlebotomia. hic
cauon intelligendus est de adultis: nam in hac inuenientia, cuius
urationem in Observatione præcedenti posuimus, propter debi-
litem eam omisimus. Secundus canon: Post phlebotomiam se-
quatur ueneris solutio, cum decoct. myrobol. aut sumiterra, non
solum hic, sed & alii, iuxta materiam peccantem, ut mox dice-
mus deuratione particulari. Tertius: quia scabies & pruritus
à cibis salsis & acutis & dulcibus posissimum generatur, idcirco
ab omnibus eiusmodi commodè abstinebunt. Quartus: conie-
dere res inspidas & acetosas, imò & humidas, in quibus non
est velocitas putrefactionis, egregie inuat scabiosos; quare &
olera corruptibilia vitanda, præsertim persica, quibus adeo
velocitas putrefactionis, qualis est in lacte, in piscibus aliqui-
bus: abstineat similiter à superfluo potu; nam ex hoc frequen-
ter generatur scabies, auctore Constantino. Cibi itaque omnes
cuius corruptibiles, ut lac, pisces, & fructus recentes, & simi-
lia, quia humores ab eis producti cito corrumpuntur, ideo sca-
biosis sunt prohibendi. Quintus: res inspidas & acetosas,
imò & humidas, in quibus non est velocitas putrefactionis, in-
uat eos sumere, ut ante diximus: talis est syrupus acetosus, agre-
sta, acinum, succum arantij, limonum, acetosa, & alia omnia aci-
da, quia alterant malam qualitatem calidam, & reprimunt acui-
tatem humorum, & præseruant à corruptione & putrefactione.

Canones uni-
uersales qui
præponuntur
urationi
scabiei.

Idè manifestè pruritus & scabiei præbens innaumentum : quæ
 verò insipida sunt & humida, maximè faciunt ad scabiem sic-
 cam. Sextus : coitus movet materiam ad exteriora, & excitat
 vaporem calidum putridum, venientem ad superficiem cutis : id-
 circo omnibus scabiosis est inhibendus, maximè si excedat. Septi-
 mus : mutare camisiam sapius & vestes, & frequenter lavare
 manus, & membra tenere munda, ac nitida, nullum prodest ad
 remouendum pruritum & scabiem. Et similiter removere pedi-
 culos & lendes, cyrones de manibus & toto corpore, & cimi-
 ces, ubicumque fuerint, confert. Octavus : immediatè à principio,
 & post purgationem diata contraria est præscribenda & obser-
 vanda ipsius causa : & canones prædicti de imperigine, qui &
 huic causa maximè utiles sunt, in memoriam reducantur, ut
 & Aniceuna commendans. Nonus : materia scabiei, licet fre-
 quenter purgetur, tamen propter hoc scabies non curatur : & ra-
 tio est, quia cutis & partes subcutanea sunt infecta : ita ut
 quicquid ad ipsas pro nutrimento venit, ab illa mala intemperie
 corrumpatur. idè post dictas sufficientes purgationes, epihema-
 ta, & unguenta cuti imponenda sunt, & balnea frequentanda,
 ut eim mala qualitas per sua contraria remoneatur. & hac est
 sententia Rhafis & Aniceuna. Quòd autem ex regiè iuuent bal-
 nea, frictiones, & unguenta, id constât, quòd poros rariores red-
 dant (ut & Constantinus dicebat 7. sua Theorica) & subli-
 cent humores sub cute exillentes, ut in vaporem conuertant, &
 per poros excludant. Decimus : Hac tamen ipsa balnea & un-
 guenta, nec non & alia localia remedia, ante perfectam purga-
 tionem pauci existunt valoris : quia universalia remedia parti-
 cularibus semper à medicis præmittuntur. Undecimus : scabiosi,
 quantum possunt, non se scalpant, quia si id fecerint, de parva
 scabie facient magnam. Duodecimus : quia cibi multi & multa
 superfluitatis sumpti scabiem generant, idè apparet quantum
 prodest scabiosis moderata comestio, & vini temperatus potus, &
 confortatio virtutis digestiva, ut bonos generet humores, non
 crudos nec adustos, nec corruptibiles. Decimus tertius, & est
 Rhafis in lib. division. quanto scabies est humidior, tanto plus
 indiget medicina fortiori in deficcando. Nunc ad curationem
 particularem procedamus.

Rhafes.
 Auicenna.

OBSERVATIO XII.

De diuersis speciebus scabiei curatis.

IV V ENI scabioso hæc commodè præscripta sunt:
 R. syr. de fumoterra, de lupulis, de end. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 aquæ fumiterræ, endiuæ ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. β misce. R. dialen.
 lonitui \mathfrak{z} vi. elect. de succo ros. \mathfrak{z} i. confectionis ha-
 mech \mathfrak{z} ij. dissoluantur cum decoct. communi, in
 qua bullierint folior. senæ m. β . misce pro unico
 haustu. deinde membra inuncta fuerunt cum vng.
 Gentilis pro scabiosis. Pro pueris verò laborantibus
 scabie sicca, maximè in corporibus humidis, præ-
 cipuè pueris, hæc egregiè contulerunt: oleum com-
 mune, terebinthina lota, cum modico sale pista,
 agitata donec dealbentur: & vtere. Vel R. olei ros.
 butyri ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. succi fumiterræ, succi plantag. succi
 ebuli vel sambuci an. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. fac bullire: deinde adde
 terebinthinam lotam, & sulphuris viui parum, item
 fac bullire succum lapathii acuti, fumiterræ; & con-
 fice linimentum cum axungia & butyro. Ad sca-
 biem calidam acutam, & ignem siluaticum, sequens
 egregiè prodest: R. olei viol. butyr. lotorum in aqua
 ros. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. argenti viui extincti salua ieiuna \mathfrak{z} j. suc-
 ci plantaginis, succi lanceolatæ an. \mathfrak{z} ij. lithargyrii
 albi \mathfrak{z} ij. probè incorporentur. Cuidam, qui ex
 phlegmate salso scabiem habebat, sola scabiosa her-
 ba trita cum axungia veteri profuit. Sed & ille
 qui scabiem fœdam manuum ac totius corporis
 habebat, inunctus ex vng. quod constabat pul-
 zinz. sulphure & butyro recenti, absque aliquo pe-
 riculo curatus fuit. Sed & hoc balneum mercatori
 profuit scabie fœda laboranti: R. rad. enulæ cam-
 panæ, rad. lapathii acuti recentis ana lib. j. foliorum
 fumiterræ, lapathii acuti, maluæ recentis ana lib. j.
 β rad. ellebori nigri m. ij. furs. tritici optimè cribrati
 lib. iiij. decoquantur omnia in aqua & lacte, pro

balneo : in quo se balneet patiens bis in die temperatè calidè. Huic tamen, sicut & aliis omnibus, cum scabies secundum plurimum fiat ab humore per viam adustionis sanguinis, vel cholerae, vel melancholice, vel per viam falsi phlegmatis desuper redundantis ad totum corpus, laudavi ut apparente pruritu & rubedine in membris totius corporis scabie afflictis, fieret phlebotomia secundum diuersos situs, iuxta materiam peccantem : ut si esset ex sanguinis adustione, cuius indicium erit pruritus & rubedo membrorum, ut diximus; tunc fiat phlebotomia ex basilica dextri lateris, ad § vi. vel plures, consentiente robore & ætate. Si verò scabies ex adustione cholerae fuerit, cuius indicium est temperatura ægri cholericæ, vehemens, & acutus pruritus & citrinitas tum loci scabiosi, tum etiam exeuntis saniei à pustulis scabiosis, tunc ut remittatur cholerae ebullitio, etiam fiat phlebotomia, sed parior quàm in præcedenti. Quod si phlegma falsum scabiei causa fuerit, cuius indicium est violentus & intolerabilis pruritus, sine apparentia rubedinis, vel citrinitatis; in prædictis fiat phlebotomia satis parua ex eadem basilica ad § iij. plus minúsve. Quod si ab adustione melancholicæ scabies trahat originem, cuius indicium est carentia fortis pruritus & liuiditatis apparentia membri scabiosi & pustulati, cum exitu sorditiei liuidæ vergentis in nigrum, ex saluatella sinistrae manus, consilio præceptoris mei Benedicti Faurentini in Empirica sua tract. de curis infectionibus cap. 4. de scabie, sanguinem detrahare iubeo ad § vi. & si æger consuetus fuerit pati hæmorrhoides, ex iis (sanguisugis applicatis) sanguinem extrahere iubeo ad § iij. Neque credendum est illis qui dicunt quòd in scabie apparente non debet fieri phlebotomia, ne natura tentans exonerare se, impediatur à suo opere, quoniam cum in scabie materia plurima vitiate sit, etiam intra venas, non

est timendum vt faciamus phlebotomiam, & si etiam tractus sanguinis ad extra venas fiat, ex eo quòd in multitudine peccantis materiæ existentis intra venas, & euacuata per phlebotomiam, iuuamentum maius adfuerit, quàm nocumentum, quod posset contingere ex aliquali adhuc per phlebotomiam retractione materiæ ab extra venas ad intus: fiet enim ex ipsa phlebotomia natura vigentior supra residuum materiæ remanentis, ad naturam regulandam ab intus & extra venas. & caue ne ante totius corporis euacuationem, ætate adhuc tolerante inungas scabiem; quoniam plerumque facta inunctione, corporis porositates obserantur. quo fit, vt materiæ malæ intus peccantes, prohibita expiratione earum, magis putrescant, & febres inducant, sicut serè omnibus contingit præmittentibus vnctiones euacuationi. Nam mulier scabiosa quasi leprosa cùm oleo ante vniuersalia ex empirici cuiusdam consilio se se inunxisset, potissimùm in facie & gutture (vt aliàs scripsimus) in anginam ac inde in mortem incidit. Ita & puer nauæ cùm caput scabiosum inunxisset, manè in nauigio inuentus est mortuus. Facta igitur antedicta phlebotomia, consului iuueni superscripto, tum scabiosis aliis, meæ curæ subiectis, vt materia peccans digereretur cum sequenti syrupo, qui valet in omni materia adusta faciente scabiem: R. syr. de fumo terr., de lupul. de end. ex infus. ros. ana ʒss. aquar. scabiosæ, fumiterræ, cicoræ, ana ʒj. misce. Interim vt materia foras euocetur, quotidie manè per quatuor horas ante cibum hoc balneo aut simili vtendum: R. folior. maluæ cum rad., violar. cum rad. ana m.ij. bull. in lq. aquæ, pro balneo. hoc diluantur omnia membra scabiosa. Postea purgetur per pilulas: R. pil. de fumo terr. ʒij. aurear. Nicolai, foetid. ana ʒss. fiat pill. v. Vel R. diacathol. ʒj. confect. hamech ʒss. elect. de succo ros. ʒiij. misce cum sach. fiat bolus: vel

vel cum decoct. communi flor. & fruct. q. f. cum qua bullierint follic. senæ, polyp. querc. summitat. fumiterræ ana ʒ ij. & detur ægro duabus horis ante lucem. Prius tamen potest leniri aliis cum cassia, diaprun. simpl. thamarind., vel cum trochis. de viol. sine scammon. quæ omnia multum leniunt euacuando humores adustos. His peractis ad linimenta & vng. transeundum audacter. Hoc tamen in pueris, in quibus nulla præcessit euacuatio, propter ætatem non consentientem, sine aliquo timore vtor: \mathcal{R} . olei ros. ʒ iiij. salis communis ʒ ij. vel ʒ j. butyr. rec. loti ʒ j. in mortario bene ducantur, & fiat vng. molle. In pueris & aliis ætatibus sequentibus etiam ante euacuationem hoc vng. ad ignem inungo: \mathcal{R} . terebinth. lotæ in aqua ros. ʒ vii. succi limonis ʒ j. β . but. recent. ʒ j. vitellum vnum oui, salis communis ʒ ij. olei ros. ʒ ij. misc. & in mortario fiat vng. Vel hoc, sed non ante digestionem & euacuationem corporis, vbi scabies crassa est: \mathcal{R} . succi lapathi acuti, succi fumiterræ, plantag. ana ʒ j. litharg. arg. ʒ iiij. terebinth. lotæ cum aqua ros. ʒ ij. cerusæ ablutæ, butyri recentis loti ana ʒ j. β . succi limonis ʒ ij. vitell. ouor. ij. salis communis ʒ j. olei ros. ʒ j. β . misce, & omnia simul in mortario plumbeo bene ducantur vel agitentur, donec fiat vng. Bettus Bononiæ ita in Comite quodam scabie laborante in Decembri, annos nato triginta & vnum, processit. Hæmorrhoides aperuit quodam suffitu. potuisset & fieri cum succo capæ, aut cyclaminis bombaci mixto, & imposito. Postea vsus est hoc vnguento: \mathcal{R} . ol. viol. ros. omphacini, nenupharini ana ʒ iiij. β . santal. alb. citr. ana gr. 4. spodii tantundem, spicæ gr. v. camphoræ gr. ij. cum cera alb. fiat vng. molle, pro hepate. Hanc condituram ante cenam sumendam præscripsit: \mathcal{R} . confer. cicoræ, ros. nenuph. an. ʒ v. specier. diarod. abb. ʒ j. ros. nouellæ ʒ ij. misce cum syr. acetos. compos. Balneo isto lauari iussit: \mathcal{R} . fol. plantag.

rag. althææ ana m. iij. hordei mund. p. iij. bull. in aqua fluuiali; cuius vaporem recipiat per totum corpus: & ipsis herbis confricet se se, & aquâ lauet. Hoc quoque vnguentum expertissimum habetur pro scabie. R. terebinth. ʒ ij. butyri rec. ʒ x. vitellum oui vnus, myrrhæ, sarcocollæ, litharg. rad. lapathii acuti ana ʒ β. salis modicè torrefacti ʒ iij. picis naturalis ʒ j. dissoluantur ad lentum ignem pix, butyrum, resina, & coquantur parum: quibus parumper refrigeratis addatur vitellus oui, & reliqua puluerisata addantur; commisceanturque secundum artem. facto vng. bulliant in succis fumiterræ ʒ j β. lapath. acuti ʒ j. ad consumptionem succorum. Aliud 1 R. vng. huius ʒ i. β. vng. infrig. Gal. ʒ β. butyri recentis ʒ ii. succi limonum ʒ iij. misce: R. rad. enulæ campanæ, lapathii acuti an. ʒ iij. hellebori nigri ʒ i. fol. fumiterræ, lapath. mal. ana m. ii. salis communis m. i. fford. mund. m. ii. furfur. triticei diligenter à farina expurgati m. iiii. bulliant simul ad consumpt. tertiar partis. Balneet manus & crura bis in die ex hoc calido decocto ad semi-horam ferè, deinde linteis calidis diligenter siccet & abstergat: hinc inungat cum vng. superscripto. Pro scabie, Currii: R. cerusæ ʒ iij. lardi & olei viol. an. q. s. fiat vng. Mulieri annuâ scabie & pruritu affectæ, & dolore brachii sinistri, & genu, in Vere: R. folior. senæ ʒ vi. epithymi, poly-podii ana ʒ i. trochisc. de agar. ʒ i. β. pass. ʒ i. & in suff. q. aquæ lactis caprini calid. per noctem infundantur, & express. adde diacathol. ʒ vi. elect. ros. Mes. ʒ i. muccari ros. ʒ i. cum decoct. cuscute; fiat potus. Aliud vng. pro scabie expertum: R. olei de vitellis ouorum ʒ β. sem. lini ʒ i. laurini ʒ vi. mastice ʒ β. pingued. porci, vituli ana ʒ i. butyri maialis ʒ β. terebinth. ʒ i. β. rad. lapathii acuti ʒ ii. althææ ʒ i. fumiterræ m. i. furfur. trit. m. i. β. malum granarum acetosum vnum. pistanda pistentur, & bulliant simul omnia lento igne ad consumptionem succo-

rum : deinde fortiter colentur. colaturæ addantur litharg. vtriusque ꝓ vi. cerusæ ꝓ iii. alum. rochi combusti ꝓ ii. calcis decies lotæ ꝓ iii. mercurii cum salua hominis extincti ꝓ iii. ceræ virginæ q. s. fiat linimentum. Ad scabiem inueteratam, malam scilicet, etiam valens ad impetiginem, & serpiginem cum crustis : R. furfuris, maluarum ana q. s. fiat fomentum. Postea pul. præcipitati insperge; miraberis effectum. Aliud ad scabiem etiam optimum, quo sæpe feliciter vsus sum : R. terebinthinæ ꝓ iii. butyri rec. quart. i. olei communis, olei ros. ana ꝓ ꝑ. vitellum vnius oui, omnia incorporentur, & fiat Unguentum.

SCHOLIA.

Phlebotomia.

VT ad particularem scabiei curationem deveniamus, observetur quam diligentissimè illa eadem victus ratio qua à nobis antea descripta est ad lepram, cancrum, impetiginem, morphæam, & alias cutis infectiones; & ut compleatur primus cano- nis, apparentibus signis sanguinis & repletionis, fiat phlebotomia ex mediana seu vena communi, vel ex basilica: & si hepar in aliquo participet, extrahatur sanguis, secundum mensuram & quantitatem & corruptionem eius, & secundum vires infirmi: & sunt quidam, ut Valescius, qui volunt, ut si scabies abundat supra partes diaphragmatis, fiat phlebotomia ex vena cephalica; sub diaphragmate verò, ex basilica. sed si cupis ambas partes vacuare, communem pertundito. Sed hic dubitatur, iuxta eundem Valescium cap proprio, quare in aliquibus post phlebotomiam factam, pruritus & scabies fiant, vel illa scabies qua prius erat parva, crescat & augmentetur. prima causa est, quia phlebotomia, si parva sit, commonet humores, & humorum commotorum aliqua pars ad cutis superficiem delegatur, & sic augetur scabies. Alia est, quia per phlebotomiam magna humoris quantitas peccantis expellitur, quæ expulsâ natura super residuum dominatur, & illud exterius ad cutem expellit. Facta itaque phlebotomia, iuxta tenorem secundi canonis, digeratur primò materia, deinde euacuetur. Si igitur materia calida

Ergo.

calida est; vel si est sanguinea, digeratur primò materia cum oxyzach. & syr. de fumo terra, cum apozemate cicetum rub. & solior. borag. deinde purgetur cum thamarindis dissolutis in aqua casei; quibus addatur rhabarbar. solum in aqua casei, vel end., vel cum cassia fistula, & myrobal. citrinis, quibus addatur ʒi. epithymi. eodem modo Gordonius, Si fuerit, inquit, ex sanguine, fiat phlebotomia; & mundificetur corpus cum manna, cassia fist. & thamarindis, precedente usu oxyzach. & syr. de fumo terra ac de borag. Si corpus est plethoricum, & sit ex cholera, fiat phlebotomia; deinde utatur syr. acetoso, viol., de fumo terra, & purgetur cum myrobal. citrinis & indis, cassia, cum elect. de succo ros. triphera sarracenic. Si autem fuerit de phlegmate, & corpus sit plethoricum, & virtus sit fortis, fiat phlebotomia, & deinde utatur oxymeli diuretico, oxyzach. compositio, syr. de fumo terra. deinde purgetur cum myrobal. chebulis & indis. Vide duas descript. syr. de fumo terra apud Valsenum cap. proprio: unus confortat stomachum, & hepar, ac aperit oppilationes, & morbos cunctis curat, ex materia adusta salsa. alia descriptio magis facit ad phlegma salsum. Materia adusta ita purgatur: R. storum viol. borag., bugloss. polyp. querc. pass. ab arill. mund. epithymi an. ʒij. Si est ex materia salsa, fiat hac portio: R. thamarind. ʒi. dissolue in sero caprino solo, vel in quo prius bullierint viol. absinth. polypod. colatura addatur rhab. temperati in aqua end. ʒi. detur manè. Vel purgentur cum pilulis de fumo terra, vel istis saepe expertis: R. aloës opat. cortic. myrob. citrin. ana ʒiij. tragac. ros. rub. diag. ana ʒi. sena, fumo terra, agar. epithymi ana ʒß. cum succo fumiterre fiant pilula. Potest etiam purgari materia calida & acuta, prius digesta, cum diaprunis, si scabies est sicca, & cum cathartico imperiali, & cum hiera Rusfi. In phlegmate salso fiat purgatio cum chebul. & diatrybich. Si autem fuerit melancholia, utatur oxymelisse diuret. squillitico, syr. de fumo terra, de pomis, borag. bugloss. ac materia digesta purgetur cum myrob. indis, belliriciis, emblicis, epithymo, sena, dia sena, confect. hamerch. Adusti quoque humores purgari possunt cum fumo terra, polypod. agar. epithymo, lapide lazuli, foliis sena, & elleboro bene represso seu correcto ut cap. de lepra dictum est. Facta ergo phlebotomia, & purgata materia, frequen-

Purgatio.

Topica.

ter obseruata optima victus ratione, ad topica deneniendum, & ponantur ager in balneo tribus diebus continuu; & qualibet vice in exitu à balneo deintur circubia trochiscata, vel aurea alexand. vel theriaca magna ℥ j. temperata cum vino. & sudet in lecto.

Balnea.

Postea vescatur bonus cibus, sumptis & preparatis cum agrestia, & aceto, & similibus; & utatur aqua acetosa, & aqua end. & in dicto balneo ponantur acetosa, malua, sumus terra, lapathium acutum, bera, borago, fnyfur, & similia. ita & Gordonius:

Stupha.

Corpore autem mundificato fiat stupha: & si causa fuerit calida, ponantur hæc in stupha: ℞. flor. borag. viol. nenuphar. epithymi, camomill. meliloti, sumiterra, ana lib. ℥. misceantur: & exenit à stupha deintur vltia trochisc. ℥ iij. vna verò apud

Vnguenta.

Valescum sufficit. deinde inungatur cum isto vnguento: ℞. vng. citrini lib. ℥. lithargyr. ℥ ij. sulphuris ℥ iij. misceantur cum succo sumiterra: & inungatur. Si autem causa fuerit cholera, ponantur in stupha quæ dicta sunt, ac præterea scabiosa, lapathij acuti ana lib. j. & exenit à balneo deintur aurea alexand. ℥ j. Deinde

inungatur cum isto vng. ℞. vng. fusci, vnguenti ad scabiem ana lib. ℥. calcis extinctæ, sulphuris, litharg. ana ℥ ℥. misceantur cum succo sumiterra: Gordonius habet cum syr. sumiterra. Quod si per balnea non curetur, tunc, inquit Valescum, fiat hoc vnguentum, quod valet in omni specie scabiei, ad alterationem cuius, &

desiccandam & mundificandam scabiem: ℞. rad. alphodel. rad. enula campanæ ana ℥ iij. rad. lapathij acuti ℥ ij. inuoluantur in stuppis madefactis in aqua, & coquantur sub caldario vel cineribus calidis, & pistentur fortiter, miscendo cum axungia porcina: deinde addantur argenti vini extincti ℥ j. viridis æri incorporati cum argento vino ℥ ℥. omnia diu incorporentur in mortario. & fiat vng. quo ungatur sub noctem: & in postero die iniret balneum herbarum supradictarum, vel balneetur in aqua sulphurea vel aluminosa, si eas habeat in promptu. Potest etiam

inungi cum isto vnguento: ℞. litharg. puluerisati, gummi tragac. vitrioli ana p. æ. incorporentur omnia simul cum aceto vini, & ponantur in vase vitreo bene cooperto, & sepeliatur in loco humido per unum mensem: deinde eo utere. Materialia, ex quibus sunt episthemata, vnguenta, linimenta, ad scabiem, hæc ex

Anicenna & deinde Gordonio, postea & à Valesco numerantur:

Vng. valens
in omni spe-
cie scabiei.

SUR: Condisi, argentum vivum extinctum, scoria argenti, aristo-
 lochi, sulphur, sal alkali, es vitum, sal ammoniacum, lentesc, myr-
 rus, sem. cicuta, ammoniacum, flos aris, stercus canis, cucumis
 asininus, succus boraginis, fumus terra, lapathi acutii, scabiosa,
 enula campana, raphani, squilla, sicla, radices istarum, folia &
 frondes, rad. lilij, ireos, fuligo, aloë, lithargyrum, cadmia, pompho-
 lyx, cornu, calx lora, sulphur extinctum, elleborus viciaque, tar-
 tarum, oleum antiquum, sex olei, axungia porcina antiqua, ace-
 tum vini, oleum de sinapi, oleum laurinum, oleum amygd. dulc.,
 oleum de nucibus, folia ficus, & succus eorum, balnea thermarum,
 aqua marina, sulphurea, aluminosa, sine fuerint naturalia, sine
 artificialia, aqua malua, butyrum, oleum rosaceum, & sesami-
 num, & cera. Ista, vel aqua ex istis mixta, prout oportet, expur-
 gant scabiem ab omni loco. Fiant igitur unguenta, episthemata,
 vel linimenta, & die sequenti intret balneum, in quo sint enula
 campana, fumus terra, lapathium acutum, malua, scabiosa, ace-
 tosa, sicla, farina lentium, fabarum, hordei, furfuris, in sacculo,
 cum quo fricetur corpus postquam inhaeserit balneo per aliquod
 tempus. Deinde cooperiatur plurimum stragulis, imò alio lecto, ut
 egregie sudet: & postea ungatur cum oleo ros. viol. oleo amygd.
 dulc. vel cum balsamo vero, quod excellentissimè est. quibus oleis
 adde acetum vel vinum malorum granatorum. Hac enim ro-
 borant, & malam intemperiam remouent. Quod si quis alioquin
 sanus sit, & urinam citrinam & in ceteris optimam habeat,
 scabiosus tamen sit, huic, teste Rhasi, sufficit balneum, frictio cor-
 poris cum sulphure, farina cicerum, baurach: & postea sudet in
 lecto, & hoc fiat ter quaterve; & vescatur bonis cibis conditis
 cum agresta, aceto, malis granatis: & bibat vinum lymphaticum,
 cauendo à rebus humores acutos generantibus, & salios, & sca-
 biem facientibus. Sic Gordonius: Accipe unum ex istis materia-
 libus, aut multa simul, & misceantur cum oleo ros. aut oleo nu-
 cum, aut cum butyro, aut oleo sesamino, aut cum axungia, aut
 aceto & cera; & fiat oleum, vel unguentum. Si autem quis sit
 debilis, R. succum rad. enula campana, axungia porcina recen-
 sis ana q. s. misce ad ignem lentum. Vel istud: R. fuliginis olei
 ros. facti cum oleo nucum, & aceto, misceantur, & fiat unguen-
 tum cum modica cera. Aliud, quod non solum valet in scabie,

Simplicia ex
 quibus fiunt
 episthemata,
 linimenta &
 unguenta ad
 scabiem.

Ung. pro de-
 bilibus.

sed

Vng. ad scabi-
biem, vlcera
fariofa, irau-
dulenta &
forda.

Vng. in forti-
bus corpori-
bus, & ad sca-
biem anti-
quam, & ma-
lum mori-
uum.

Vnguentum
ad scabiem
inneteratam,
ex phlegmate
falso.

Historia Va-
leci, de quon-
dam inuento
mortuo ex
vnguento
quo linuntus
fecerat.

Aqua mirabi-
lis, non solum
valens ad
scabiem, sed
ad crustas
morbi Galli-
ci, & verigia
eius delet.

sed in ulceribus scabiosis saniosis fraudulentiis fœdus: R. antimoni-
ij, eris vli, litharg. cadmia argenti, marcasita, ceruse, balau-
stia, aluminis, sarcocolla, corticis thuris, pompholygos ana ʒ ʒ.
conficiantur cum fece olei antiqui & cera q. s. & fiat vng. idem
valet ad gangranam. In fortibus corporibus, corpore prius mun-
dificato, R. ellebori albi, vel vtriusque q. v. commendantur forti-
ter, & cum axungia porcina recenti misceantur, & fiat un-
guentum. omnem scabiem antiquam delet, & malum mori-
uum. Ad scabiem inneteratam & induratum, & maximè pronenien-
tem ex phlegmate falso: R. succi fumiterre, scabiosa, lapathi
acuti, enula cathapana, absinthij ana ʒ j. ʒ. picis nigra ʒ ij. olei
nucis, fecis olei olina ana ʒ j. ʒ. decoquantur succi cum istis, de-
inde colentur, & addatur tartari ʒ j. nitri ʒ j fiat vnguentum,
& liniatur, ut suprâ. Ego autem, inquit Valescus, cum terrore
pono in vnguentis arsenicum, auripigmentum, vitriolum, &
ellebori species, ob mala exempla quæ vidi accidere eis qui cum
his operabantur. Miles quidam, cum ex istis nepoti suo tinea so-
composuisset Vnguentum, ac capiti eius raso in nocte apposuisset,
postero die subsequenti puer in lecto mortuus inuenitus est. Pra-
ceptor eius Nicolaus Colba, cum baccalaureum haberet in arte
medica in Ponte Ortosij, qui scabiosus erat; hic pharmacopœus
quidam suamet auctoritate ex supradictis vnguentum dedit; quo
postquam sese inunxisset baccalaureus, putabat se ardere, tuta-
quam in igne positi fuisset, & non potuit quiescere, donec to-
tum vnguentum amotum esset, ac membra aquâ tepidâ abluisset.
Ergo felix quem facinus aliena pericula cautum. Cane ergo
à talibus, ne insaniam incurras: quin potius lenioribus utere.
Addam his mirabilem aquam præceptoris mei Benedicti Fa-
uentini, quæ patiens inungat scabiem, facta foris & subtili dilu-
tione: R. aqua destillationis lapathi acuti lib. ij. succi plantagi-
nis ʒ iij. aqua rosæ ʒ ij. succi limonis ʒ ij. lithargyrj ʒ vi. ce-
ruse ʒ ʒ. sublimati ʒ j. ʒ. salis communis ʒ ʒ. sulphuris vini
ʒ ij. pulverizentur pulverizanda subtilissime, & cum aquâ
misceantur, & in infusione maneant per diem naturalem. De-
mum ponantur omnia in alembico, & lento igne destillentur. Es-
scias quòd prædicta aqua non solum confert scabiei, sed etiam
vtilis est ad delendum crustas morbi Gallici: & eâ non solum

tekm-

potuerunt sustine morbi Gallici, sed etiam vestigia eius, & cruciatum : & scias quod quemadmodum precedens aqua multum confert ad scabiem sanandam, ita plurimum conferunt aquæ theriacum sulphurea, veluti sunt aqua de Poreta, de Albano, de Perriolo, & huiusmodi. Enacnato enim corpore, & à superfluis bene mundato, si in prædictis balneis patiens aliquantisper balneetur, videbis ex hoc innumensum præstans. & idem præceptor memi eos quos ad Pisanas thermas relegauit, cum miraculo deum sanos tenuisset. Idem consulis eo tempore quo sit inunctio sub noctem, ut mane appatente luce utantur sequenti balneo calido in toto illius corpore : & ut mox exiens à balneo ingrediatur lectum calidum, dormiat & sudet : R. folior. lapathij acuti, folior. fumiteriæ, folior. malua cum rad. folior. borag. ana m. ij. sursum ligati in pecia m. p. filiginis m. ij. bulliant emnia in f. q. aqua, usque ad consumptionem tertie partis : deinde colentur, & colatura vsui seruetur. Nos balneis artificialibus vti possumus, vel aqua marina, cum naturalia alia nobis desunt.

OBSERVATIO XIII.

De scabie humida, & de scabie sicca, & de inueterata, fæda, cum diuersis exemplis.

PVER annorum nouem, qui post morbillos curatus in scabiem humidam inciderat, cui & vlcera in cruribus quasi crustosa aderant, cum scabie fæda, prius decocto senæ purgatus, tandem hoc adhibito vnguento sanatus est : R. lapidis calaminaris subtilissimè triti, litharg. auri & argenti ana ʒ ij. sulphuris vivi, cerusæ ana ʒ j. ꝑ. omnibus diligenter minutissimè in puluerem redactis, cum axungia porcina veteri fiat vnguentum. Alteri, qui scabiem in facie ac alibi habebat, satis adulto, ac propemodum iuueni, post corporis exactam purgationem hoc vnguentum egregiè contulit : R. succ. chelidon. fumar. borag. scabiosæ, lapathij acuti ana ʒ j. litharg. cerusæ lotæ, aris vlli ana ʒ j. misc. cum seco

fece aceti & axungia veteri fiat vng. Sed & hoc
 ad scabiem expertum. lauetur manè & vesperti quo-
 libet die cum decoct. fumiterræ & scabiosæ, quo-
 usque ceciderint squamæ: & terebinthinæ, axungia
 cerui, cum succo herbæ morsus gallinæ, cum modi-
 co aceti, fiat vng. in peplo extendatur & apponatur.
 Ad scabiem humidam & siccam, & rad. enulæ
 campanæ, in aqua decoctam & pistam confice cum
 axungia porci salita, pauco adiecto argento viuo
 extincto, & vitriolo incorpora. quidam ad colorem
 adiiciunt croci momentum: post vniuersalia reme-
 dia, & purgationem totius corporis, in adultis &
 mediocriter robustis, mirabile est. Ad scabiem
 fœdam, crustosam, vlcerosam, ex phlegmate falso,
 præstans est remedium balneum aquæ decoct. sul-
 phuris viui, aluminis rochæ. deinde & tartari vini
 albi, litharg. ana ʒ j. bulliant in aceto, & cum oleo
 nucum confice vng. Vel & calcis sapius lotæ &
 exiccata & puluerizata ʒ iij. incorpora cum succo
 ciclæ aut caulis, & adde ol. ros. & ceræ q. s. fiat vng.
 In coxis quoque & tibiis expertum habetur sequens
 vng. & ol. nucum ʒ ij. sulphuris viui ʒ β. ceræ ʒ j. ar-
 genti viui extincti cum salua ʒ ij. aceti exiguum.
 simul misce pro vng. Quidam cum scabiem in coxa
 ex falso humore cum crustis haberet, appositum est
 emplastrum ex extremitatibus vitis (quas capreo-
 los vocant) cum sale mixtis, contusis; & illæ crustæ
 vnica vice vel duabus ceciderunt: deinde inunctum
 est (ad exiccandum) vng. de lithargyrio. Iacobus de
 Carpo chirurgus Bononiæ hoc vng. utebatur ad
 scabiem: & terebinth. ʒ iiij. lardi colati ʒ iij. salis
 gemmæ, thuris ana ʒ j. cerusæ, lithargyrii argenti
 ana ʒ β. succi pomi citranguli num. j. misce. Ama-
 tus ad scabiem in qua papulæ erant exedentes, vt
 timor esset de herpete, post vniuersalia & conser-
 uam florum & summitatum fumiterræ, pro san-
 guinis mundificatione, hoc linamento vsus est:

℞. vitellorum ouorum num. ij. olei ros. butyri recentis ana ꝑ ij. succi duorum limonum, sublimati ꝑ ꝑ. misce. Nicolao Halsio puero Delphensi scabioso, tum multis aliis, præscripsi sequens vng. quo omnes sanati sunt: ℞. rad. lapathii acuti mund ꝑ ij. coquantur in aqua ad mollitudinem: contrusæ per seraceum excipiantur. adde pul. baccarum lauri, aristoloch. rotundæ, zinzib. ana ꝑ ꝑ. ad ignem coquantur cum flore lactis, continuò mouendo cum spatula, vt in linimentum coëat. coquendum autem est parum; alioqui exiccatur: & quamuis admodum parum coquatur, facilè tamen in linimentum optimum coit, quod nullum odorem habet, estque molle, vt optimè liniri possit.

SCHOLIA.

VNICVIQVE scabiei speciei, quantum possibile est, intelluenda sunt remedia vniuersalia & topica propria. Vniuersalia ad materia antecedentis euacuationem serosa substantia, pituitosa, vel melancholica, aut sanguinea præscribi debent. Si enim sint serosi humores à bile, pruritum faciunt, & veluti pustulas aquosas, quales fieri solent in herpete miliari. Sunt autem remedia ad illa serosa recrementa, syrup. ros. laxat. syr. de fumaris simpl. serum lactis, vel apozema ex purgantibus serosa, vel alterantibus humorem & mundificantibus serosa recrementa. vt ℞. cassia noniter extracta ꝑ j. cum sacch. fiat bolus. ad idem valet diaprun. simplex, vel diasebsten, ab ꝑ j. vel syr. ros. laxat. ab ꝑ j. ad ꝑ ij cum decoct. lapathij acui, vel acetosa, vel cum sero lactis. Si frequenter his utamur, poterit purgari: si verò uno tantum apozemate, diutius erit viuendum. Nam cum materia sit in venis magnis & paruis, oportet sapins & diutius purgare, vt non solum quod in primis venis est, vacuetur, sed quod sanguini permixtum est. ℞. rad. lapath. acui ꝑ ij. ciccorei, end borag. bugloss. cicla, mercur scabiose, fumar. ana m. j. prun. sebesten ana num. xx thamarind. ꝑ j. sena orientalis ꝑ ij. flor. cord. ana p. j. fiat decoct. in aqua eud. fumaris, & aqua fontis, vel in sero caprim, & in lib. ij. colatura dissolue syr. de fumo-

Quæ faciunt
ad scabiem
ex seroso hu-
more, à bile,
qui prurum
facit, & ve-
luti pustulas
aquosas,
quales fieri
solent in her-
pete miliari.

ter. compos. 3 iij. sacch. parum. fiat syr. media coctionis : utatur
 quinquæ dosibus. Ultima dosi adde robustis grana v l. diagridij :
 debilibus aut mollioribus, infus. 3 ij. rhab. Aliis robustioribus
 3 ij. elect. de succo ros. vel con. el. ham. ech. Viatur optima victus
 ratione, qua cacorchymiam bilis emendes. Si videatur non satis
 corpus purgatum, iterum purgeur modo præcedenti, interpositis
 tamen paucis diebus. Postea ad topica descendendum : & ideo pro
 cautione animadvertendum tam in pruritu, quam scabie, quod
 materia in principio non est repercutienda, ut non ladat mem-
 bra interiora per suam retractionem, sed per phlebotomiam (ut
 præcedentibus observationibus ac scholis diximus) vel purgatio-
 nem. vel per urinam vel per sudorem est expellenda. Nec vltim
 locale remedium, neque enaportio, neque linimentum, neque
 unguentum loco affecto externo aut cuti est applicandum, nisi
 prius materia antecedens sufficienter fuerit expurgata & ena-
 cuata. & hac regula in omnibus ferè morbis est observanda, ut
 Gal. docuit 3. artis parva, tract. de causis, & potissimum in
 morbis intercutaneis : quemadmodum nuper enegit in longa
 quadam agitudine ex repercussione scabiei ad interiora, ut
 quidam valde angeretur. sumens autem continuò ex decocto fi-
 cium, nempe xii ficulm. decoct. in lib. ij. cernisia ; denique scabies
 extrà propulsa est. At præcedentibus purgationibus iam supradic-
 tis, de hoc symptomate non est timendum : præcipuè reiteratis
 purgationibus per intervalla, ut diximus : deinde itò viatur
 balneo sequenti: R. rad. elerij, lapath. acuti lib. j. cicla, parietaria,
 & saponaria ana m. ij. flor. anthos, chamomill. ana p. j. fiat
 decoctio pro balneo: cui adde salm lib. iij. nativ. : & si non cure-
 tur, viatur sequenti unguento : R. unguenti enulati 3 iij. li-
 tharg. 3 j. cernisa lora 3 ss. chalcant. vel chalcit. 3 ij. argenti vi-
 ni, in succo limonum extincti 3 ij. misce. ungantur vola ma-
 num. descriptio habebat chalcit. & non chalcantibi. Vel sic: R.
 resina 3 iij. terebinthina lora in aqua ros. 3 ij. cernisa lora in
 aqua sumiverra 3 j. litharg. loti in aceto 3 ss. argenti vini 3 ij.
 succi limonum vel aranciorum 3 ij. misce. ad formam ung. nu-
 tritii fiat unguentum. vel minuaturs dosis argenti vini. Si pitui-
 ta falsa morbum faciat in senitus, purganda erit pituita hoc
 modo: R. syr. rosac. 3 ij. mell. ros. 3 ss. aqua buglossa, capivi. Ven.

Cautio.

Balneum.

Unguentum.

Contra sca-
 biem ex pi-
 tuita falsa.

ana 3 i betonica 3 iij. misc. R. rad. ele. y & liquiritia rasa ana 3 ij. beron. bugloss. boraginis, mercurialis, herbar capill. ana m. j. fumaria, cicla, fol. br. sica marina ana m. s. sem. carthami 3 iij. flor. anthos & bugloss ana p. j. hordei & cicer. rnb. ana p s fiat decoctio in duatur part. aqua fontis, & una absinth ad lib. ij in quibus dissolue mellis ros. 3 iij. syr. ros. laxat. 3 v. sacch. q. s. fiat syr. colectur, & aromatizetur 3 j. diarrhod. abb. capiat quinque matutinis. Finis syrupie dictis, R. 3 iij. diacarthami, vel de curo soluni, & dissolue in una parte decoctionis; vel deur 3 s. in decoct. mercurialis, & 3 ij. syr. ros. laxat. Fortiora usurpare oportet in omnibus affectibus, qui sunt in habitu corporis; vel mitioribus frequenter usendum est; & postea ungantur partes affecta sequenti unguento: R. unguenti enulati 3 iij. cecbinthina 3 ij. argenti vini 3 i. styrac. 3 ij. misc. innungantur manu cum bit dormitum. Si a materia melancholica, vel ex affatis humoribus fiat, purgetur sic: R. catholic. 3 ij. diaphæniconu 3 i. dissol in decoct. mercur. & 3 i. syr. ros. laxat. ego putarem 3 j. cathol sufficere cum reliquis: R. bugloss. & liq. ana 3 i. rad. enula 3 s. passul. mundat. & prun. sebellen ana num. xx. anisi 3 iij. poly-pod. querc. 3 iij. sem. carthami, sene orientali, summariis ihymi ana 3 ij. hamomill. bugloss., borag. scilicet florum, ana p. j. thamarindorum elect. 3 ij. fiat decoct. in lib. ij colatura dissolue syr. viol. ros. laxat. ana 3 iij. syr. de fumo terr. 3 vi. misc. aromatizetur cum 3 ij. diarrhod. alb capiat quinque matutinu: R. confect bamech 3 ij. diaphæn. 3 ij. dissolue in una parte decoct vel in decoct. mercurial. cum 3 j. syrupi ros. laxat. fiat potio postero die capiat: heriaca 3 i. R. unguenti nutriti 3 ij. litharg. 3 j. cetrus lora in aqua 3 i. s. arg. vini 3 iij. cecbinth 3 j. s. olei ros. 3 iij. succi lapathij acui & succi limonum ana 3 ij. misc. ungantur partes: R. cernis lora, litharg. ana 3 ij. plumbi vlli & loti, anisimonij ana 3 ij. chalcitu 3 iij. ung pompholyg 3 iij. arg. vini 3 iij. olei ros. & irini ana 3 ij. succi plantaginis, lapathij acui & limonum ana 3 j. incorporetur argentum vivum cum 3 iij. axungia porcina: deinde misceatur aliis. Hæc scripsit Rondeletius prodesse ad scabiem & ad psoram seu scatiem Græcorum. At hoc quidem omnibus commune & simplicissimum est: R. olei rosacei 3 iij. sulphuris vini 3 j. succi limonum 3 ij. resina pini 3 iij.

Cautio.

Si sit a materia melan-
cholica, vel
ex affatis hu-
moribus,
quomodo
curetur.

Vnguentum.

Vnguentum
comune de
simplicibus
num, valens
in omni
scabie.

Vng. ad scabi-
em humi-
dam, &
phlegma sal-
sum.
Vng. utilissi-
mum in
scabie.

misc. unguantur vola manuum. Aliud, quo viebatur Valescus ad scabiem humidam, & ad phlegma salsum: R. argenti vini extincti ℥ i. litharg. ℥ ij. plumbi vili ℥ ij. olei ros. & aceti ana q. s. fiat vng. fortius erit si addatur vitrioli ℥ i. ss. Sed nos hoc ad omnem scabiem valde simplicissimo utimur: R. rad. lapathij acuti lib. j. decoquantur solum in aceto fortissimo, donec mollescant: terantur fortiter in mortario, donec fiat quasi vng. molle, sine alicuius additione. Veneti hoc vng. utuntur: R. tartari, plumbi vili, cineris cucurb ana ℥ ij. zinzib. ℥ j. succi lapathij acuti quart. j. olei viol. ℥ ij. misc. lento igne, ad consumptionem succi, addendo cera nova ℥ ss. fiat vng. in fine addatur pul. sulphuris ℥ j. Cuidam scabiem in manibus habenti, post purgationes commodas facta sunt lauacra ex decoct. hedera terrest. malua, fumiterre, rad. lapathij acuti in aqua fontis: (potest quoque feri in sero lactis:) deinde exiccatis manibus, inungebat eas vng. quod constabat cera, oleo, & sulphure: ac tandem manus lavabat lixivio communi. Vulgaris etiam vng. conficiunt ad scabiem ex oleo cannabino & cera. Fel verò gallinae illius tollit maculas scabiei relictas. Nunc ad speciem scabiei, quæ à quibusdam malum mortuum dicunt, accedamus.

OBSERVATIO XIV.

De malo mortuo.

CVIDAM, qui malum mortuum habebat in cutribus & brachio, postquam primò materiam antecedentem satis purgassemus, ad crustarum lenitionem & loci mundificationem hæc admovebantur: R. foliorum lapathij acuti, tapsi barbati ana m. ij. folior. scabiosæ, viol. ana m. j. chelidonix m. ss. decoquantur in aqua currenti, ad mollitudinem: postea coletur. & pistentur herbæ; quibus addebantur mellis communis lib. j. farinæ hordei q. s. ad inspissandum pro vng. seu cataplasmate. Sed & huic decoctioni decima pars aceti addebatur: & ante appositionem cataplasmatissiebat fomentatio cum dicta decoctione. Facta quoque est fomentatio

ratio cum decoctione folius lapathii acuti, cum aceto & herba pistata de super emplastrata. Deinde vnguenta exiccantia præscripta sunt.

SCHOLIA.

MALVM mortuum est quedam species scabiei, quæ oritur ex melancholia naturali adusta, ut dicebat Gordonius cap. proprio, & ex adustione phlegmatis falsi, cum liuore & nigredine, & pustulis crustosis; magnis, sædis, sine sanie, cum quadam insensibilitate; & cum turpi aspectu, in coxis & tibiis frequentius eneniens. Valescus cum etiam Malum mortuum speciem scabiei grosse in coxis & cruribus esse definiat, apud eundem tamen hæc eadem species modò humida est, modò sicca, & ut plurimum ex melancholia naturali adusta, cum admixtione phlegmatis falsi: & ut addit Gordonius, causa huius scabiei est multa comestio ciborum melancholicorum, oppilatio splenis, resectio hæmorrhoidum, menstruorum, & ciborum præter consuetudinem. Et licet communiter secundum Constantinum 7. sua theorica dicatur quòd scabies sit de phlegmate falso mixto cum sanguine cholericò; tamen ista species sit de grosso phlegmate falso, cui miscetur melancholia adusta. Signa iam ex dictis manifestata sunt: est enim morbus cum pustulis & crustis magnis, sædis & aridis, modò cum humiditate, pro eius malitia, vel minus sicca, modò humida, & est cum pruritu. & ut Gordonius dicebat, fit sæpe in coxis vel tibiis. Et quia ab humoribus crassus fit, tardè dissoluitur: ideo morbus est chronicus, nisi citò succurratur. Curatio eius fit digerendo materiam, præsertim hoc modo: R. rad. sænic. petros. brusc. asparagi, graminis, corticis capparis, fraxini, thamarisci ana ℥ ij. conquassentur & temperentur in aceto albo per diem & noctem: tunc R. borag. scabiosa, sumi-terra, lapathij acuti, buglossa, melissa, stæchad. viriusque ana lib. ꝑ. sol. sena, epithymi, polypod. anthos, flor. borag. viol. ana ℥ iij. anisi ℥ j. mell. ros. panis zach ana lib. j. fiat syrup. Vel R. thymi, epithymi, polypod. querc. flor. borag. & bugloss. passular. ab arill. mundat. myrobal. chebul. emblicor. ana ℥ j. succi borag. scabiosa ana lib. ꝑ. mellis ros. lib. j. fiat syr. detur cum aqua bordei, propter hepar, vel cum aqua end. quod melius est. Deinde

Malum mortuum quid.

Cause.

Signa.

Prognostica.

Curatio.

Digestio.

Purgatio.

Topica.

purgetur cum pilulis de fumo terræ: vel cum fumo terræ, polypod. agar. ep. thymo, serâ: Vel cum hiera Russi, vel hiera iopadit. ex his ultimis tres drachmæ dat Gordonius. Et fiat minis sanguinis, iuxta cavillam pedis domesticam (idej. malleolum interiore) de uno pede. Postea fiat hoc balneum: R. absinthij, exiremitatum ebuli, sambuci, rad. iteos, an. q. s. bulliant in aqua; & lauentur crura, & coxa; & ex iisdem pistatis epithimentur loca affecta sub noctem: & postero die eadem aqua abluantur & lauentur, idq. per octo dies continuos. Deinde fiat hoc unguentum: R. sulphuris vini \mathfrak{z} ij. argenti vini extincti \mathfrak{z} i. viridis aris \mathfrak{z} ss. cerusa \mathfrak{z} ij. bene incorporentur, cum oleo nucis, vel cum oleo sem. lini \mathfrak{z} ij. & axungia veteris porcine quart. i. fiat ung. Si autem timeatur sceler sulphuris, eius loco pone storacem liquidam, & folia ficus. & si maior videatur sanguinis repletio, fiat minis sanguinis de basilica virinsque brachii: & uerum purgetur cum pul. diarrhæib, agar. epithymo, cum decoct. polypod. fumo terræ, myrob. indorum. Sciendum autem quod malum mortuum dicatur, quia quasi mortificationem & colorem mortificatum in cruribus & coxis inducit: & cum sit species scabies, uti diximus, ea quæ de victus ratione in scabie præscribuntur, hic quoque observanda. Gordonius corpore purgato stupham fieri iubet multis diebus stomacho vacuo: in qua ponit herbas intrantes in syr. iam superscripto: & in exitu quilibet vice dat aurea alexand. vel theriaca \mathfrak{z} ij. cum vino decoct. fumo terræ. Mulieri autem detur aurea alexandrina solùm: & postea fiant unguenta superius dicta: vel illud quod sequitur: R. succi raphani, spatula scæida, aristoloch. cucumer. asinini, borag. fumo terræ, scabiosa, lapathij acuti ana quart. i. verumque ellebori, sulphuris vini extincti ana \mathfrak{z} ij. pulverizata misce cum prædictis succu, & cum oleo nucum ac cerâ incorporentur, & fiat ung. Sed & hoc probatur in malo mortuo & scabie: R. succi chelidonia lib. ss. axungia porcine antiquæ quart. i. bulliant simul ad consumpt. medietatis succi: & tunc addatur argenti vini \mathfrak{z} i. incorporentur in mortario, & ungantur loca infecta: ac postero die lauentur cum decoctione superscripta. Id quoque notatu dignum, si superenerit ex rheumate, vel scrophulis, vel glandulis, vel splene, vel menstruis repressu, aut hæmorrhoidibus retenti, tunc illa

prius

Cautio.

prius debent curari, & mundificari, & potissimum splen & hæc dicta sufficiant de scabie.

OBSERVATIO XV.

De pernionibus.

QUOD perniones habebat, huic consilium dedimus, ut rapam feruentem contusam imponeret. Vulgares apponunt cutem extractam ab halece fumo induratum, vel pappos contritos ex specie gladioli vel iunci crescentis in aqua, ex quibus pueri fellulas tum alias pro puppis sedes conficiunt.

SCHOLIA.

PERNIONES Græci Chimeila & vulgares apud Italos Chimetla Buganze nuncupant; nostrates idiomate Germanico Cackhielen. Sunt autem ulcera, quæ ex frigore hiberno in digito manuum, pedumq; potissimum contrahuntur: & maxime hic affectus calcaneum infestat. Curantur perniones cum rapo fermenti imposito, ut in Observatione precedenti dictum est, vel cum eiu decocto: curantur & unguibus asini combustis & applicatis: curantur & appposito unguento diapalma Vel R. oleum in quo allia vel scilla decocta fuerint: quibus abiectis oleum cum cera ad ignem misce, & adhibe. Ad perniones ulceratos facit ceratum rosaceum, in rapo ad ollæ similitudinem excavato super fermentem cinerem liquefactum, & impositum Vel R. olei omphacini, adip. taurin. fellis ana lib. ss. argenti spuma ℥ iij. colophonia ℥ ij. mellis ℥ iij. confice secundum artem, & vitior. Ad scissuras calcaneorum (ex Paulo lib. 3. cap. 79.) adipis caprilli, cera, olei ana. vitior. Alumen cum farina ad perniones etiam valet, & malicorium incoctum vino, & in pulnerem redactum, & cum cerato exceptum, & impositum.

Quomodo
curentur
perniones.

OBSERVATIO XVI.

De panaritio, seu Græcorum paronychia.

VXOR Iohannis Aperi consulis Delphensis, cum panaritio in indice laborasset, ac perperam de-

cem diebus per Catharinam in forcipe, sic dictam, medicastram tractaretur, intolerabili cruciatu die noctuque afficiebatur, ita vt tandem in extremitate ipsius indicis apostema effectum fuerit, & vlcus subsequutum immensi doloris, cum febre, angustia, vigilis: insuper totum brachium dolebat ad axillas vsque, cum eiusdem inflatione haud exigua: putabat autem puncturam nerui esse, vnde etiam me ac chirurgum Ysbrandum Delphensem vocauit. cumque 13. die Aprilis primò vocati essemus, (nam per 10. antea dies malè tractata fuerat à muliere illa, sanguinis missione tum reliquis optimis auxiliis prætermisissis) timebamus de spasmò ob ingentem dolorem. Panaritium autem esse cognouimus ex descriptione ipsius Guilhelmi Placentini chirurgi peritissimi, ex eius lib. 1. cap. 31. de apostemate in digitis, quod panaritium dicitur. Est enim panaritiū apostema ex materia cholericà, acutæ & ingentis caliditatis & inflammationis: quæ quidem sua caliditate & ignitione (sic enim loquitur) cum dolore fortissimo est in fine neruorum manus digitorum, & ligamentorum vnguium, cum extremitatibus digitorum, & quandoque vltimum os digiti interficit, & vocatur Germanicè *Den sit*. Signa huius, secundum eundem, partim sunt rubedo vehemens, & acuitas apostematis, & dolor fortissimus, cum pulsatione grandi, & continuus; & ascendit talis dolor per brachium totum vsque ad cor & cerebrum, & multoties accidit syncope & destructio appetitus, &c. Quantum ad curationem, auctores procedunt statim in principio cum phlebotomia & purgatione. Sed quia hæc mulier erat debilis, sanguinem mittere non fuimus ausi, quia iam decem diebus laborauerat, & eodem tempore purgata fuerat cum foliis senæ ex proprio consilio, vt perperam nunc apud multos huius medicamenti vsus frequentissimus est. Isbrandus chirurgus, qui etiam

etiam vocatus erat, vt paulo antè diximus, de frumento proposuit, ad sedandum dolorem; quare hoc quod sequitur vnà præscripsimus, ex foliis viol. maluæ, florum chamomill. meliloti, radicis althææ, sem. althææ, & vermibus terrestribus. Quod si ego fuisset vocatus in principio, post phlebotomiam & vniuersalia remedia posuisset digitum per longum tempus in ovo putrido: id enim plurimos curasse, experientiâ constat. alii eum in musculis putribus tenere, optimo cum successu, & magna cum laude, vt audio. Cæterùm cùm iam apostema perfectum esset, & paruum foramen quasi acu diuulsum in apostemate suppurato appareret, neque materia virulenta exiret, quasi conculcata, vt ibidem fieret incisio, proposuimus, quam nullis modis tunc temporis admittere voluit. Fuisset tamen hoc præstantissimum remedium; sicuti etiam in punctura acus in digito; quemadmodum habemus historiam apud Amatum centuria prima, curatione. 38. Anselmi (inquit) illustris Comitissæ mater, sexagenaria, quum fuisset, pollicem acu prope vnguem pupugit: à punctura multum doluit; febricitabat; non quiescebat; adeò vt per duodecim dies parum aut nihil dormierit, quieueritve. Dolor in vniuerso hoc tempore continuò perdurauit ita intensus, vt parum abfuerit quin ex eo moreretur: ad quam cùm accessissem, penitus locum animaduertens inuenio in ipso pollice inter vtrumque articulum sanien genitam esse; quam cùm viderem, ilicò in loco secari iussi, sanienque pro membri quantitate fluere: à sectione verò optimè manu oleo rosaceo completo inuncta, in ipsoque vulnere immisso linimento ex albo & luteo oui optimè contusis, & splenis debite applicatis, intra 2. horas à doloribus libera fuit, & postea intra paucos dies sanitati restituta. Periculosæ admodum sunt eiusmodi puncturæ; ob quas multi aliquando digitum, aliquando manum, aliquando

verò & ipsam vitam amiserunt. Vnde Galenus hæc sciens, doctè admodum confugit ad sectionem, vt lib. art. parvæ cap. 92. docuit: cum enim nihil expiraret, obæcato cutis vulnere sæpe oritur conuulsio. Aperiendum itaque statim arque exiccandum medicamenti tenui substantia præditis, vt method. 6. & 3. de compos. medic. secundum genus in libri frontispicio latè expressit Galenus. At vt ad nostrā ægram redeamus, illa nullo tamen modo sectionem admisit. idèò chirurgus appaſente illo foramine, vt diximus, cum materia virulenta non exiret, amota pelle puluerem præcipitatum imposuit, & demum amota eschara & crusta impositum est digestiuum, quod habebat paratum ex vna parte mellis, dimidia verò terebinthinæ: cui vitellum oui & pauca farina hordei, cum myrrhæ, adiecta erant. Exteriorem partem digiti, ac conuexam prætenti manus, pro defensiuo, vt conuenerat inter nos, cum vnguento nutrito inunxit. Brachium verò quia dolebat vsque ad axillas, ne fieret spasmus, oleo vermium terreſtr. & liliaceo simul mixtis inunximus. atque ita processimus vsque ad 23. diem Aprilis. Postea cum nondum admitteret incisionem, quam maximè urgebam, adhibuit loco digestiui vnguentum apii seu hyperici, quod propriè educit materiam viscosam ex ossibus, & panaritium per se curat: & est nobile experimentum, non solum ad panaritium, sed & contra vulnera, & omnia vlcera. cuius est hæc descriptio, quæ etiam ponitur in libello quodam Germanico Philippi Harmanii, & conuenit, eodem teste, panaritio, vlceribus digitorum, & in quibus vlceribus vermes latuerint, & potissimum omnibus vlceribus malignis & inueteratis: quam descriptionem falsò sibi Petrus Volckius empiricus iactabundus, tamquam illius author existeret, ascripsit: sed Hugo aromatarius Delphensis, illud oleum in vsu habebat, & conficiebat nostro tempore. estque ar-

canum

canum contra panaritium. fit autem hoc modo: ꝛ.
succorum hypericonis, apii an lib. ij. fenetionis,
vugaribus cruciatæ dictæ, succi millefolij, absinthij
ana lib. j. succi chelidoniæ, persicariæ ana lib. ꝑ. mel-
lis despumati lib. v. olei hypericonis lib. ij. terebin-
thinæ lib. j. farinæ tritici q. saluminis vsti ꝑ. ꝑ. ꝑ. suc-
ci coquantur secundum artem, & reliqua addantur,
& coquantur, vt artis est, ad spissitudinem lina-
menti seu vng. mollioris, & vsui reseruetur. Hoc so-
lo vnguento ipse aromatarius supradictus à pana-
ritio curatus est. Maximo autem successu cum fila-
menti imposuit & noster chirurgus digestui loco
& supra ipsa linamenta peciam vng. Basilico exten-
sam: & interim pro defensiuo, vt diximus, vnguen-
to nutrito partes circumstantes & manum inunxit.
& sic processimus vsque ad Maium mensem. Alii
pinguiusculè solùm Vng. de apio seu persicaria, vel
de hypericone per totum digitum commodè appo-
nunt: quemadmodum & infinitos curauit Theodo-
rus chirurgus Nosocomii Delfensis, qui in inter-
signio quinque annulorum habitabat, vt mihi re-
tulit, absque incisione, ita vt os corruptum aliquan-
do cum solo vng. appposito exierit; & eodem vlcere
repurgato, ad sanitatem panaritium reductum sit.
Postea, pro maiori exiccatione fomento ex salvia,
ambrosiana, hyperico, absinth. centaurea, & simili-
bus in vino rubeo decoctis vsi sumus. Prius itaque
filamenta instar tentarum circumlinita vng. apij
imponebantur: deinde vng. basilicum supra peciam
linum. Circumvicina loca vnguento nutrito in-
ungebantur: sed prius facta fomenta: postea etiam
post omnia iam dicta apposita, etiam panni linei
intincti in fomento, circumligabantur digito: & ita
processit chirurgus. Verum postea, nescio qua de
causa, alius quidam accitus est: & tunc admittens
incisionem, quam nos frustra proposueramus, ab-
lato osse corrupto facilius curata fuit.

SCHOLIA.

Panaritium
quid.

PANARITIVM est aposthema calidum, accidens in summitate alicuius digiti, in latere unguis, cum vehementia doloris & inquietudine & punctura, in tantum ut inducat interdum insomnitatem (ut vocant) vigilias, & similia, ut & multis verbis ostenditur à Valeſco tract. chirurg. cap. 24. & à Gordonio de solutione continuitatis parte 1. cap. 28. de morbis. Est enim aposthema calidum, dolorosum, locum suum habens in radice unguis, aliquando cum ulcere; aliquando cum sanie virulenta, & tunc non caret digiti periculo. Et quia hic affectus est cum saevissimis symptomatibus, oportet chirurgum in eius curatione esse studiosissimum. & ideo primò considerandum num adsit plethora; & tunc fiat phlebotomia & purgatio, si est necessaria. deinde curandum curatione aliorum apostematum calidorum, ut in phlegmone & erysipelate dictum est. Ponenda ergo in principio repercussiva, ut sunt succus sempernina, solatri, & vermicularis: & secundum Auicennam primò ponatur digitus in aceto calido, ex mente Galeni. Si addatur fursus, farina hordei, cum aceto, facto emplastro, pauca adiecta camphora, conferet. Et valet emplastrum mucilaginis psyllij, cum pulvere gallarum & lycij, albumine oui; & valet mucilago psyllij cum psidiis & balanstiis, & emplastrum de sempernina: ista enim sufficiunt ad repugnandum, & alterandam malam intemperiem. Prescripta igitur victuratione, deinde phlebotomia, postea & pharmaco convenienti adhibito, corpore ita mundificato, à principio mucilago psyllij facta cum aqua ros., opio, camphora, & farina hordei & aceto, apponatur, secundum Gordonium. In augmento autem illiniatur locus cum sorditie auris; in statu, cum mucilagine psyllij, vñ cum lacte; & in fine statim perforetur cum acu: & in declinatione medicetur cum farina lupinorum & melle: & si ibi esset ulcus, curetur cum aloë, thure & arsenico. Valeſcus ponit historiam sui ipsius, nempe quòd ipse, cum laboraret panaritio, in principio hoc modo se ipsum curaverit, cum maximè inquietus esset: apposuit lenticulam aquæ tritam, & incorporatam cum aceto & albumine oui, & statim fuit liberatus à dolore: & cum vidisset aliquid saniei sub cute in latere unguis, aperuit cum acu,

Curatio.

In principio:

In augmento.
In statu.

In declinatione.

Valeſcus
quomodo se
ipsum cura-
verit à panar-
itio.

& emisit duas trēsve guttas sauei; & ex toto curatus fuit. Aliqui, eodem authore, faciunt digitale ex cera noua. hoc enim calefaciendo & mitigando sopit ac lenit ex parte dolorem; & valet ante eruptionem & post. & si post eruptionem fiat digitale ex cera vel apostolico, inuat ad retinendum foramen apertum. Si non ita suppuratur citò, hoc maturans apponatur: r. rad. maluanisci incis. & coct. § 1. vitellorum onorum collorum nundu, butyri recentis § i. s. misce, & fiat emplastrum. Si alia accidentia concurrant, ut est vlcus, fistula, esthiomenus, ignis sacer, curentur ut in propriis locis dicitur. Hæc minus mala sunt in prima aut secunda iunctura, alioqui metus est de manus perditione, vel toto corpore; quia digiti manus subsunt emunctoris cordis: attamen cum materia sit exigua, competunt percussina, quæ sub axillis non competerent. Ad morbos unguium tum vitia pertinent non solum paronychium, sed & spasmi, leprositæ, virginitum, albedo maculosa, fœda citrinitas, scissura, & similia, ut Gordonium dicebat. Si fissura adest, liniatur cum mastice soluta in oleo sisamino. Si spasmus, citrinitas, & leprositæ in unguitibus, corpore à melancholia mundificato, iungatur cum adipe gallinæ, & oleo sisamino; deinde radatur cum vitro, deinde emplastrety cum semine lini & gummi enpresfi. Et si volumus ut unguis cadant, iungantur cum oleis & allio, aut cum sulphure, arsenico, & aceto. Et si ex attritione sanguis niger mortificatus fuerit subius unguem, perforetur suauiter unguis cum acn, & emittatur sanguis, deinde fomentetur cum vino albo & chammomilla. Et si in unguitibus fuerit albedo enormis maculosa, liniatur cum nucæ cypressi & farina lupinorum, & aceto. Et si sit citrinitas, fiat cum aceto & oleo de eruca. Paronychium corruptum nomen esse videtur: nam Græcis Paronychia appellatur: sed & redunia dicuntur: de quibus sic Paulus scribit: Redunia, Græci paronychiam appellant, abscessus est qui ad redunia unguis coit: cum parua adhuc est, & prima habet rudimenta, galla cum melle eam reprimis & confirmari prohibet; vel Misa pastillus, vel iris ex aqua. At ubi caro iam præter naturam excreuerit, eò curatio dirigenda est, ut per rodenia medicamenta absumatur rumpaturq;: valet autem ad redunias, tum aurium sordes, tum lycim: suppuratis autem reduniis, acn adacta hu-

Quæ ad morbos aut vitia unguium pertineant.

Paulus ad unguium vitia & de reduniis lib. 3. cap. 81.

morem

morem emittere, spongiamq; aqua imbutam imponere oportet; vel lenticulam illinere, cum aqua tritam, aut palmulatum decoctum cum vino: vel rosas viridibus vel siccas, aqua respersis tritisq; utemur: quin & polenta cum aqua efficax est redimnis; ac etiam lapidinum farina, melle vel mullio mactata. Exulceratis redimnis opitulatur hoc medicamentum: Aeruginis, argenti spuma ana ℥ iij. sarcocolla tantundem, super linamentum ex vino & spongia imponitur. Convenit autem etiam in undignaque ab ungue diducere. Pterygion carnis incrementum est, aliquam unguis partem operiens sit autem in pedis & maxime in principibus pollicibus: in pedibus quidem ex illorum offensione plerumque; in manibus autem ex neglecta redimnia. aut alia huiusmodi causa: adversus quam antipigmentum & magna pari pondere spargitur: super autem, linamentum ex vino spongiq; imponitur. Aliud: Chalcididis squama, malicoriana par. aq. excipiuntur siccis tostis & melle parte affecta, spissamentorum decocto prius delibuta. quod autem siccum est in ungue, circumcidito. Ad digitorum pterygia putrida, itemque ad pudendorum ulcera: R. lachryma thuris, squama ana ℥ i. arg. rasa ℥ iij. mellis cyathus: terantur in sole, donec insit flarescant, & loco vino prius delibuto per splenium inducuntur. Eadem subito exiccans persanansq;: Soryos combusti, thuris ana ℥ ij. argin. rasa ℥ i. cum melle contrita ipsi pterygio inducantur. Valeri etiam ad reliqua maligna horum locorum ulcera, nigritias & puiredines. Vel squama aris, palmularum carne excepta, aut scorum vitior. Vel columba stercus cum polenta ex pulso coctum petrivinūq; calens imponitur. item squama per se inspersa, pterygia desiccant. Oportet autem crebro angulum unguis pterygion pungentem, ne increseat, scalpello superimmissio, adimere. Ad ungues contusos: Myrti & mali punici foliis teneris ungues illi ito. Ad cruentos ungues: Farina pice mista imponitur. Ut ungues qui laboraverint abscedant: Sulphur trium adipe suillo exceptum iniicitur. Ut scabri ungues abscedant: Visci quercini, sandaracha, scammograti, singulorum pondus sextans: cantharidum, thapsia, singulorum uncia, aceti quod satis est. Vel propolis Assica, cera, bituminis ana ℥ ij. sulphuris ignem non experti ℥ i. oleo non inquinantur: in usu calefactum unguibus illinuntur. Vel picis liquida

Medicamen-
valens ad
viceratas
redimnas.

Ad ungulum
pterygia.

Ad digito-
rum pterygia
putrida.

Pterygia
exiccantia.

Ad ungues
contusos.
Ad cruentos
ungues.
Ut ungues
qui labora-
verint, abs-
cedant.
Ut scabri un-
gues absce-
dant.

da. cera, colophonia, terebinth. gutta ammoniaci, sulphuris vini,
 aphronitri pares portiones, ne manus inquinent. Aliud, quod
 separari scabros vngues, sine exulceratione: Bituminis, autipig
 sandaracha, sulph. vini ana \mathfrak{z} iij. resina excipio, & visor;
 dissolvens per dies septenos. Aliud. Erui farina, felle ouillo, vel
 urina ouilla imbuta visor: vel calce vina cum oleo, vel chia
 cum opobalsamo, vel visco, atramentum suorum, sulph. urque
 vinum, quod satis est, exceptum, pelli illum superinducto: vel
 herba pedicularia cum aceto trita visor, vel resina terebinthina
 \mathfrak{z} iij. sandara. ha \mathfrak{z} ij. simul radici vngui imponitur, diligen-
 terq; fascia illigatur. Cum autem vngui exciderit, ceram myr-
 rentem, cui paululum medicamenti ex resina adiectum sit, super-
 accommodatur. Atq; hac sunt quæ de tumoribus præter naturam
 dicenda habuimus: nam quamvis aliqui tractationem de Lue Ve-
 nereæ huc pertinere censcant, tamen nos illam plurimam ob causas
 separatim edendam esse indicauimus. Et ita hos quinque libros
 Chirurgicos, Summi Dei auxilio absoluiimus, ipso anno 1570,
 die 21 Septembris, cum rest. Gallicana cessante bello intestino,
 pacem inisset, ut pro certo ferebatur. Faxit Deus opt. max. ut
 omnia talia bella a nobis absint quam longissimè.

Separari
 scabros vng-
 ues sine
 vlcatione

FINIS LIBRI QUINTI ET VLTIMI
 Observationum & Curationum Chirurgicarum
 de tumoribus præter naturam.

IN-

INDEX RERVM MEMORABILIVM, quæ his quinque Libris Obseruatio- num Chirurgicarum continentur.

A.	Alphos. 418. albus. 418. niger. 418. 432
A bscessus vis. 2. eius defi- nitio. 2. futuri signa. 10. notæ iam facti. 10. prognos- tica. 11. quomodo aperia- tur. 21	Althææ vires. 349
Abcessus qui facillè conco- quantur. 11. qui terminentur maximè per resolutionē. 11	Aluminis vis. 259
Abcessus suppuratio. 22	Amari historia, de herpete mi- liari, 157. de lepra Græcorum, & psora. 397. de liche- ne impetigine. 182
Abcessuum puruliforum dif- ferentia. 257. eorum causæ. 257. curatio. 258. materia. 258. prognostica. 258. signa. 258. eorū enumeratio. 252	Ambustio, & quomodo cure- tur. 190. 191. 192. 193
Abcessio membri quo modo fiat. 97. quæ in ea conside- rantur. 97	Aneurisma, & eius exempla. 105. differt à varice. 106. quid sit. eius causæ, signa, prognostica, & curatio. 107
Aceti vis. 218	Angliæ reges strumas curant. 295
Aceti usus in scirrho. 326	Aniprutilus. 416
Acrochordon quid. 399. eius curatio. 407	Anthrax. 71
Adriani Dodonii vxor ab am- bustione curata. 190	Antispas. 17
Aduentia medicamenta. 73	Apercio abscessus suppurati, & quid in ea spectandum. 22
Ægyptiacum vnguentum. 96	Apercio œdematis. 122
Ægris delectus. 128. præpara- tio. 128	Aphorismi curationem gæ- græ concernentes. 101
Æruginosa bilis. 118	Aphorismi septem, curationem erysipelatis, complectentes. 134
Ærugo, & eius vis. 407	Aphionitri vis. 218
Affectus animi. 322	Apii vis. 76
Albasas. 418. eius curatio. 424	Apollonii medicamentum. 141
Alchymistarum, quorundam error. 429	Apostema. 2. quid sit, & eius species. 3
Aleyda Iodoci pestilenti bu- bone laborans, curata. 83	Apostema aquosum in pede. 230
Alhasaphum Arabum. 188	Apostema calidum. 1
Alopecia, lepræ species. 361. eius signa. 368. 369. curatio. 386	Apostema circa ventriculum curatum. 5
	Apostema durum lapideum, sem scirrhosum in femore, crure & genu. 312
	Apostema intercutaneum, Ha- liabati. 235
	Apo-

Apostema ventosum. 4. 114
Aqua calida adulti quomodo
cruentur. 196
Aqua coaceruata intra calua-
riam. 138. sub caluaria. 138
Aqua contra guttam rosa-
ream. 165
Aqua extra cranium Auicen-
ne, quid. 235
Aqua frige facit. 138
Aqua mirabilis ad omnem
scabiem & reliquas crusto-
sas morbi Veneti. 478
Aqua tubedinem faciei & pu-
stulas auferens. 166
Aquæ aluminosæ vis. 159
Aquæ falsæ perfusio vbi &
quando conferat. 73. 95
Aquarum naturalium vsus. 378
Aquosi tumores cutati. 232.
 vide Tumores.
Ardoris mitigatorium. 134
Argent. viol. noxa in vngu-
entis. 478
Atiobarzanum emplastrum.
 440
Atinoglossæ vires. 73
Arsenicum. 73. eius vis. 284.
 quæ copia sumi possit. 284
Arsenicum sublimatum. 346.
 eius vsus. 96
Arsura vt curetur. 302
Aschachilos quid. 90
Ascites ex seroso recremento.
 232. generatur à maiori sili-
 giditate, quàm tympanites.
 232
Atheroma quid. 296. eius cau-
 sa. 296. curatio. 299. eius cu-
 rati aliquot exempla. 295.
 signa. 297
Attrahentii tumores. 309
Attra bilis, & eius differentia.
 Vide Bilis atra.
Attrahentia medicamenta. 75
Attritio. 263
Auellanæ nucis medulla cas-
bunculos maturat & rum-
pit. 74
Auicennæ emplastrum ad stru-

mas. 165
Augustinus Teylingius ab am-
bustione oculi curatus. 190.
pustula sub genu laborans,
& curatus. 449

B.

BALNEI vsus in scabie. 482
Biliofi tumores. 115
Bilis. 117. quid sit? 117
Bilis atra, & eius differentia.
 309. 312. 314. exquisitè
 atra. 314. ex aduisione alio-
 rum humorum. 315. atra
 per congelationem & indur-
 rationem. 316. ex admixtio-
 ne. 316
Bilis ctocea. 118
Bilis duobus modis deficit à
sua natura. 118
Bilis flaua duplex. 117. natu-
 ralis. 117. non naturalis. 118
Bilis porracea. 118. quo modo
 gignatur. ibid.
Bilis vitellina. 118
Bocium. 256
Bocium gulæ, & eius exempla.
 302. 303
Bombardatum cõbustio quo-
modo curetur. 200. 201
Bronchocele. 256. eius exem-
 pla aliquot 302. quid sit.
 302. eius causæ. 303. signa,
 prognostica. 304. curatio.
 305. 306. 307
Bruni emplastrum ad strumas.
 265
Bubo, in inguine tumor, quo-
modo curetur. 65. 257
Bubones suppurati cur trans-
uersim secentur. 22
Butyræ vires. 100

C.

CACOCYMEA. 17
Calida repellentia quæ. 19
Callus, & eius curatio. 413
Cancer, & eius descriptio. 335
 ex quo humore gignatur.
 335. cum vlcere. 335. sine
 vlcere. 335. quibusdam Lu-
 pus vocatur. 349. mitiora
 semper

- remedia spernit. 346. quare hoc nomen habeat. 335. nō temerē secandus aut vrendus. 342. signa & curatio. 336. 338. 339. 340
- Cancer non vlceratus in mamilla. 328
- Cancer non vlceratus quid distet à scirrho. 329
- Cancer vlceratus in mamilla. 344
- Cancris exulcerati exempla. 318. eius causa, signa. 338. curatio. 345. 346. 347. quādo vltionem aut scctionem desideret. 347
- Cancris nomen ad duo morborum genera extenditur. 335
- Cancris qui radicitus tolli debeant, qui non. 338
- Cancris radices quæ. 338
- Cancris quibusdam duntaxat adblandiendum. 347
- Canon obseruandus in morbis melancholicis. 347. in omni erysipellate. 125
- Cantharidum vsus. 346
- Caprillum stercus. 364
- Carbo pestifer. 71
- Carbunculus, alius simplex, alius malignus seu pestifer, & eius exempla, notæ, & curatio. 71. 77. 84. 85. non pestifer, in nate, curatus. 70. sine pustula, & cum pustula. 72
- Carcinoma. 347. & eius extincti nota. 347. vide Cancer.
- Carnes melancholicæ. 312
- Castratio elephantiasin curat. 377
- Cataplasma commune in omni phlegmone. 47. ex atraglossa 73. Galeni, ad induratos tumores, 54. Galeni, ad scirrhos. 324. Halliabbatis. 47. mali punicii. 348
- Causæ summorior. 40
- Causica medicamenta varia. 244. sensum adhibenda, &
- interquiescendum. 244.
- vsus eorum in bronchocle. 307.
- Cautistici trochisci. 96
- Cauticum ex calce & sapone. 284
- Cautio in abscessum ruptione 50. in ambustis. 195. in malo mortuo. 487. in phlegmone curanda. 44. 48. in scabie. 482
- Celsi medicamentum ad impetigines. 181
- Cenchrias herpes. 144
- Ceratum erysipelatosis commodum. 132. ex ætippo. 127
- Iohannis de Vigo. 131
- Chimæila. 487
- Chirurgi officium est, in his quæ ad phlebotomiam & purgationem attinent, nihil attentare, citra medici consilium. 130
- Chorades, seu scrophulæ quomodo curentur. 109. 255
- Xuysdæ. 276
- Xuysdæ. 255
- Cicatrice ut pulcræ remaneat post combustionem. 100
- Cirones 180. eorum remedia. 190
- Clauus, quid. 400. eius remedia. 407. 412. in digito pedis curatus. 411
- Clysteris vsus in erysipellate. 131
- Coctura, vel adustio ignis quomodo curetur. 196
- Critus cū leprosis noxius. 387
- Cōbustio, & eius curatio. 183
- Compressio & attritio. 263
- Concoquentia medic. 121
- Congestio, tumorum causa. 6
- Consolidæ maioris vis. 76
- Constantini Imp. leprosi diæum. 390
- Cornelia Teylingia à ganglio curata. 266
- Corrosio qui fac. 283
- Corruptionis signa. 10
- Cosm.

Coss. 442
 Crocea billa. 118
 Croci vites. 11
 Cruor humanus elephantiafin
 curat. 390
 Crus erysipelatosum, cura-
 rum. 127. scirrho legitimo
 laborans. 310. serpigine at-
 que impetigine affectum, cu-
 ratum. 170
 Crusta quando resoluta. 125
 Crustæ morbi Gallici vt tol-
 lantur. 478
 Crustas à partibus exustis sol-
 uentia. 99
 Cupressi vites. 108
 Curandi optima ratio. 10
 Cutis capitis exulceratio. 180
 Cutis descædatio maculosa. 416
 Cutis rubores & infectiones
 quomodo tolli debeant. 178
 Cutis sola in herpete exulcera-
 tur. 146
 Cydoniorum muccilago, &
 eius vis. 101
 Cyriacus Marchæ erysipelate
 puro laborans, & curatus.
 121

D.

DIGERENTIA quæ.
 12. 166
 Diachylon. 164. 166
 Diapalma, vnguentum. 193.
 166. 181. 341
 Diaphœnicine. 341
 Diapompholygos descriptio.
 341
 Diastichium. 180. empla-
 strum. 440
 Digerentia in augmento vinci
 debent à repellentibus. 41
 Digerentia per halitum. 260
 Digestio in phlegmone. 59
 Digatorum pterygia quomodo
 curentur. 494
 Dionysia medicamentum. 48
 Discussio quid fiat. 164
 Discussoria medicamenta.
 142. 305
 Dissolutionis tumorum indi-

cia. 9
 Dolor à combustione vt mi-
 getur. 194. in phlegmone vt
 leniatur. 11
 Doloris mitigatorium. 134
 Dothien quid? & eius curatio.
 67. 68
 Drageta coctionem adiuuans.
 116.
 Dropacia vsus. 376
 Dubleti pituitosi. 151
 Durities in particulis causa.
 319
 Durities reliqua in curatione
 tumoris, quomodo tollatur.
 54
 Durities scirrhosa sub poplite,
 curata. 308

E.

ECCHYMOMA, seu descædatio
 cutis. 456
 Ecphyma quid? 450
 Ecchymata quæ? 87. 147
 Eleæuario de succo tofato non
 temere in erysipelate valde
 calido vtendum. 129
 Elephantia. 361
 Elephantiasis Arabum, & eius
 exempla. 350. notæ ac signa
 & curatio. 351. & seqq.
 383. 384. & seqq.
 Elephantiasis Græcorum. 360
 Elephantiasis quibus differat à
 cancre. 361. eius causæ pro-
 cata. 363. coniunctæ. 363
 signa. 364. signa æquivoca.
 365. signa vniuoca, & alia.
 365. 366. cur incurabilis.
 369
 Elephantiasis quâtdiu vocan-
 da recens. 371. eius curatio.
 371. 372
 Elephantici cuti extra pomæ-
 ria vrbium ablegentur. 365
 Emphysemata. 4
 Emplastrum Auicennæ, discus-
 tiens aquosos tumores. 133
 è cupresso. 108. Galeni. 44.
 Guilielmi à Saliceto. 100.
 Rhafis. 110
 à 2
 Ephelis,

Ephelis, & eius cura. 435
Ephelis. 189
Epinyctis, & eius exempla. 109
 eius signa. 110. curatio. ibid.
Epithymi vis. 339
Erysipelas, & eius exempla. 112.
 eius causæ. 116. quid sit.
 115. exquisitum. 115. exul-
 ceratum. 116. legitimum
 seu verum. 119. non legiti-
 mum, & eius species. 116.
 119. phlegmonosæ. 116.
 ulcerati causæ & remedia.
 119. 120. 134. quæ æde-
 marode, eiusque exempla.
 115. simplicis origo. 120
Erysipelas in crute. 127
Erysipelas sequitur motum
 testium febri. 124
**Erysipelatis curatio particula-
 ris** 126. 128. vniuersalis. 128
**Erysipelatis puri exempla va-
 ria.** 120. signa. 121. 123.
 prognostica. 123
Esse, vel faire quid? 110
Esthiomenos. 190
**Esthiomenos Auicennæ, &
 eius exempla.** 101. 103
**Eua Teylingia à scabie diutur-
 na curata.** 466
Euaporantia medicamēta. 333
Exanthemata. 147
**Excoriationis remanentis post
 combustionem curatio.** 195
**Excrecentia magna, coræ
 adnata, curata.** 149. 250
Excrecentia phlegmatica. 251.
 in collo nata. 245
Excrecentia medicamenta. 301
Exinanthio quot fiat modis.
 241
**Exitus, 3. earum mox futura-
 rum signa.** 10
**Experimentum à ratione na-
 turali inuentum.** 143
Experimentum in ambustis. 196
**Exulcerata loca quibus inun-
 genda.** 149

Facies lentigo curata. 436.
 impetigo. 173. pannus.
 433. pustulæ. 442. rubor.
 165 166
**Femina minus apprehendun-
 tur lepra, quam viri.** 370
Femoris ædemata curatum. 214
Fetida lora Italis quid? 188
Fiatulenti tumores. 224
Fluxio. 7. quibus prohibeatur.
 39. 48. eius causæ coadiu-
 tices. 16
**Formica, quis affectus apud
 Auicennam?** 143
**Fornicari non licet, ut pitul-
 iam cura.** 390
**Franciscus Teylingus, à phle-
 gmone illegitima curatus.** 55
**Frigida medicamenta qualia
 sint, & quid efficiant in ru-
 moribus.** 18
**Fugilla, apostema glandulo-
 sum.** 257
Furunculi, qui, & curati. 67.
 68. 69.

G.

**GALLIARVM Reges diuino
 quodam munere strumas
 curant.** 195
**Ganglium, seu Γάγγλιον Græco-
 rum, quid.** 252. 267. 209.
 254. eius notæ, seu signa &
 causæ, 267. prognostica.
 268. curatio, & curati ex-
 empla varia. 268. 266. na-
 turam canceri interdum re-
 fert. 267
**Gangrena. 90. eius descriptio,
 signa, & prognostica.** 92. 93.
 eius curatio. 94. 100. in
 sphacelum abiens, quo mo-
 do tractanda. 98. 87. pessi-
 mus tyrannus. 90
Gangrena ex frigore. 95. ex
 obstruptione. 96. ob vasa
 magna incisa, vel siccitatem.
 95
Gargarismatum vsus. 306
Genus apostema ventosum, cu-
 12.

ratum.	224.	le.	140
Gisbertus Hostius, medicus insignis.	179	Herpes cenchrias.	144
Glandula qualis affectus. 209.		Herpes miliaris. 144. eius ex- empla. 153. 154. causa, signa, prognostica & curatio. 156. 157. medicamenta exigit bilem & pituitam educentia. 147	
Auicennæ eadem cum ganglio. 252. à putrare ciceris, usque ad magnitudinem melonis, secundum Rhasium. 253. Fernelio quid significet. 253. quid Guidoni. 252. curatæ exempla. 261		Heutera, matrona nobilis, à maculis plùbeis curata. 414	
Glandulæ inflammatio. 66		Hidra, seu sudamina quomodo curanda. 188	
Gordonii historia. 363		Hydrelæum quid. 133	
Gosium. 303		Hydrocephalon quid. 235. eius causæ variz. 236. 237. materialis. 238. prognostica. 239. eius curati aliquod empla. 234. 235. curatio per dictam solam, & absque chirurgia. 240. 241	
Guaraci usus in elephanta. 377		Hysteryami vires. 33. de eo nota. 53	
Guisonis error. 146		Hypopia. 437	
Guilhelmi de Berendrecht filia curata à lichen.	437	Hypofarca. 209	
Guilhelmus Brasserus ganglionà laborans. 87			
Guilhelmus Melissæus, seu de Bre, lichen laborans. 185			
Gulæ hernia. 302			
Gutta rosacea. 164. 165. 445. eius remedia. 165			

H.

HAIRWORM, lichenis species. 185
Hali-abbatis emplastrum. 264
Hemina quantum capiat. 141
Henricus pictor à carbunculo pestifero curatus. 77
Herba Roberti. 349
Hernia gulæ. 302
Herpes. 139. & eius descriptio, species ac differentiz. 139. 140. & seq.
Herpes ethiomenus, eiusq. exempla. 139. eius species duæ 143. exedens seu depascens dictus Latine. 143. 119. eius causa, signa, prognostica, & curatio. 149. 150. 151. 152. 153. exulcerati exempla aliquot. 150. quibus differat ab erysipellate ulcerato. 145. 147. medicamēta exigit cholagoga. 147. folius curis est exulceratio. 146. oris à valde tenui bi-

IACOVS Forestus à clauo in digito pedis curatus. 412
Idus venenosus, ganglionæ sæpe est causa. 95
Ignis ambustus curatus. 192. 196. 200
Ignis sacer. 143
Ignis Sancti Antonii. 90
Ignis Sancti Marcialis. 90
Impetigo, & eius curatæ exempla. 167. causæ 171. 186. prognostica. 186. signa alia. 172. 173. curatio. 173. 175. 186. remedia alia. 165. 176. species variz. 169. 181. species deteretima quæ. 391. vera quæ sit. 168. Unde sic dicta. 171
Incisionum diversi modi. 243
Indicatio à partibus desumpta. 15
Indurationis notæ. 10
Infantium in utero materno positura. 236
Inflammatio, & eius differentiz

eiz varix. 118. in varilis corporis partibus oborra, & curata. 14. 25. 26. & seqq.

Inflammatio generatim accepta, quid significet. 31

Inflammatio magna, & spe gangrænz causa est. 95

Inflatio. 224. eius & œdematis differentia. 224. inueterata ut curetur. 223. notæ eius, prognostica, & curatio. 225. 226. unde fiat. 226

Inflatio in artubus, musculis & membranis, ex contusione, quomodo curetur. 227

Iohannes Heuterus apostema, teſturæ laborans, & curatus. 11. impetigine laborans, & curatus. 167

Ionhi. 442

Iordanus Forſſtus à vetrucis curatus. 398

K.

K'H'AH nomen commune plurimistumoribus. 301
Kneipſe. 168

L.

L A C E R T A caput, & eius vsus. 407

Laminæ plûbez vis. 263. 348

Lanæ succidiz vsus. 227

Lapidei tumores, & eorum emollio. 312. 313

Laurentius Bruninck, chirurgix doctus. 280

Lenticula, & eius cura. 435

Lentigo. 434. eius causæ externæ & internæ. 434. signa & prognostica. 434. 435. eius curatæ exempla varia. 433. 436

Lentigo faciei curata. 436

Leonina lepra. 361. eius signa, 367. remedia eius. 384

Leontiasis. 360

Lepra, *Atrope*. 168. eius differentiz. 360. 361. quid sit. 168. 169

Lepra Arabum. 350. 360. præſeruatō ab ea. 379. 380

Lepra Græcorum, & eius cûſura. 391. 394. 395

Leproſorum accidentia externa. 387. 388

Leproſorum maculæ ut tollantur. 165

Leuce. 418. eius cura, ſecundum Græcos. 430

Leucophlegmatia. 209. 231

Lichen, & eius differentiz. 168. 178. cum vlceratione ſordida intercutanea, curata. 178.

eius ſpecies, & exempla. 185 Græcorum. 168. quæ ſpecies eius fuerint Græcis & Romanis cognitz, & quæ poſtea iſtreperint. 182. eius curatæ exempla. 437

Lichene quid? 169

Ligamentorum ſcithroſorum cutis. 326

Ligaturæ vsus in ſtrumis. 285

Linacum vires, & emplaſtrum ex eis confectum. 265. 322

Linimentum Hali abbatis. 43

Liſor ſi membrum quodpiam occuper, quid faciendum. 134

Lupia, glandulæ ſpecies, apud neotericos. 253. magnam ſimilitudinem habet cû ganglio Græcorum. 253. 269. quomodo curati debeat. 265

Lupus morbus. 253

M.

MACULÆ. 3415

Maculæ cholericæ ut tollantur. 166

Maculæ cutim viſitantes. 415

Maculæ cutis plumbez curatæ. 414

Maculæ leproſorum ut tollantur. 165

Maſter Iodocus, chirurgus Ducis Philippi. 201

Maluz vis. 349

Malum mortuum. 485. 418. quid ſit. 485. eius cauſa, ſigna, prognostica, & curatio. 485. 486

Mammillæ cancer periculofus. 344

Man.

Mannæ thuris vsus post incisionem. 23
Margareta Susia à pustulis aquosis curata. 188
Margareta Teylingia à scabie curata. 458
Marcelli compositum, ad ambusta. 193
Matiscarum prouocatio sæpe utilissima. 374
Masticatoria. 280
Materiæ ad interiora recursus. 54
Matricis pruritus curatus. 456
Maturantia medicamenta. 221. 265.
Maturatiuum Auicennæ. 76
Maxillæ nimia rubedo ut tollatur. 166
Melancholia 309. ea quatuorplex. 309. 310. 311. naturalis. 309. non naturalis. 314. non naturalis est rursum quadruplex. 314
Melancholia quatuor tumorum differentias facit. 316. vacuata est ex intervallo. 348
Melasma. 437
Meliceris, & eius exempla aliquot. 295. quid sit. 297. eius causæ, signa, & curatio. 297. 298. 300
Melleus nodus. 251
Membri alicuius abscissio quomodo administranda, & quid ante eam considerandum. 99
Membri alicuius liuor quid indicet faciendum. 134
Memphicum vnguentum, utile ad palliandam lepram. 390
Mentagra. 180. propriè dicta, quæ. 183
Miliaris herpes. 147. vide Herpes.
Mixtionem membri alicuius quæ dissoluant. 92
Mollitorium medicamentum, ad ganglia, & alios duros tumores. 269
Molopæ. 437

Monialis quædam à phlegmone illegitimè curata. 16
Montani vnguentum ad psoriam & lepram Græcorum. 396
Morbilli ex herpetum sunt genere. 147
Morbus diui Lazari. 360
Morphea, & eius curatæ exempla aliquot. 416. eius quot sine species. 416. quomodo cõueniat cū lepra. 419. quo differat ab ictero. 417. remedia eius. 420. 421. 424
Morpheæ alba curatio. 426
Morpheæ nigra curatio. 428
Morpheæ rubra curatio. 426. 445
Morificationis alicuius partis causæ tres. 92
Mundificatiuum ex apio. 76
Musculi cum inflatione dolentes ex contusione, quomodo curentur. 227
Mylires lapis. 326
Myrmecia. 400. earum curatio. 407. mira curatio alia. 408. confunduntur ab Auicenna cum herpibus. 146
N,

NARIVM oppilatio ut deobstruatur in leprosis. 389
Nasi rubedo ut tollatur. 166
Napta, idem quod Nata. 256
Nata, excrescenzæ species. 256, ad steatoma spectat. 256. tumor pituitosus. 209
Nauta ab apostemate circa ventriculum curatus. 5
Nicolaus Nielzon à phlegmone curatus. 25
Nigra, species impetiginis. 181
Nobilis quidam à futunculo curatus. 67
Nodus, tumoris species. 251. 256, adipinus 251. Auicennæ quid significet. 256. melleus. 251. quomodo curetur. 261
Nolime tangere, qualis sit passio. 161. eius exempla. 161. 163

I N D E X.		
Numannus quidam ab impetigine faciei curatus.	173	sale. 321. eius vis. ibid.
O.		Oxyerati vsus. 42
OCCASIONIS inuentio, principium curationis tumorum.	15	P.
Odoramentum.	242	PANAX ET IVM quid. 488.
Oedema, O ſ ſus, quid.	210.	491. 492. quomodo curatur. ibid.
212. duplex, verum & illegitimum. 210. eius causæ. 212.		Panis genera quatuor apud antiquos. 73
iudicia seu prognostica 213.		Panis optimus quis. 322
signa alia. 212. scopi eius curandi. 217. cum adhuc gignitur, quomodo cutetur. 217. inueteratum quomodo cutetur. 217. remedia eius varia. 213. eius curati exempla varia.	203	Panus quid? 61. eius causæ. 61. signa, prognostica, & curatio. 62
Oedema compositum vt curatur.	223	Papula scia. 144. simplex. 144
Oedema illegitimum curatum in diuersis.	214	Papulæ sudorum. 188
Oedema morbus.	213	Papularum eruptiones. 147
Oedema verum, curatum.	214	Paronychium quid? 488. eius curatio. 492. 493
Oedema verus aut inueteratum vt curandum.	222	Parotides. 438. earum curatarum exempla. 439. biliosæ, & earum curatio. 440. oedematosæ. 440. sanguineæ. 439. scirrhosæ. 440
Oedema, vt symptoma, seu accidens, quibus maxime accidat. 210. 223. quomodo tunc curandum.	217	Pars iucisæ quomodo tractanda. 23
Oedematis & inflationis differentia.	224	Pauli medicamentum ad strumas maturandas. 265
Oedematis initio seu principio quæ medicamenta conueniant. 220. quæ eius incremento. 220. quæ statui seu vigori; & quæ eius declinationi.	221	Paupercula quædam ab apostemate calido, casu curata. 1
Oedematosi tumores varii curati.	209	Peccatum non committendum, vt corpus sanetur. 390
O ſ ſi vi.	227	Pedis apostema aquosum, curatum. 230
O ſ ſus iduatus.	212	Pelioma. 437
Oleum vsus.	322	Penis pruritus. 456
Oleum mirabile ad scrophulas.	294	Perniones quomodo curentur. 487
Oliua, mulier, excreſcentiam magnam coxæ adnatam habens, curata.	249	Petrus Florentius, laborans malo quodam, Noli me tangere dido. 161
Oſſum ſideratio.	90	Phagedæna curata. 119
Oxalac, O ſ ſus, ſit ex aceto &		Phlebotomia an in herpete conueniat. 157. eius vsus in phlegmone. 58. in scabie. 474. vsus eius in eryſipelate. 129
		Phlegmone, eius generatio, & quid ſit. 16. eius curatio, cū maximo dolore affigit. 55
		Phlegmone illegitima, & eius aliquot exempla. 55
		Phlegmo-

Phlegmone in incremento
quæ remedia desideret. 40.
in statu quæ. 44. quæ in de-
clinatione. 45
Phlegmone si in abscessum
abeat, quid agendum. 42
Phlegmone varis corporis par-
tibus oborta. 24
Phlegmones curandæ inten-
tiones quatuor. 40. curatæ
aliquot exempla. 37. 38. 39
Phlegmones duplex acceptio.
31. causæ. 33. eius nomen
apud medicos & chirurgos
duo proprie designat. 31. pro
phlogosi acceptio. 31
Phlegmones erysipelatodis cu-
ratio. 116
Phlegmones veræ ac legitimæ
indicia. 34. prognostica. 35.
quatuor tempora. 35. reme-
dia cum adhuc generatur.
39
Phlegmones scirrhoræ seu in
scirrhum mutatæ exem-
plum. 314
Phlogosis, quid. 31
Phlyctænx, 211. earum exem-
pla. 159. curatæ in terminis.
160. in infantibus curatæ.
60
Phlyctides. 159
Phygelion, & eius causæ. 61.
sub aliis obortum & cura-
tum. 61
Phyma quid proprie sit. 65.
quomodo discutiat, rum-
patur, aut aliter curetur. 66.
varia eius curati exempla.
64. 65. venitem inferiorem
infestans, curatum. 63
Pincium vnguentum. 164
Pinnæ vsus in curandis myr-
meis. 409
Pituita, 210. eius species octo
Autemæ, quatuor Hali-
ebbari, dux Galeo, 211.
quomodo & quando à na-
tura sua degeneret. 211. sem-
per fit à frigidityte. 208

Pituitosi abscessus, & eorum
enumeratio. 252. curatio.
258. 259. 260
Pituitosi tumores. 209
Planta noctis, pustularum spe-
cies. 188
Plethora. 17
Plumbi vis mirabilis in can-
crois tumoribus. 342
Potracea bilis. 118
Porrus, tumor. 399. quomodo
à verruca differat. 399. 400
Posca aquosa. 210
Posca quid propriè? 149
Portio tribus consideratur mo-
dis. 242
Potus erysipelate laborau-
itum. 229
Præceptum commune in om-
nibus morbis melancholi-
cis. 376
Prætor Carthusianus glandulam
in fronte habens. 262
Prutigin qui maximè ob-
noxii. 464
Pruritus quid. 453. eius causæ.
454. signa, prognostica, &
curatio. 454. 455. 456. 189
toto corpore molestus, cura-
tus. 453
Psora, 462. 168. 169. quid
proprie significet. 184. quo-
modo curetur. 395
Psylli gens, quæ vulnera ex
morsu serpentium illata in-
nocuè exugebat. 76
Pictygia vnguentum quomodo
curentur. 494. quomodo
exiccantur. 494. 495
Pudendi ganglion. 269
Puerulus à phymate curatur.
63
Puuctis tormentarii flammâ
adusti quomodo curentur.
196
Pulvis ad bronchocelen &
gutturatos. 306. ad strumas
efficacissimus. 295
Punici mali vis. 74. 148. ex co-
cataplasma. 74. 148
k
PUL

Purgatio in erysipellate com- moda. 131. in phlegmone quem vsum habeat. 58. quē vsum habeat in gāgrā. 94	17. 16
Pus mouentia quæ. 46. quale optimum, aut deterrimum. 11	148
Pusca idem quod Pusca. 149	Reprimentia herpetibus ex- edentibus accommoda. 148.
Pustulæ, & earum differentiæ. 3. 450. causæ, 451. choleri- cæ, & earum remedia. 166. 190. leproforum quomodo curentur. 388. liuentes. 110. malæ & biliosæ. 143	in augmento præpollere de- bent digerentibus. 41. in- commoda sunt, vbi multus est vitiosus succus. 148.
Pustulæ aquosæ vt curentur. 188	quem vsum habeant in her- pete exulcerato. 155
Pustulæ faciei curantur. 442	Repulsio. 40. in principio phle- gmones locum habet maxi- mè. 42. quando non vsur- panda. 17. 19
Pustulæ miliares in vlcus ab- euntes, quo modo trahan- dæ. 150	Resoluentia remedia. 305
Pustulæ rubræ, latæ & eminentes in crure & brachio. 451. quomodo dignoscantur & curentur. 451	Resolutio quando speranda. 46. quibus medicamentis promoueat. 241
Pustulæ solæ apparentes cura- tæ. 449	Retractio. 39
Putrefactio in tumore, quo- modo tractanda. 54	Rhasis emplastrum. 210. eius- dem medicamentum ad scir- rhos emolliendos & discu- tiendos. 324
Putridis consecrata medica- menta. 96	Rheumaticæ phlegmones cu- ratio. 54
Pyrites lapis. 326	Ricini oleum. 326
R.	Rogerii emplastrum. 265
R A P A R V M olei magna vis. 197	Roestgrans. 189
Reduiz exulceratæ quomo- do curentur. 494	Roesthous. 189
Refrigerantia quæ, & qualis eorum materia. 132	Rubedo magna, in modum serpiginis, & eius remedia. 166
Refrigerantia & humectantia pariter conueniunt in her- petibus exedentibus. 148	Rubor faciei innaturalis, quo- modo tollatur. 165
Refrigeratio quatenus vsur- panda in erysipellate. 131	Rubor Hauescens, ad tadium subterugiens, quid designet. 123
Regerentium materia. 148	Rustica, species impetiginis. 181
Regressionis & delitescentiæ indicia. 10	Rumpentia abscessum. 49
Repellentia communia. 18. propriè dicta. 18. 142. cali- da. 19. frigida. 18	Ruptorio non bene aperiantur abscessus. 11
Repercutere in quibus liceat,	Rustica à phlegmone magnâ curata. 36
	S.
	SABINVM oleum. 326
	Saire, pustula. 110
	Sanguinei tumores. 23
	Sanguinem adurentis. 328
	Sanguinis corrupti vacuatio. 94
	Sane

Sanguis quid, & quotuplex. 32	generetur. 319. prognostica,
bifariam degenerat à propria	& signa eius. 319. periculum
sua natura. 32. multis modis	eius, & incurabilitas. 319
aduritur. 463	Scirthus legitimus non exquisi-
Sanguisugatum usus. 73	tus, & eius aliquot exem-
Sapx vites. 227	pla. 320
Sarmentorum aqua. 407	Scirthus verus non exquisitus.
Saryialis. 360	316. exquisitus. 317. can-
Scabies 169. quid propriè sig-	crosus. 317. propriè dictus.
nificet. 184. eius differentix	317. qualis eius materia.
& species varix. 461. causx.	317. quomodo tractandus.
462. signa. 464. prognostica.	323. remedia. 321. 323. sig-
465. curatio eius. 467. 468.	na eius, & causx. 317
& seqq. varix eius species	Sclerosis. 314
curatx. 458. 469	Scolopomachxion. 408
Scabies diuturna seu inuetera-	Scrophulx seu Scrophulx. 109.
ta, eiusque varia exempla.	254
466. 479	Scrophulx curatx. 170. 171.
Scabies ex seroso humore què	172. & seq. in collo curatx.
curetur. 481. ex materia me-	285
lancholica. 483. ex pituita	Sectiones amplx in tumori-
falsa. 483. 484	bus, noxix. 22
Scabies feta. 178	Sectiones quando & vbi adhi-
Scabies humida curata in di-	bendx. 97
uersis. 479	Sclaa, quid. 251
Scabies sicca & eius exempla.	Sephiros Auicennx. 314
479. 455	Serpigo cur ira dicatur. 171.
Scabies suppis, fæda ac inuete-	causx, signa prognostica, &
rata. 479	curatio. 171. 172. 175.
Scabiosi qui maximè. 464	176. 178
Scabiosorum remedia varia.	Serpigo in crute, cum pustulis
477. 478. 458. 469. vnguen-	paruis erodentibus atque
ta varii generis. 480. 481.	fistulis, curata. 170
& seqq.	Serpigo vñctione curata. 389
Scalpello melius aperiuntur	Sideratio. 90. eius causx. 91.
abscessus, quàm ruptorio. 11	eius exempla. 101
Scarificatio. 40	Sideratum membrum confre-
Scirrhii qui propriè dicantur.	stum refecandum. 93
325. eorum curandorum	Simplicia sunt regula compo-
summa. 325. 326. 327.	sitionum. 292
Scitibus accommodata remedia.	Solani succus. 341. 348
324	Sphacelus. 90. eius signa. 92.
Sclerthosifumores. 309	prognostica. 93. remedia.
Scirthus duplex. 314. legiti-	94. 100
mus & illegitimus. ibid. ery-	Sphacelus, σφάκαλος Græcorum
sipelatodes, œdemarodes,	& eius exempla. 101. cura-
phlegmonodes. 317. verus,	tio. 104
non exquisitus. 316	Spina Auicennx, erysipelatis
Scirthus ex lapsu. 318	species. 116
Scirthus illegitimus quomodo	Spongix lixiuio imbutx vis.
	221 k 2 Spina

<i>Springer</i> diet.	159
Stratomaticus curati. exenpla.	195.
remedia varia.	198.
	299
Stectus bubulom.	407
Stectus capillum.	264
Sternutatoria.	292
Sternutatorium nobile & ex-	
petum.	241
Stigmata 437. quomodo de-	
leantur. ibid.	
Stigmata gynaeciorū.	325
Struma. 109. 255. eorum cau-	
sa, signa, prognostica, cura-	
tio. 270. & seqq. 276. 277.	
magnitudo & natura.	278
Strumæ cancrorū, seu carcino-	
des.	255
Strumæ Cornelii Celsi.	255
Strumarum curatio generalis	
& particularis.	188. 189.
	290. 291
Strumarum locus, multitudo,	
& ortus.	279
Strumas discutienda.	280
Strumas euellendi modus.	
281. 285. mundificandi mo-	
dos.	283
Strumis qui sint magis ob-	
noxii.	278
Sudamina seu hidraa curata.	
	188
Superciliorum depilatio vt	
piceaueatur.	389
Suppurantia medicamenta.	265.
Suppuratio. 22. in eâ septem	
attenuenda. 22. notæ eius.	
	10
Suxa inflammatio in absces-	
sum transmutata.	12
Synptomata quæ phlegmones	
curantem incipient.	35
Synptomatum mitigatio ma-	
ximè procuranda in phle-	
gmone.	52
	T.
TALPA, excrecentia, seu tu-	
mor pituitosus. 109. 251.	
	256
Tartari oleum.	429

Tempus quid influere.	160
Tendonum scirrhosorum cura-	
tio.	326
Terminthus, tuberculum. 69.	
in nate abortus, & curatus.	
	69
Testiculorum pruritus & im-	
pigo.	46
Testudo, excrecentiæ species.	
256. tumor pituitosus.	209
Teteris.	437
Terapharmacum.	20
Theodonich emplastrum ad	
strumas. 265. medicamen-	
tum. 221. vnguentum, dia-	
pomphorygos dictum.	348
Theodorus de Rijsk a phle-	
gmone curatus.	24
Thetiaca.	218
Thymi naturalium.	410
Thymion. 400. eius curatio.	
	407. 409
Tibiz vermiculorū aut impe-	
tigine afflicta quomodo cu-	
rentur.	187
Tibiarum circors vt tollan-	
tur.	189
Topica ad scabiem.	476.
in phlegmone.	59
Trochisci caustici.	96
Tubercula.	3
Tumores, præter naturam, &	
eorum differentia. 2. 3. 9.	
14. quomodo curandi vni-	
uersaliter. 15. 16. eorum ef-	
fectia tria in se continet. 14.	
methodus eos curandi. 231.	
in abcessum degenerantes,	
curati.	20
Tumores aquosi curati. 230.	
eorum cautæ. 231. 232. no-	
tæ. 232. qua parte maximè	
colligantur. 232. quomodo	
curantur.	232. 233. 234
Tumores biliosi.	215
Tumores cancrorū.	335
Tumores flatulenti. 225. quo-	
modo curentur.	225. 229
Tumores humorales, & eo-	
rum diuisio.	4

Tumores inæquales. 254
Tumores melancholici & eorum exempla. 308. 309. quatuor numero. 316
Tumores mixti, curati. 414. 415
Tumores puritiosi curati. 203. 204. 205. & i. qq. eorum octo differentiz. 211
Tumores sanguinei. 13. eorum differentiz. 31
Tumorum nova quædam apud recentiores nomina. 4. 209. signa & prognostica. 7. 8. tempora quatuor. 8. 9
Turbith. & eius polvis quem usum habeant. 259
Typha, eale triticum. 322
Tyria lepra. 361. eius signa. 367. quomodo curetur. 385
V.
VACUANTIA per alium an conducant in omnibus tumoribus præternaturalibus. 259
Vacuatio eius quod iam influxit. 40. 41
Vad. merum Gordonii, vnguentum ad pustulas. 452
Valerius Cordus Romæ mortuus. 379
Valel. i. arcanum, contra herpetem militarem. 158. experientia utrum in combustis. 195 historia, quo modo scriptum curaretur à panarino. 493. de quoviam inuentio mortui ex vnguento quo mundus fuerat. 478
Vall. 442. eorum causæ. 445. prognosi. 2. 446. remedia. 446. si fiant à cholera adusta. 447. si sint à melancholia adusta. 448
Variolæ. 147
Vasa magna incisa gangrænam inferunt. 95
Vena strumæ annexa quomodo tractanda. 283
Venz scdïo quem usum ha-

beat in gangrænâ. 94. in elephantiasi. 373. 374
Venenum aut venenatus spiritus si inflationem causet, quid faciendum. 218
Ventosa apostemata. 214. vide Apostemata.
Verruca quid. 399. eius species, causæ, & differentiz. 399. 400. prælagia. 410. remedia. 398. 405. 406. 407. 410. vbi quando possint. 408
Verruca fistilis. 400
Verruca in virgâ curata. 401
Verticillum plumbeum. 269
Vesicæ à combustione orarum curatio. 195
Vesicatio in combustione vet prohibeatur. 195. 198. vbi tollatur. 194
Vesicatus locus quomodo tractandus. 198
Vibices. 437
Vini, aceti & lizuii collatio. 218
Viperæ caro, & eius usus in elephantia. 377
Virgæ pruritus & impetigo curata. 416
Virgæ verruca curata. 401
Viri magis apprehenduntur leprâ, quam femine. 370
Virus atrox hepatis quæritur. 74
Vitellina bilis, & eius differentiz. 118. ex admixtione pituitæ. 148. ex metaca bile. 118
Vitiligo albus curata. 411
Vitiligo, & eius differentiz. 418. alba. 418. 421. curata. 418. 421. eius species tres. 418. causæ eius. 419. 420. signa, prælagia. 421. 422
Vlceratio à combustionem quomodo curanda aut prohibenda. 194. 195
Vlceri crustoso quid imponendum. 75
Vlceri in cute combusti quæ conducant. 199. 200
Vice-

Vlceris curatio in herpete. 149	Vnguentum mundificatiuum. 222
Vlcus inueteratum vt sanetur. 149	Vnguentum pincatum. 364
Vlcus omne exiccati vult. 149	Vnguentum Rondeletii, ad pforam, lichenes, & lepram Gtæcorum. 397
Vlcus quomodo in genere tractandum. 23	Vnguentum Rogerii. 263
Vnguentum ad canctos vlceratos. 348	Vnguentum tumori iam aperto imponendum. 23
Vnguentum ad omnes tubores & infectiones cutis ex cholera aut sanguine aut aliis humoribus simul mixtis. 177	Vngues contusi vt curentur. 494. 495
Vnguentum ad lepram, Amati Lustrani. 397	Vngues cruenti quomodo curentur. 495
Vnguentum ad morpheam, albas, & impetiginem. 429	Vngues scabii vt separentur, sine vlceratione. 495
Vnguentum ad pustulas. 452.	Vngues vt abscedant. 495
ad pustulas choleticas. 190	Vngulum vitæ & morbi quomodo curentur. 493. 494. 495
Vnguentum ad scabiem quamcumque. 452. 476. 477. 478. 480. & seqq.	Volatica quid? 180
Vnguentum Ægyptiacum. 266	Vrinam cientia. 259. 260
Vnguentum apollolorum. 222	Vitæ quid? 221
266	Vitio quando administranda. 75. 98
Vnguentum commune & simplicissimum, ad omnem scabiem. 484	W.
Vnguentum contra setpiginem. 177. 178	Wyna: Gerardi à duritie scirrhosa sub poplite curata. 308
Vnguentum ex chalciride. 281	X.
Vnguentum expertum, ad cocturam ignis vel aquæ. 209	Xiquet quid. 462
Vnguentum Gordonii. 177	Z.
	Zythepsa Delphenis sphacelo in pede correptus. 101



F I N I S.





